

دوا کا انتخاب

ترجمہ

سیلیکٹ یوریمیڈی

مصنف
ہومیوڈاکٹر داس پشمبر

مترجم

ہومیوڈاکٹر محمد عرفان
گدیپ جبین

عرفان پبلشرز چنیوٹ بازار فیصل آباد
فون نمبر ۲۳۸۱۲ — ۹۱۶۶۶۶ — پاکستان

دوا کا انتخاب

ترجمہ

سیلیکٹ یوریمیڈی

مصنف
ہومیوڈاکٹر داس پشتمیر

مترجم

ہومیوڈاکٹر محمد عرفان
گلدیپ جسن

عرفان پبلشرز چنیوٹ بازار فیصل آباد
فون نمبر ۲۳۸۱۲ — ۹۱۶۶۶۶ — پاکستان

نام کتاب ————— سلیکٹ یور رمیڈی (دوا کا انتخاب)

مصنف ————— ڈاکٹر بشمیر داس

مترجم ————— ہومیو ڈاکٹر محمد عرفان - کلیدیپ جین - عطا اللہ -

اشاعت اول ————— ۱۹۸۹ء

تعداد ————— ایک ہزار

صفحات ————— ۶۱۶

قیمت ————— ۹۰ روپے

پبلشر ————— عرفان پبلشر

چنیوٹ بازار - فیصل آباد - پاکستان

فون نمبر { ۲۳۸۱۲ / ۶۱۶۶۶۶ }

حرف چند

یوں کہنے کو تو کتاب کی جدید اشاعت پیش خدمت ہے لیکن دراصل کتاب کو از سر نو لکھا اور ترتیب دیا گیا ہے۔ بہت سے مفید اضافے کئے گئے ہیں۔ تحقیق طلب مسائل کو چھیڑا گیا ہے اور ایسے زاویوں اور گوشوں کی جانب راہنمائی کی گئی ہے جن پر بہت کچھ کہا اور سنا جاسکتا ہے۔

مجھے اس کا اعتراف ہے کہ کتاب میں خامیاں بھی ہوں گی۔ خواہ وہ زبان و بیان کی ہوں یا مواد و مضمون کی۔ یہ اس موضوع پر اردو زبان میں اولین کتاب ہے اور نقش اول بہر حال نقش اول ہی ہوتا ہے۔ اس میں خرد کی بخجہ گری بھی ہو کرتی ہے اور جنون کی پردہ داری بھی۔ البتہ اب کی بار جن نامساعد حالات، صبر آزما اوقات اور گراں بار اتفاقات میں یہ کام سرانجام دیا گیا وہ بجائے خود ایک ایسی داستان ہے جس کا تذکرہ آپ کے لئے دلچسپی کا باعث نہیں ہو سکتا، لیکن میری جراحت دل کیلئے سامانِ صدف ہر رنگ دان ضرور ہو گا۔ غم ہائے روزگار کو سہارنے کے ساتھ ساتھ ذہن کو اس طرف مبذول کرنا کوہِ کنی سے کم نہ تھا۔ لیکن اسکے باوجود رسوم و قیود کی سرگشتگی جاتی رہی، دوسرے فرائض کے ساتھ یہ کام بھی ہوتا رہا اور اس طرح تیشے کے بغیر مرنے کا لطف آگیا۔ اگرچہ آدھی رات کے چراغ جلے رہے اور وقت کو نہ جانے کن کن بہانوں سے نہ روکا گیا۔

ویسے کتاب اس اعتبار سے پھر رسمی طور پر ادھوری ہے کہ مجھے کسی دوست خصوصاً جناب ضمیر صاحب۔ صادق صاحب یا منظر صاحب کا شکریہ ادا نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ دبی زبان میں ناشر کا بھی شکر گزار نہیں ہونا جن کی شبانہ روز کاوشوں سے یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔

مخلص
ڈاکٹر محمد عرفان

فہرست

باب نمبر	تفصیل امراض	صفحات
۱	دماغی امراض۔	۱
۲	اعصابی نظام کی بیماریاں۔	۷۱
۳	آنکھیں اور نظر سے متعلق بیماریاں۔	۱۲۳
۴	کان اور سننے کی بیماریاں۔	۱۵۰
۵	ناک اور گلے کی بیماریاں۔	۱۵۸
۶	مسورھے، دانت، منہ اور زبان کی بیماریاں۔	۱۹۳
۷	چھاتی، پیچھڑوں کی بیماری اور کھانسی۔	۲۲۲
۸	دل اور خون کی نالیوں کی بیماریاں۔	۲۵۳
۹	نظام انہضام کی بیماریاں اور سپٹ۔	۲۷۳
۱۰	پیشاب کے نظام کی بیماریاں۔ عام پیشاب، مثانہ، گردے۔	۳۳۸
۱۱	آلات تناسل کی بیماریاں۔ عام بیماریاں، سوزاک۔	۳۶۶
۱۲	ہڈیوں، جوڑوں اور پٹھوں کی بیماریاں۔	۴۴۳
۱۳	جلد، بالوں اور ناخنوں کی بیماریاں۔	۴۶۷
۱۴	عام بخار۔ حمیات۔	۵۰۶
۱۵	متفرق۔ بیشی مرض۔ کمی مرض۔	۵۲۰

پہلا باب

دماغی امراض

دوبلہ سیریل ملک لائبریری
نمبر اضافہ 20518 تاریخ 1991
باب 219 ص 20518

دماغی امراض

دماغ کا غیر حاضر ہونا (بھولنا اور سوچنا بھی دیکھئے)

منکس ماسکٹا - جاگنے پر نہ جان سکے کہ کیا جواب دے اور کہاں ہے - بیخبر جیسے کہ مدہوش ہو۔
لیک کینیم - خریداری کرے لیکن ان چیزوں کے بغیر ہی چلا جائے۔ خط کو ڈاک میں ڈالنے جائے
لیکن خط ہاتھ میں لے واپس آجائے۔
بوروسٹا - پھپکاکی یا پتی اچھٹے میں غیر حاضری دماغ - سفیدی مائل اُبھارناش اور ہلکے بہراہ۔
اگنس کاسٹس - جتنی بے راہ روی یا جلق کے بعد پڑھنے اور خیالات کے تسلسل کو جاری رکھنے
میں دقت محسوس کرے۔

ایٹھوزا - سوچنے یا دماغ کی یکسوئی کے ناہل۔
سچرس کنٹرولرس - دماغی غیر حاضری - خواب دیکھنے والا - اپنی کار کے عوض غلط کار لیجانا۔
گالیال دینا - (غصہ بھی دیکھئے)

اینا کارڈیم - لعنت ملامت کرنا چاہے اور قسمیں کھانا چاہے۔ یادداشت جاتی رہے۔
ہائیوسائیمسٹ { ناراض ہوئے بغیر ہی گالیاں دینا چاہتا ہو۔ اگر پہلی دوائی اثر نہ کرے تب دوسری
لائیسین ۲۰۰ { دوائی دینا چاہئے۔ ایک ہفتہ میں صرف ایک خوراک ہی دی جائے۔
کالی آئیوڈینم - گالیاں دے۔ اپنے بچوں اور خاندان والوں کے لئے سخت اور بد مزاج۔
بلیڈمگ - شاید ہی اچھے الفاظ میں بات کر سکے۔ جب نرمی سے بھی بڑایا جائے تب بھی تیز اور سخت
آواز سے بولے۔ اس کے دوست بھی اس کو مطمئن نہ کر سکیں مذہبی خیالات کا جنون یا مذہبی مانچولیا۔
اسے راضی کرنا ناممکن ہو۔

الگو حلی۔ الفولیت (خواہش بھی دیکھئے)

زنکوس ملبوس :- شرابیوں کا جنون۔

کافیا۔ شراب نوشی کی وجہ سے سردرد۔ جیسے کہ سرمی کیل گاڑے جا رہے ہوں۔ کھل ہوا میں نیا قی
بے خوابی۔ بے اختیار نہیں اور زندہ دلی۔

انٹم کروڈ۔ شراب نوشی کے بعد کافی عرصہ تک جی تھلانا۔

کیسپیکم۔ صبح کے وقت کی تھ۔ معدہ کی قتل۔ ڈراؤنے خواب اور ہڈیاں۔

زنکم۔ تھوڑی سی مقدار میں شراب نوشی سردرد۔

کینتھرس۔ مریض پشیمانی کی حلیف اور جیسی برا بیگنہ کی کے ساتھ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔

اسام لیورہیم۔ شراب کی زبردست خواہش۔

ایوننا شایوا۔ اعصابیت اور بے خوابی۔ شراب کی خواہش دور کرتی ہے۔

سمی تی فیوگا۔ بخوابی دہشی دباؤ کے ساتھ اور بے ہوشی کے ساتھ۔

نکسوامیکا۔ انگوری شراب یا دیسی شراب سے اعصابیت تھوڑی سی آواز سے ڈر جاتا ہے۔

رات کو ڈراؤنی چیزیں نظر آئیں۔ یہ دیسی شراب کے اثرات کو دور کرتی ہے۔ جیسے کہ تیز معدہ

سرکارنا۔ بے ہوشی وغیرہ۔ حد درجہ رنگ کا چھان۔ گول یا خنجر بھونکنے سے خود کشی کا رجحان۔

ایو سائیم کینا بس۔ حد درجہ شراب نوشی کے لئے۔

ہائوساٹرس۔ مستقل ہڈیاں زیادہ بولنے اور بے خوابی کے ساتھ۔ بیاض تھہرنے یا روتے کیساتھ۔

کینا بس انڈیکا۔ پُر تشدد اور زیادہ باتونی خراب کی وجہ سے توہمات اور بدگمانیاں بھری ہوئی

چیزوں کے متعلق۔ وقت اور خلا کے متعلق وغیرہ وغیرہ۔ چہرہ سنا پتلیاں پھیلی ہوئیں اور جلدی

ہسینہ کا آنا۔

اوہیم۔ پرانے پانیوں کے لئے۔

سلفیورک ایسڈ۔ مزمن شراب نوشی کی بلند ترین درجہ کی تھوڑی سی مقدار خوراک بھی برداشت

نہ کر سکے۔ دھکی دلائے بغیر پانی نہ پی سکے۔ بلانڈی کی زبردست خواہش۔ بعض پتلا جھپٹوں والا اور

سُرمونیم۔ عادی شرابیوں کیلئے بہترین۔ ہر کونے سے اپنی طرف جانور آتے ہوئے دیکھے۔ اور ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ چہرہ سُرخ چمکدار۔ توہمت اور اہم۔

کونیم۔ تھوڑی سی شراب یا انگوری شراب پانی ملا کر پینے سے بھی مدہوش ہو جائے۔ کوکا۔ شرابی مشروبات کی خواہش۔

سفلینیم۔ کسی بھی صورت میں شراب کی خواہش۔ شراب کا درشتی رجحان۔

الیومنا۔ آسانی سے نشہ ہو جائے خواہ تھوڑی سی شراب پی جائے۔

لیکس۔ بد طبیعت لوگ بڑے بڑے جرائم کا رجحان رکھنے والے۔ مستقیم مزاج۔ حاسد۔ دوسروں

کا برا بھلا کرنے والے۔ اپنے آپ کو نہیں دوسروں کو مارنے والا۔ شراب نوشی سے پہلے اور شراب نوشی کے دوران میں بہت باتیں کرے۔

پیٹرولیم۔ بغیر طاقت کے تیلے والے، قوت ارادی نہ رکھنے والے۔ شراب کے گلاب کو دیکھ

کر انکار نہ کر سکے۔ تھوڑی زیادہ شراب پینے پر تے کرے۔ جب پی لے تو بہت بولے۔

آرمینیکم الیم۔ شراب کی پیاس، جوڑی کی دوائی بھیجے، اسے پہلے آزمانا چاہیے۔ تے کا رجحان۔

اور اس سہال کا بھی۔ شرابیوں کا بازوؤں کا کاٹنا۔

چائٹا آف۔ جو لوگ شراب چھوڑنا چاہیں، ان کی عادت کی اطلاع کے لئے ہر روز دن

میں دو دفعہ دس سے تین قطرے دیجئے۔ (نوٹ) مذکورہ بالا ادویات ہر صفحہ ۲۰۰ پوٹینسی

سے کم ہرگز نہ دیجئے (یا پھر جو لکھی ہوئی پوٹینسی ہو) حتیٰ اگر شراب کی خواہش مکمل طور پر دور

ہو جائے۔

غصہ۔ (رنخش بھی دیکھئے)

سٹیفسگریا۔ غصہ یا غصہ کے بعد اثرات کے لئے بہترین دوائی ہے۔ جذبات کے

دبنے سے زبان تنگ ہو جائے۔ جوڑی سے ایڑی تک کاٹنے۔ پنجابی۔ اپنے آپ کو قابو میں نہ

رکھ سکے۔ معمولی سی حرکت یا الفاظ جذبات کو مجروح کر دیں۔ جلد ہی غصہ میں مبتلا ہو جائے۔

لیکن شاذ و نادر ہی اسکا اظہار کرے۔

کیمو میلا۔ بچوں میں غصہ جس کے نتیجے کے طور پر اسہال۔ کھانسی اور تشنہ۔ لڑکا بچہ۔ بچہ ہرنٹ نئی چیز کی خواہش کرے لیکن پیش کرنے پر انکار کر دے۔ خادم کے چہرہ پر مارے۔ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کیلئے معمولی معمولی چیزوں پر آپس سے باہر ہو جائے۔ ہر مہرہ CM یا IM کی ایک خوراک دیجئے۔

آرم فولیٹم۔ جب غصہ کے اخراج کا موقع نہ پائے تو کانپے۔ کسی کو بے عزت کرنے کیلئے لڑنے کی کوشش کرے۔

بیوفو۔ اگر غلط سمجھا جائے تو ناراض ہو جائے۔

کالو سنکھن ۲۰۔ خاموشی سے جذبات کو ٹھیس پہنچنے پر برہمی (حادیہ ایوی) جو کہ شدید اعصابی درد کا باعث ہو، سر میں، آنکھوں میں، بڑی آنت اور اعصاب کے ساتھ تکلیف۔ کلکیر یا کارب۔ مباشرت یا بھلے کے بعد غصہ۔

نکس مار کاٹا۔ حمل کے دوران میں غصہ۔

آرم میٹ۔ { معمولی سے اختلاف رائے سے غصہ۔
نکس وایکا۔ }

آئیوڈم ۲۰۰۔ شدید غصہ، جو بھی نزدیک آئے اسے قتل کرنا چاہے۔ جب اپنے آپ میں ہو تو خوشی محسوس کرے۔

ہیپر سلف۔ لڑکا اس سے نباہ کرنا مشکل ہو۔ کوئی چیز خوش نہ کر سکے۔ انہماک اور جگہوں کیلئے بہت زیادہ حساس جو اس کو پسند نہ ہوں۔ مستقل طور پر انہماک۔ چیزوں اور ماحول کو تبدیل کرنا چاہے لیکن تبدیل شدہ چیزوں سے بھی ناخوش اور شدید مزاج ہو۔

کالی آئیوڈ۔ شدت کی تنگ مزاجی۔ ظالمانہ اور تند مزاجی کا سلوک اپنے خاندان والوں سے اپنے بچوں اور دوسروں کے ساتھ، گالیاں دینے والا۔

نیرم آریکیم۔ معمولی چیزوں سے غصہ۔

کروکس ٹائیوا۔ شدت کے ساتھ غصہ جس کے بعد پھپھٹائے۔

جھنجھلاہٹ - (غصہ بھی دیکھئے)

سٹیف سگریہ - ۲۰۰ - تھوڑے سے الفاظ جو غلط محسوس ہوں، غصہ اور برہمی پیدا کریں۔ جو لوگ خیالی برہمی کا باعث بنیں ان پر چیزیں دے مارنے کی زبردست خواہش۔
 کوکوس انڈیا - تھوڑی سی گرد بڑبڑہی کا سبب بنے۔
 آرمینیکم الیم - شور یا روشنی کی وجہ سے غصہ آئے۔
 کوئم - معمولی باتیں غصہ کا باعث بنیں۔

ٹیو برکولینیم - ٹیڑھا اور بد مزاج بچہ پٹوں کو درد بھینک دے، دوسرے بچوں سے بغیر کسی وجہ کے گستاخ ہو۔ چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہ ہو۔ غصے کا خوفناک طوفان۔ شدید غصہ اور بلند آواز سے روئے جو ضبط نہ ہو سکے۔ دو ماہ تک ہفتہ وار ایک خوراک، اگر ضرورت پڑے زیادہ دیکر دی جا سکتی ہے۔
 فامفورسٹ - دخی غصہ، بد مزاجی کا طوفان ذہنی اور جسمانی طور پر سکول میں بچوں اور اساتذہ کے ساتھ لڑے۔ قابو میں نہ آنے والا بچہ جب غصہ میں آئے اپنے کو غلغلہ میں بند کر لے۔ آسانی سے ڈر جائے۔ ڈر کی وجہ سے کانپے اور ہلے۔ اندھیرے ڈرے۔ ذہنی تپتلی جو بصورت جلاہت۔
 ایکولس - جلدی سے آپے سے باہر ہو جائے۔ لیکن آہستہ آہستہ قابو پالے۔
 (دیکھئے ڈر، اندیشہ، دوسرہ، پریشانی)

نفرت

انیشیا - دل لگی۔ تمباکو کے دھوئیں اور تمباکو نوشی کو برداشت نہ کر سکے۔
 سیپیا - خاندان کے افراد۔ کاروبار اور اپنے پیشے مخالف جنس سے نفرت۔ زود درنج سبب رضی تھکا ہوا۔ اندھیرے میں الگ رہنا چاہیے۔ میر سے نفرت پیدا ہو۔
 پلاٹینا - سبکدوشی وجہ سے اپنے گھر کے افراد اور دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو اعلیٰ دارفع خیال کرے۔

پسٹیل - عورتوں سے، جماعت سے، شادی۔
 کیڈم سلف - ذہنی یا جسمانی کام کرنے سے نفرت۔

ایکونامیٹ نیپلس - گلنے کیوجہ سے رونا آئے یا گانا ملے۔

گریفائٹس - گلنے سے نفرت۔

ریفینس - عورتوں میں مخالفت صفت سے نفرت۔

نکس و امیکا - بدبھی کیوجہ سے کام سے نفرت - اگر وہ کام کرے تو غلط کرے۔

پلمبیم - کام سے نفرت جب مزمن پیش ہو۔

سائیکیمین - بدبھی میں کام سے نفرت - گوشت سے نفرت - روٹی، نمک اور بیئر شراب سے نفرت۔

نیٹرم میور - روٹی چربی ادرامی سرانہ خوراک سے نفرت۔

لیک - ویک - ڈیفیلو - دودھ - آدمیوں، عورتوں اور بچوں سے نفرت - دودھ پنی سکے کیونکہ یہ

انہیں بیمار کر دیتا ہے - لوگوں سے ملنے اور ان کے ساتھ بولنے سے نفرت، دودھ پینے سے مراد۔

گلونائن - خاندان سے نفرت۔

چلیڈونیم - کام کرنے یا کھانا کھانے کی حرکت کرنے سے نفرت - پیسے سے نفرت۔

آجنٹم ٹائیریکیم { محزن و ملال میں کام کرنے سے نفرت - اگر پہلی دوا مدد نہ کرے تو

لیکسس { دوسری دوا آزمائی جاتی جائے۔

ایسڈ تھیور - خاندان کے افراد اور بہترین دوستوں سے نفرت - گھر سے دور جانے کی خواہش۔

عباش نش آدمیوں میں کینیز پن جنسی بے راہروی کی وجہ سے۔

کونیم - کام کرنا نہ چاہے کھیل کو ترجیح دے

کاجو پٹم - اگرچہ دوسروں کی بات سننا چاہے لیکن بلایا جانا پسند نہ کرے - جن کتابوں کو عام طور

پر پڑھتا ہو ان کو اندر سے دیکھنا نہ برداشت کرے - اپنی ہی صفت کی مجلس سے نفرت۔

نیٹرم کارب - زیادہ مطالعہ کیوجہ سے کام نہ کر سکا - دودھ سے نفرت کیونکہ گرلی پیا جائے تو

اسہال لاحق ہو جائیں۔

پکرک ایسڈ - شادی سے نفرت - شادی کا خیال ناقابل برداشت۔

کالی فیکر ویکم - گوشت سے نفرت - بچڑھا پن کے ساتھ۔

کوکولس - کھانے اور پینے سے نفرت -
 کلکیر یا کرب - بھوک کم، گوشت سے نفرت کے ساتھ اور اُبے اندوں کی زبردست خواہش -
 ایسڈ ٹائٹرک { گوشت کا دیکھنا یا خیال کرنا ہی برداشت نہ کر سکے -
 ایسڈ میور { گوشت سے نفرت -
 لائیکوپوڈیم - کافی اور گوشت سے نفرت - ان کو لینے سے نفرت ہو -
 وریٹریم ورائیڈ - مٹھائیوں سے نفرت - پانی کا ذائقہ بھی میٹھا معلوم ہو -
 ابرو ٹینم - سوکڑے کپے پتوں میں دودھ سے نفرت، جو دودھ میں اُبلے ہوئی روٹی کے بے حد
 مشتاق ہوں، اپنی بھوک مٹانے کے لئے -
 الیونٹا - آلودوں سے نفرت جراثیم زائیں - گوشت سے نفرت جس کا کوئی ذائقہ محسوس نہ ہو یا
 بیر شراب سے نفرت -
 الیو منافاس - قریب بیٹھنے سے یا مجلس میں بیٹھنے سے اور جواب دینے سے نفرت -
 انٹرمٹارٹ - دودھ سے نفرت جو کہ مریض کو بیمار کر دے - متلی اور تھے لاحق ہو - ہر قسم
 کی غذا سے نفرت -
 اوسیم - کافی یا تمباکو سے نفرت - ان کی بو سے کراہت اور تنفر -
 پٹرو لیم - چربی غذا سے، گوشت، کھلی ہوا سے سخت نفرت، گویا کھانے سے زیادتی ہو -
 کیمو میل - کافی، گرم مشروبات - شور پے اور مائع غذاؤں سے نفرت -
 سیلشیا - والدہ کے دودھ سے نفرت جب بھی پیا جائے تے کر دے -
 میگنیٹ پولس آسٹریس - بات چیت کرنے سے نفرت -
 اپیکاک - ہر قسم کی خوراک سے سخت نفرت اور ناپسندیدگی -
 کاربوئیج - قابل ہضم اور اچھی خوراک سے نفرت - کافی اور کھائیوں کی خواہش -
 سٹرونیوم - مائعات سے نفرت، پانی کا ایک گھونٹ بھی جباس کے ہونٹوں کے قریب لایا
 جائے تو سخت تشنچ پیدا ہو جائے - مائع صرف مشکل کے ساتھ ہی گلے کے اندر اتاری جائے -
 گرائڈیلیا - اندھیرے سے نفرت، تمام رات کمرے میں روشنی جالتے -

ٹرنٹولا ہسپانیولا۔ گانے سے حساس بوہنی گانا سننے وہ کود جائیگی اور ناچنا شروع کر دے گی۔
 تھریڈ لیون۔ شور سے نفرت۔ ہر آواز پر تمام جسم میں داخل ہوتی محسوس ہو۔ متلی اور چمک کا ہوش۔
 دانتوں میں آواز داخل ہو۔ آنکھیں بند کرنے پر زیادتی ہو۔
 ٹیوٹر کو لینم۔ ہر قسم کی خوراک۔ گوشت جس کو کھانا ناممکن ہو۔

ذہنی تھکان ، وپریشان ، اعصابی کمزوری ، گرٹھنا ،

ایسڈ فاس۔ اپنی حالت گرٹھنا۔ محبت میں ناکامی پر گرٹھنا۔
 اگنیشیا۔ تصوراتی تلخ واقعات اور تسکالیت پر گرٹھنا یا پریشان ہونا۔
 نکس وایکا۔ مقدر سے باری پر پریشان ہونا جس کا ابھی فیصلہ ہونا ہو۔
 لیومنگ۔ تھکا ماندہ ، پھلانا بیٹھے سکے لیکن پریشان ہو اور ماضی کے متعلق بہت سوچ بچار کرے۔
 در میٹرم البم۔ خاموشی میں پریشان ہو یا گرٹھے۔
 جلیسیم۔ بچے کے گم ہونے پر متواتر پریشان۔

دھوکہ دہی - (دیکھئے دھوکہ)

غیب دانی۔ آئندہ ہونے والے واقعات و حالات کی پیش گوئی کرنا۔
 آئیوٹم۔ چوٹی کی دوائی ہے جب رلیف یا گل ہونے کے قریب ہو۔ بغیر کسی وجہ کے تشدد پسند۔
 جینزوں کو پیٹنا اور تباہ کرنا۔

لائئ سین۔ کہے کہ کلاک یا گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتا ہے جو کہ نظر کے سامنے بھی نہیں۔
 کہے کہ فلاں آدمی جو کہ اس کی نظر میں نہیں کہاں بیٹھا ہے۔
 اینکونائٹ نیپس۔ کہے کہ اس کی محبوبہ جو کہ میلوں دور ہے فلاں خاص گیت گاتی ہے۔
 فاسفورس۔ بہت کم حوصلگی۔ ڈرے۔ آسانی سے ناراض ہو جائے۔ پیشین گوئی کی حالت میں۔
 اگر کیس میکرس۔ شعر کہنے کا رجحان اور پیش گوئی کرنے کا رجحان۔

رفاقت یا صحبت، نفرت

- کالونٹھس - دوستوں سے نفرت ان سے دُور رہنے کی کوشش کرے۔
 کیٹس - ہسٹریا میں۔
 کونیم - حیض کے دوران میں رفاقت سے نفرت لیکن ایسے رہنے سے ڈر۔
 نیڑم میور - حمل کے دوران میں۔
 کیورم میٹ - دمد کے دوران۔
 بیوفو - رفاقت سے نفرت تاکہ جلتی یا ہتھوڑی کر سکے۔
 اگنیشیا - اعصابی مریضوں میں۔
 کاجوٹم - اگرچہ قدرتی طور پر شرمیلا ہو مگر توں کی رفاقت میں اچھا محسوس کرے۔
 آدمیوں سے بات چیت کرنا نہ چاہے۔
 پائٹیل - مخالف صنف کی رفاقت سے نفرت جسے ذہنی طور پر خطرناک خیال کرے۔
 لائیکو پوڈیم - رفاقت سے نفرت لیکن قریب والے کمرے میں کسی کی موجودگی چاہے۔
- ## خواہش

- آرم میٹ - دل کی بیماریوں میں۔
 کونیم - ہسٹریا میں۔
 سٹراٹونیم - پاگل پن میں روشنی کی خواہش۔
 آرچنٹم ٹائیٹریٹیم - اپنی بیوی یا بچے کو رفاقت کیلئے جگائے - اکیلا رہنے سے ڈرے۔
 آرسینکیم الیم - رفاقت چاہے جو کہ اس کے ڈر کو کم کرے۔
 بیکسونی - (دیکھئے - سوچنا - اور بھولنا) - اعتماد کی کمی۔
 اینا کارڈیم - اپنے آپ میں - پاگل پن جس میں اعتماد کی کمی۔
 لائیکو پوڈیم - ہسٹریا میں - معالجوں اور علاجوں پر بے اعتمادی۔
 آرم مرڈ - خیال کرے کہ اس کے لئے ان معالجوں کے پاس دوائی نہیں ہے - اور یہ بات اسے غمزدہ کر دے۔

ذہنی تھکان

سلفر - صبح کے وقت جاگنے پر
ایک کیلوس ہپ - ذہنی پریشانی کے ساتھ جاگے۔ پریشانی میں کمرے میں ہر طرف دیکھے۔
متیر، لوگوں کو نہ جانتا ہو۔ حیران ہو کر وہ کہاں ہے اور جو چیزیں وہ دیکھ رہا ہے اس کے کیا معنی
ہیں۔ بہت زیادہ غمی۔ تنگ مزاجی۔ یادداشت کا نہ ہونا۔ اور کام سے نفرت۔ مطلوب چیزیں
حاصل نہ کر سکنے پر غمی۔

زنکم۔ اعصابی امراض۔ سرخ بخار یا گرمی کی تکالیف سے دماغ متاثر ہو جائے۔

بیسلاڈونا۔ ہڈیاں کے بعد۔

لیکس۔ دُفقیر یا میں۔

نمبو امیکا۔ کھانا کھانے کے بعد پریشانی اور ذہنی دباؤ اور بہت کم جسمانی کام سے۔
کالی بروم۔ مایہ نولیا۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے عقل دھوکش کھو دینے کا احساس۔
جلیسیم۔ مخلوق میں۔ ہتھکڑی کرنے والوں میں۔

سٹر موٹیم۔ آدمی رات کے بعد پریشانی میں اٹھنا اور اُدھر اُدھر پریشانی میں چلنا پکڑ کر کیا تھک پریشانی۔
پیکرک ایرٹ۔ ذہنی تھکان کوٹھڑی یا پُشت میں درد۔ گردن کے حصے میں۔ ادنی لوگوں اور
اساتذہ کی ذہنی تھکان۔ قوتِ ارادی کی کمی۔ بولنے یا سوچنے یا دماغی کام کرنے سے نفرت۔
وہ چیزوں میں دلچسپی کھو دیتا ہے۔ کسی بھی دماغی کام سے مشغول ہو جاتا ہے۔

پٹرولیم۔ ذہنی تھکان اور جگر۔ اُٹنا بدحواس ہو کر گلی میں اپنا راستہ بھول جائے۔ خیال
کرے کہ اس کے قریب اور لوگ بھی ہیں جبکہ کوئی بھی نہ ہو۔ اس کے دوبرے بازو ہیں۔ اس
کے ساتھ بستر میں کوئی دوسرا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ ہونے کے خواب دیکھے۔

کلکریا کارب۔ ذہنی تھکان، سوچ نہ سکے۔ ڈرے کہ ناخواستہ ہے۔ ناکامی کا درد۔

انڈرونی تناؤ۔ عزت نفس کے مجروح ہونے پر افسردہ

گوکا۔ ذہنی اور جسمانی دباؤ تلے کمزور ہونا۔ یا قیلے ہونا۔

ایلیم سپیا۔ شراب کے بعد۔

ایومنا۔ ذہانت کی تھکان۔ فیصلے پر اثر انداز نہ ہونے کے۔ قوت فیصلہ صدمہ مریم۔ جانی پہچانی چیزیں یا جن کو جانتا ہو، انہیں غیر حقیقی معلوم ہوں یا ان کے متعلق شک کر دوں میں یا کہ نہیں۔ امبر اگریسا۔ ذہنی تھکان۔ ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف چلے جانا۔ ایک مال بچھے جواب کا انتظار کیے بغیر دوسرا بچھے۔ ایک موضوع سے دوسرے موضوع پر چلا جائے۔ قبل از وقت پڑھایا۔

ہائیڈرو سائینک لیڈ۔ دماغ پر بادل چھائے ہونے کا احساس۔ سینٹورائیگنا۔ احمق پن دماغی ابتری۔ کسی ایک چیز پر دماغ کو مرکوز نہ کر سکے۔ ایک چیز کو ترک کرے اسے نامکمل چھوڑ کر دوسری چیز کرے۔ آہستہ آہستہ دماغ کو مرکوز نہ کر سکے۔ یادداشت کھو بیٹھے۔ پریشانی محسوس کرے کہ اپنا کام نہ کرے گی۔ بدگمانی کرے کہ اس کا خاوند اسے پاگل خانے بھیج دے گا۔ غلط بس یا غلط گاڑی پر سوار ہو جائے یہ نہ جانتے ہوئے کہ کہاں جا رہی ہے جب صحیح راستے پر جانے کو صحیح جگہ پر سے اترے بغیر گزر جائے۔

ڈولکا مارا۔ ذہنی الجھاؤ کسی چیز کے لئے صحیح لفظ نہ مل سکے۔ ایسٹنک لیڈ۔ ذہنی الجھاؤ، اپنے کچھوں ہی کو نہ پہچانے۔ تازہ واقعات کو بھول جاتا ہے۔ ذہنی کوفت کے دورے۔ چڑچڑاپن۔ خیال کرے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ ایگریس میکس۔ بیوقوفانہ اور نہلمی باتیں کرے۔ نامناسب موقع پر گاتا ہے اور ریشیاں بجاتا ہے شعرا و پیشین گوئیاں کرے یا مخالف سمت میں بھول کر جائے۔ اپنے ماحول سے لاتعلقی ہو، خود سر مندی اور متکبر۔ بیوقوف۔ بد وضع اور بے ڈھنگا۔

اینا کارڈلم۔ دماغی کمزوری اگر مکمل طور پر فائر العقل نہ ہو۔ آہستہ آہستہ سوچے۔ یادداشت کمزور کمزور۔ غمی اور دماغی سستی۔ متلون مزاجی ٹھیک یا غلط فیصلہ نہ کر سکے۔ جھکچکائے اور کچھ نہ کرے۔ کینا بس سٹانیوا۔ اپنی شخصیت کو کٹھنڈ کرے۔ دماغی الجھن کے ساتھ جگر۔

سکون و ادھر۔ دیکھتے ہو گھنے کی اور تمام دھڑکی حسیات درم برہم اور گھوٹ۔ اپنا گھر اور جانی
بہیانی جگہیں اور چہرے عجیب و غریب معلوم ہوں۔

سلیشیا۔ طالب علموں، وکلاء اور پادریوں میں ذہنی تھکان۔ مستقل کوششوں سے اپنا
کام مکمل کرنے کے لئے شب بیداری کی وجہ سے۔

دلجوئی۔ دلاسا

نیرم میوڑیکم۔ غمناک اور رونے والی حالت۔ دلجوئی کرنے پر زیادتی ہو۔

لیٹم گونیم۔ رحم کے جنوں میں دلجوئی کرنے پر زیادتی۔

پسٹیل۔ مریض کی دل جوئی کرنے پر مرض میں اتنا دھوس کرے۔

اگنیشیا۔ سیرٹائی مریضوں میں دلجوئی کرنے پر علامات مرض میں زیادتی ہو جائے۔

سپیا۔ قبض کے ساتھ یکریا میں دلجوئی کرنے پر علامات مرض میں زیادتی ہو جائے۔

کافیا۔ دلجوئی نہ کرنا چاہے اور اکیلا ہی اپنی سخت بُری حالت سے لطف اٹھائے۔ خوش طبعی

کرنے پر ناراض ہو جائے یا اسے خوش کرنے کی کوشش پر ناراض ہو جائے۔

سیبل سر۔ ہمدردی اسے ناراض کر دے۔

تردید!

آرم میٹ۔ تردید سے تکلیف لاحق ہو جائیں۔

لائیکو پوڈیم۔ تردید کو برداشت نہ کر سکے۔

کافیا۔ تردید سے سہ درد لاحق ہو جائے۔

فیرم میٹ۔ تردید کو برداشت نہ کر سکے۔ لڑاکا۔

زبردست خواہش۔ دیکھیے خواہش۔

موت۔ بختمہ یقین۔

بیشیا۔ ٹائیغائیڈ بخار میں۔

ایکس - تنگی تنگی میں -
 سورائیم - ٹائیٹائیڈ بخار لیکن ناک سے خون نکلنے پر افادہ -
 کیمفورا - تبخیر معہ میں -
 آپس - دل کی طبعی بیماریوں میں -
 کافیا - درد زہ میں
 ایجنائیٹ نیلس - حمل کے دوران میں موت کے ڈر کے ساتھ -
 ہیلی بورکس ٹائیگرا - موت کے ڈر کے بغیر موت کے دن کی پیش گوئی کرے -
 ڈر

ایجنائیٹ نیلس - حمل کے دوران میں موت کا ڈر - موت کے دن اور وقت کی پیش گوئی
 کرے، یقین ہو کہ اس کی بیماری مہلک ثابت ہوگی -
 ڈیجیٹلس - دل کی بیماریوں میں -
 نکس و امیکا - خودکشی کا رجمان - لیکن منہ سے ڈرے -
 الیومنا - موت کا ڈر، خودکشی کے رجمان و خیالات کے ساتھ -
 کالی فاس - زندگی کی تھکاوٹ کے ساتھ -
 وریٹرم البم - ہیضہ میں ماتھے پر ٹھنڈے پسینوں کے ساتھ -
 کوکولس - موت کا ڈر اور نامعلوم خطرے کا ڈر -
 اوپیم - سر پکھڑی موت کا ڈر - ڈر اور وحشت کے اظہار کے ساتھ -
 آرسینکیم البم - جب اکیلا ہو تو اچانک موت کے آنے کا ڈر -
 اکیٹا سپائیڈیا - موت کا ڈر خاص طور پر رات کے وقت بستر میں -
 خواہش

آدم قول - خوشی کیساتھ موت کی خواہش کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں ہنسنے کے قابل نہیں ہے -

آرم میٹ۔ مستقل طور پر خودکشی تیز ہوا ہو ذہنی خرابی کی وجہ سے بہت زیادہ غم خیال کرے کہ وہ کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہر کام کو غلط طریقہ پر کرے۔ ناامیدی ایسے زندہ رہنے پر راضی نہ ہو۔ خیال کرے کہ اس دنیا کے لئے موزوں نہیں۔

دھوکہ دینے والا

پلیم۔ دھوکہ اور غریب دینے کا رجحان۔ آہستہ سمجھے، قبض، بیماری کا بہانہ بنانا۔ اپنی تکالیف کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔

کوکا۔ صبح اور غلط کی تمیز اٹھ جائے۔ چڑچڑا۔ علیحدگی اور تدریک میں خوش۔
آرٹھریٹس۔ ڈیپلوک اور اعصابی۔ غشی اور کانپنے کا احساس۔ دھوکہ دینے کا رجحان۔
کاسٹیکم۔ دھوکہ دینے کی خواہش رٹائی کے رجحان کے ساتھ۔ ناحق پریشان۔ توہم پرست
قریب نظر۔ ادراک۔ موہم پیکر۔ اندیشہ

سٹریمونیم۔ جانوروں کو دیکھنا، سیاہ کتے وغیرہ (ان علامات پر غم و غنا کا علاج بھی کرتا ہے)۔
ایٹھاپ۔ کوہرا عکس کرنا۔ لمبا اور ایک حصہ گم محسوس کرنا۔ اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی چیزیں علیحدگی اور انداز پر برداشت کر سکے۔ روشنی اور کسی کی موجودگی ضروری ہو۔ بھوت دیکھے اور رتوں کی آوازیں سنے اور ان سے باتیں کرے۔ ایسے محسوس کرے کہ ٹھیکوں کا بہت بڑا چھتہ اس کا بچھا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جھوڑوں کا جلوس۔ اور اس کے بعد کا درجوں کا بہت بڑا اکٹھ رنگ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اپنی اطراف ڈرا دنی تصاویر اپنے سامنے کے مقابلے میں حقیقت گت لگائے اور نمش باتیں کرے۔ غریب نظر اور ہڈیاں۔ تیز آواز۔ بھونکنے کی گوشش کرے یا کاٹنے کی گوشش کرے چیزوں کو غلط نام سے پکارے۔ بوسٹہ لکڑی کی گیلیاں محسوس ہوں۔ اس کے سونے کا کرہ اصطبل کی طرح۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھے۔ وعظ کرے۔ پیشین گوئیاں کرے۔
کلورلیم۔ رات کو سخت خوفزدہ۔ پادریوں کے خواب دیکھے۔ اندھے میں یا آنکھیں بند کرنے پر آوازیں سنے۔

لیک کینیم۔ سانپوں کے توہمات۔ خیال کرے کہ وہ ان میں گھرا ہوا ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے

دُورے کرنا پکا کٹکا میں گئے۔ اپنے آپ کو میں چلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اذیت دینے والے خیالات باتوں میں حقیقت نہ ہو۔ مجھے جو کچھ وہ کہہ رہی ہے بھڑپ ہے۔ وہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ اسکی مرضی یا خصوصیات نہیں۔ کسی اور کی ناک پہنے ہوئے ہے۔

سبا ڈیلا۔ اپنے جسم کے متعلق غلط معلومات، جس طرح پیٹ ہوائے بھولنے پر اپنے آپ کو حاملہ پلاٹینم۔ تکبر اپنے آپ کو بہت بلند خیال کرنا۔ خیال کرے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ خیال کرے کہ اس کا جسم دوسروں سے لمبا ہے۔ مغرور و خود دوسر۔

کیمفر۔ ہر بلنے والی چیز بھوت معلوم ہو، مگرے کی بے جان چیزیں زندہ معلوم ہوں اور اُسے ڈرائیں۔ بہت زیادہ اعصابی۔ اجنبیوں اور اندھیرے سے ڈرے۔

کلیریا کارب۔ جو لوگ حاضر نہیں ہیں ان کو دیکھے اور ان سے باتیں کرے۔ خیال کرے کہ وہ کتوں سے گھری ہوئی ہے۔ ہر کام سے نفرت۔ غلگین اور اداس۔ دُورے پر اور زندگی سے طرز۔ ایلینتھس۔ محسوس کرے کہ چوٹیا کوئی چیز بازو یا جسم پر رینگ رہی ہے۔

اینا کارڈیم۔ مریض اپنے آپ کو اچھائی اور بُرائی کے درمیان پاتا ہے۔ اس کی باہر کی قوت ارادی اس سے برائی کا کام کرنا پہلے ہے۔ لیکن اس کا ضمیر ایسا کرنے سے روکے۔ فیصلہ نہ کر سکتا۔ ایک لمحہ سوچے کہ ایسا ہے اور دوسرے لمحے بہت سے دلائل سوچے کہ ایسا نہیں کم حوصلہ۔ بدل دُورے کہ کوئی اس کا بچھا کر رہا ہے۔ چوروں کی تلاش کرتا ہے۔ دشمنوں کی توقع کرتا ہے۔ ہر چیز اور ہر کسی سے خوف کھاتا ہے۔ اس کی بُری فطرت بغاوت اور بے انصافی پر گراتی ہے لیکن اچھی فطرت روکتی ہے اور بُرائی ہے (ایمو سائٹس۔ بیلا ڈونا۔ اور سٹراٹونیم بھی دیکھئے) بہنوں اور والوں کی آوازیں سننے جو کہ بہت دُور ہوں۔

ہیلی بوریس ناچیکرا۔ جسم اور ذہن کا بیوفانہ اور سست رویہ۔ مدہوشی جس سے کہ بہت قوت سے اٹھایا جائے تو واردات کے متعلق باتیں کرے اور کہے کہ وہ سینگوں اور مگوں والے شیطان دکھاتا ہے۔ دہم بے بنیاد۔

کاشیکم۔ مجروح ضمیر جیسے کہ عورت نے جرم کیا ہو۔
فریم ایڈوڈم۔ جیسے کہ جرم ۲۰ فٹ اونچا ہو گیا ہو۔

پیشیا۔ محسوس کرے جیسے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا ہے۔

کیو میلا۔ غائب لوگوں کی آوازیں سُنے جو اس کی نیند خراب کر دیں یا نیند میں خلل ڈال دیں۔

زخم میٹ۔ اپنے اندر سے آوازیں بولتی محسوس ہوں۔ کالی گھوڑ اور گندی زبان بولیں۔

میلا ڈونا۔ ڈراؤنے چہرے اور دیو دیکھے۔ مارتا ہے اور کاٹتا ہے۔ مریض اس وقت اپنے آپ کو یا کسی اور کو زخمی نہیں کرتا جب تک کہ وہ ایسا اپنے فطریہ کیلئے صحیح تصور نہ کرے، جو کہ وہ اس کی فطریہ کے خلاف مریض اس پر حملہ کرے گا۔

پسائیجلیا۔ پریشان اور اعصابی مریضوں کیلئے۔ اُسے سے استعمال سے گریز کرے کیونکہ مستقل طور پر کھانا کھانے کی خواہش رکھتا ہو۔ کھانا کھانے کے کانٹے سے خودکشی کی خواہش۔ کھانے کی میز پر تیز اور نوکدار اشیاء سے ڈرے۔

تھو جا۔ احساس کہ زندہ بچہ پیٹ میں ہو۔ جسم کو تھلا اور نرم دنازک محسوس کرے۔ آسانی سے ٹوٹنے والا جیسے کہ شیشے کا بنا ہوا ہو۔

کینا بس انڈیکا۔ جگہ اور وقت کے تعین میں غلطیاں کرے۔ مریض محسوس کرے کہ اس نے پچھلے چھ ماہ سے خوراک نہیں کھائی۔ اگرچہ اس نے ابھی ابھی کھانا کھایا ہو۔ ایک میل کا فاصلہ بھی سو میل معلوم ہو۔ نامکمل خیالات سے ذہن بھرا ہوا ہو۔ گینڈو اور ہاتھیوں کا پیچھا کرنے کے توہمات۔ تصور کرے کہ وہ بہترین گانا سُن رہا ہے۔ آنکھیں بند کرے مزید خیالات اور خوابوں میں کھو جائے۔ تصور کرے کہ وہ ایک وسیع و عریض جگہ میں بغیر جسم کے رہ رہا ہے۔ جسم پھیلنا ہوا محسوس ہو اور سر کی کھوڑی، آسمان کی عراب سے بھی بڑی محسوس ہو۔ ہر چیز غیر حقیقی معلوم ہو۔ اپنے آپ کو بھی غیر حقیقی محسوس کرے۔ سارے خیالات بہت بڑھے چڑھے معلوم ہوں۔ آوازیں اور بہت ہی بہترین گانے سُننے۔ خوبصورتی اور مشہوری کے تصورات جن کا مقابلہ صرف بہشت ہی میں ممکن ہے۔

آر سیکنگ الم۔ گھر کو مکھیوں سے بھرا ہوا محسوس کرے۔ ان کی تلاش میں گھر میں دوڑے۔ یا ان کے ڈر کے مارے گھر میں چھپ جاتے۔

سکوٹا اور دوسا۔ محسوس کرے کہ عجیب و غریب جگہ اور غیر عام حالات میں رہ رہا ہے۔
 ہر چیز عجیب و غریب اور تقریباً ڈرانے والی معلوم ہو۔ انسانیت سے حسد یا بغض۔ اپنے
 دوستوں سے ان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے دُور بھاگے۔
 دسکم الیم۔ تویم، جیسا کہ جسم کا اوپر والا حصہ اُڑ رہا ہے۔
 کوکولس۔ کسی چیز کے دیواروں۔ کرسیوں، فرش اور دیگر جگہوں پر ریگنے کا دم اور وہ
 اس پر بھی ریگنے لگی۔

ہائیوسائیمس۔ تصوراتی لوگوں سے باتیں کرے، جیسے کہ وہ اس پہلو میں بیٹھے ہوئے
 ہیں، مری ہوئی ہوئی، ہمشیر یا خاندان سے باتیں کرے۔ جیسے کہ وہ دوبارہ زمین پر ہوں خیال
 کرے کہ چیزیں کیڑے مکوڑے ہیں، ہزر ریاں کیڑے مکوڑے، چوہے، بلیاں اور بھوٹی
 چھمیاں ہیں۔ محسوس کرے جیسے کہ اسکی انگلیاں اور ہاتھ بہت بڑے ہیں۔
 کوکین۔ سوچتا ہے کہ وہ اپنے متعلق ناخوشگوار فقرات کئے جا رہے ہیں۔ منے کے
 توہم۔ بستر پر لیٹے گھنٹوں نیند نہ آئے۔ اپنے کمرے اور بستر میں کھٹل اور کیڑے مکوڑے
 دیکھے اور محسوس کرے۔ کد اخلاقی سمجھ۔

الیومنا۔ جب وہ کوئی چیز کہتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے کسی اور شخص نے یہ کہا ہے۔
 اسی طرح جب وہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ جیسے کسی اور شخص نے یہ کہا ہے یا کسی
 اور کے قالب میں ڈھال کر ہی دیکھ سکتا ہے۔ ذاتی پہچان کھو دیتا ہے۔
 گلوٹائن — ٹھوڑی، گھٹے تک لمبی محسوس ہو۔ ٹھوڑی کو بار بار جھوٹے تسلی کرنے کے
 لئے کہ ایسا نہیں ہوا۔

کارلونیملٹ — آوازیں سننے اور یقین کرے کہ اس نے ڈاکر ڈالا ہے۔
 لیکسس۔ جب کسی کو بھی آہستہ آہستہ باتیں کرتی دیکھتی ہے تو خیال کرتی کہ اسی ہی کو معین
 کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے کو غیر مرئی تسلط کے زیر اثر محسوس کرتی ہے (نیم خوابی کھلتی ہیں)

اسے لازمی اس غیر مرقی طاقت کا حکم بجالانا چاہیے۔ ڈرتی ہے کہ دشمن اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔
 دوائی کو زہر خیال کرے۔ گھر میں چور محسوس ہوں اور وہ کھڑکی بھلا لٹکنا چاہے۔
 ملی لوثس — توہم خیال کرے کہ ہر کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اونچا بولنے سے ڈرے۔
 دور بھاگ جانا چاہے۔

انکس کاٹس — میسرنگ محفل کی بوکا دہم یا مشک کا دہم۔
 کوکا — جلد یا کپڑوں پر کیڑوں کوڑوں کے چلنے کا دہم۔
 ایتھوزا — بیتاں اور کتے نظر آنے کا دہم۔ بستر یا کھڑکی سے بھلا لٹکنا چاہے۔
 اسارم یورپ — جیسے کہ ہوا میں اوپر ہی تیر رہی ہے ایک ہا جگہ پر اچکڑے کیے کہ ستر ایوں
 کو ہوں۔

برٹیا کرب — جیسے کہ اس میں ہر چیز بٹے۔ جیسے کہ جہاز میں بٹے۔
 کر دکس — جیسے کہ بیٹ میں کوئی زندہ چیز ہو۔ خیالی حاملہ پن۔ تبدیل ہونی والی طبیعت۔
 مار فینم — جیسے کہ کمرہ بچوں سے بھرا ہوا ہے۔ بستر پر آدمی علامات بیان ذکر کے
 معمولی چیزوں پر آہیں بھرے۔

میدو دینیم — جو کام آج کرے ایسے محسوس کرے کہ ہفتہ پہلے کئے ہیں۔ اس کے
 پیچھے کوئی آہستگی سے بول رہا ہے۔ فرخجہ کے پیچھے سے چہرے بھانکیں اور
 اسے کہیں کر آ۔ زندگی غیر حقیقی ایک خواب معلوم ہو۔ ناقابل معافی گناہ کر دیا ہے۔ اور وہ جہنم میں
 جانے لگی۔ فکر نہ کرے خواہ دوزخ میں جلے یا بہشت میں بے صبر اور بہت خود غرض۔
 مرکورس — محسوس کرے جیسے کہ گلے میں کیڑے رنگ کر اوپر اٹھ رہے ہیں۔ سب کا چھلکا
 گلے میں لگ جانے کا احساس۔ کان میں برف جیسی ٹھنڈک۔ کانوں سے ٹھنڈا پانی بہہ رہا ہو۔
 پیلاڈیم — محسوس کرے کہ اسے نظر انداز کیا گیا ہے۔ عزت نفس مجروح۔
 پٹرو لیم — خیال کرے کہ مکے ساتھ لہتریں کوئی دوسرا فرد یا کچھ ہے اپنے دوا دوسے زیادہ

ہونے کے خواب دیکھے۔ اس کی بائیں دو ٹی میں۔

پلاٹینم — ایسا محسوس ہو کر وہ اپنے ہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی۔ تھوڑی سی غیر حاضری کے بعد ہر چیز تبدیل شدہ معلوم ہو۔ آنکھ اور دماغ میں چیزوں کا تناسب قائم رکھنے کا احساس نہ ہو۔ سورائیم — محسوس کرے کہ دماغ جسم سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ جیسے کہ مائع میں دماغ کے لئے اتنی جگہ نہیں ہے، جیسے کہ اس نے اپنے کانوں سے سنا ہو۔

سائیکامین — جب کبھی بھی کسی آدمی کو یا کسی چیز کو چھو لے تو اپنے آپ کو گندہ محسوس کرے۔ اور نہانا چلے، ہر چیز دوسری نظر آئے۔ جیسے کہ بستر میں پڑے ہوئے آدمی۔ فرائیض انجام نہ دینے سے تکالیف یا برا کام کرنے سے تکالیف ظاہر ہوں۔

سٹیفس گیریا — جب چلے تو محسوس کرے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ پریشانی اور ڈر کا باعث بنے اور وہ اپنے پیچھے کی طرف نہ دیکھے۔

سلفر — ہر چیز خوبصورتی میں تبدیل ہو جائے۔ پرانے جوتے اور پرانی چھڑیاں لالچری کا بہترین نمونہ معلوم ہوں ہر چیز خوبصورت معلوم ہو۔ جیسے کہ مریض محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر چیز کو چھونے کی خواہش کرے۔

کینابیس سٹائیوا — اپنے آپ کے مارے جانے کے متعلق خسر چھڑنے کے اعلیٰ ترین ہستی کی طرف سے حکم ہے۔

کیو پریم ایسٹیکم — وہم کہ اس کو پولیس گرفتار کرنے آگئی ہے۔ ہر قسم کی شکلوں اور علاقوں یا حدود خاص طور پر جب شام کے وقت سونے کیلئے آنکھیں بند کرے یا سونے کی کوشش کرے۔ اولینڈر — اپنے آپ یا اپنے پڑوں کو دھوئے کسی چیز کو چھونے کے بعد، کسی آدمی کو چھونے کے بعد خیال کرے کہ اس نے کسی گندی چیز کو چھوا ہے جس کے نتیجے کے طور پر اسے لازمی طور پر دھونا چاہیے۔

پائیروجینیٹم — یہ وہم کہ وہ امیر آدمی ہے اور بینک میں بہت دولت رکھتا ہے۔

نکس ماسکٹا — یہ خیال کردہ آدمی ہے اور دوسرے کو کھیلتا ہوا دیکھتے۔ وہ گم محسوس کرے اور جب اس کے ساتھ بولا جائے تو پریشانی کے عالم میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کرے کہ وہ دوسرے رکھتی ہے۔

نکس وامیکا۔ تنگ مزاج۔ ہر چیز اور ہر کسی میں عیب نکالے۔ دوسروں کے الفاظ اور توجہ سے بہت زیادہ حساس۔ اپنے بہترین دوستوں کو مارنے کا رجحان۔ خود کشی کرنا چاہے لیکن آنا بزدل کہ خود کشی سے ڈرے۔ بہت ہی زور درخ۔ لڑاکا۔ کینز جو۔

مرکیوس — ہر قسم کی اچھائی کی تمیز کھو بیٹھے۔ جسمانی طور پر پرانگندہ اپنی عزت نفس کا جنازہ نکالے ہوئے۔ یادداشت کی بہت کمزوری۔ نظر کمزور۔ بدبودار سانس۔ بھاری پالش شوز زبان۔ اگنیثیا — غم کی وجہ سے ذہنی طور پر بہت ہی حساس۔ کاروبار الفت و محبت میں مایوسی۔ کلکیر یا کارب — دماغ اور دوسرے اعضا کی نامکمل مہر و تری جھولنے کے ساتھ علم حاصل کرنے میں سست اور علم حاصل نہ کر سکتا۔

لائیکوپوٹیم۔ بہت زیادہ روحانی دباؤ۔ ناامید۔ اپنی نجات کے بارے میں متفکر یا اپنے فرائض انجام دینے کے بارے میں متفکر۔ امتحان دینے کے بارے میں متفکر۔ زور درخ۔ غمگین، بہت ہوشیلا اور ناراض قبض کھٹی خوراک کے ڈھار۔

سٹیف گیبریا — بخوابی۔ شرم کے ساتھ ڈر لو کہ متغیر بے عزتی، ناامیدی، علیحدگی کا خواہشمند۔ کیومیللا۔ حساس۔ زور درخ۔ کم حوصلہ۔ بہت آسانی کے ساتھ ناراض ہو جائے۔ اور ان کے نتیجے کے طور پر عوارض میں مبتلا ہو جائے۔

ٹیرنٹولا ہسپانیولا۔ کسی بات پر غصہ آنے پر جو چیز بھی ہاتھ آئے دے مارے خواہ کسی چیز پر گرے، معمولی سا بھی اختلاف رائے پر جو بھی چیز ہاتھ آئے وہ دے مارے۔

افسردہ دلی

کالی برومیٹم۔ مادہ منویہ کے اخراج پر۔ تکلیف دہ ادھام۔ بخوابی اور سر پرینڈ لانے والی تباہی کا ڈر جس سے ہر قسمی تباہ ہو جائے گی۔ ڈراؤ پریشانی دہم اور اخلاقی کمزوری

آرم میٹ - اتنی زیادہ افسردگی کہ مریض خودکشی کی طرف کھنچا جائے۔
نکسوامیکا - مادہ منویہ کے اخراج پر۔

امبرگریا - روحانی کمزوری یا دلولوں کی کمزوری۔

آرٹیمیشیا - افسردگی مرگی کے حملہ سے ایک دن پہلے۔

بیلی پورس - کُرج بخار کے بعد۔

کروٹیلِس - کمزوری کے ساتھ افسردگی، غشی اور بامیں کو لے میں درو۔

کیڈیم سلف - افسردگی برامانے کے ساتھ۔ ناامیدی۔ ہمت کی کمی۔

زخم میٹ - جلدی امراض سے افسردگی۔ دن میں دو دفعہ دوائی دینی چاہیے۔

نائٹرک الیڈ - شام کے وقت۔

کینابس سٹائوا - دوپہر سے پہلے۔

فاسفورس - اس نظرئیہ کے ساتھ کردہ ناقابل اصلاح دل رکھتا ہے۔

جیسمیم - گرمی سے نامردی سے۔

زیٹرم میور - بے تحاشا بھوک سے۔

کیلڈیم - نامردی سے۔

ڈیجٹالس - دل کی دھڑکن کے ساتھ

کوکا - کام کی زیادتی اور زیادتیوں سے

فاسٹولا کا - گھٹیا سے۔ آتشک میں

اگنس کاسٹس - عام کمزوری اور قوت حیات کی کمزوری، موت کی یقینی آمد کے خیال کیسا بہت زیادہ غمی۔

میوکیس - جب لیگوریلا سے آفات ہو۔

الیڈ فاس - افسردگی جو بہت زیادہ لا تعلقی۔ بے پرواہی۔ بے رخی وغیرہ وغیرہ

امونیا کارب - روحانی کمزوری۔ زیادہ روئے، غشی کے درروں کے ساتھ پریشانی بے اطمینانی

اور حرکت سے بہت زیادہ کمزوری وجہ سے تنگی نفس۔

تمنا - خواہش - طلب - (کھانا ہے)

سلفر - ہر وقت شراب پینے کی خواہش صبح سے شام تک - بچہ ناک نے کھلا ہوا مواد کھاتا ہے
حاملہ عورتوں میں برائڈی کی خواہش -

فاسفورس - معدہ کی جلن دور کر کے شراب کی خواہش کو دور کرتی ہے، نتیجتاً بہت زیادہ بھوک -
پلیئم - امیہم ایک خاص شراب خریدنے کیلئے روپہ چوری کرے جو نہی اس پر سے پابندی ہٹائی جائے
خواہش جاتی رہے -

ایسڈ سلفیورک - شراب خوری کی عادت کو دور کرنے کے لئے ایک حصہ سلفیورک ایسڈ اور تین
حصہ الکحل ملا کر دینے سے عادت دور ہو جاتی ہے - دس سے پندرہ قطرے تین چار دفعہ دیں -
ٹیرنٹولا سپانیولا - راکھ کھانے کی خواہش خاص طور پر چل کے دوران اور پُر درمیتض،
ریت کھانے کی خواہش -

ایسڈ ٹائٹرک - چاک کھانے کی خواہش - چربی نمک چونا مٹی - پستہ کھانے کی عادت -
ایوٹما - نشاستہ - کچے چاول - چاک - کوئلہ - چاء - ایسی ہوئی کافی - کھٹی اور مبضم
ہونے والی اشیاء - آلو - گوشت - اور میر سے نفرت -
سکوٹا وائروسا - بچہ کو کمرہ منہ میں ڈالے - ظاہرہ خوش ذوقی سے یا بار غبت کھائے - کچے
آلو کھانا چاہے، اس سے معلوم ہو کہ وہ کھانے اور نہ کھانے والی اشیاء میں تمیز نہیں کر سکتا -
کوٹرکس - شراب کے بُرے اثرات اور چائے - تمباکو وغیرہ کے بُرے اثرات سے محفوظ رکھے
یا بُرے اثرات سے بچائے -

سٹر فنیٹس - شراب کی زبردست خواہش کو دور کر دے - مدد نکچر کے دس سے پندرہ قطرے
دن میں دو دفعہ دیجئے -

پیمسی فلورائن - ماریا اور انیون کی خواہش دور کر دے - پانچ سے دس قطرے فی خوراک -
ایوینا سٹائیوا - دیجئے -

فائیٹولاکا - دانتوں اور مسوڑھوں کو کاٹنے کی نہ رکنے والی خواہش - دھواں لگے گوشت کی
زبردست خواہش اور عام گوشت کی بھی خواہش -

مینگنم - ہر وقت بستر پر پڑے رہنے کی خواہش - بستر میں آرام سے آفاقہ - تکلیف اور پریشانی
حکمت سے زیادہ ہوتی ہیں -

ہمپر سلفر - سرکہ اور اچار کی زبردست خواہش -

ہائوسائیمس - پاگل آدمیوں میں کام کرنے کی خواہش -

کیلیدیم - تنباکو کے لئے تودہ - اس کی زبردست خواہش کو دور کرتی ہے - یادداشت کی
کمزوری ادماغی غیر ماضی اور بھولنا - ہر چیز جلدی میں کیجاتی ہے - یہ مندرجہ بالا علامات کے
ساتھ آنکھ کے اوپر پتیلیوں کا بھی علاج کرتی ہے -

پلاڈیم - عورتانہ کی جانے خواہش -

لیڈم پال - وہ سکی کی خواہش کو دور کرتی ہے -

کالی بائیکرومیکم - بیڑ اور تیزابی مشروبات کی خواہش -

میڈرونیٹم - نمک، مٹھائیوں - سبز پھلوں - برون کٹھی چیزوں اور سنگتوں کی زبردست خواہش -

مرکوریس - کھانے کا گوہر اور تالابوں کا کچر کھانے کی کوشش -

سینی کولا - پیچھے کی طرف دیکھنے کی خواہش -

سیسیا - انگور کی شراب - سرکہ اور مٹھائیوں کی خواہش -

آئیوڈیم - گوشت اور نشہ آور مشروبات کی خواہش -

تھلاپسی - مکھن دودھ کی خواہش -

سائیکلین - سارڈین (ایک خاص قسم کی مچھلی) کھانے کی خواہش -

کروٹیلوس ایٹم - برون کی زبردست خواہش -

سٹرونیٹم - اپنے دانتوں سے کھانے اور چھانٹنے کی زبردست خواہش تیزاب کھانے کی

زبردست خواہش - سرکہ سے آفاقہ -

میگنیشیا کلرہ - ٹی بی اور کسی مرض میں بار بار تھکا ہونے والے بچوں میں گوشت کی زبردست خواہش

سسٹس کینا ڈنس۔ پیئر کھانے کی خواہش، رگام میں مبتلا ہونے کا رجحان کے ساتھ جو کافی عرصہ تک قائم رہے، سردی میں زیادتی۔ تیزابی خوراک یا پھل جو تکلیف یا پچش کا باعث نہیں۔ ایلیم سپیا۔ کچے پیاز کھانے کی خواہش۔

کوئیم۔ اپنے بہترین پٹے پہننے کی خواہش کرے۔ بے فائدہ چیزیں خرید کرے۔ چیزوں کی پرواہ نہ کرے، انہیں ضائع یا برباد کر دے۔

کلیریا کارب۔ اندوں کی خواہش، چونا۔ سلیٹ۔ پنسل۔ چاک۔ اگر کیس ایمٹ۔ بہت ہی ٹھنڈے پانی کی اچانک زبردست خواہش۔ پریشانی کے حملے کے دوران میں جو فائدہ بخش ہو۔

کلیریا فاس۔ سور کے نمکین گوشت۔ سور کے ران کے گوشت نمکین یا خشک ہوئے بھونے ہوئے گوشت کی زبردست خواہش۔ نفخ زیادہ۔ بچوں کا ہیضہ۔ آرجنٹم نائٹریم۔ کھانڈ اور مٹھائیوں کی خواہش جو اس نہ آئے۔ نشاستہ اور انڈہ نہ لے سکے۔ یہ عیبدار کر دے۔

سیلینیم۔ نشہ آور مشروبات کی نہ رکنے والی خواہش۔ بیوفو۔ علیحدہ ہونے کی خواہش جلتی کیلے۔ علیحدگی خواہش کرے لیکن علیحدہ ہونے سے ڈرے۔ لائیکوپوڈیم۔ میٹھی اور گرم چیزوں کی زبردست خواہش۔ کافی اور گوشت سے نفرت۔ برائی اونیا۔ کسی چیز کی خواہش لیکن یہ نہ جانے کہ کس کی۔ بچے کو ایک کے بعد دوسرا کھلونا دیجئے لیکن وہ سب کو مٹا کر دے۔

لیک فیل۔ کاغذ کھانے کی زبردست خواہش۔ میزمریم۔ چربی، سور کی ران اور دودھ پینے کی زبردست خواہش۔ نیٹرم سلف۔ برف اور انتہائی ٹھنڈے پانی کی خواہش۔ انٹیم مارٹ۔ تیزاب اور کھٹے پھلوں کی خواہش جو اسے بیمار کر دیں۔ سرکہ کھٹے چیزوں کھٹی شراب

اور کھٹے پھلوں سے معدہ کی تکالیف -

ورٹیم ایلم - اپنے ہی پاخانے اور پیشاب کو پینے کی زبردست خواہش -

کوکا - شرابی مشروبات اور تمباکو، روایتی نشہ بازوں کے لئے -

آرنیکا ایم - سرکہ کی خواہش خاص طور پر حاملہ عورتوں میں -

بیکس وائیکا
بیکس
پسٹیللا

برڈی کی خواہش - دیئے گئے مہاسب دیں -

کاشیکم - نوجوان لڑکیاں شادی کی خواہش میں جلیں -

ٹوبیکم - تمباکو نوشی کی خواہش کو دور کر دے - ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ کی پوٹیشی میں ہر نصف ایک خوراک

کاربوئیک - کافی - تیزابیات - میٹھی اور نمکین چیزوں کی خواہش - قابلِ مہضم اور بہترین خوراک سے نفرت -

انگجورا ویرا - کافی کے لئے زبردست خواہش -

تباہ کن

سیلاڈونا - حاسد غصہ ور - کاتا ہے - مارتا ہے - بھاگتا ہے - سخت بدنمایا گھناؤنے

چہرے - ڈراؤنے چہرے -

کینتھرس - طیش میں لانے والے توہمات - جنسی جوش کی وجہ سے چلائے اور بولے -

بڑھوتری

برٹاکارب - دماغی بڑھوتری کی کمی جبکہ جسم بڑھے - ہم ایسے مریضوں میں ڈرا اور بیوقوفی دیکھتے ہیں

جیسا کہ بچوں میں - بچکانہ بیوقوفی اور معصومیت - ۱۸ سے ۲۵ سال کی عمر کی لڑکیوں میں بیوقوفانہ

باتیں - گڑبڑوں کے ساتھ کھیلتی ہے اور بیوقوفی کی باتیں کہے - بیوقوفانہ رویہ - عورت بن دیر

سے آنا - عورتوں والے کام اور استعمال میں دیر سے آنا -

ڈر

کیڈیم سلفٹ — کسی بھی جسمانی اور ذہنی کام کھنے سے ڈرنا۔
 کوہنیم — اکیلے ہونے کا ڈر۔
 چائنا آف — کتوں اور دوسرے جانوروں کا ڈر۔
 فاسفورس — ڈر جیسے کہ ہر کونے میں کوئی چیز ریگ رہی ہے۔
 یوریکس — بچے کی طوفان حرکت سے ڈرے۔
 لائیو کلوڈیم — متفکر، غمیگین، اور چڑچڑا۔ آدمیوں سے ڈرے۔ رفاقت سے نفرت۔
 جلیسیم — حرکت سے ڈر۔ اعصابی۔ گانے والوں اور مقررہوں سے ڈر۔
 اگنیشیا — چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر۔

کھاتا ہے

دریٹرم ایلم — اپنا ہی باغیانہ کھائے اور پیشاب پیئے۔
 سلفر — بچہ ناک سے نکلی ہوئی رطوبت کھائے۔ نزلہ زکام کا رجحان۔
 بھاگ جانا

بیلادونا — بھاگ جانے یا فریج پر بستر میں چھپ جانے کی خواہش۔
 اوپیم — بخار میں خاص طور پر ٹائیفاؤڈ بخار میں بھاگ جانے کی خواہش۔
 لائیو کلوڈیم — عورتوں میں اپنے بچوں سے بھاگ جانے کی خواہش۔
 دریٹرم ایلم — دماغی بھلیوتوں کی وجہ سے بھاگ جانے کی خواہش۔
 مرکوریس — ہسٹیریا میں بھاگ جانے کی خواہش جیسے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہو۔
 ہائیوسٹائیمس — بستر سے کود جائے اور دروہ بھاگ جانے کی کوشش کرے۔

امتحان

آرٹھرمائٹ — امتحان سے ناکامی کی وجہ سے سخت ہراساں ہونا۔ پیشگی ڈر جو اسپہال
 کا باعث بنے، دروازے کے قریب نشست چاہے۔ بھاگ جانے کے لئے سکول
 کے بچے جو سکول یا چرچ یا مسجد میں جانے سے ڈریں۔

اینا کارڈیم۔ امتحان سے پہلے ڈر۔ زیادہ پڑھنے سے اعصابی کمزوری۔ مادہ منویہ کے اخراج سے کمزوری۔ یادداشت کی کمی۔

لایسکو پوڈیم۔ امتحان کے پاس کرنے کے سلسلے میں افسردگی۔ قدرتی طور پر ڈر پیدا کرنے والی وجوہات سے حساس اور جسم پر واضح اثرات۔ جھٹکا یا ہوا۔ چڑچڑا۔

اجتھوزا سٹینسیم۔ سوچنے یا توجہ مرکوز کرنے کی نااہلیت۔ اس علامت کے ساتھ مریض امتحان کے خوف پر قابو پا لے گا۔

جیلسمیم۔ امتحان سے پہلے سخت ہراساں یا سخت خوف۔
ڈر۔ (موت اور ڈر بھی دیکھئے)

ایکونائٹ این۔ موت کا خوف اندھیرے کا پُر شور بگبگوں اور گانے سے خوف۔ موت کا ڈر حمل کے دوران میں۔ بھوتوں کا خوف۔ ٹرائی کار یا ریلوے ٹرین میں داخل ہونے کا ڈر۔ پریشانی کے ساتھ ڈر۔ گلیوں کو پار کرنے کا ڈر۔ سخت ڈر۔ بہت زیادہ پریشانی اور بے چینی۔ سٹر انونیم۔ بدحواسی میں ڈر۔ کتوں کا ڈر۔ فریب نظر یا خیال باطل کی وجہ سے ڈر۔ پانی کا خوف۔ روشنی کا خوف۔ غلط کام کرنے کا خوف یا بھڑکھپاڑ کے جانے کا خوف۔ اندھیرے کا خوف، لیکن چمکدار چیزوں سے بھی خوف۔ رات کا خوف۔ زخمی ہو جانے کا خوف۔ بہت زیادہ پیاس لیکن پانی سے ڈرے۔

اویسیم۔ زخم یا جراحت کے بعد خوف کا قائم رہنا۔ جب ڈر کی وجہ سے اسہال ہوں۔ آسانی سے ڈر جائے۔ موت کا ڈر۔ خاص طور پر جب ڈر کی وجہ سے بُردلی ہو۔ نکسوامیکا۔ غیر حقیقی خوابوں سے خوف۔ خوف کا مسلط ہو جانا۔ شور کا خوف۔ اعصابی اور چڑچڑے لوگوں کے لئے موزوں۔

کیوپرم میٹ۔ جب خوف کی وجہ سے تشنجی دمکشی یا تنگی تنفس ہو۔

مرکوریس۔ خوف بھاگ جانے کی خواہش کے ساتھ۔ جیسے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہو۔

آرٹریک الیم۔ چاقو سے مارے جانے کا خوف۔ اکیلے رہنے سے ڈرے ساتھی چاہے۔ بہت بے چینی محسوس کرے۔

کیو پرم ایسٹیکم۔ بستر کے کپڑوں یا کھڑک کو آگ لگنے کا خوف۔
سلیشیا۔ ذہنی سکون۔ منجمد خیالات۔ حرف اپنوں کے متعلق سوچے اور ڈرے انہیں تلاش کرے۔ اور گئے۔

آرنیکا ایم۔ اچانک موت کا خوف۔ ڈرے کہ اچانک کچھ ہو جائیگا۔ رات کے وقت اٹھے اور اپنے دل کو پکڑے۔ ڈراؤنے خواب اور کاہوس۔ جو لوگ اس کی طرف آئیں ان سے ٹکرانے کا خوف۔ کلیریا کارب۔ پریشانی اور خوف کہ کچھ خوفناک اور نفاک واقعہ ہونے والا ہے۔ ڈر کر لوگ اس کی ذہنی بدحواسی کو جان جائیں گے۔ سامنے کا خوف۔ پاگل ہو جانے کا خوف۔
بیلارڈونا۔ تصوراتی چیزوں اور برائیوں کا خوف۔ دُور بھاگ جانا چاہے۔ جانوروں کا خوف۔
کتوں کا خوف۔

ہائیموسٹیمس۔ زہر دیئے جانے کا خوف۔ زخمی ہونے کا خوف۔ بھڑ بھڑاٹ کا خوف۔
پانی اور لوگوں کا خوف۔ درندوں سے کاٹے جانے کا خوف۔

سکسینم۔ ٹرینوں یعنی ریل گاڑیوں اور بند کمروں کا خوف۔
اگنیشیا۔ ہوائی حملے کا خوف ہسٹریائی لوگوں میں جو تھوڑی سی انگشت پریشانی میں خوف کی وجہ سے غمی۔

برائی اونیا۔ غربت کا خوف۔ یا غریب ہو جانے کا خوف۔
جیلیسم۔ بیماری اور ہوائی حملے کا خوف وغیرہ۔ شیخ کا خوف۔ بیماری اور ہوائی حملوں کی خبریں سن کر دل کی دھڑکن کا تیز ہونا۔ تھکا ماندہ اور کاہنے۔ بے چینی اور پریشانی اس دوا میں ملتی ہے گرنے کا خوف۔

آرنیکا ایم۔ موت سے زیادہ پریشان۔ ڈرا ہوا۔ جلد باز بیماری اور ہوائی حملے کی وجہ سے

بے چینی اور ادھر بھاگنا اس دوائی کی نمایاں علامت ہے۔ خون کو موت نزدیک آرہی ہے۔
 مجمع میں جانے کا خوف، چرب سینہ یا بھرے ہوئے کمرے میں جانے کا خوف جہاں وہ مانس
 نہ لے سکے۔ جیسے کہ اوپر اٹھانے والی لفٹ یا سڑگ۔

فاسفورس - سر پر منڈ لانے والی تباہی کا خوف - اندھیرے کا - اکیلے رہنے کا - دم گھٹنے کا -
 طوفان برق و باران کا - یا کسی بُری بات کے وقوع پذیر ہونے کا -
 الیمونا - شام کے وقت -

لائیمین - پانی کا خوف - پانی نظر آنے پر مشیاب کی خواہش - یہ خاص دوائی ہے
 جب پانی کا خوف ہو -

کینا بس انڈیکا - ہمیشہ کے لئے گم ہو جانے کا خوف - اللہ تعالیٰ کے نام کی پسکارِ بابت
 ذکر کے کیونکہ وہ مڑتا ہوا محسوس کرتا ہے جھکدار چیزیں دیکھنے پر خوف - ہوا کے چھوٹے مانس
 پر یا کسی کے آنے پر - اندھیرے کا خوف -

لائیکو پوڈیم - اکیلے رہنے کا خوف - مجمع کا خوف - اندھیرے، موت، بھوتوں اور لوگوں کا خوف -
 کوکولس - موت کا خوف اور انجانے خطرے کا خوف -

کالی کارب - مستقبل کا خوف - موت - کسی چیز کے ہونے کا خوف، بھوتوں کا ان لوگوں،
 میں جو تھکے ماندے ہوئے ہوں - چڑچڑے اور حساس کبھی بھی مطمئن نہ ہوں - کبھی بھی اکیلے
 نہ رہنا چاہیے -

کلیمیٹس - اکیلے رہنے کا خوف لیکن قابل قبول لوگوں سے ملنے کو پسند نہ کریں -
 اینا کارڈیم - ڈر ہے کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے - چوروں کو تلاش کرے - دشمنوں کی توقع کرے -
 ہر چیز اور ہر کسی سے ڈرے - اندرونی پریشانی سے بھرپور بہت ہی زیادہ بزدل جسم کو احساس
 کے بغیر زخم کرے - ظالم - کینہ دار بد طبیعت -

کیلیڈیم - شدید اعصابی - اپنے ہی سامنے سے ڈرے - تمام ارات شہوت پرستی کے خیالات

سے جاگتا رہے۔ پریشانی خاص طور پر سونے سے پہلے۔ اپنے مستقبل سے ڈرے۔
 کیمرے۔ پریشانی کے ساتھ شدید خوف۔ اجنبی لوگوں کا خوف۔ اندھیرے کا تصوراتی بھولوں کا خوف۔
 میسنگم۔ پریشانی اور خوف۔ بہت زیادہ اندیشہ۔ کچھ بہت ہی خطرناک واقعہ ہونے والا ہے۔
 ذہنی مصروفیت کی کوشش کرتا ہے۔ جتنی زیادہ یہ کوشش کرتا ہے اتنا ہی پریشان ہوتا ہے۔ وہ پرج
 نہیں سکتا کیوں کہ وہ تھکا ہوا ہوتا ہے اور ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ پیچھے لیٹ جاتا ہے اور یہ سب گزرتا
 میں۔ لیٹ جانے سے افادہ ہوتا ہے۔

پسوجیا۔ موت کا ڈر۔ مستقبل کا ڈر یا خوف۔ یا کسی خطرناک کام کے وقوع ہونے کا خوف۔
 تنگی تنفس اور پریشانی کے ہمراہ۔

پاولینا نائٹیل۔ گھل گھل کر مرنے کا خوف۔
 اوسمودیم۔ سیریسوں پر چڑھتے یا اترتے وقت گرنے کا خوف۔
 مانسینڈا۔ بد روحوں کا دیوانہ ہونا۔

میدویرنم۔ جب اکیلا ہو تو موت کا ڈر یا خوف۔ جاگنے پر ڈر کا احساس جیسے کہ کوئی
 خطرناک واقعہ ہو چکا۔ اندھیرے کا خوف۔

سینی کو لا۔ اندھیرے کا خوف۔ اپنے پیچھے کی طرف دیکھنے کی متواتر خواہش۔
 کینا بس انڈیکا۔ اندھیرے کا خوف۔

ٹیرٹولا ہپانولا۔ لامحدود خوف۔ کسی واقعہ کے ہونے کا خوف۔ کسی چیز کا خوف جو موجود نہ
 ہو۔ خوفناک چیزیں دیکھے جو وہاں نہ ہوں۔

سٹیف گیگیا۔ اپنے ہی سایہ سے خوف۔ بڑی کے ساتھ پریشانی۔ اندرونی جذبات کو بہت
 بگڑی ٹھیس پہنچا۔ ہاتھ میں جو چیز ہو اُسے دور پھینک دینا۔

ہائیڈرو سائینگ لیڈ۔ خیالی تکالیف۔ ہر چیز کا خوف۔ گھوڑوں کا خوف۔
 گرتے ہوئے گھر والے کا خوف۔

خوشامد

پلاڈیم - خوشامد کی خواہش۔

بھول جانا (دماغی غیر حاضری بھی دیکھیے۔ سوچ اور غلطیاں)

لیک کینیم - مریض غیر حاضر دماغ - وہ بہت بھولنے والا۔ بازار سے چیزیں خریدے لیکن ان کے بغیر ہی چلا آئے۔ وہ لفظ یا الفاظ لکھتے وقت بھول جائے جب بولے غیر اوازی طور پر نادانستہ طور پر دیکھی ہوئی یا سوچی ہوئی چیزوں کے بدل بولے۔ لکھتے وقت وہ بہت زیادہ الفاظ استعمال کرے صحیح الفاظ کی جگہ۔ پڑھتے یا مطالعہ کرتے وقت کیسوئی اور توجہ قائم نہ کر سکے۔ ایسڈ فاس - جنسی بے راہروی کی وجہ سے حافظہ کی کمزوری۔ بے پرواہ۔ ناقص یادداشت اپنے خیالات کو مجتمع نہ کر سکے۔

ایناکارڈیم - دماغی محنت کی وجہ سے بھول جانا، خاص طور پر صبح کے وقت۔ عام ادھرنگ کے بعد یا عام فانیج کے بعد کمزوری یا حافظہ کی کمی۔ لعنت طامت یا قسمیں کھانے کی نہ ہٹنے یا دہنے والی خواہش۔

بریرٹا کارب :- بوڑھے لوگوں میں عمر کی وجہ سے دماغی صلاحیتوں کے کم ہونے کے لئے خاص طور پر نفیس ہے۔

کینا بس انڈریکا - مریض بہت ہی زیادہ بھولتا ہے، فقرہ مکمل نہ کر سکے کیونکہ یاد نہ کر سکے کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے۔

سیلینیم - جاگتے وقت بھول جائے اور فینڈ میں اس چیز کے خواب دیکھے۔

سفلینیم - بھول جانے والا - کمزور دماغ والا - بغیر کسی وجہ کے ہنسے یا روئے۔ صحت مند ہونے سے ناامید۔ ٹگین - کاروبار اور دوسرے کاموں سے لاپرواہ۔

گلوناٹن - بھول جانے کی وجہ سے مریض مضحکہ خیز بن جائے۔ وہ جانی پہچانی کیلوں کے نام خبر اور محل وقوع بھول جائے اگرچہ وہ دماغی سالوں رہا ہو۔ گھر کا راستہ لیا دکھائی دے۔ جانی پہچانی گلیاں عجیب معلوم ہوں۔

سینفگیہ یا۔ جلق یا اخراج منی کے بعد حافظہ کمزور کیا جنسی مشاغل پر تواتر عمل کرنا۔ وہ جب کسی چیز کو ٹھٹھاتا ہے تو معمولی یاد باقی رہتی ہے۔ بہت زیادہ یاد کرنے کے بعد شکل یاد کر کے۔
 ایک دیک ٹویفل۔ لاپرواہی اور ذہنی کام سے نفرت کیوجہ سے بھول جانا غمی اور آسان طریقہ سے موت کی خواہش کرے۔

کیلڈیم۔ بھول جانا۔ غیر ماضی دماغ۔ جنسی زیادتیوں یا تمباکو کی زہر کیوجہ سے بہت زیادہ پرجوش، وہ سوچ نہ سکے جتنا زیادہ سوچے اتنا ہی زیادہ موضوع سے دور ہلے۔ یہ ذہنی اور دماغی کمزوری کیوجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ مشتمل مریضوں کے لئے بہترین ہے۔ جو کسی بھی چیز کے متعلق پریقین نہ ہوں اگرچہ انہوں نے کوئی چیز دیکھی اور محسوس کیوں نہ کی ہو اور وہ اسکے وجود کے متعلق شک میں پڑ جائے جب وہ چیز اس سے دور ہٹ جائے۔

آئیوڈم۔ آسانی سے بھول جانے کوئی چیز بھول جائے لیکن یہ نہ جانے کہ کیا بھول گیا ہے۔ اس کے ذہن پر اس کا وزن ہو۔ یہ اسے بے چین اور وہ اسے اعصابی طبع بنائے۔
 ایلنٹھس گلینڈ ولسا۔ ایک لمحہ پہلے ہی بولی ہوئی چیز بھول جائے، متواتر بھولتا رہے۔
 اولینڈر۔ کمزور یادداشت اور بھول جائے آہستہ آہستہ سمجھے۔
 امبرگریسا۔ اعصابی کمزوری کیوجہ سے ساتھ الفاظ اور واقعات یاد نہ کر سکے۔ قبل از وقت بڑھایا۔ ایک موضوع سے دوسرے موضوع کو تبدیل کر دے۔

کوئیم۔ یادداشت کی کمزوری۔ بھول جانا۔ ذہنی کاوش کے نااہل۔
 کالی بروم۔ نامردی کے ساتھ بھول جانا۔ قلت خون۔ لاغری یا وہ الفاظ بھول جائے رکن تہجی بھول جائے۔

زینک فاس۔ ذہنی کمزوری بھولنے سے کم درجہ کی بیوقوفی میں تبدیل ہو جائے۔ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ جلن۔ کمر کا تھوڑا تھوڑا درد جو بیٹھنے پر زیادہ ہو۔ مطالعہ یا مشقت کے کام پر زیادہ ہو۔ ہاتھ پاؤں کے پٹھوں کی کمزوری۔ کانپنا اور پھٹکنا۔ پاؤں اور ٹانگوں کی شدید کمزوری۔ شدید ایسا دیگیں اور اخراج منی جس کے بعد خصبیوں اور منی کی نالیوں میں کھینچنے والے درد۔
 میڈورٹیم۔ کاموں، سکوں اور ناموں کو جو بڑھاپا ہو بھول جائے، بچوں لفظوں میں لکھتے

وقت غلطیاں کرے، وقت آہستہ آہستہ گزرے، ہر چیز آہستہ آہستہ گزرے۔
 نیز طم کا رب۔ اعصابی اور جسمانی تھکاوٹ کے ساتھ بھول جانا۔ ہنسے جمع کرنے کی نااہلیت
 جو کچھ بڑھے بھول جائے۔ صفحہ پڑھتے وقت اس سے پہلے پڑھا ہوا صفحہ بھول جائے۔ یاد
 داشت قائم نہ رہے۔ فقرہ کے پہلے حصہ کو بھول جائے آخری حصہ پڑھنے تک۔
 لائیو کو پوڈیم۔ غلط الفاظ اور بیجے۔ غلط بیجے کرے یا الفاظ کے حصے چھوڑ جائے خیالات
 دردم برہم۔ نئی چیز دیکھنا برواشت نہ کرے۔ جو کچھ لکھنا ہے۔ پڑھنے کے۔
 سلفر۔ بہت زیادہ بھولنے والا۔ نام اور قریب کے واقعات یاد نہ کر سکے۔ بیوقوف سا
 اور گھبرا ہوا۔ بول چال سے اجتناب کرے۔ بولتے وقت یا لکھتے وقت مناسب الفاظ نہ پا
 سکے یا الفاظ کو غلط جگہوں پر استعمال کرے ادن کے وقت غلگن اور شام کے وقت خوش خیلی
 پلاؤ لکائے اور تیس کرے لیکن کام نہ کرے۔ (شیخ پتلی جیساروتیہ)
 روڈ ٹنڈرون۔ یادداشت کی کمزوری۔ لکھتے وقت الفاظ چھوڑے۔ خیالات کا اچانک غائب
 ہو جانا جس چیز کے متعلق بات کرے بھول جائے۔
 رسٹاکس۔ لگا تا سوچنے کی نااہلیت۔ مریض جب ۱۲ گھنٹے لگے تو ایک کا ہنڈر لکھ کر دوسرا ہنڈر
 بھول جائے لکھنا ہے۔
 سٹراٹونیم۔ غلط الفاظ استعمال کرے اصحح الفاظ نہ بل سکیں۔

جوا بازی

مکرویرس وٹیمو۔ بڑے جواری۔ بعض اوقات بہت زیادہ روپیہ خرچ کرے اور بعض وقت بچوں جو۔
 سلفر۔ چوری کرنے والی عادت والے جوئے باز۔ تمباکو استعمال کرنے والے لوگ۔
 مجرم ذہنیت۔ (دیکھیے توہم۔ خوف اور مراقی حالت) توہم۔
 غیب دانی۔ نفرت۔ بیزاری نفرت۔ گھر کی یاد کا ستانا۔
 کیسپیم۔ گھر کی یاد ستائے کیلئے چوٹی کی دوا ہے۔ سرخ زخار۔ بخوبی کے ساتھ سکول کے
 بچے مطالعہ یا کام نہ کر سکیں۔ گھر جانا چاہیں۔

آئرس ٹیکس - غلگین - افسردہ - گھر کی یاد ستائے -
ایسٹ فاس - گھر کی یاد کی وجہ سے جو تکالیف ہوں -
اگنیشیا - تبدیل ہونے والی طبیعت - خاموشی کڑھے - غلگین - رونے والا - صدر غم اور
ناامیدی کے بعد کی حالت -

مراق - (دیکھئے ضعف اعصاب)

نکسوامیکا - بہت زیادہ چڑچڑاپن - بھدا - اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو مارے کی خواہش
اپنے آپ کو بھی - آوازوں - جوڑوں - روشنی - گرمی اور سردی سے شرمندہ رہتا ہوں - اپنی خوراک
کپڑوں میں نقص نکالے وغیرہ وغیرہ - یہ سب بٹھے رہنے کی عادات - بہت زیادہ خوراک اور
مشروبات کے استعمال کی وجہ سے خاص طور پر شراب کے استعمال سے -

اکٹیریسیموسا - یہ ایک عورتوں کی دوائی ہے - ایام حیض سے پہلے افسردگی اور غمی کے دورے
خیالی جلاؤں سے ڈرے - جو کہ ایک برس - ایک ڈاکٹر - ایک دوست - ایک چوما چومیا -
ایک بی - ایک گتا ہو سکتا ہے - زندہ رہنے کے قابل لیکن مرنے سے ڈرے -

کلکیریا کارب - تشویش مندی یا بھرنہ - موت کا خوف - بے بسی کا خوف - پاگل ہو جانے کا خوف -
بیمار ہو جانے کا خوف - رونے اور آہوں کے ساتھ غمی کے دورے - مردوں اور ناخوشگوار چیزوں کے خلاف -

سٹیفیسگیریا - اعصابی نظام کے لئے بہترین دوا ہے جو کہ دماغ اور جنسی کو متاثر کرے -
علیحدگی چاہے اپنے حالات بنانے کیلئے - اترا ہوا چہرہ - بے رونق آنکھیں - کانپتے ہوئے ہاتھ
ٹھنڈے پسینے - یہ سب کچھ خلق اور جنسی بے راہ روی کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی اظہار خیالات
سے اثر پذیر ہو -

فاسفورس - بزدل - مذہب یا غیر مستقل مزاج - جنسی بے راہ روی - یا خلق کی وجہ سے -
مریض میں ٹی بی میں بار بار مبتلا ہونے کا رجحان - متشدد - باتونی - ہڈیانی - رونے والا - غلگین
ہسٹرک - کمزور دماغ اور احمق -

آرم میٹ۔ بہت زیادہ ناامید۔ اپنے آپ سے ناامید۔ خودکشی کرنا چاہے لیکن مرنے سے ڈرے۔ دونوں سونہ سکیں، عورتیں نیند میں سسکیں بھریں۔ ادا آدمی قسمیں کھائیں۔ اپنے آپ کو طاقت کریں۔ اپنے آپ پر تنقید کرنا بڑی بڑی علامتیں ہیں۔ خیال کرے کہ وہ کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ہر کام غلط کرے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنے دوستوں کو نظر انداز کر دیا ہے اور اپنے فرائض سرانجام نہیں دیئے۔ اس لئے وہ نجات کے قابل نہیں۔ سسپیا۔ اپنی صحت اور مگر طبعیات کے بارے میں نکلین۔ غیر ارادی طور پر رونے اور ہنسنے کے دورے بہت زیادہ پڑ پڑ اپنی جولا پرواہی سے تبدیل ہو۔ علیحدہ رہنے سے ڈرے لیکن مجلس میں بہت پرجوش۔ حقیقی یا تصوراتی برائیوں کی پریشانیوں کے ساتھ خوف۔

نیرٹرم میور۔ نگلین اور رونے والے مریض جو کہ دلجوئی کرنے کو پسند کرے۔ اور دلجوئی کرنے والے سے سخت نفرت کریں۔ نگلین۔ کم سخن، کم گو۔ زندگی سے تھکا ہوا۔ نفرت کرنے والا۔

کینہ جو انتقام پرور۔ معمولی معمولی چیزوں سے ہل جائے یا محسوس کرے۔

کونیم۔ جنسی افعال کے سرانجام نہ دینے کی وجہ سے مراق یا مانگو لیا۔

ہسٹریا۔ باؤگولہ

اگنیشیا۔ بھاتی میں نمایاں کھچاؤ دم گھٹنے کے احساس کے ساتھ۔ پانی جیسا صاف پتیلاب بہت زیادہ مقدار میں نہ بیان کی جانے والی بو والا۔ ٹھنوں کا کھینچا اینٹھن اور تشنج کبھی رونے کبھی ہنسنے۔ دورہ کے وقت پہلی طاقت ۵ استعمال کیجئے اور پھر اونچی طاقت۔ ہسٹریا کے لئے جو ٹی کی دوا ہے۔ ایک عورت جس کا اپنا بچہ یا خاوند چھن جائے سر درد ہو۔ بخوابی۔ اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ اپنے آپ کو تباہی میں نہ رکھ سکے۔ خیال کرے کہ اس نے کوئی فرض پورا نہ کیا ہے۔ یقوتوفی کے کام کرے اور ان پر غر کرے اور وہ ان لوگوں کو دکھائے۔ وہ اپنے جوش میں دھن کی پکٹی۔ اگر تحلیف اگنیشیا دینے کے باوجود دوبارہ ہو جائے تو نیرٹرم میور دیجئے جو اگنیشیا کی مریض ہے۔

اکیٹا ریموسا۔ یہ پٹھوں کی اور سیرائی اینٹھن کی جس میں اعصاب اور عضلات اور پٹھے متبادل
ہوتے ہیں۔ بہت ہی ٹگین یا جذبات غم میں دیا ہوا۔ ایام حیض شروع ہونے سے پہلے تمام علامات
کی زیادتی۔ اس دوران میں تکلیف کا سبب عموماً ایام حیض کی بےقاعدگی یا رحم یا بیضہ دانی کی
دوسری بیماریاں ہوتی ہیں۔

ایسا فٹیڈا۔ جب درد پیٹ میں سے باؤگولر اٹھنے کی وجہ سے ہو۔ دورے کے دوران کھائی
ہوئی خوراک کی تپے پیشاب کی تکلیف۔ باؤگولر جو کہ دباؤ کے ساتھ خلق میں پھنسا ہوا یا گلے میں
پھنسا ہوا معلوم ہو۔ متلی مریضہ اکثر ننگے کی گمشدہ کرے۔

سکوٹا وائرورسا۔ احساس کے نہ ہونے کے جن میں خیر ارادی طور پر پٹھوں کا پھرنے اور دھکے
لگنا۔ خاص طور پر بازوؤں اور انگلیوں کے۔

پوتھوس۔ مدر فکھر کے دس قطرے دیجئے۔ اسیریا کی خاص دوائی ہے۔

سنائونم۔ جب دورہ دکاروں بتلی۔ قے کے ساتھ ختم ہو تو ایام حیض دوران میں
بہت زیادہ اور زیادہ عرصے تک خون حیض جاری رہے۔

میگنیشیا میور۔ تشنج۔ غش کھانا۔ باؤگولر رحم کے حصہ میں پیچے کی طرت دباؤ۔ رحم کا تشنج۔
خون حیض سیاہ درد کر کے ہمراہ۔ ہر پانچ دن کے بعد لیکوریا۔ اور رحم کا تشنج۔ نظام انتہام
درہم برہم۔ دوپہر یا شام کے کھانے کے بعد غش کھانا۔ دکاروں سے افاقہ۔ ادھر ادھر چلنے
سے دل کی دھڑکن کو افاقہ۔

سینشو اور نیس۔ اسیریا حیض کے دبنے سے۔

ایریکاک۔ اسیریا متلی اور قے کے ہمراہ۔

ویلیریا پائے۔ اعصابی ہیجان۔ پخلانہ بیٹھ کے یا سکول سے زہ بیٹھ سکے۔ پھلٹنے والے درد
جن کو حرکت سے افاقہ ہو۔

نکس ماسکاٹ۔ یادداشت کا کھودنا۔ پچھلے واقعات کو بھول جائے کہ وہ تمام دن اپنے
نیٹے سے باتیں کرتی رہی ہے۔ جب اسے سمجھا جائے تو یہ بھول جائے کہ وہ ابھی ابھی کیا رہی تھی

اوتھو، غنودگی، غشی، مریض کجالات، حیرانی و پریشانی، عجیب و غریب ماحول، خواب جیسی کیفیت اور بیہوشی پیدا کرنے والی حالت سے تبدیل ہو کر غیر حاضر و غایب۔ نیند آخر کار مدہوشی، جذبات و احساسات کا کھو دینا واقع ہو جاتا ہے۔ بدلنے والی کیفیت، ایک وقت ہنسے اور دوسرے لمحے مکیں ہو جائے۔ سمجھنے میں غلطیاں کرے۔ چیزیں اپنے قد سے بڑی معلوم ہوں لیکن جب ان کو مستقل مزاجی سے دیکھے تو صحیح معلوم ہوں۔ سر اور ڈاڑھی دھڑوڑی کا چھاتی پر گرنا۔ یہ اس طرح گھومتا ہے جیسے کہ یہ بہت بڑا ہو۔ منہ اور گلے میں خشکی، دل کی دھکن بہت اچھارہ۔

ہائوسائیمس۔ معمولی تشنچ یا بغیر تشنچ کے ہسٹیریا کے دورے۔ دو، دو۔ تین تین گھنٹے پر محیط ہسٹیریا کے لمبے دورے۔ دورے کے دوران مریض بدل بدل کر چلتا ہے اور ہنسے۔ پیٹ پر انگلی تک لگانا برداشت نہ کرے۔

ماسکس۔ موزوں ہے جب مریض جلد ہی بیہوش ہو جائے۔ ایک رخسار سرخ اور ٹھنڈا دوسرا زرد اور گرم۔ پُرجوش، بُرا بھلا کہنے والا۔ بیہوش کرنے والی ٹھنڈک، تعلق اور پھر دل کا تشنچ پلاٹینا۔ تشدد کے جنون میں کارآمد دوائی ہے یا مغز و طبیعت رکھنے والے مریض۔

لیٹم ٹیگریٹیم۔ ہسٹیریائی عورتوں کے لئے، وہ اچھے طریقے سے نہ بولیں یا اچھے الفاظ بولنے میں استعمال نہ کریں۔ بہت ہی زیادہ چڑچڑی، خیالی پلاؤ سے پُر۔ پاگل پن، مذہبی جنون۔ اور تصورات دل کی بیماریوں کے ہمراہ شیخ کی طرف کھچاؤ جیسے کہ تمام اعضاء نیچے کھینچ رہے ہوں۔

کیسٹوریم۔ نامکمل ہسٹیریا سے پہلے اعصابی دورے۔ ٹپچوں کا پھٹکنا۔ بہت زیادہ کمزوری کے ساتھ۔ دباؤ سے تکالیف میں آفات۔

حیض کا قونچ زرد اور ٹھنڈے پسینے

تھائیرائیڈینم۔ بازوں اور چہرے کی سو جن یا استقاء، ہسٹیریا کے ہمراہ حیض کے وقت ہسٹیریا کے حملے۔ ہسٹیریائی دوروں کے رجحان کے علاج کے مندرجہ ذیل اوقات پر کبھی نہیں۔ زکرم دیلر ۳۳، سیپا ۳۰، ماکس ۴۶، کالی فاس ۲۰۔ اور کوسٹیلر بائیک، ہاسلی ڈائیسوشن۔

امونیا کارب :- تنگی تنفس، بیہوشی کے دوروں، بے چینی اور حرکت سے ناتوانی یا شدید کمزوری کے ساتھ ہسٹریا ۲۰۰ یا اس سے اوپر کی پوٹنسی دیکھئے۔

نیرٹرم میور :- اگنیشیا کی مرن ہے، جب اگنیشیا عمل کرنا بند کر دے تو یہ دی جانی چاہیے۔ ادل بدل کر روئے اور ہنسنے۔ اپنی محبت کے جواب کے جذبات کو قابو نہ رکھ سکے۔ شادی شدہ آدمی گھریلو نوکر کو چران کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ عقلمند نہیں ہے لیکن اس سے بچ بھی نہ سکے۔ اس سے بچ بھی نہ سکے۔ اس دوا کا استعمال اس کے دماغ کو ٹھیک کر دے گا۔

ٹیرنٹولا سپانیولا :- گانے اور ناچنے کی نہ رکنے والی خواہش۔ ناچنے کا جنون۔ سر کو مارے، بالوں کو نوچے، پکڑوں کو پھاڑے۔ چیزوں کو تباہ کرے۔ اپنے آپ کو اور دوسروں کو مارے۔ بوڑھے لوگوں کو نہ چڑائے۔ دورے بیہوشی اور نیند پر منتج ہوں۔

کونیم :- جنسی افعال سے رکنے پر ہسٹریا۔
کاسٹیکم :- دوران حیض مرض میں زیادتی۔ خشک ٹھنڈی ہوا لگنے سے زیادتی مرض۔

ضعف عقل

ٹیوبرکولینم اس دوائی کے ساتھ علاج شروع کرنا چاہیے۔ علامات کے ساتھ دوسری ادویات کے ساتھ ۱۔ ایم طاقت پندرہ دن میں ایک دفعہ دیں۔

برٹیا کارب :- ضعف عقل کی چوٹی کی دوا ہے۔ بچے ذہنی اور جسمانی طور پر بونے اور نہ بڑھیں یا نشوونما نہ ہو۔ پیٹ بھولا ہوا ہو۔ ٹھنڈے جلد متاثر ہوں۔ گلے کے غدود (اوزین) سوجے ہوئے۔ یہ ۱۔ ایم ٹیوبرکولینم سے ادل بدل کر دیا جاسکتی ہے
کلکیریا کارب :- پریشان تشویش مند۔ شام کے وقت زیادہ پریشانی۔ دلائل کے نہ ہونے سے ڈرے۔ بد قسمتی سے ڈرے۔ بھولنے والا پریشان کم حوصلہ۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ پریشانی ضد۔ ہٹ۔

برٹیا میور :- جو بچے منہ کھول کر چلیں اور ناک میں بولیں۔ دیکھنے میں بے وقوف۔
کلکیریا فاسس :- کمزور۔ دُبے پتلے اور خون کی کمی والے مریض چڑچڑے ہر وقت کسی دوسری

جگہ جانا چاہیں۔

سفلیٹیم۔ درمیان کی دوائی جبکہ شیور کو لینیم اور برٹیا کارب مکمل طور پر شفافہ دے سکیں یا جب وہ غیر موثر ثابت ہوں یہ مزدوری ہے کہ مندرجہ بالا ادویات کے ساتھ ادل بدل کر یہ دوائی دیکھا جائے۔
ایستھورا۔ ضعیف العقل بچے جو دائمی بھراؤ کی وجہ سے سمجھ نہ سکیں۔ اگر وہ ایک حد تک کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہوں وہ مزید پڑھائی بے فائدہ محسوس کریں۔ جو کچھ پڑھایا گیا ہو وہ گڈ ٹڈ معلوم ہو اور یاد نہ رکھ سکے۔

تحریکات

ایڈوٹم۔ گرم مزاج مریضوں میں جو ہمیشہ ٹھنڈی ہوا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے شدید تحریکات محسوس کریں، بغیر کسی وجہ کے کسی بیٹنا چاہیں۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کی تحریک لیکن مزاحمت کرے۔ کسی کو مارنے یا تباہ کرنے کی نہ رکنے والی اچانک خواہش یا تحریک۔
آرم میٹ۔ اپنے کو بلندی یا کھڑکی سے گرا کر خودکشی کرنے کی تحریک۔ خودکشی کے خیالات کو دبانے کی تحریک۔

نکسوا میکا۔ خودکشی کرنا چاہے لیکن حوصلہ نہ پائے۔ اپنے بچے کو لگ میں گرنے کی تحریک۔
آرسینک البم۔ حجام جو کہ سرد مزاج مریض ہو گرم کمرے میں رہنا چاہے۔ شیو کے دوران میں اپنے لاکھ کو اترے سے قتل کرنا چاہے۔

آرجنٹم نائٹریٹیم۔ دریا میں پھیلانے لگانے یا کھڑکی سے کود جانے کی تحریک۔

لالی سین۔ اپنے گوشت میں چاقو گھونپنے کی تحریک۔

اسٹیل گوا ایم۔ خودکشی کرنے کی تحریک خاص طور پر پانی میں ڈوب کر۔

الیومنا۔ جب تیز دھارا آرا یا خون دیکھے اندر سے خواہش اٹھے اپنے آپ کو قتل کرنے کی۔
پلاٹینم۔ اپنے بچے کو قتل کرنے کی تحریک یا جوش۔ اپنے خلوں کو قتل کرنے کی نہ رکنے والی خواہش جسے کہ وہ ٹوٹ کر محبت کرتی برادر اطمینان کیساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہو۔

سیف سگیر یا۔ کسی آدمی پر چینی دے مارنے کی تحریک جس نے معمولی سی بات بھی طبیعت

کے خلاف کی ہو یا خیالی غصے سے چڑچڑاہن۔

ہیپرسلف۔ تشدد کرنے کی تحریک یا خواہش اور قتل کرنے کی خواہش بغیر کسی ناراضگی کے اور بغیر کسی وجہ کے اس دوائی اور آرسینکیم ایلم میں زیادتی مرض کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دوا ٹھنڈی یا سرد اور ٹھنڈے متاثر ہونے والی ادویات میں وہ گرمی اور حرارت چاہتے ہیں جبکہ آئیوڈیم کا مریض گرم ہوتا ہے اور ٹھنڈے ماحول میں رہنا چاہتا ہے۔

مرکبورس سال۔ جو کوئی اس صورت سے اختلاف کرے اس کو مارنے کی خواہش۔ مارنے کی خواہش یا خودکشی کی خواہش یا چیزوں پر تشدد کرنے کی خواہش۔ ڈرے کو عقل کھو بیٹھے گا۔ جو خودکشی تکمیل کیلئے۔

بے رُخی۔ بے اعتنائی۔ بے پرواہی

امبر گریا۔ ہر چیز سے بے رُخی۔ خوشی سے، غمی سے، لوگوں سے وغیرہ وغیرہ۔ ایسی چیزیں جو دوسروں کا دل توڑ دیں، ان سے بھی بے رُخی۔

ایسڈ فاس۔ جب جنسی شاعلی کی زیادتی سے کمزوری لاحق ہو جانے کے بعد زندگی کے معاملات سے بے رُخی ہو۔ ہر چیز سے دماغ بے اعتنائی برتے۔ زندگی میں یا مروتی دنیا میں دلچسپی نہ دکھائے۔

آرنیکا دماغ کی چوٹ

سکوٹا کے بعد بے رُخی

فاسفورس۔ خراب نوشی کے بڑے اثرات کی وجہ سے اپنے بہت ہی پیارے دوستوں سے بے رُخی اختیار کرے۔ اپنے بچوں سے بھی بے رُخی اختیار کرے۔

سائیکلیمین۔ سن یا س (عورتوں میں ۴۰ سال کی عمر کے بعد جب جیھن بند ہو جائے) میں دماغی خلل سے بے رُخی۔

فلورک ایسڈ۔ جن کو بہت زیادہ پیار کرتا ہو ان سے بے رُخی لیکن اجنبیوں کو پسند کرے۔ سیپیا۔ اپنے خاندان اور ان لوگوں سے جن کو بہت پیار کرتا ہے بے رُخی یا بے اعتنائی برتے۔

جنون، مایخولیا، (جنون یا ضبط بھی دیکھیے)

مایوسائیمس - مریض باتونی، لڑا کا اور اپنے آپ کو ننگا کرنا چاہے۔ وہ کینہ پرور اور راتی بڑتا ہے۔
 احمقوں جیسی جیسی ہنستا ہے۔ مضحکہ خیز ہنستا ہے۔ مضحکہ خیز اشارے کرتا ہے۔ لوگوں کی
 طرف چاقو تے کر دوڑتا ہے۔ جو لوگ اسے ملتے ہیں انہیں مارنے دڑتا ہے۔ جو قتل کرنے کی کوشش
 کرتا ہے۔ آدمی کو سوئے خیال کرتا ہے۔ خوشخوار جانوروں کے کاٹے جانے سے ڈرتا ہے۔ مایوسی
 کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈبو کر خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ خیال کرے کہ وہ غلط جگہ پر ہے۔ احمقوں
 جیسی ہنسی ہنستا ہے۔ تقریباً ہر وقت خوش خوش، جلدی جلدی بولے اور خوشی کے انداز میں بولے
 شدید حاسد - ہم کو ننگا کرنے کا رجحان اور اجنبی اعضاء دکھائے عشق اور خوش گانے گائے۔

بیسلا ڈونا - جب سر میں اجتماع خون ہو۔ آنکھیں خون کی طرح سرخ ہوں۔ اور مریض
 بہت ہی غصہ میں۔ کپڑے پھاڑے۔ کاٹتا ہے۔ مارتا ہے۔ دولتیاں جھاڑتا ہے۔ چھیلا جاتا ہے۔
 ایسڈ فلور - جنون یا ضبط کی ایسی حالت جب ایک کونے میں تمام دن خاموشی سے بیٹھا ہے۔
 بغیر ایک لفظ بولے جب بلایا جائے تو مشکل بولے۔ (پلسٹیل)

سٹر امونیم - حاد جنون یا تازہ جنون بغیر سر کی علامات کے۔ تصوراتی لوگوں کو مایوسیزوں کو دیکھے۔
 مایخولیا ڈرا ہوا - بہت باتونی۔ روشنی کی خواہش کرے۔ یعنی روشنی چاہے۔ کھانے پینے سے بچے
 اور کہے کہ ان میں زہر ملی ہے۔ بے چین۔ کانپے۔ بلا ارادہ پانا ناہ اور پیشاب خارج ہو۔ محل کے
 دوران پاگل پن۔

اگیر کیس ایم - بے خوف۔ دھمکیاں دے۔ تباہ کرنے کا جنون۔ اپنے اپنے کے خلاف ہو۔
 اور زخمی کرے۔ جھگڑائیاں کرے۔ شعر کہے۔ خوش دھرم اور لاپرواہ۔ احمقانہ اور گھٹیا باتیں
 کہے۔ بے موقع گائے اور سٹیاں بھجائے۔

آرم میٹ - غلط ذہن۔ زندگی سے محبت نہ خود کشی کرنا چاہے۔ دبا ہوا۔ افسردہ۔ ملی نہکتے
 ناامید، کم حوصلہ۔ اپنے آپ کو اس دنیا میں رہنے کے لئے غیر موزوں تصور کرے۔ ہر وقت کڑھے

گرم موسم میں افاتہ اور ٹھنڈے موسم میں زیادتی مرض -
 آر جٹلم ٹائپیکم - جنوں کا بڑھنے والا فالج یا زیادہ ہونے والا فالج -
 سلیشیا - انفلوئنزا کے بعد جنوں -

ٹیرنٹولا ہسپانیولا - جنوں اچانک ذہنی تبدیلی کے ساتھ جس میں وہ اپنے آپ کو یاد دوزل
 کو مارے، پھاڑے، ٹکڑے کرے اور تباہ کرے - اچانک شدید اور تباہ کن حرکات - دورے
 کے بعد افسوس کرے اور معذرت کرے - کسی ہونے والے واقعہ سے ڈرے - کسی چیز سے ڈرے
 جو کہ موجود نہ ہو - خطرناک چیزیں دیکھے جو کہ وہاں نہیں نہ ہی موجود ہیں - بے قابو ہو کر لپچے اور
 گائے - سر مارے اور بال نوچے - بے چینی، آنکھیں کھلی اور کٹی لگا کر دیکھے -
 لیکسس - مذہبی جنوں - خود پسند - حاسد - نفرت اور ظلم کرنے والا - اپنے سے بے جا
 محبت - حسد - بدگمانی - جب وہ کسی کو آہستہ آہستہ باتیں کرتے دیکھے خیال کرے کہ وہ اس کے
 متعلق ہی باتیں کر رہے ہیں -

کینابلس انڈیکا - بہت اونچے خیالات کے ساتھ جنوں - دقت آہستہ آہستہ گزرے - جگہ
 غیر محدود معلوم ہو -

آر سینکیم ایلم اور ڈیرٹرم ایلم { ہر گھنٹے میں تبدیلی ہو - ایک ہفتہ کے لئے - جب جنوں وقفہ دار بخار
 کے ساتھ ہو - دو ہر چڑھے - مریض نم دار ماحول میں رہے -
 نیٹرم سلف - جنوں اور دماغی تکلیف سر میں زخموں کے ساتھ

لائی سین ۲۰۰ - جنوں پانی اور نہانے کی دماغی علامات کے ساتھ پانی پینے کی بھی خواہش
 ہو - اپنے گھر کی چھت پر سے کود جانا چاہیے -

کالی بروم - کسی خاص نام کو سنکر اور خاص چیز کو دیکھ کر غصہ ناک ہو جائے -
 کاسٹیکم - شدید بیزان کے ساتھ جنوں - دماغی کمزوری - ناامیدی، پھنسیوں پر مریم وغیرہ
 لگا کر دبانے سے ناامیدی -

برٹامیو - کسی بھی قسم کا جنوں بڑھی ہوئی اور شدید نفسی خواہش کے ساتھ - بچوں کی برصی ہوئی

کمزوری اور بڑھے ہوئے غمزدگی۔

سائیکلکیمین - جب حیض باری ہونے پر مایہ نچولیا کو افاقہ ہو۔

سلفر - بکھرے ہوئے خیالات، اپنے خیالات کو مجتمع نہ کر سکے۔ جلد باز - تیز تر پہلے اپنی

خوراک پر حقو کے۔ زنگی کا جنون یا پاگل پن۔ بچے کی پیدائش کے بعد خاندان سے دلچسپی نہ رکھے۔

بچے کو دودھ نہ پلائے۔ خاموش رہنا چاہے۔ ہزار پوٹینسی میں دبکے

کر کوکس - شدید غصے میں بھٹ پڑے، اپنے بہترین دوست یا رشتہ دار کو دینا چاہے اور اسکے

فوراً بعد لیٹمان ہو جائے۔ طبیعت بدلے۔ ہنسنے کے بعد روئے۔

تھو جانا - مریض اپنے آپ کو شیشے کا بنا ہوا تصور کرے۔ ایسے اپنی جلد کو محفوظ کرنے کے

لئے کاغذات میں یا کسی دوسرے سامان میں لیٹے۔ کسی بھی چیز کو بھونے سے ڈرے کہ وہ ٹوٹ کر

دو حصوں میں نہ بیٹ جائے۔

ملی لوٹس - یہ دوائی ظاہر ہوتی ہے جب مندرجہ ذیل علامات ایک ساتھ ہوں۔

(۱) - مریض بھاگ جانا چاہے، خود کو مارنا چاہے۔ کینڈر پرور۔ جو قریب آئیں انہیں مارنے کی

دھمکیاں دے۔ خیال کرے کہ اس کے معدے میں شیطان ہے جو کچھ وہ کھتا ہے وہ اس کی

تردید کرتا ہے۔

(۲) - اپنے آپ کو چھپانا چاہے کیونکہ وہ خیال کرے کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔

امصابی - بزدل - اونچا بولنا چاہے کیونکہ وہ ڈری ہوئی ہے۔ بے خوابی۔

(۳) - پنہاں نکلنے اور اپنے آپ کو مار دینے کا جنون۔

(۴) - مذہبی جنون یا مذہبی مایہ نچولیا۔

در ٹیرم ایلمیم - چیزوں کو تباہ کرنا چاہے۔ اپنے کپڑوں کو بھاڑ دینا چاہے۔ نمایاں تشدد اور

تباہ کن اپنے اکھٹوں پر گھنٹوں دعا میں مصروف رہے۔ یقین کرے کہ وہ بلند مرتبہ جیسی ہے

زنگی کا جنون اور نظریوں کے بل ٹھنڈک اور ٹھنڈے پسینوں کے ساتھ۔ یہ ایک تہائی مریضوں

کو خشک کرنے کا امکان ہوتا ہے۔ مذہبی جنون، دلجوئی نہ کی جا سکے۔ مکرے میں مادہ اُدھر

دوڑے۔ زمین پر ہی نظر رکھے یا کونے میں بیٹھ کر کڑھے، گریہ زاری کرے یا روئے،
سیپا۔ موقفی حیض کے جنون کے ساتھ۔ تنگی تنفس اور قبض، گرم طبیعت رخص ۲۰۰
پوٹینی کی خوراک میں دیجئے۔

سٹیفگیریا۔ حلق یا ہاتھری کی وجہ سے پاگل پن یا جنون۔ جو کوئی بھی قریب آئے اسے لعنت
بھیجا گا لیاں دے۔

فاسفورس۔ حلق یا ہاتھری کی وجہ سے پاگل پن یا جنون سے زیادہ جنسی مشاغل میں مبتلا ہونا۔
قد کے نتیجے کی وجہ سے پاگل پن۔ دماغی اور ریٹھ کی نری یا کوئی اور ضائع کرنے والی بیماری
ایڈوڈم۔ جنون کے آخری مراحل جب پریشانی دماغ میں بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ پہنچتی ہے
وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے ابھی کیا سوچا تھا اور پریشان ہو جاتا ہے۔ دماغ آرام کرتا ہوا نہ
دکھائی دے اور دماغ تیز تر خیالات اس کو پاگل بنا دیں۔ کھانا کھاتے وقت خیالات کا زبردست
اجتماع۔ باتونی پن ذہن میں خیالات اتنی تیزی کے ساتھ آئیں کہ وہ گھنٹوں خوش اور بہت
ہی زیادہ اعتماد کے ساتھ بولتا جائے۔ غیر معمولی بصیرت یا غیب دانی۔

اینا کارڈیم۔ بہت ہی زیادہ دماغی کمزوری کے ساتھ جنون پاگل پن۔ ذہن مرکوز کرنے میں
وقت، سر دھری۔ مراق۔ مایحویا۔

آرم آر سینکم۔ متعصبوں کا پاگل پن۔ شرابیوں کا، مذہبی لوگوں کا پاگل پن۔ سخت افسوس
کرنے والا۔ باتونی پن اور ہنسنا۔ زندگی سے شدید نفرت۔ شدید چڑچڑاہٹ۔ خدی اور
آسانی سے ناراض ہو جانے والا۔ اپنے آپ کو غلط کام پر ملامت کرنے والا۔ دوسروں
کو تصور آتی زخموں کے لئے ملامت کرے۔

بیوفو۔ کاٹنے کی رغبت یا رجحان۔

حسد۔

ہائیوسائیمس۔ قتل کی کوششوں، غصے اور بد اعتمادی کے ساتھ، شہوانی جنون کے ساتھ۔
حسد کے برے اثرات۔

ایسٹ میلٹیکا۔ عورتوں میں بدگمانی اور حسد۔ گرمی۔ گرم کمرد اور گرم پانی سے ہٹانا جس سے مرض میں زیادتی۔

لیکسس۔ ڈراؤنے تصورات کے ساتھ۔ مزہ پڑانے کا رجحان۔ بھٹکے خیز نظریات یا خیالات۔ تکالیف سے یا امراض سے، بیوی اپنے خاوند پر اور خاوند اپنی بیوی پر اعتماد نہ کرے۔ ہمیشہ ان کے اعمال اور حرکات کی نگرانی کریں۔ تکلیف کی توقع کرے۔ لڑکیوں میں بدگمانی اور حسد۔ اپنی دوست لڑکی سے بدگمانی۔

پلسٹیللا } اگر مندرجہ بالا ادویات
نکسواپیکا } ناکام ہو جائیں تو ان ادویات
سٹرامونیم } کو دہری گئی ترتیب سے استعمال کرائیے۔

ناکام محبت

ایسڈ فاس۔ جب ناکامی محبت کی وجہ سے اونگھ آئے۔
ہیلی بورکس۔ جب ناکامی محبت کی وجہ سے قلت حیض واقع ہو۔
ہائوسائیمس۔ مایوسی، مرگی، ہنسے کی طرف مائل یا رجحان۔ مایوسولیا۔ خودکشی کی طرف مائل جس میں اپنے آپ کو ڈبو کر مرنے کا رجحان ہو جسد۔ ناخوشگوار محبت حسد کے ہمراہ۔
اگنیشیا۔ جب محبت کی ناکامی غم کے ساتھ ہو جب تک احساس نوجوان لڑکی اپنی محبت کے متعلق سمجھے کہ اس نے غلط محبت کی ہے اور نوجوان نے اسے مایوس کر دیا ہے۔ وہ اس دوائی کا استعمال سے غلا سفر اور سمجھدار بن جائے گی۔

نیٹرم میور۔ ناکام محبت۔ محبت کا تعلق توڑ دینا چاہے لیکن توڑ نہ سکے۔
جب اگنیشیا ناکام ہو جائے تو یہ دوا دیجئے۔

محبت میں گرفتار ہونا۔

نیٹرم میور۔ محبت میں غلط طور پر گرفتار ہو جانا۔ اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ شرابی۔ شہ مرد یا گھریلو ملازم سے جس سے عام طور پر بچے، وہ محسوس کرتی ہے کہ اس معاملہ میں بے عقل ہے۔

لیکن اس سے بچ نہ سکے۔ اس دوائی کا استعمال اس کے دماغ کو صحیح کر دینا۔
باتونی پن۔ (دیکھئے لون)

بھوٹ بولنا۔

ادویم۔ جو لوگ بھوٹ بولنے کے عادی ہوں ان کیلئے یہ دوائی مفید ہے۔
کلکیر یا کارب۔ چوری کرنے اور بھوٹ بولنے کا رجحان۔
مارفنینم۔ بھوٹ بولے بڑھڑاپن۔ نقائص نکالے خواب جیسی حالت میں ہو۔

جنون۔ (دیکھئے۔ پاگل پن)

برٹیا میور۔ کئی قسم کا بھی جنون، بڑھی ہوئی شہوانی خواہشات کے ساتھ۔
ملی ٹوٹس۔ بھاگ جانا چاہے یا اپنے آپ کو قتل کرنا چاہے۔ آوارہ جو کوئی بھی تہرب
جائے تو اسے مارنے کی دھمکیاں دے۔ مذہبی مانجھو لیا یا مذہبی جنون۔
سٹرامونیم۔ شدید جنون قتل کر دینے کے رجحان کے ساتھ۔ پھرتے سے زخمی کرنے یا کاٹنے
کا رجحان۔ پریشانی کے ساتھ اپنے منہ کو سوراخ کی طرح کر دیتا ہے۔ روشنی اور رفاقت کی خواہش۔
تالیاں بچائے۔ حمل کے دوران۔ مذہبی جنون۔ ہر وقت دعا مانگنا چاہے۔ فضول اور بے
سر و پا خیالات کے بولے۔ غریب نظر یا اداہم ہندو کی کیفیت کے ساتھ۔ زچگی کا جنون۔ باتونی
اپنے آپ کو بے اختیارانہ گرائے۔ روشنی میں کیفیت خراب اور اندھیرے میں افاتہ۔
کوکولس انڈ۔ جب حیض کے دنے کی وجہ سے یا رکنے کی وجہ سے جنون لاحق ہو جائے۔
ہائیو سائیمس۔ مزاج۔ کپڑے اتار کر ٹھکانا چاہے۔ حسد کے ساتھ جنون۔ احمق۔
ورٹیم ایلیم۔ ہر چیز کو کاٹنا اور بھاڑنا چاہے۔ خاص طور پر کپڑوں کو۔ ہر کسی کو چومنا چاہے۔
لیکسس۔ گھر کا تباہی و بربادی کے بعد جنون۔ مرگی کے حملے سے پہلے جنون۔ مذہبی جنون
برائی اور ظلم سے بھرا ہوا۔ خود کو دھوکہ دے۔ حامد نفرت اور ظلم۔ وہ اپنے رشتہ داروں
اور دوستوں کو اپنے بُرے افعال کی وجہ سے اپنی روحانی ٹھکانا کی کہانی سن کر ناراض کرے۔

اوپیم۔ ٹراؤنے خیالی تصورات۔ فحش۔ ناشائستہ۔

سپیا۔ بہت زیادہ خوش حیض کے دوران جنون یا سس یا س کے وقت جب اپنا ملک خون میض کے بند ہو جائے اور خاندان سے دلچسپی نہ رہے۔

پلسٹیللا۔ حیض کے دہنے کی وجہ سے جنون۔

بیلادونا۔ ایک لٹو خوش لیکن دوسرے طر ارد گرد بیٹھے والوں پر حقو کے یا کاٹنے دوڑے۔ یہ ٹر ٹریم اور ہاؤس ٹیس کے درمیان کی دوائی ہے، چونگ جاتا ہے۔ کود جاتا ہے۔ نیند سے جانے پر گر جاتا ہے۔ مرکوریس۔ جنون، رات کو کپڑے دور بھینک دیتا ہے۔ کپڑے پھارتا ہے۔ برا بھلا کہتا ہے۔ بوتا ہے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتی ہے۔ اکثر تھوکتی ہے۔ اپنے پاؤں سے تھوک کو پھیلا دیتی ہے اور کچھ تھوک خود ہی چاٹ جاتی ہے۔ گائے کا گوبر یا جوڑ کا گار چاٹتی ہے۔ کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتی لیکن جب بھجوا جائے تو زراحت کرتی ہے۔ اجنبیوں کو ناک سے کھڑنے کی زبردست خواہش جب چل پھر رہی ہو یا سیر کر رہی ہو۔

ٹیرنولا سپانیولا۔ جنون۔ پہلے ڈاکی پھر ہر ایک کو گالیاں دے۔ جس چیز پر ہاتھ پڑے یا جو چیز ہاتھ میں آئے تباہ کر دے۔ اپنے کپڑے پھاڑے، ہنسے اور لگائے، بوڑھے آدمیوں کی عمر کی وجہ سے منہ بنائے۔ دورہ بیہوشی کی نیند پر ختم ہو۔ چاہے کہ ہر چیز حرکت میں ہو۔ کسی دیکھنا برداشت نہ کرے۔ جانتی ہے کہ اس کے رشتہ دار گھر کے ارد گرد بغیر کسی مقصد کے گھومیں۔ وہ نہیں جانتی کہ کوئی بیکار بیٹھے یا سست ہو۔

سلفر۔ فلسفیانہ جنون۔ کچھ نہ کرنا بردقت سوچتے رہنا کہ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا اور آخر کار قدرت پر پھوڑ دینا۔ اور تب پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا۔ اسکا باپ کون تھا اور لڑی طرح۔ اکیٹارسموسا۔ اعصابی درد کے غائب ہونے کے بعد جنون۔

کیو پرم میٹ۔ جنون کے دورہ کا خاتمہ پسینہ پر ہو۔

پلاٹینا۔ پریشان کن حالات کے بعد۔

آیوڈم۔ خاموشی اور سوچ، پجار کے بعد جنون میں افاتہ۔

کلکیر یا کارب - مذہبی جنون - مذہب کا پابند جنون کے تحت پرکے طور پر تناسب کی تیز جاتی رہے۔
 کیمفر - زہنگی کا جنون آنکھیں سُکڑھی ہوئیں - شرارے بھٹکتے ہوئے اور گھڑتی ہوئی - زرد
 چہرہ - اور ماتھا ٹھنڈا - گالیوں کی زبان میں لعنت طاعت کرے۔ جلد خشک -
 نکسو امیکا - بے خوابی کی وجہ سے جنون - منہ کیل لیتا ہوا - اور پُرجوش -
 اسٹیل لاگو - ہانے کا جنون - خود کشی کرنے کی تحریک خاص طور پر رُڈ بکر -
 مایخو یا (پاگل بن بھی دیکھے) - بھول جانا (داغی غیر حاضری) - حافظہ یادداشت -
 اور سوچنا -

کنجوس - بنجیل

لائیکوپوڈیم - حرص - طبع یا کنجوسی کی عادت کی چوٹی کی دوائی ہے -
 پلیٹیل - کنجوس - ناقابلِ اقتدار - غیر دماغی طور پر غیر ماضی اور کم حوصلہ -
 آریٹیکم ایلیم - جب مندرجہ بالا ادویات فیل ہو جائیں تو کنجوسی کی عادت ہٹانے کیلئے مفید ہے -

غلطیاں

لائیکوپوڈیم - حساب کتاب - حروف تہجی - الفاظ کے استعمال میں بھون میں کھنے میں غلطیاں کرنا -
 نکسو امیکا - وہ ہمتوں اور اذنان میں غلط جواب دیتا ہے -

غلطیاں
 نکس ماسکٹا جگہوں یا محل وقوع میں غلطیاں کرنا - دیئے گئے نمبر پر آرائش کیجئے -
 پڑویم

نیرٹرم میور - بولنے اور بکھنے میں غلطیاں کرنے کا رجحان
 کینابلس سٹائیٹوا - لکھنے اور بولنے میں غلطیاں کرتا ہے جو کچھ پڑھتا ہے یا سنتا ہے -
 اس میں غلطیاں کرتا ہے -

چائٹ - غلط الفاظ استعمال کرے یا الفاظ کو غلط جگہ استعمال کرے -
 لیکس - الفاظ لکھتے وقت غلطیاں کرے -

تھو جا۔ پڑھنے اور لکھنے میں غلطیاں کرے۔ آہستہ بولے جیسا کہ الفاظ کھودے۔
 زیر و فاسلم۔ گند ذہن۔ مطالعہ کے وقت ذہن یکسو نہ کر سکے۔ نام بھول جائے۔ الفاظ کے
 آخری لفظ پہلے لکھے، عام الفاظ کے غلط بھی کرے۔

ایونٹا سلیکٹا۔ بولنے اور لکھنے میں غلطیاں کرے۔ بھول جائے۔ بے پرواہ۔
 دھصل یقین۔ یا غیر پختہ یقین۔ خیالات کی کمی۔

مذاق اڑانا یا جنسی اڑانا

لیکس {
 پلاٹینم {
 دوسرے لوگوں یا رشتہ داروں کا مذاق اڑانا۔
 دی گئی ترتیب میں دوائی آزمائیے۔

جلد گھبرا جانا۔

کیلیڈیم۔ بہت زیادہ گھبراہٹ۔ اپنے ہی سائے سے گھبرائے۔ شہوانی خیالات کے ساتھ
 تمام رات جاگتا رہے۔ سونے سے پہلے اندیشہ۔ مستقبل کا ڈر۔ احمقانہ جرأت۔ دروازے کا
 زور سے بند ہونا یا اخبار کے کھر کھرانے سے چونک جائے۔

ایوڈوم۔ سخت گھبراہٹ۔ چیزوں کو دور بھینک دے۔ اور ان کو توڑ دے۔ بغیر کسی وجہ کے
 لوگوں کو ہینا یا مارنا چاہے۔ بھولنے والا۔ کمزوری اور چڑچڑاہٹ۔

ایسٹ فاس۔ پرانے غم کو جو سے اعصابی کمزوری۔ زیادہ دماغی کام۔ جنسی مشاغل کی زیادتی
 جسم اور دماغ پر اعصابی دباؤ۔

کیسٹوریم۔ ٹائیفائیڈ بخار کے بعد اعصابی کمزوری اور چڑچڑاہٹ۔ اعصابی کمزوری کے حملے
 جبکہ نامکمل ہسٹیریا ہو۔ شدید کمزوری کے ساتھ بٹھوں کا پھٹنا۔

ایپس میلیفیکا۔ لڑکیوں میں اعصابی کمزوری۔ بے چینی کے ہمراہ۔ گھبراہٹ۔ بے وقت کی
 ہنسی، کام کے وقت متلوں مزاحی۔ بھدی چیزوں کا ہاتھ سے گر پڑنا۔ اور تب ہنسنے۔

کالی فاس۔ اعصابی کے لئے شاندار اور چوٹی کی دوا ہے۔

لیک کینیم - مزوت سے زیادہ حساس - مثال کے طور پر ایک مریض کئی دنوں سے انگلیاں علیحدہ علیحدہ کئے ہوئے پڑا ہے اگر وہ جڑ جائیں تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے -

نیٹرم کارب - معمولی سی آواز سے گھبرا جانا یا پریشان ہو جانا - دروازے کا زور سے بند ہو جانا - اعصابی گھبراہٹ اور دل کی دھڑکن بہت زیادہ تھکاوٹ کے ساتھ - کاغذ کا کھڑکھڑانا - دل کی دھڑکن اور جڑ چڑا پن پیدا کر دے - گانا خود کشی کے رجحان کا سبب ہے - کانیا - اعصابی گھبراہٹ - بے خوابی - رونے کا جذبہ - اعصابی درد - پٹھوں کا پھٹ کرنا - دانت درد - بہرے کا درد - سُرخ چہرہ اور گرم سر خاص طور پر خوشی کی وجہ سے یا اچانک خوشی یا مریض کسی بڑے کام کے لئے محنت کر رہا ہو -

کالوسٹھس - جھلاہٹ یا جڑ چڑا پن اور اعصابی تھکان - کاروبار میں ناکام ہونے کی وجہ سے یا عورت میں جو اپنے خاوند کی دن رات نگرانی کرے دوسری عورتوں سے دور رکھنے کے لئے - کوئیم - رانڈ عورت اور رانڈ مرد میں اعصابی تناؤ جو کہ اپنے جنسی تعلقات سے اچانک ختم ہو جائیں - جسم اور دل کی کمزوری دماغی یکسوئی نہ کر سکیں - کانپنا - ہلنا اور پٹھوں کا پھٹ کرنا - اعصابی - پشیمردہ حالت - زندگی سے تھکے ہوئے -

کالی آئیوڈ - اعصابیت اور دماغی تھکاوٹ - جب آرام کر رہا ہو اور لگاتار حرکت اور چلنے سے مرض میں زیادتی سخت ظالم اور جڑ چڑا -

کروٹیلوس ہوا - اعصابیت اور دماغی تھکاوٹ - کانپتا ہوا - گھبرا ہوا - کمزوری - قوت حیات کی اچانک اور شدید کمی اور انتہائی کمزوری - باتونی -

آرم میٹ - رانڈ ہوا، غم سے پُر - ہر چیز سے غیر مطمئن - بالخصوص - تصور کرے کہ وہ اس دنیا کے لئے غیر موزوں ہے - موت کی خواہش کرے - جو اس کو خوشی دے - لڑاکا - جھلا ہوا - خدیہ معمولی سی بھی اختلاف رائے برداشت نہ کرے -

کیمفر - انتہا پسندی کی دوائی - پہلے پہل تشدد - جوش اور جنون اور بعد میں جوش غائب، ہونا - بیہوش اور ٹھنڈا پن - شدید کمزوری اور تھکاوٹ شدید -

نکسوامیکا - لڑاکا - ملامت کرے - تشدد کو بھی، طاقت و خوشنویات - تیز روشنی کوئی آواز
یا بولنے کو برداشت نہ کر سکے - غیر مستقل مزاج -

کاکولس - ششاش بٹاش دکھائی دے - اپنی محنت کی طرف توجہ نہ دیں - دوسروں کی بیاہری کمزور
زیادہ متوجہ اور پریشان بہت ہو - اعصابی نظام کی شدید بے چینی - معمولی سی بھی آواز یا حرکت
آواز ناقابل برداشت، تھوڑی دیر کے لئے بھی بازو سیدھے کئے جائیں اور وہیں رکھ کر ہاتھیں -
اور جب ڈھیلے کئے جائیں تو درد کریں - دماغ اور جسم کے کام سنست، فالجی کمزوری پیدا کریں -
تھوڑے دن - بہت حساس اعصابی حالت کمزوری و کانپے، ٹھنڈک - پریشانی - عیش کھانے اور
آسانی کے ساتھ گھبرا جائے -

جیلسیم - ڈر - مدد اور مشکل کی نکالیاں - ایک سپاہی جنگ کو جاتے ہوئے بے اختیار
پاخانہ کر دے - ڈر کی وجہ سے بلا اختیار پیشاب کرے - چیلنی و ڈر کا ہمراہ ہونا -
آر جیم ٹائٹریکیم - جب کسی دوست یا اجنبی کی ملاقات کے لئے یا ڈرامہ کے لئے کپڑے پہن رہا
ہو تو اپنا ایک اسپہل کا حملہ - یہ سب اعصابی ککساہٹ کی وجہ سے ہوتا ہے -

کریوزوٹم - ذہنی طور پر بہت چڑچڑا - بہت سی چیزوں کی خواہش کرے لیکن جب پیش
کی جائیں تو انکار کر دے - کوئی چیز بھی موزوں نہ لگے اور کوئی چیز بھی اسے مطمئن نہ کر سکے -
ضعف اعصاب - یا اعصابی کمزوری - اعصابی تھکاوٹ، دماغی تھکاوٹ

یا تھکاوٹ - (دیکھیے دماغی تھکاوٹ اور غمی)

کالی فاس - ضعف اعصاب کے لئے بہترین دوائی ہے - یہ خاص طور پر ان کے لئے
اچھی ہے جو کم اعصابی طاقت کے ساتھ یا کمزور اعصابی طاقت کے ساتھ پیدا ہوئے ہوں -
شرعیلے یا بہت زیادہ رات کو احتلام - جماعت کے بعد شدید کمزوری یا جنسی طاقت گھٹی ہوئی
یہ بڑی بڑی علامات ہیں

سٹرکینیا فاس - یہ دوائی کالی فاس کے بعد اچھی دوائی ہے - اعصابی طاقت کی بے ترتیبی

سے یہ دوائی ظاہر ہوتی ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ یا بعض دفعہ بہت تھوڑی ذہن اور بچوں پر کنٹرول نہ رہے۔ یہ عام قلتِ خون میں بھی دی جاتی ہے۔

پیکرک الیڈ۔ یہ سٹرکینیا فاس کے بعد مفید ہے۔ ذہنی اور جسمانی کمزوری اس کی رہنمائی بخشی ہے۔ تھوڑی سی محنت ہی سے تھکاوٹ محسوس کرنا۔ بولنے کی خواہش نہ ہو یا کوئی کام کرنے کی خواہش ہو۔ لیٹے رہنا چاہے۔ بھوک کی کمی۔ بے عملی یا بے حسی کا رجحان۔

امبرگر لیسیا۔ بہت ہی ناخوشگوار اشیاء کے درمیان رہنا پڑے جو اس کے حواس پر مسلط ہوں اور وہ ان سے بچکارانہ حاصل کر سکے۔ تیز تجسس۔ بہت ہی ناخوشگوار چیزوں کے درمیان رہے۔ جو اس پر مسلط ہوں۔ اعصابی ٹوٹ پھوٹ۔ ٹوٹی ہوئی شخصیت۔ خاندان میں اموات۔ کاروبار میں ناکامی وغیرہ کے مددوں کی وجہ سے ذہنی کمزوری۔

نیرم میور۔ ماضی کی تلخ یادوں پر غور و خروش ہو۔ رات کو جاگ کر ان پر گڑھ قرار ہے۔ یہ انگلیشا کی زمین ہے۔ اس کی تکمیل کرنے والی ہے۔

آرجنٹم نائٹرکیم۔ جب کالی فاس فیل ہو جائے تو یہ دوائی دی جائے۔ خاص طور پر جب کریمک جہتی میں کمی ہو۔ اعصاب اور بچوں پر اختیار نہ ہو۔ بازو کا پٹنے ہوں۔ جب ملاقات مقرر کی ہو۔ وہ پشیمان ہو جاتا ہے۔ پسینہ پینہ ہو جاتا ہے۔ جب شادی ہو اور اس میں غائیر ڈرامہ یا چرچ میں جائے۔ پشیمانی کے ساتھ ڈرے۔ یا اسہال بھی آئیں۔ بٹھائیوں کی زبردستی خواہش جو موافق نہ آئیں۔ اعصابی مایوسیا، پروردہ ٹھنڈک کے ہمراہ کانپے۔ دماغی تھکاوٹ چکر۔ نرم ٹپی اور دباؤ سے تکلیف میں افادہ ہو۔ طلق میں پھانس کا احساس ڈکارا دہ کا مرضِ طوبت کی تے۔ گیس کی تکلیف جو گرگری سے اور رات کو زیادتی ہوتی ہے۔

زنکیم۔ دماغ اور بچوں کی شدید تھکاوٹ جب یہ مرگی یا اس کے غلط علاج کی وجہ سے ہو۔ یہ کاروبار میں ناکامی کی پریشانی یا طلباء میں بہت زیادہ دماغی محبت کی وجہ سے ہو۔ یادداشت کمزور۔ صبح کی نااہلیت۔ چکروں کے اکثر حملے جن کو لینے پر افادہ ہو۔ مریض بے پرواہ ہوتا ہے غیر متحرک ہوتا ہے۔ جنسی زیادتیوں سے نامردی۔ یہ دوائی کافی عرصہ تک پوٹیشی کی تبدیلی کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔

ہائپرکم - اعصابیت کی بھی قسم کی ہو حد درجہ تک کی تبدیلی کی وجہ سے یا کار کے حادثہ وغیرہ
گفٹار کا بنتی ہوئی اور جھجک کے ساتھ - مریض خاموش رہے اور زندگی میں دلچسپی نہ لے۔
اینا کارڈیم - اعصابی تھکان - زیادہ پرٹھائی کی وجہ سے یا مادہ منویہ کے اخراج کی وجہ سے -
یادداشت کمزور محسوس کردہ دو ہیں - اس کی ہرمت یا ہر طرف اجنبی ہیں - اس کا اپنا بچہ اس کا
بچہ نہیں ہے - ذہن اور جسم علیحدہ علیحدہ ہیں - مختلف قسم کے اثرات کا دباؤ اس پر پڑ رہا ہو - ایک
سے کتاب کے برائی کرے اور اچھائی کے لئے کہے - سب خواب معلوم ہو اور اس دنیا میں کوئی چیز بھی
حقیقی نہیں۔

آرٹو جنٹ میٹ - انسان کی یادداشت اور ذہن کا بگاڑ - دلیل دینے کے نااہل - سوچنے کے
اہل - ذہنی صلاحیتوں کی کشمکش کا رو باری آدمیوں - طلباء پڑھنے والوں اور سوچنے والوں میں -
آرم میٹ - ٹم کی وجہ سے تسکلیف - ناکام محبت - ڈر - غصہ - اختلان رائے عزت
نفس کو کچلنے کی تسکلیف - اپنی حالت پر گڑھے اور دنیا سے نفرت کا اظہار کرے - اپنی ذہنی
حالت کسی کو نہیں بتاتا - اور تب خود کشی کر لیتا ہے -

کوئیم - ذہنی مشقت کے نا قابل - یکسوئی کی کمی - کسی چیز پر توجہ مرکوز کر کے - آہستہ آہستہ
ڈبکی ٹیکس - خوفزدہ - پشیمانی علیحدہ رہنا چاہے - غمی - ناخوشیا - ناامیدی اور بے چینی
فیصلہ کر کے - نبض بے قاعدہ - کمزور اور آہستہ - اپنے آپ سے کام لینے کی نااہلیت -
سائپر میڈیم - لمبی بیماری سے اعصاب کا درجہ برہم ہو جانا - چائے کافی کا بے تحاشا
عادی ہونا - انفلوئنزہ کے بعد دماغی ہیجان -

میگنیشیا کارب - زندگی کے تھپیڑوں کی زیادتی سے اعصاب کا تھک جانا -
۲۰۰ پونسی دیکھے۔

زنگ میٹ - آواز - کان کے کھر کھرانے، بولنے یا اپنے بہترین دوست کی بات
سننے سے بھی حساس -

میفاٹیس - بخی طاعت میں دینے سے اعصابی نظام کو درست اور تھکاوٹ کو دور کرتی ہے۔

ایپس ایم۔ اعصابی لڑکیاں، بے چینی اور اشتعال پذیری۔ بے وقت کی فہمی کام کے وقت متلون مزاجی۔ بھدی چیزوں کو ہاتھ سے گرائے اور ہنسے۔

کاربوونک۔ چیزوں کو سمجھنے کی نااہلیت۔ بلا تیز کردہ خوشگوار میں یا نا خوشگوار میں۔ جب خوفناک چیزوں کے متعلق بتایا تو وہ اڑ کر تکی دکھائی نہ دیں اور نہ ہی خوشگوار چیزیں اسے خوشی دیں۔ سکول کے لڑکے اور لڑکیاں جو بہت آہستہ سکھیں اور رات کے خوف میں مبتلا ہوں۔ وہ اکیلے نہ سو سکتے ہوں۔ یا بغیر کسی اور کے کمرے میں نہ جائیں۔

سینور الگنا۔ احمق پن اور دماغی اتیری مریض ادھر ادھر اور ہر جگہ تیزی سے چھٹتا۔ پھرتا ہے۔ کوئی کام شروع کرتا ہے بغیر مکمل کئے چھوڑ دیتا ہے اور دوسرا کام شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسرا اسی طرح پڑا رہتا ہے۔ سست اپنے آپکے یکسو نہ کر سکے۔

الگیشیا۔ سرور کے ساتھ شدید اعصابی تھکاوٹ۔ کانپے بے خوابی بچے یا خاوند کے کھو جانے یا موت کے بعد۔ وہ کوئی ہے۔ اور سو نہیں سکتی۔ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ اپنے آپ سے شرمندہ ہے۔

ٹیو بر کو لینم بود۔ محبت کا نہ رہنا۔ اپنے بچے یا خاوند سے محبت نہ کرے۔ ذاتی نااطاقتی۔ یہ علامات ٹی بی ہسٹری کے ساتھ۔

کلکیریا کارب۔ مذہب، غیر مستقل مزاج، ڈرپوک۔ بے چین اور اعصابی ڈرے کردہ نا خواستہ ہے۔ اتیری اور سوچنے کے نا اہل۔ اندرونی دباؤ۔ افسردہ دل۔ پریشان۔ عورتوں کی موجودگی میں خوش نہ رہے۔ یا بے چینی محسوس کرے ٹھنڈے مرطوب موسم میں مرض میں زیادتی۔

ناجس۔ بھول جانے والا۔ غیر حاضر دماغ۔ خود کشی کا رجحان۔ تصوراتی چیزوں پر کڑھے۔ معمول سے جذبات کی وجہ سے رونے لگے۔ اپنی جنسی نااہلیت پر پریشانی اگرچہ غلطی موجود ہو۔ جیسے کہ ہر چیز غلط کر رہا ہو۔ اور تصحیح نہ کر سکے۔ جو چیز کرنا ہو اس کا بہت زیادہ ادراک اور اسے نہ کرنے کا بے قابو رجحان یعنی اس کو کرنے کا نہ کٹر ٹول ہونے والا رجحان۔ احمق۔ پریشان۔

یسی لولا۔ دماغ کا آوارہ پن۔ کسی ایک چیز پر مرتکز نہ رہ سکے۔ ایک چیز شروع کرنا
پھر اسے چھوڑ کر دوسری کرنے لگتا ہے۔ بھوک نہ ہو۔ پاش شدہ زبان۔ منہ خشک۔ گرم اور
بند کمرے میں زیادتی مرض۔ ایک ایم طاقت میں دیجے۔

کوکولس۔ ایک غیر پسندیدہ موضوع پر خیالات کا اجتماع۔ خیالوں میں گم اپنے
متعلق کچھ نہ دیکھے۔ ضعیف العقلی کا ظاہر ہونا۔ دماغ کو نامعلوم دے۔ غلام میں گھومتے
آہستہ آہستہ آنکھوں کو سوال کرنے والی کی طرف گھمائے۔ بھٹکل جواب دے۔ ضعف اعصاب
مریض کی لگاتار۔ تیمارداری خاص دلچسپی کے ساتھ۔ خاص طور پر عورت کا اپنے خاوند کا تیمار دار
بنایا خاوند کا پیاری بیوی کا تیمار دار بننا۔ پریشانی اور غنیمت کی کمی۔ یہ پیشہ ور زبوں پر الحاق
یعنی وہ تیمارداری کی وجہ سے ضعف اعصاب میں مبتلا نہیں ہوتیں۔ اس کا دماغ سست
کام کرتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے ابھی کیا پڑھا ہے۔ دماغ کی اتھری۔

لیک کینم۔ دل شکستہ۔ ناامید۔ زندہ پہنچے میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اس کی بیماری یا یوں
کہن ہو۔ دنیا میں کوئی دوست نہ رکھتی ہو۔ رونے والا ذہن۔ علم کا بوجھ بڑھ چڑھا۔ بچہ ہر وقت
پچھتے چلائے۔

سٹیفھیسگیا۔ جب ایک آدمی اپنے حکام بالا سے غیر مطمئن ہو اگرچہ اس نے اچھے
کلمات سننے کے لئے بہترین کام کیا ہو اور اپنی تمام طاقت کام کو سر انجام دینے میں صرف
کی ہو اس کے نتیجے کے طور پر وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ دو آئی اسے فوراً بحال کر دے گی۔

نائٹرک ایسڈ۔ بہت معمولی بات پر سیخ پا ہو جائے۔ کام کرنے کا میلان نہ ہو۔
نبیجہ کام کی تکمیل نہ کرنا چاہے۔ دماغ کمزور اور آوارہ۔ یادداشت کی کمزوری اور آوارہ پانے
بہترین دوست سے بھی زیادہ ناراضگی۔ بیمار کی تیمارداری سے جسم اور دماغ پر بوجھ یاد باؤ۔
ڈرڈسیرا۔ بے اعتمادی سے بھرا ہوا جیسے کہ وہ بھوٹے آدمیوں معاملات کر رہا ہے۔
بے چین۔ غلغلیہ طبیعت۔ بداندیش۔ حاسد لوگوں سے دھوکہ دینے جانے کا خیال کرے۔
ناموافق بات سننے سے ڈرے۔

سپینا - اعصابی اور کودنے والی - ہر کسی سے اور ہر چیز سے دُور جانا چاہیئے۔ انہماک میں ایسی آنکھیں بند کر کے لیٹ جانا چاہیئے۔ اگر وہ دس منٹ کی نیند لے لے تو وہ تبدیل شدہ صورت معلوم ہو۔ کند ذہن بے تعلق - خشکی ماندہ - پڑھ چڑھی - وہ احقانہ اور بھدھی ظاہر ہو۔ سمجھ کی کمی، آہستہ سوچے اور بھول جانے والی ہو۔

پلاٹینم - جب ذہنی علامات ظاہر ہوں تو جسمانی علامات غائب ہو جائیں اور اسکے الٹ ہو جب دماغی طور پر خوش ہو تو جسم نکالیف میں مبتلا ہو۔ اور جب جسم آرام میں ہو تو ذہن متاثر ہو۔

سلیشیا - صبح کے وقت چلائے کہ اس کے ہاتھ سوگئے ہیں، صرنبیوں اور سوئیوں ہی کے متعلق سوچے۔ ان سے ڈرے۔ ان کو تلاش کرے اور احتیاط کے ساتھ گئے ہر جگہ بیٹوں کو تلاش کرے۔

یوہر کو لینم - ہر دم تبدیلی کی خواہش - سفر کی، کسی جگہ جانے کی اور کوئی مختلف کام کرنے کی خواہش - پاگل پن کے قریب لوگ۔

تھرڈیون - ہر آواز تمام جسم سے آ رہا ہوئی معلوم ہو۔ جلی اور چمک کا بدبختی۔ سٹرکولیا - یہ نظام دوران خون کو باقاعدہ کرتی ہے۔ مقوی - اہمال روکنے دل کے نظام کو درست کرنے اور اسے باقاعدہ کرتی ہے۔ اور بطور پیشاب آور کام کرتی ہے۔ کمزور دل۔

ایرومنافاس - سوالوں کے جواب دینے اور محفل سے یا لوگوں کی صحبت سے گریز کرے۔ بہت پرجوش اور بھول جانے والا۔ غم کے مزمن اثرات ایسے یہ اگنیشیا کے بعد کی دوائی ہے۔ ذہنی کمزوری - جنسی مشاغل کی زیادتیوں اور بہت لمبی مدت تک دماغی کام لگنے سے متغیر ہے۔ کالج کی زندگی کے اختتام پر ذہنی تھکاوٹ - ہر وقت لیٹے رہنا چاہے کیونکہ تھوڑی سی محنت یا چلنے سے تمام علامات واپس آ جاتی ہیں۔ غیر حاضر دماغ اعصابی کمزوری - لاتعلقی - غیر مستقل مزاج خیالات کی کمی - لمبی ذہنی خستہ کے بعد ذہنی تھکاوٹ۔

کینابلس سٹامپا - اپنے آپ کو مارنے کی سرگوشیوں کی سرسراہٹ مٹے۔ سمجھ کر یہ اعلیٰ طاقت کی طرف سے حکم ہے۔

ضدّی - (ناراضگی بھی دیکھئے)

کیومیلا - ضدّی بنتے - جو کچھ انہیں کرنے کو کہا جاتا ہے نہ کریں - چیزیں طلب کریں

لیکن جب پیش کی جائیں تو لینے سے انکار کریں -

کلکیر یا کارب - مزاجی دوائی ان بچوں کے لئے مفید ہے جن میں موٹے ہونیکا رجحان ہو -

سٹیفگیر یا - بد مزاج بچے جو چیزوں کیلئے چلائیں لیکن جب یہ جائیں تو انکار کریں -

نکسوامیکا - دوسروں کی خواہشات کی مزاحمت کرے - پاگل پن - کثرت حیض -

آرژنٹم نائٹرکیم - بہت ہی ضدّی جب کسی چیز کی تجویز کی جائے تو عجیب و غریب اعتراضات کرے -

گرم کرے میں گھٹن محسوس کرے - عجیب خیالات سے بھرپور - ہر چیز ضدّی چاہے - ضدّی

ہوا - ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی خوراک چاہے -

پڑھ چڑا پن

آرم میٹ - پڑھ چڑا پن - خوشی سے تبدیل ہو یعنی پڑھ چڑا اور پھر خوش و خرم -

لائیکوپوڈیم - اسہال میں یا جاگنے پر پڑھ چڑا پن -

کیومیلا - بچوں میں پڑھ چڑا پن - دانت نکلنے کے دوران تنگی تنفس کے ساتھ -

فیرم میٹ - پڑھ چڑا پن - تردید کو برداشت نہ کر سکے - لڑاکا -

پٹرولیم - بہت پڑھ چڑا - کسی کو بھی بغیر کسی وجہ کے مار پیٹ کرے -

سمجھ - ادراک

کالچیکم - ٹائیٹانیڈ بنجار میں ادراک میں کمی جائے یا سمجھ میں کمی آجائے -

برٹیا کارب - جسمانی طور پر کمزور بچوں میں سمجھ کی کمی -

پلمبم - آہستہ آہستہ سمجھے - آہستہ محسوس کرے - فالجی دیوانہ پن - دماغ کی کارکردگی

ست۔ یہ سب آخر کار نابج پر ختم ہو۔

اگر کمیں میکی لیں۔ بھڑے رہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سے لمبے لمبے قدم بھرے یا
کو دے جیسے کریہ درختوں کے تنے ہوں۔ ایک سا سوراخ ڈراؤنا گہرائی کا معلوم ہو۔
چچ بھرا پانی بڑی جھیل معلوم ہو۔

زہر دیا جانا۔

ایلیم سیٹ۔ زہر دیئے جانے کا ڈر۔

ہائیسوٹائیس۔ زہر دیئے جانے کا گمان۔ ایک خوراک ایک ایم طاقت میں دےجے۔
لیکس۔ تصور کرے یا فرض کرے کہ اسکے رشتہ دار اس کو زہر دینے کی
کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ ان سے کھانے والی ہر چیز لینے سے انکار کرے۔

غزور۔ تکبر

پلاڈیم۔ غزور کو ٹھیس لگی ہو محسوس کرے کہ اس کی عملی یا زبانی بے عزتی کی گئی ہے۔
پلاڈینیم۔ ذہنی جھوٹ یا فظوں کی مار۔ تھوڑی سی بھی اختلاف رائے کو بہت زیادہ
محسوس کرے۔ گہرے زخم دل تک کٹے ہوئے۔ دل شکستہ۔

لائیکوپوڈیم۔ سخت اور نمود و نمائش والا۔ اپنی ہی بات منوانے والا۔ یا اپنی
ہی مرضی کے مطابق کرنے والا

لیکس۔ تکبر کا جنون۔ خوبین۔ حاسد۔ نفرت۔ انتقام اور ظلم کرنا
نمایاں سلامت ہے۔

فیرم میٹ۔ غزور۔ مطمئن۔

سلفر۔ غزور۔ جب دوسری سب ادویات نفل ہو جائیں تو یہ دوائی بطور
عمل انگیز کے طور پر کام کرتی ہے۔

(دیکھئے حصہ یا لڑاکا)

عنی (دیکھئے اعصاب کی کمزوری)

گریفائٹس - گانے کے دوران غمی کی زیادتی - موت کے خیالات -

پلائینا - گھر میں غمی - کھلی ہوا میں آفاتہ

سٹانم - غمی آدمیوں سے نفرت کے ساتھ -

پلمیم میٹ - غمی - مایخولیا - محسوس کرنا کہ کچھ انتہائی خطرناک واقعہ ہونے والا ہے - اس نے

گناہ کیا ہے - اس نے ناقابل معافی گناہ کیا ہے - سوچ زیادہ بیمار کر دے - سوچنے سے بیماری میں زیادتی ہو سبے خوابی -

اگنیشیا - سخت غم کے بعد غمی

آرم میٹ - غمی اور تصور کہ اس نے دوستوں کی محبت کھودی ہے - یا

دوستوں کی محبت سے محروم ہو گئی ہے -

ایکونائیٹ - مستقبل کے متعلق غمی -

ایسٹناس - غمی کی وجہ سے کمزوری -

آرم فولیٹم - مایخولیا - وہ محسوس کرے کہ وہ دنیا میں زندہ رہنے کے اہل نہیں -

اس نے بڑی خوشی کے ساتھ موت کی خواہش کرے -

کوکولس - مایخولیا اور غمگین - بے عزتی سے حساس - جلدی سے ناراض ہو جائے

معمول بات بھی اسے ناراض کر دے -

حیادار - شرمیلا

جیلیسیم - غمگوں میں جانے سے جھبک یا شرم محسوس کرے - شرمیلا - ڈرپوک -

دماغ کا کھوکھلا پن -

خود اعتمادی کی وجہ سے شرمیلا پن - ڈرپوک

اور - ڈرپوک

سلفر - بزدلی - ڈرنے کے رجحان کے ساتھ -

برٹیا کرب {
کالی فاس

ایوٹنا۔ بڑی جو خود اعتمادی سے بدل بدل کر ہو یعنی کبھی بڑی اور کبھی خود اعتمادی۔
 کوکا۔ شرمیلا پن۔ ذہنی براہِ یکتگی کے ساتھ۔
 پلیٹلا۔ بڑی کے ساتھ شرمیلا پن۔

نیمند۔

میدور نیم۔ گھٹنے جھاتی سے لگا کر سنا۔ نوجوان بھی اسی طرح سوئیں۔
 کوکولس۔ سونے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اُسے سنے خواہ خراٹے بھر رہا ہے۔
 میورٹیک ایڈ۔

اگنیشیا۔ نیند اتنی ہلکی کے وہ سب کچھ سننا ہوں۔ اسی ہی بات کے متعلق تمام رات خواب دیکھے۔

کیڈیم
 اپکاک
 لائیکو پوڈیم } آنکھیں کھول کر
 سوئے یا سونے کے
 دوران آنکھیں کھلی رہیں۔

اُونگھ۔ نیم خوابی

سائیکس۔ ناقابلِ رکاوٹ۔ نیم خوابی۔
 سائیکلین۔ نیم خوابی۔ بد مزاجی۔ سستی۔ مدہوشی۔ کام نہ کرنے کا رجحان شدید
 بدلی اور مایہ خولیا۔

انڈول۔ نیم خوابی سستی کے ہمراہ۔ ہر وقت لیٹے رہنے کی خواہش۔ کام کرنا کی خواہش نہ ہو۔
 نیم سلف۔ پڑتے وقت نیم خوابی۔
 فاسفورس۔ غصہ کے بعد یا ہنسنے کے بعد۔ کمزوری سے نیم خوابی۔
 پلیٹلا۔ کھانا کھاتے وقت نیم خوابی۔

آرنیکا۔ ایم۔ جواب دیتے وقت نیم خوابی یہ حالت عام طور پر
 پیشیا۔ { مایہ خولیا، بخار، نوبتی بخاروں یا انفلوئنزا وغیرہ

میگنیشیا کارب - کھانا کھانے کے بعد - کھڑے ہونے کی حالت -

سلفر - پانخانے کے بعد -

ایتھوزا - پانخانے کے بعد یاتے کے بعد -

بائیوسائیمس - ذہنی کام کی زیادتی کے بعد -

ناجا - گہری نیند و بہوش آدمی کی طرح خراٹے دار آواز کے ساتھ سانس عام ریگنے والے جانور کی طرح -

نیٹریم میور - نیند اور ادھک کھانا کھانے کے بعد -

کاسٹیکم - دن کے دوران میں شدید نیند اسے بمشکل روکے لیٹ جانا پڑے -

چیلڈرینم - کھلی ہوا میں ادھک اتنی نمایاں کہ وہ پلے وقت سونے کے قریب ہو -

بے خوابی -

کافیا - جاگنے کی حالت میں کارآمد ہوتی ہے - آنکھیں بند کرنا ناممکن ہوں - ذہنی جُتی

کی وجہ سے ہیجان - خوشخبری زیادہ کام کرنے کا موجب بنے - اور خوشگوار حرکیات کے بعد لیکن بے

آرامی یا تکلیف کے بعد نہیں - زیادہ دیر سو کبلا کر کرنے یا نشہ آور ادویات یا نشہ آور اشیاء

کے غلط استعمال کی وجہ سے -

سینٹو - رحم کے اپنی جگہ سے ٹل جانے کی وجہ سے بخوابی - رحم میں ہیجان

سن یا کس کے دوران -

سائپریمیڈیم - جب ذہن میں خوشی کے جذبات کی افرقہ دار کی وجہ سے نیند نہ آئے -

پھوٹے بچے اکثر جاگ پڑتے ہیں - اور تمام رات کھیلنے ہیں اپنے والدین کیلئے تکلیف کا باعث بنتے ہیں

میگنیشیا کارب - پیٹ میں دباؤ کی وجہ سے بخوابی یا پریشان کن بے چینی اور اندرونی گرمی

بگنے ہونے کے بہت زیادہ خون کے ساتھ - پیٹ کی گیس کی وجہ سے بے خوابی -

کالی فاس - بے خوابی کی چوٹی کی دوائی ہے - خاص طور پر رات کے پچھلے پہر - ملحقہ اعضاء

طور پر ٹوٹا پھوٹا ہوا - کاروباری تھکاوٹ یا دماغ کے زیادہ کام کی وجہ سے -

میوٹریک الیڈ - سونے کی خواہش لیکن سونہ سکے - ادھر ادھر سر گھماتے تمام رات خواب دیکھتے -

اور بے چین در پریشان سوا در پشیمان ہو۔

کاسٹیکم - خشک رات کی وجہ سے تمام رات بے خوابی، کسی بھی پہلو پر آرام نہ آئے، ادھر ادھر سر گھمائے۔ وہ آرام دہ حالت میں نہ رہ سکے۔

فیرم میٹ - صرف شمال کی طرف بستر کا سرانہ تبدیل کر کے نہ سو سکے۔

الگنیشیا - اتنی ہلکی نیند سوئے کہ وہ ہر چیز سنے۔ ایک چیز کے تمام رات خواب دیکھے۔ پریشانی کے خیالات کی وجہ سے بے خوابی - غم - غمی یا افسردہ خیالات کی وجہ سے بخوابی - غمی کی ہر جسم میں دوڑنے سے بے چینی۔

آرنیکا مائٹ - جسم اور ذہنی کام کی زیادتی کی وجہ سے بے خوابی۔

ایکونائٹ این - پریشانی - بے چینی - ناراضگی اور ڈر کی وجہ سے بخوابی - بچا ادھر ادھر بے چینی میں رہے۔

آرسینک ایلیم - ہوائی عملوں وغیرہ کے ڈر کی وجہ سے بے خوابی یا نیند نہ آئے۔

اوپیم - جب کافی فیل ہو جائے تو بے خوابی کے لئے اچھی ہے۔

سلفر - بے آرامی کی مختصر سی نیند جیسے کرکری پر بیٹھے بیٹھے تمام دن سوئے اور رات کو جاگے۔

کلیٹس - صبح کے وقت یہ احساس کہ ابھی نیند پوری نہیں ہوئی۔

پیمسی فلوراٹک - بخوابی کی بہترین دوائی ہے یہ مدرنگ کی حالت میں ۱۰ قطرے سے

۲۰ قطرے فی خوراک دینی چاہیے۔

امبرگر لیا - ذہنی پریشانی کی وجہ سے بخوابی جیسے کہ کاروباری تکلیف - مرض بستر

پر معقول تھکاوٹ کے ساتھ سونے کے لئے جاتا ہے لیکن جونہی سرنے پر رکھے وہ سو نہیں

سکتا اور جاگتا رہتا ہے۔

ٹوبیکم - اعصابی توڑ پھوڑ یا شدید اعصابی تھکان کی وجہ سے بے خوابی۔

بیلرس اپ - علی الصبح جاگ پڑے یا رات کے جاگ جانے پر بھڑنسوئے۔ مدرنگ استعمال کیجئے۔

کوکولس انڈیکا - رات کو تیمارداری کی وجہ سے جاگنا۔ پیشہ ورانہ کام نہیں بکدرتہ دواؤں

کی تیمارداری۔

کے لئے پریشانی اور کسی پشیمانی کے ساتھ۔ دن کے کاروبار کے خیالات سونے میں جاہل ہوں۔ یہ
 ڈسوتے ہیں۔

سکولیر پالیٹ۔ اعصابی مریضوں میں جو کہ بہت ذہین۔ حوصلہ مند اور جُست ہوں۔ وہ
 معاشرہ کے سرکردہ آدمی ہوتے ہیں یا کاروباری حضرات لیکن وہ اچھی طرح نہ سو سکیں اور متواتر معاشرہ
 اور کاروباری معاملات پر کڑھتے ہوں۔ اعصابی سر درد جو دماغ کی جڑ میں کی وجہ سے بخوابی۔
 نکسوسامیکا۔ شرابیوں کی بے خوابی، کافی، چائے کے غلط استعمال یا معدہ کی خرابی
 بیلا ڈونا۔ سر میں گھٹن کی وجہ سے بہت بے چینی کی وجہ سے نیند۔ آنکھیں بند نہ
 کر کے کیونکہ ایسا کرنے پر خوفناک تصورات دیکھے، بچے نیند میں ڈر کر جاگ اٹھیں۔
 ہائپوسامیس۔ اعصابی بے چینی کی وجہ سے بے خوابی۔ دماغ ڈراؤنے خواب و
 خیالات اور تصورات سے پر ہو۔ بچوں میں خوابی۔ جو بچہ گیس ڈر کی وجہ سے چلا میں اور کانیں
 چرچرے اور جلدی سے برا ٹینگتہ ہو جانے والے لوگ۔

کیموسیل۔ تکلیف کی وجہ سے بے خوابی۔
 جیسیم۔ دماغی کام کرنے والوں کی بے خوابی۔ کاروباری آدمیوں کے لئے مفید
 جو بے چینی راتیں گزار دیں۔ صبح سویرے جاگ جائیں اور اپنے کاروبار کے متعلق بہت فکر مند رہیں۔
 کینابلس اندیکا۔ ضدی قسم کی بے خوابی باقاعدہ نیند کے ساتھ مدہمچر میں قطرے
 بحساب فی خوراک دیجئے۔

چوری

کلگیر یا کارب۔ چوری کرنے اور بھوٹ بولنے کا رحمان۔ روپیہ چوری کرنے کی عادت
 کو دور کرتی ہے۔ بغیر کسی وجہ کے کچھ لوگوں سے نفرت کرنا۔
 آرٹیمیزیا۔ مرگ میں چوری کی عادت۔
 سٹامونیم۔ جنون میں چوری کرنا۔
 سیفیسکریا۔ چوری کرنے کی عام عادت۔

سلفر - بمبکو نوشوں اور جو آبازوں میں چوری کی حادث -
 اونیٹیم - چوری کرنے اور بھوٹ بولنے کی حادث -

یاخانہ

دریلم الیقیم - اپنا یاخانہ یا پیشاب ننگنے کی زبردست خواہش -

خودکشی کا رجحان - (محکات بھی دیکھئے)

اینا کارڈیم - گولی سے خودکشی کرنے کا رجحان کسی دوسرے طریقے سے نہیں خودکشی کرنا چاہے لیکن ڈرپوک کہ خودکشی نہ کر سکے - ایک ایم خودکام دیتے -

رٹساکس - اپنے آپ کو کھڑکی سے کود کرنا چاہے لیکن موت سے ڈرے - اگر بالی کے قریب ہر تو اپنے آپ کو ڈوبنا چاہے - باورچی خانہ میں داخل ہو کر جل مزنا چاہے چولہے یا سٹو سے - مریض ہر وقت ہلتا رہے اور افسوس کرتا رہے -

کلیریا کارب - تیز دھار آگے کے گھونپنے سے خودکشی کرنا چاہے -

کیپسیکیم - ہر وقت خودکشی کرنے کے خیالات لیکن اپنے آپ کو مارنا نہ چاہے - اور خیالات کی مزاحمت کرے، وہ خودکشی کی خواہش نہیں رکھتا جب خودکشی کی خواہش ہو تو کوئی اور دوائی دیتے! یہ کیپسیکیم نہیں ہو سکتی -

الیومنا - ایک کم حوصلہ مریض، وہ شک کرتا ہے کہ وہ خود ہی ہے یعنی اپنے آپ کے ہونے پر شک - اسے برے خیالات آتے ہیں اور وہ اپنی ناقابل برداشت زندگی کو گلا کاٹ کر ختم کرنا چاہتا ہے - چاقو یا خون دیکھ کر خودکشی کا رجحان اُبھرے -

انگس کاسٹس - خودکشی کے رجحان کے ساتھ اپنے خاوند، بیٹے اور جیسی عمل سے نفرت - آرم میٹ - بہت ہی اعلیٰ دوائی پاگل پن کے لئے ہے جو کہ خودکشی کے رجحان کے ساتھ ہو - وہ اپنے آپ کو گولی مار دینا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو بلندی سے گر کر ختم کر دینا چاہتا ہے - اپنے آپ کو ڈبو کر خودکشی کرنا چاہے کیونکہ وہ اس دنیا کے لئے کامد نہیں ہے یہ سب

کچھ چپکے چپکے کڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی نکالیف کسی کو نہیں بتاتی۔
 انظم کروڑ۔ جذباتی پاگل بن۔ اپنی خواہشات کے پورا ہونے کی وجہ سے مریض خم زدہ
 اور چڑچڑاہوا ہوتا ہے۔ اپنی نکالیف کا خاتمہ اپنے آپ کو گولی مار کر یا ڈبو کر کرنا چاہتا ہے۔
 نیرٹرم سلف۔ خودکشی کے جنون کے لئے ایک اور بہت بڑی دوا ٹی ہے اسے مستقل
 طور پر اپنے آپ کو منع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے جسم کو کوئی نقصان پہنچا
 دے۔ وہ لگانے سے ڈرتا ہے جو اس کو افسردہ کر دیتا ہے۔ ایسی خودکشی کا رجحان عموماً سر کے
 زخم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو تباہ کرنے کا رجحان لیکن وہ ڈرتا ہے کیونکہ وہ مرنا نہیں
 چاہتا۔ مجلس سے یا لوگوں میں بیٹھنے سے نفرت۔ نہ خود بولنا چاہے اور نہ یہ چاہے کہ دوسرے
 اس کے متعلق باتیں کریں۔

اسٹیل لگو۔ پانی میں ڈوب کر خودکشی کا رجحان۔
 انگیشیا۔ کاروبار کے دہم برہم ہونے پر دیاسلامیوں کی ناسمجس کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہے۔
 زخم میٹ۔ مایخولیا اور افسردگی کے ساتھ خودکشی کے خیالات۔ اتنا ڈر لپک کر خودکشی نہ کر سکے۔
 کسی کو اذیت دینے کی خواہش۔ ایک ایم کی طاقت میں دب سکے۔
 کینا بس سٹائیوا۔ اپنے آپ کو مارنے کی کھسک بھرنے اور خیال کرے کہ یہ اقتدار اعلیٰ
 کی طرف حکم ہے۔

آر جنٹم نائٹر ٹیکم۔ جب بلندی پر ہو تو عجب خیالات۔ جب پل پر سے گزرے وہ
 سوچے کہ اپنے آپ کو پانی میں چھلانگ لگا کر مار دے گا۔ جب کسی اونچی کھڑکی میں سے دیکھے
 تو خیال کرے کہ یہاں سے کود جانا خطرناک ہوگا بعض اوقات ایسی تحریکات کہ اسے واقعی
 چھلانگ لگانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔

جیلسیم۔ کھڑکی میں سے اپنے آپ کو پھینک کر خودکشی کرنا چاہے۔
 ہیلی بورس نائٹک۔ کچھ لوگوں کی طرف چوری وغیرہ کے الزام کے نتیجے طور پر خودکشی
 کرنے کا رجحان۔ وہ اس الزام کو دل پر لگا لیتا ہے اور اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے۔

آئیوڈم - وہ بغیر کسی وجہ کے اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے لیکن مزاحمت کرتا ہے۔
 ایک دیک ڈی فلو - یادداشت کا جاتے رہنا بکستی اور ذہنی کام سے نفرت جی
 موت چاہتا ہے اپنی تابہی کے لئے آسان ترین طریقہ کے لئے سوچے۔
 میٹھوینیم - خودکشی کا رجحان، اپنا پستول لے کر اٹھتا ہے لیکن اندرونی مرضی ایسا کرنے سے
 روکتی ہے - (دیکھئے مغالطہ یا سرب) تو بہت -

بدگمانی -

لیکسس - خیال کرے کہ لوگ اس آدمی یا عورت کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ بدگمانی کرے
 کہ اس کو ہاگل خانہ میں ڈال دیا جائے گا یا زہر دے دی جائے گی۔ اپنے آپ کو مافوق الفطرت
 چیزوں کے قابو میں پائے جو اس کو چوری کرنے یا قتل کرنے کا حکم دیتی ہے، جس کے حکم کی
 تعمیل کرنا اس کے لئے ضروری ہے۔

حسد -

بایوسائیمس - زہر دینے والے کی بدگمانی۔ اس کا پچھا کیا جا رہا ہے۔ سب لوگ اس
 کے مخالف ہو گئے ہیں۔ بدگمانی کرے کہ اس کے خاندان کے آدمی اس کی بخوانی کرتے ہیں
 کے متعلق اسے غلط فہم ہے۔ ہر روز اپنے کپڑے تبدیل کرے تاکہ اسے پہچان نہ سکے۔ گھر کو
 چھوڑنا چاہے۔ بدگمانی کرے کہ اس کی بیوی اس کی مخلص نہیں یا وفادار نہیں ہے۔

ہمسردی -

کاشیکم - دوسروں کی تکلیف کے شدید ہمسردی۔
 نیوفسر - کاشیکم ناکام ہو جائے۔

باتونی

اگر کس ایم - گائے بولے لیکن جواب نہ دے۔ لا تعلق - نذر - جوش مسرت نمایاں۔
 گانے کے ساتھ شور مچائے۔ شعر کہے اور پیشگوئیاں کرے۔
 اکیٹا آر - لگاتار بولنا۔ ایک موضوع سے دوسرے موضوع بدل کر دیا کرنا یاں کے
 دھڑوں میں ہوتا ہے۔

سٹکپانی۔ کسی بھی چیز کے متعلق بولنے کی بہت زیادہ خواہش، یہ خیال نہ کرے کہ کوئی سنتا ہے یا نہیں، اپنی زبان کو خاموش نہ رکھ سکے۔

ایسوسی اٹمس۔ بہت ہی بدگانی اور باتونی، فحش اور شہوت پرستی کا جنون۔ جسم کو نکال کرے۔ ہر چیز پر ہنسنے کا رجحان۔ آہستہ بولے، نیند میں بولے یا چلائے۔ اپنے آپ سے بولے۔ دہی۔ ایک بات کو بار بار دہرائے۔

کینابلس انڈیکا۔ بے ربط باتیں روحانی کیفیت و سرور میں مبتلا ہونا۔ بہت زیادہ بولنا۔ بے حد ہنسنے۔ چند منٹ کے لئے اپنے آپ کو کم کر دے۔ جانے کہ وہ بے عقل کی باتیں کریں۔ لیکن ایسا کہ بغیر نہ رہ سکے۔ غور بجائے فی البدیہہ شعر کہے نہ جانے وہ قائم ہے اگر ایسا ہے تو کس مقصد کے لئے۔ شدید باتونی خیالات کی تغیر پذیری کے ساتھ۔

لیکس۔ باتونی پن کی چوٹی کی دوائی ہے۔ شدید جوش۔ نگین کسی آدمی کے ساتھ ملنے جلنے کی خواہش نہ ہو۔ بے چین و پریشان رہے۔ ہر وقت کسی دلدرد راز جگ جگانا چاہے اتنی جلدی بولے جو نہی کوئی بولنے لگے وہ پہلے بولے اور کہانی مکمل کر دے۔ اگرچہ پہلے اس نے کبھی نہ سنا ہو۔ پختے ہوئے فقرات کی تقریریں کرے لیکن مختلف موضوعات پر جلا جائے۔ ربط کی کمی۔ بعض اوقات فقرات نیم مکمل ہوتے ہیں اور وہ سمجھ لیتی ہے کہ تم نے مکمل جتھے ہو۔ کروٹلیس۔ باتونی پن بڑھانے کے ساتھ، غلط ملط الفاظ کے ساتھ اور اپنے الفاظ پر ہلکھڑائے۔ خاموش حالت جیسے کہ نشہ میں مدھمکس ہو۔ لیکس کا مریض صاف الفاظ میں بولتا ہے غلط ملط اور بڑبڑانے کے بغیر۔

سٹرامونیم۔ نہ رکنے والی بول چال۔ ہنسنا گانا تمسین کھانا۔ عبادت کرنا۔ تافانہ بنی کرنا۔ جلدی ہی خوشی غمی میں تبدیل ہو جائے۔ اپنی شخصیت کے متعلق تو ہم۔ اپنے آپ کو لمبا محسوس کرے۔ دہرا۔ ایک حصہ کم۔ علیحدگی اور اندھیرا بابت نہ کرے۔ روشنی اور رفاقت ضروری چاہے۔

دیکھیے چُرانا۔ چوری کرنا۔ غیر ماضدماغی۔ بھول جانا۔

سوچنا۔

ایٹھوزا۔ سوچنے یا توجہ مرکوز کرنے کے قابل ایسے طالب علموں کے لئے بہترین دوائی ہے جو پڑھنے کے لئے دماغ نہ رکھتے ہوں۔

کاجو پیٹم۔ ایک منٹ میں ہزاروں چیزوں کے متعلق سوچے۔

کینا بس انڈیکا۔ آنکھیں بند کر کے سوچنے میں لگن ہو۔

کافیا۔ خیالات سے پُر جب جاگتا ہوا لیٹے ہزاروں چیزوں کے متعلق خیال کرے،

درد دراز گرے کے مینارہ کے گھڑیاں کوٹنے۔ بھوکنے ہونے کٹوں کوٹنے۔ یادداشت بہت

تیز۔ خیالات سے پُر سوچنے اور بحث کرنے کرنے کی طاقت بڑھی ہوئی۔

اونسوڈیم۔ دماغ کی یکسوئی کی طاقت کی کمی یا ربط کی کمی

آر جنٹم نائٹرکیم۔ جب سوچنے سے اسہال لگ جائیں۔ نظر کی کمزوری لاحق ہو۔

اوسیم۔ دوسروں کے حادثات کے خیالات۔ یہ خیالات ان پر مسلط ہوں جیسے کہ

دیسے ہی زخم وہ دوسروں کو کرے۔

بیشیا۔ ٹائیفائیڈ بخار میں سوچنے کی نااہلیت

ایسڈ فاس۔ مجامعت کے بعد سوچنے کی نااہلی۔

ٹیرنیتھنا۔ اعصابی سردرد میں سوچنے کی نااہلی۔

الیومنا۔ سردرد جو قبض کی وجہ سے ہوا میں سوچنے کی نااہلی۔

آر جنٹم میٹ۔ سوچنے کی نااہلی یا دداشت اور انسان کی فہم و فراست درہم برہم سردرد

اور سردرد۔

نائٹرک ایسڈ۔ گذشتہ تکالیف کے متعلق سوچنا۔

برائی اونیا۔ خیال کرے کہ وہ گھر سے بہت دور ہے اور گھر جانا چاہیے۔

کروٹن لگ۔ اپنے سے باہر کچھ نہ سوچ سکے۔

رونا۔

پلسٹیلہ۔ خوشی یا غمی کے واقعات پر روئے۔ جب اپنی علامات بتائے تو رو پڑے۔
اختلاف کرنے پر روئے۔

نیرٹم میور۔ رونے کی نمایاں طبیعت، ہمدردی ظاہر کرنے پر زیادتی۔
کافیا۔ اپنا کھٹوٹ گوار جیرانی پر رونا۔ دروں پر رونا۔ جذبات کے کچلے ہلنے پر رونا۔
یانظر انداز کئے جانے پر رونا۔

کیمفر۔ خشک آنکھوں کے ساتھ رونے کی خواہش
سٹرامونیم۔ اونچی آواز سے رونا۔ کمزور دماغ، مزاحمت کرنے کا رجحان اور بڑبڑانا۔
کالی فاس۔ مذہبی جنون میں۔
پلائٹنا۔ خاموشی سے رونا۔

سیپیا۔ جب اسکی علامات کے متعلق سوالات کئے جائیں۔ روئے۔
ایلیم سٹائیوا۔ نیند کے دوران روئے۔
مینڈورینیم۔ روئے بغیر نہ بول سکے۔
کاربو انیمیس۔ جب کھائے تو روئے۔
لائیکوپوڈیم۔ جب کسی درد کو خوش آمدید کہے یا واقف کار سے ملاقات ہو یا
شکریہ ادا کیا جائے۔

قوت ارادی۔

اینا کارڈیم۔ جیسے کہ ضمیر پر رکھا ہو ایک مثبت اور ایک منفی۔ ایک قتل کرنا چاہے اور
دوسری اس کے برخلاف۔

مزاجیہ۔

سٹرامونیم۔ جب ایک شخص فحش مزاجیہ ہو یا ناشائستہ مزاجیہ (دیکھئے غرور تکبر، زنجی غرور
ایٹھن۔ لکھنے والے کے ہاتھ کا آئینی درد)

میگنیشا فاس - لکھنے والوں کے ہاتھوں کے تشنجی درد کی بہتر دوائی ہے جو کہ زیادہ دیر تک انگلیوں اور ہاتھوں کے استعمال کی وجہ سے ہوا، ریشہ ہو، جبکہ گرمی سے آفاقہ ہو۔ ایک ایسا حکمت میں استعمال کیجئے۔

جیلیمیم - ہاتھوں کی اینٹھن اور کانپنے کیلئے چوٹی کی دوائی ہے۔ پٹھوں کو کنٹرول کرنے کی طاقت کی۔ بازوؤں کے پٹھوں کی اینٹھن۔

کرسٹالس - انگلیاں سخت پٹھوں کی نسبت دروں میں زیادہ تکلیف - آرام کرنے پر آفاقہ - (سوائے سختی کے) اور خشک گرمی سے آفاقہ، جیسے کہ بجلی گرمی یا تہ کی گرمی۔

ایکونائٹ این - بازو اور ہاتھوں کی فانی کزوری خاص طور پر لکھتے وقت بھی انگلیوں میں بھیجنا ہٹ

کیوریم میٹ - پٹھوں کا لہنا اور چھڑکن۔ ہاتھوں کا ٹھنڈے رہنا۔ بتھیلیوں میں اینٹھن، بازوؤں کی شدید تھکاوٹ۔

سٹرامونیم - معمولی اینٹھن کے ساتھ انگلیوں کی کزوری اکیٹا آر - لکھتے وقت انگلیوں کا پینا۔

زنگم فاس - تمام ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دینی چاہیے۔

میورٹیک ایسڈ - لکھتے وقت دائیں انگوٹھے کے گولے پر اینٹھن کی طرح درد۔ انگوٹھا ہلانے پر درد ہو جاتی ہے۔

سلیفورک ایسڈ - زخموں کے بعد گلگین ہو جانے کا رجحان۔

لکھنے والے کے تشنجی درد - سیر کے زہر کے بعد۔

فیسریم آیوڈیم - لکھنے والے کے تشنجی درد کے لئے بہترین دوائی ہے۔

دوسرا باب

اعصابی نظام
کی
بیمکاریاں

مرگی

ایکونائٹ این - بھر اور نبض بہت ہی ذہنی اور جسمانی پریشانی کے ساتھ جب سردی اچانک ڈر جانے کی وجہ سے ہو۔ چہرے کی سرخی حملے کے دوران نوٹ طاقت میں ہر پندرہ منٹ کے بعد دیتے تھے۔

بیسلا ڈونا - چہرے کی بہت زیادہ سرخی، سر میں اجتماع خون - بھر اور تیز نبض آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئیں - پچھلے طاقت میں دیتے اور ہر پندرہ منٹ کے بعد دہرائے حتیٰ اگر حملہ مرگ جائے۔

اوپیم - دماغی مرگی - جب بڑے لکھ موئے پتلیاں پھیلی ہوئیں - گرم پسینہ - ایک طرف کافالنج - بیہوشی کے ساتھ صبح و شام کے دھندلے جسمی، چہرے پر سرخی، خراٹے دار سانس - جب اچانک اور بہت زیادہ خوشی ہو - آہستہ اور بوجھل نبض - یہ چوٹی کی دوائی ہے - ہر سہفتہ ایک ایم پوٹیشی میں دینی چاہیے۔

اگنیشتیا - غم کی زیادتی یا جذبات کے دہنے کی وجہ سے اور مریض اعصابی طبیعت رکھتا ہو۔

لیکسس - ذہن کی خیالی باتیں - اجتماع خون کی وجہ سے سر جھکائے - در دیں گہری - دماغ میں خاص طور پر بائیں طرف - جوڑوں کی سختی - چہرہ زرد اور پھولا ہوا پلیٹیللا - سست اور کامل - سمجھ کی کمی - سو جا ہوا - اور نیلا ہٹ والا سرخ زرد اور پھولا ہوا چہرہ - مکمل کھانا کھانے کے بعد ہوں - دل کی دھڑکن نبض تقریباً مکمل طور پر دبی ہوئی - فیسم فاس - کمی خون والے اور زرد رنگ والے لوگ - نبض تیز - دھیمی اور تازہ جیسی ہیلو نیاس - دل کی زبردست دھڑکن جو چھاتی اور پیٹ کو ہلائے - پٹھوں کی پھڑکن کے ساتھ بیہوشی -

جیلیسیم - اونگھنے والا نیم خوابیدہ - آہستہ حرکت کرے - زبان کافالنج ہو - نبض دھیمی بھر پور لیکن نرم - پتلیاں پھیلی ہوئیں -

سٹرکینیا فاسس^{۳۸}۔ پٹھوں میں چربی کا جزو بدن بننا جب تو تھرا یا دھبہ دل کی طرف آیا ہو۔ اور دل بڑھا ہوا ہو۔

آرٹیکا مائٹ۔ زخم کی وجہ سے مرگی جسم ٹھنڈا اور سرگرم جب مریض ہوش میں آجائے تو یہ دوائی دینی چاہیے۔ تمام جسم میں درویں اور دکھن۔

فارمیکا۔ اگر دماغ کی کمزوری کی وجہ سے مرگی ہو یہ دماغ کو طاقت دیکر دوروں کو روکتی ہے۔

لاروسیرکوس۔ بغیر اطلاع کے اچانک مرگی کا دورہ۔ دھڑکن کے ساتھ ٹھنڈی مندر جلد اور سپرے کے پٹھوں کی حرکت تیز یا بھنبھلاہٹ۔

اعصاب کی مرض جسمیں بے اختیار پٹھے پھڑکیں۔

رعشہ۔ (ہیٹریا بھی دیکھئے)

اگنیشیا۔ ڈر۔ دھمکی۔ سزا اور بُری خبر کی وجہ سے رعشہ۔ غم یا جذبات کے بعد بازوں میں بھنبھناہٹ۔ جوڑوں میں درد۔ ضدی اور چڑچڑا۔

کیوپرم میٹ۔ اینٹین یا تشنج میں مبتلا بچے کو میز کے نیچے گھسٹتے دیکھ کر رعشہ کی حرکات مزمن حرکت انگلیوں اور پنجوں سے شروع کر بازوں تک پہنچ جاتی ہے ہونے دوران افادہ لیکن جب جاگے تو شدید طور پر درد اور فضول حرکات شروع کر دے۔

سٹرامونیم۔ رعشہ جس سے پہلے رونے کا رجحان ہو، ہنسنے اور غرض طبعی کا رجحان۔ سر کے اوپر بازو گھماٹے اور سر پر ہاتھ بجائے۔

نکسوامیکا۔ ریڑھ کا رعشہ بے ڈھنگی، چال کے ساتھ پاؤں کو گھیسے قبض کا سٹیکم۔ جب دائیں طرف زیادہ متاثر ہو۔ بائیں طرف کی نسبت چہرے کے پٹھے۔ زبان بازو اور انگلیں سب ملوث ہوں یا متاثر ہوں۔ جب بولے تو لفظ تھرتھرائیں مریض متواتر یا ہمہ وقت اپنی پوزیشن بدلے متکلم تھک کر سو جائے۔ بچے جنہوں پہلنا سیکھ لیا ہو

آسانی سے گرڑیں اپنی چال میں۔

مائیکل - ریشہ کے غیر عجیبہ کیسوں کے لئے جب بیٹھا ہوتا نیگیں حرکت میں ہوں یا کھینچی جلتے جب چلنے کی کوشش کرے۔

اگر کیس میں - دماغی ریشہ، آنکھ کا ڈھیلے اور پلکیں پھٹکیں اور تشنج ہو۔ بازوؤں اور ٹانگوں کی تشنجی حرکات کی مخالف طرف ہوں یعنی یہ ایک طرف کا اوپر والا حصہ کو متاثر کرے اور دوسری طرف کے نیچے والے حصہ کو متاثر کرے۔

ٹیسٹو لارمیش - دانے بازو اور دہنی ٹانگ کی مزمن حرکت جورات کو بھی جاری رہے۔ ڈر - غم وغیرہ کی وجہ سے ہو۔ ریڑھ کے احساس ہونے کی وجہ سے بے چین اور کانپنے پر فیض چلنے کی نسبت اچھا دور کرے۔ دماغی انتشار خاص طور پر گانا بلیٹ افادہ ہو۔

زنکم میٹ - پاؤں کی لگاتار حرکت جورات کو بھی جاری رہے خاص طور پر چپے پھٹے پھنسیوں کے دبنے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوئی ہو۔

اکٹیا لسموسا - ریڑھ کی ہڈی کی سوزش گھٹیا کے ہمراہ خاص پر عورتوں میں بلوغت اور موقوفی حیض پر جنونی، باتونی - اکثر ایک موضوع سے دوسرے موضوع پر چلے جانا، ٹپھوں کا جھٹکے کھانا۔ چلتے وقت یا ٹھڈے کے وقت جس طرف لیٹے یا داؤ ڈالے جھٹکے محسوس کرنا۔ ٹپھوں کا سن ہو جانا یا جھٹکے کھانا۔

تھیسپیم - ریشہ، ہڈیاں، مرگی، خود کشی کرنے کا رجحان - افسردہ، ہنسے اور روئے بدل یعنی کبھی روئے کبھی ہنسے۔

فرم آرسنیکم - قلت خون کی وجہ ریشہ (کمی خون)

رہوڈنڈرون - بائیں ٹانگ کا ریشہ - بازو اور چہرہ کا ریشہ جو طوفان کی آمد پر بدتر ہو یا زیادتی ہو۔

ایونیا سٹامپوا - بوڑھے آدمیوں کے اعصاب لرزہ یا تھرتھراہٹ۔

بازوؤں کا سوجنا۔ جیسے کہ فالج میں مبتلا ہو

و سکم البم۔ ریشہ کے چکر کے لئے بہترین دوائی ہے۔
 ہائیوسائیمس۔ بازو ٹھنڈے کا پتہ ہوئے اور سوجائیں۔ جھنجھوڑنے والی
 حرکات اور ہلکی ہوئی آنکھیں نمایاں اور ابھری ہوئی۔ چلائے، دانت جیسے۔ علامات کھانے
 اور پینے کے بعد نمایاں طور پر ظاہر ہوں۔

لاروسیراسس۔ لگاتار جھٹکے۔ پھر کن پھلانہ۔ میٹھے دے۔ عجیب علامات۔
 مانینا۔ ماتھے کی ٹھنڈک۔ یا ماتھا ٹھنڈا۔ سر کی چوٹی پر وزن۔ شدید اوصابی۔
 آرسینکیم ایلیم۔ ماتھے پاؤں کا کانپنا۔ خاص طور پر بازوؤں کا۔ شرابیوں میں ماتھے پاؤں
 کا کانپنا۔ ماتھے پاؤں سن یا بے حس ہو جائیں۔ جیسے کمرہ ہوں۔ لاغری۔

غشی یا کوما۔

برٹیا کارب۔ مرگی میں
 انٹیم مارٹرکیم۔ ہوا کی نالیوں کے زکام میں نیند سے جاگ جانے گھٹن جھک کر
 اوپیم۔ غرائے دار سانس لینا۔ بلا ارادہ پیشاب اور پانسانہ نکل جائے۔ پیشاب
 میں کھار آئے۔ نبض بھرپور اور سست۔

ایسڈ ہائیڈروسائیکم۔ مرگی کی گرفت کے بعد دماغ میں اجتماعِ خون اپنا کلمہ دینے والی حرکت۔
 زکیم میٹ۔ دماغی تھکاوٹ سے۔ بھرپور پھوڑے پھنسیوں کے غائب ہونے پر۔
 جلیسیم۔ دماغ اور ریڑھ کی ہڈیوں کی جھلیوں کی سوزش۔
 گلوٹائن۔ سوزج کی دھوپ میں۔
 ہیلی بوریس۔ دماغ کی چوٹ۔

پیشانی
 فاسفورس
 آرنیکا
 ٹائیفاٹڈ بخار میں۔

کروٹیلِس ایچ - تعفن کی وجہ سے بخار میں - مرگی میں -

بیوفو - مرگی کے دورے کے بعد جن لوگوں نے حلق کے ذریعہ یا ہتھ دھکی کے ذریعے جنس کا غلط استعمال کیا ہو -

ٹیریفٹھنا - غشی جسمیں صرف ہلانے سے اٹھایا جا سکے لیکن فوراً دوبارہ غشی میں مبتلا ہو جائے - لڑکھڑانی چال جیسے شرابی ہو - ہاتھ پاؤں کا سسٹن ہونا -

ایلو مینیم میٹ - ذیابیس یا شوگر میں ۲۰۰ x طاقت میں دیجئے!

سلفر - مرگی کے دورے سے پہلے یا مرگی کے دورے کے دوران - پلاٹینا - زنگی کی بھل کے دوران میں -

زنکولس بلیا - شراب پینے سے مرگی کے دورے میں غشی -

اجتماعِ خون - تشنج (دیکھیے سوزش)

بسیلا ڈوزنا - تشنج کی چوٹی کی دوائی ہے - سرگرم اور تپکن والی درد - گھوڑے والی

آنکھیں اور پتلیاں پھیلی ہوئی - بھرپور کودتی پھلاکتی نبض - دانت نکالنے کے دوران تشنج - بچہ اچانک سخت ہو جاتا ہے - بچوں میں تشنج جو اچانک آئے - سرگرم بازو ٹھنڈے ۲۰۰ طاقت میں دیجئے اور ہر چوتھے روز دوائی دہرائیے -

کاکولس - بے خوابی کے بعد تشنج

جیلسیم - تشنج بخار کے ہمراہ - کمر اور گردن کی سختی کندھوں میں دردوں کے ہمراہ

آنکھیں ایک طرف سے دوسری طرف گھومیں - مریض بے چین اور شدید گرم مندار -

سنا - لمبی آنت میں سوزش - کیڑوں یا بد ہضمی کی وجہ سے سوزش تشنج - بچہ سخت

بد مزاج اور بدلنے والی بھوک والا - یعنی کبھی کم بھوک اور کبھی زیادہ - لمبی آنت کی سوزش کی وجہ سے جلد کا رنگ غیر صحت مند - جلد کے پھول کا پھڑکنا -

ہائیوسائیمس - اچانک زمین پر گر پڑے - چیخوں اور تشنج یا آنکھوں کے ساتھ

بچوں کا تشیخ خاص طور پر درد کی وجہ سے کھانا کھانے کے بعد انٹیشن۔

کلکیر یا کارب۔ سوکھا۔ مان یا ریڑھ کی ہڈی کیوجہ سے تشیخ۔ دانت نکلانے کے دوران یا نمونیا کی وجہ سے تشیخ۔

ایٹھوزا۔ بچوں میں تشیخ بہت زیادہ لازمی اور کمزوری اور نیند کے ساتھ۔ پاناٹہ اور تے کے بعد اونگھنے کے ساتھ تشیخ۔ آنکھیں نیچے اوپر اور اطراف کی بجائے نیچے کی طرف گھوم جائیں۔ چہرے کے اندر دھنسنے کے آثار۔ اوپر کے ہونٹ کی سفیدی ناک کے سوراخ کی باہر والی لائن سے منہ کے زاویہ تک صاف ٹھیکو۔

بیلی بورس۔ پھنسیوں کے دہنے کی وجہ سے تشیخ جیسے کہ چھپک کے دہنے سے۔ تواتر چلنے کی حرکت ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کی حرکت خود خود ہو۔ سر کو سر ہاتے گھیرنا۔ بے ہوش۔ پیشاب کا دب جانا یا پیشاب کی کمی۔

سکونا وائرورا۔ سر باز اور ٹانگوں میں تشیخ کے جھٹکے۔ بازوؤں میں زبردست تھپچھوڑ۔ سر پیچھے کو کندھوں پر جھک جائے۔ ٹھوں کے جھٹکے۔ چہرہ گہرا سرخ، ہونٹ نیلے اور غنی جھلک منہ سے آئے۔ تشیخ اوپر سے نیچے کی طرف پھیلے اور مرکز سے کناروں کی طرف جھٹے۔ تھوڑا سا چھونے یا ہلانے سے تشیخ ہو۔ ہوش میں آنے کے بعد جو کچھ ہوا ہے کچھ بھی نہ یاد رہے۔

زخم فاس { کاروباری آدمیوں۔ طلباء، عیاش اور مرگی
آرم میور { کے شکار اور اس کے غلط علاج کے جانے والے آدمیوں میں

دلہن اور حرام مغز کے درم کی وجہ سے تشیخ کیوجہ سے یہ دی گئی ترتیب میں دی جائیں۔ کیو پریم میٹ۔ نیلا چہرے جھپٹے ہوئے آنکھوں کے ساتھ تشیخ۔ تشیخ کے دوران تے۔ زنگی کے تشیخ، بیضہ میں۔ تشیخ کا حملہ۔ بازوؤں اور ٹانگوں کے بننے اور پھٹنے سے ہو۔ جس کے بعد آنکھوں کے ڈیٹ گھوٹیں جو بالآخر پھٹ جائیں۔ یا منجمد ہو جائیں اور اوپر کی طرف گھوم جائیں۔ اخراجات کے دہنے یا پھنسیوں کے دہنے کیوجہ سے تشیخ۔ بازوؤں سے سنٹر کی طرف تشیخ۔ ٹھنڈے مشروبات سے اتفاق اگر ابتداء ہی میں دسے دی جائیں تو بیماری میں اتفاق۔

سلفر۔ جب اچھی طرح منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوائی ماکامیٰ دیکھئے۔
نکسوامیکا۔ ہوش کے ساتھ تشنج بدبغضی کی وجہ سے۔ جبڑوں کو جہانے کی حرکت شراب
کے غلط استعمال کی وجہ سے۔

کیمو میلہ۔ والدہ کے عصر کی حالت میں دودھ پلانے کے بعد بچوں میں تشنج۔ دانت نکلنے
کے دوران اگر میلہ ڈنڈا۔ ناکام ہو جائے۔

اوپیم۔ والدہ کے اچانک ڈر جانے کے بعد دودھ پلانے کے بعد بچوں میں تشنج۔
پھر ڈر کر جاگے۔ جینے چلانے حتیٰ اگر تشنج ہو جائے۔ گرمی سے یا گرم پیوں سے زیادتی۔
گلوٹائمن۔ بچوں میں دانت نکلنے کے دوران گرمی کی وجہ سے یا سر میں اجتماع خون کی
وجہ سے تشنج۔ اگر میلہ ڈنڈا ۲۵ ناکام ہو جائے تو یہ دینی چاہیے۔ تشنج کے دوران انگلیاں اور پنجے
علیحدہ علیحدہ ہوں۔ سانس لینے میں دقت اور سنی جانے والی دل کی دھڑکن۔
گریشی والا۔ تشنجی حالت ہوش گم کئے بغیر۔

آئرینک { پچھلیوں کے ساتھ پھر کی پیدائش کے فوراً بعد تشنج یا بچہ کا سر کافی دیر تک
سرخ رہنے کے بعد تشنج۔ دی گئی ترتیب میں ایک تہزار کی طاقت دینے
ہائپرکیمک { تھے اگر آرام آجائے۔ ہر ایک کی چار غور کریں دیتے۔ آئرینک کی صورت میں سرگرم
اور باقی جسم کا حصہ ٹھنڈا۔

سیکل کار۔ تشنج اور جسم کے مختلف حصوں کے ٹپھوں کا بھڑکنا۔ انگلیاں کافی دور
دور ہوں۔ جسم کی سختی جو بعض اوقات نرمی سے تبدیل ہو جائے۔

سٹرا منیم۔ شدید تشنج جس میں جسم کا ہر ٹپھا ملوث ہو اور پیچھے کی طرف مڑ کر ٹھکے۔
شدید تھڑ مڑ۔ بازوؤں کا سکڑنا۔ زبان کا ٹٹنا۔ ڈر کی وجہ سے تشنج یا ہوش کے ساتھ
ڈراڑنے خواب چمک دار روشنی میں آنے سے تازہ ہو جائیں۔ پانی دیکھنے پر۔ روشنی یا
شیشہ یا کوئی چمک دار چیز تشنج کا موجب ہو۔ تنہائی اور اندھیرا برداشت
نہ کئے۔ چھینوں کی وجہ سے ان کا دب جانا تشنج کا باعث بنے۔

ہڈیان

بیلڈوڈنا - شدید ہڈیان خون کی طرح سرخ آنکھوں کے ہمراہ - مریض کپڑے پھاڑتا ہے - مٹھو کریں مارتا ہے - کتے یا بھیڑیے کی طرح چلتا ہے - جینٹا ہے اور خیالی یا تصوراتی آدمیوں سے دور بھاگ جانا چاہتا ہے - ہاتھ پاؤں ٹھنڈے - سرگرم - تمام جسم پر گرمی اور جلن - بھاگ جانا چاہے - تشدد کی وجہ سے کھڑکی میں سے کود جانا چاہے - تشنج کی وجہ سے کاٹنا چاہے - اجتماعِ خون میں - بخار - بد صورت - بغیریت یا ڈراؤنی شکلیں - دانت نکلنے کے دوران میں توڑ مروڑ - دانت پیسے - مارنا چاہے - ننگے میں دقت رسول کے غائب ہونے پر - چوہے چوہیاں دیکھے -

ہائیوسائٹمس - سختی کے ساتھ چوری کا الزام لگنے کے بعد - چمکدار آنکھوں کے ساتھ بہت زیادہ جسمانی طاقت کے ساتھ - حسد سے بولتا ہے - بیڑیا ہے - تصوراتی غلطیوں سے - اپنے آپ کو ننگا کرنا چاہے - ہائیوسائٹمس - شدت میں بیلڈوڈنا اور سٹرامونیم کے درمیان کی دوائی ہے - غش گلنے لگے - ہڈیان - مدہوشی کے دوروں کے ہمراہ ہڈیان - اپنے آپ سے بولے - سٹرامونیم - ہڈیان کی تین دوائیوں میں یہ تیسری دوائی ہے - پہلی دوائیاں بیلڈوڈنا اور ہائیوسائٹمس ہیں - کسی کو ہمدردی کے اظہار کے لئے بلائے - ڈر کر جیسے اس پر کتے حملے کر رہے ہیں - غصے والا ہڈیان لیکن ایسے غصے والا نہیں جیسے کہ بیلڈوڈنا یا ہائیوسائٹمس میں ہوتا ہے - گھروالے یا تو ساتھ رہنے والا مردہ یا پھڑپھڑے ہوئے لوگوں کو کچا کرے جو حال حاضر نہیں ہیں - محبت دیکھے یا ان کی آوازیں نے خوشی سے جنمی خوش سے پاگل - شربلہ چھپ جانا چاہے - گھٹا دہنئے ہو قوفوں کی طرح - تالیاں بجائے اور آنکھیں کھولے - وہم یا فریبِ نظر کی وجہ سے شور مچائے بے ربط بڑبڑانا - تمام ادا نام خوف اور دہشت پیدا کریں - سرخ چیزوں کی بجائے سیاہ چیزیں نظر آئیں - پیشاب رکا ہوا یا دبا ہوا - اگر کیس ایم - بہت زیادہ ذہنی خوش - خوشی - دلیری - بولے - بے ربط بات چیت مانگیلیا -

نقلیں بنانے اور پیشگوئیاں کرنے کا رجحان کے ساتھ اور راسخیتوں کو چھوڑنا چاہیے۔

لیکسس - بڑبڑانے والا ہڈیان - کھوڑپی کا سرخباد - آنکھیں بند کرنے پر سپر
میں یا تیسرے پہر میں یا سونے کے بعد ہڈیان کے دورے - جھپکے کے دینے کی وجہ سے
بیہوشی - زرد خناق میں چمکے قلمت خون کے ساتھ نمی کا اظہار - سانپوں اور دوسرے ڈراؤنے
چیزوں کو دیکھنا - گلے میں گھٹن کا احساس - نیند میں اچانک اٹھ کھڑے ہونا جیسے کہ خواب میں جو
بیوقوف - ہڈیان اسہال کے ہمراہ -

پلجسم - ہڈیان جو در در قریب سے ہل کر ہو - ہڈیان اس جیل سے کہ اس کی زندگی قاتلا
محلے یا زہر دینے جلنے کی وجہ سے خطرے میں ہے اور اس کے ارد گرد کوئی قاتل ہی ہے -
کیو پرم میٹ - سیض میں ہڈیان - بھاگ جانا چاہیے - اخراجات یا پھنسیوں کے دینے
کی وجہ ہڈیان -

دریٹرم ورائیڈ - بچے کی پیدائش کے دوران میں ہڈیان - بخار یا زچگی کا ہڈیان، پیٹ
بھولا ہوا - گھورتی ہوئی آنکھیں اور وحشی پن - دونوں ہاتھ متواتر حرکت میں - نبض کمزور -
دل کی دھڑکن شدید -

آرٹیکیم ایلم - افسردگی - بے چینی - موت کا ڈر - اکیلے رہ جانے کا خوف خودکشی کے
رجحان کے ساتھ ہڈیان - دماغ اور جسم میں قلمت خون -

اکٹیارسمیوسا - ہرقسم کی چیزوں کو مختلف رنگوں اور حالتوں میں دیکھے، جیسے کہ
چوہے - سانپ - شیر - کڑے کورے، مکھیاں وغیرہ دیکھے - بالوفی ایک موضوع سے
دوسرے موضوع پر تبدیل ہوتا رہے - چڑچڑاپن - بے چینی اور بے خوابی نمایاں علامات -
نکسوا میکا - جبکہ روض ناراض و خفا - چڑچڑا - بعد یہ سب کچھ شراب نوشی کی
وجہ سے ہو -

پیشیا - خناق - ہسرو پن -

اوسیم - پرانے پائپوں جو زیادتیوں کی وجہ سے اپنی صحت خراب کر لیں کمرے کے مختلف
حصوں مختلف جانوروں کو نکلتا دیکھے - بھوت پریت غیث رومی دیکھے جن کے ساتھ باتیں کرے -

کینا بس انڈیکا - برغور غلط خیال، جگہ اور وقت کے متعلق غلط سمجھے۔
 کینتھرس - شدید بذیاتی کیفیت جنسی خیالات اور باتیں - فحش گیت گائے - انسانی
 اعضائے تناسل - پیشاب پاخانہ کے متعلق باتیں کرے۔

کلیریا کارب - مریض جو بھئی اپنی آنکھیں بند کر رہا ہے وہ خوفناک چیزیں دیکھتا ہے۔ یہ بات
 اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر رکھے۔ اعصاب کی وجہ سے جانور دیکھے اور ان کھیلے۔
 چائنا - جب آنکھیں بند کرے تو لوگوں کو دیکھے لیکن غائب ہو جائیں۔ جبکہ آنکھیں کھولے
 شدید کمزوری، بھوک کی اور کھانا کھانے کے اور نہ رکنے والی سونے کی خواہش یا بے خوابی بدل
 بدل کر - قلتِ خون۔

زنگ میٹ - بہت زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ ہڈیاں بیہوشی اور بازوؤں کے ٹھکے۔
 کوکولس - حیض شروع ہونے پر دماغی علامات کے ساتھ ہڈیاں اور دم جیسے کہ کچھ
 زندہ دیواروں، فرشوں پر اور کرسیوں پر رنگ رہا ہے اور اس پر بھی رنگے گا۔

سوزشِ دماغ -

جیلسیم - کمرے سردی کی ہرنچے کی طرف جائے جو اس عورت کو ہلا دے۔ لمبی اور
 تھکا دینے والی گرمی - سرد درجہ - گردن اور کندھوں کے پٹھوں کی دھکن - کندھیں - چکر
 لا پر دہی - سرگردانی - ناک سے پانی جیسا سادہ مادہ کا اخراج - چہرہ گرم، بھاری - سرخ
 پکلیں دہنی - نظر کمزور - پٹھوں پر کمزور گرفت۔

آر سینک ایلم - جب دماغ یا کسی اور حصہ جسم میں تباہ کن تبدیلیاں ہو رہی ہوں۔
 ہائیوسائیکس - دماغی سوزش گرمی، سر اور چہرے میں اجتماعِ خون، شدید تپکن،
 سر جکانا - شدید دم۔

سٹرا مونیم - دماغ کی سوزش گرمی اور کھوٹے میس تپکن کے ہمراہ اپنی
 شخصیت کے متعلق دم - روشنی اور رفاقت دونوں ضرور چاہے۔

پہلی بھروس - دماغ کی سوزش احمق پن کے برابر - یادداشت کی کمزوری - مایوسگیا - اندکھ -
 آر جنٹم ٹائٹریکیم - بلغمی جھلی چمک کرتی ہے - خاص طور پر معدی نالی - یہ دماغ پر گہرا اثر کرتی ہے
 جلیسیم کی نسبت زیادہ اور پھوڑا عصاب کی زیادہ تباہی، لیکن اس کا عمل پٹھوں کے نظام پر کم اثر کرتا ہے۔
 پیشیشیا - آوارہ - بڑبڑاٹے - ہڈیاں - مدہوشی - بات چیت کے دوران سو
 جائے - دماغی گھبراہٹ - سرد دکھے - بہت بڑا - سانس متعفن - ناگوار -
 کاسٹیکم - بلوغت کی عمر پہنچتے ہی مرگی بے قاعدگی حیض کی وجہ سے یا پھوڑے
 پھنسیوں کے دہنے کی وجہ سے یکسی ڈر کی وجہ سے نئے پائندہ پرزادتی مرض - بلا ارادہ
 پیشاب کا عمل جانا - ٹھنڈا پانی پینے سے آفاقہ -

پیمسی فلورائٹک - حملے حیض شروع ہونے پر ہوں چھاتی میں گھٹن کا عجیب و غریب احساس -
 اوفتھی کرو کیٹا - اچانک اور مکمل بیہوشی - خطرناک تشنج کے ساتھ - نوجوان لڑکیوں میں
 حیض کا ظاہر نہ ہونا جس کے نتیجہ پر مرگی اور تشنج - زیادتی اس وقت جب حیض شروع ہونا
 چاہیے - خاص علامات تھیں، اچھا رہ اور حملے دوران نیم ایسا لگی، سو جا ہوا سرخ چہرہ
 منہ میں جھاگ کے ساتھ -

پلمبم - جب دماغی سختی یا گومرین اور فالج کا احساس حملے سے پہلے اور اس کے
 اکثر فالج اور خراٹے - سخت قبض -

بیللڈونا - صرف تازہ کیسوں میں تشنج صرف بازوں میں شروع ہوا اور چہرہ آنکھیں
 اور منہ تک پھیلے - دن کے وقت تھوڑے وقت کیلئے کئی دفعہ درے ادا چانگ گڑیاں
 آر جنٹم ٹائٹریکیم - ڈر یا حیض کے وقت ہوں - حملے سے دنوں یا گھنٹوں پہلے تلیاں
 کا پھیلنا اور حملے کے بعد آنکھوں کا کافینا اور بے چینی - تیز جھج - پٹھوں کی شدید کمزوری
 خاص طور پر گلے کی - مکمل بیہوشی منہ میں جھاگ کے ساتھ، اکثر اپنی زبان کاٹ - تباہی
 خند تقریباً تین گھنٹے - میٹھے پھل کھانے پر دورہ پڑے -

کیوپرم میٹ - ٹانگوں میں احساس شروع ہوا زیریں پیٹ کے حصہ تک پہنچے -

جب بیہوش - تشنج اور منہ میں جھاگ داخل ہو - حملے کے دوران مریض لگاتار زبان باہر نکالے - اور اندر کرے - گرم کرے میں زیادتی حملے سے پہلے دباؤ والا سر درد -

نیٹرم میور - حملے سے پہلے اور دوران میں ٹانگوں کا پھڑکنا - کندھنی - سوچنے میں دقت - اندر لگی اور چڑچڑاپن - احساس بازوؤں میں شروع ہونے یا ایسے محسوس ہو کر ٹانگ پر چڑھا پڑھے - پیٹ کے دائیں طرف - حملے سے پہلے پکڑ - نیند میں دانٹوں کا پینا - متلی اور تے پر سن میں جھاگ - کانپے - جسم کے جھکے - ٹانگیں جلدی اور کھینچ جائیں - ہاتھ بند انگلیاں اندر کھینچ جائیں - بازوؤں اور ٹانگوں کا ٹھنڈک - حیض کے دوران زیادتی مرض - سورا کے اثر کے پرانے کیس بدل ہوئی حالت -

نکسوا میکا - ہوش کے ساتھ تشنج - تشنج جس میں پیچھے کی طرف مڑ کر ٹھیک سرخ چہرے اور آنکھیں بند - چھوٹے سے جذبات سے ہلنے سے بدھنی سے زیادتی مرض - تشنجی سختی کے ساتھ تشنج - دورے کے دوران بے اختیار پلٹنا اور پیشاب - جون ٹنگم کے بالائی حصہ پر احساس حملے کے بعد گہری نیند - کھلی ہوا میں زیادتی -

کالی بروم - سبب دورہ نئے چاند پر ہو - تو دورے کے بعد سرد - دماغی کندھنی - انہما خیال میں کستی چکر غیر یقینی چال - بد مزاج اور سونے والا - لونہ - مرگی پرے چاند پر -

بیوفو - جب حلق یا ہتھری یا جنسی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہو - جماعت کے دوران دورہ ہو جائے - پیٹ میں شدید پریشانی کا احساس اور تب اچانک ہوش کا ہاتے نہنا - تپیلیاں بہت زیادہ پھیلی ہوئی اور حملے سے پہلے روشنی سے متاثر نہ ہوں - احساس جنسی اعضاء پیٹ سے شروع ہو - حملے سے پہلے نہ کھلا ہوا - حملے کے بعد پیشاب یا انہما خیال ہو جائے - بریٹاموریکم - لاعرضی اور غشی کے دورے - موسم بہار میں شکایات تکالیف میں زیادتی - تمام جسم میں سرسراہٹ -

آرٹیمیزیاوی - شدید جذبات کی وجہ سے دورے پڑیں - تشنج کے دورے قریب قریب پڑیں -

تب آرام کا کافی وقفہ ہو۔

ایونٹا - دورے عام طور پر پاخانہ خارج کرتے وقت پڑیں۔

ابن سقیم - جب دورے سے پہلے کانپے چکر اور گرانی۔ حملے کے بعد یادداشت کی کمی یا جاتے رہنا۔ مڈرکچر یا چھوٹی طاقت میں دبیجے۔

اگنیشیا - مرگی کے دورے جذبات کو ٹھیس لگنے سے یا بہت زیادہ غصے اور پوشیدہ غم پریشانی پریشانی سے یا ناکام محبت سے۔

تھو جا - ٹیکے لگانے کے بعد جب چوڑے جو کھینے کی وجہ سے بن جائیں ۵ غائبہ ہوجائیں
میتجہ کے طور پر حملے سے پہلے کان سن ہوجائیں۔ ایک اہم طاقت میں دبیجے۔

اگنیشیا - مرگی کے دورے جذبات کو ٹھیس لگنے سے یا بہت زیادہ غصہ و غم پریشانی یا ناکام محبت کی وجہ۔

سٹانم - دانت نکلنے کے دوران مرگی کے دورے، پیٹ کے کیڑوں کی علامات کے ساتھ۔

چہرہ زرد ہاتھوں اور آنکھوں میں کھنچاؤ۔ بازو ہلانے کے ساتھ۔

لائیکوپوڈیم - ضدی آدمی جو فلسفیانہ ذہن رکھتے ہوں۔ جن کو بیوقوف سمجھے ان سے

حکمرانہ سلوک کرے لیکن آپ خود اعتمادی سے محروم ہو۔ شام کے وقت زیادتی۔

سلیشیا - ڈبلے پتلے لمبے۔ سالوے رنگ۔ انفرادہ۔ معزور۔ پیاس نہ محسوس کرنے والا۔

چھپے پاخانے کے ساتھ پسینہ والی ہتھیلیاں اور غیر تندرست جلد سے اور پورے چاند میں رات کے وقت دورے پڑیں۔

وسکم البم - مرگی کیلئے جب دورے کے بعد چکر رہیں۔

کلیریا کارب - بچوں میں مرگی کھلے تالو کے ساتھ اور دیر سے دانت نکلیں۔ سرگردن پر

پسینہ۔ حملے سے ڈرے اور اس کے لئے افسردگی پیدا کر دیں۔ پھینکوں کے دبے کیوجہ سے مرگی۔

مشت زنی یا جنسی بے اعتدالی بازوؤں میں کچھ جلنے کا احساس یا معدہ کے گھرمے سے منجھکی

طوت چکروں کا اچانک حملہ۔ بغیر تشنچ کے ہوش کا کھودنا۔ حملے سے پہلے منہ کی جبانے کی حرکت

یادداشت کی کمی اور ابتری - سر درد - سرگرائی حملہ کے بعد - پیاس اور بھوک -

سکڑاوا اور سوسا - اپناک سختی جس کے بعد چھٹکے اور شدید توڑ موڑ - سانس کا دبا جانا -
چہرہ کا رخ منہ پر بھاگ - دانتوں کا بند ہو جانا یا دند سکرٹ - پیچھے کی طرف گردن کا جھکنا - حملے
کے بعد شدید کمزوری - مرگی کا دورہ سوزش معدہ کے ساتھ - انگوٹھے انگلی کی طرف مڑ جائیں دوسرے
کے دوران میں حملے کے بعد کچھ بھی یاد نہ رہے ایک ہی چیز پر نظر جا کر متواتر گھومے اگر وہ اپنے
سر کو دو گھمائے تو بے ہوش جائے - تھوڑا سا بھی چھوٹے ہی یا ہلنے سے دورہ سخت ہو جائے -
تھیمپیم - اسیریا - مرگی اور رشتہ خود کشی کے رجحان کے ساتھ - ہلنے اور بدل
بدل کر رہے - رشتہ خاص طور پر نیند کے دوران میں ہونٹوں کی چلبلاہٹ - بازوؤں میں
لنگر اپن اور تشنج اینیٹھن - مردوں میں جماعت کے بعد کستی - عورتوں میں بائیں ہچک دانی
میں درد - حیض کی کمی کے ہمراہ -

ہائوسائیمس - تشنج اور چھٹکے منہ پر بھاگ کے ہمراہ اور زبان کاٹنے کے ہمراہ حملے
سے پہلے بھوک - ڈر کی وجہ سے مرگی کا دورہ - دورہ سے پہلے چکر - کانوں کا بجنا - آنکھوں
کے آگے شرارے اور کاٹنے والی بھوک - دورے کے دوران چہرے کا رنگ اوڈوا یا ارغوانی
آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی - چیخے - دانت پیسے - بغیر ادوی طور پر پیشاب نکل جائے جس کے
بعد گہری نیند اور خراٹے -

اگر کیس ایم - مرگی میں جب دورے کے بہت بعد، بہت زیادہ خیالات آئیں -
اور دورہ میں مریض بہت بولے - ہر ساتویں روز مرگی کا دورہ - جمائیوں سے شروع ہو -
فیہم فاس - مریض جو بیلادونا کے مخالف ہوں، یعنی قلت خون والے - کمزور - اعصابی
اعصابی چہرہ زرد - بلغمی تھلی زرد -

گلو ماٹھن - بہت شدید تکین والا اور دہانے والا سر درد - ۳۶ گھنٹے یا ۳۸ گھنٹے،
دورے سے پہلے یا دورے کے بعد - یہ گرم کمرے یا گرم اشیاء لگانے سے زیادہ ہو سکتا
کی دھڑکن تمام جسم میں عکس ہو -

سلفر - یہ دو آئی درمیانی عمل انجینز کے طور پر دینا چاہئے خاص طور پر جب مرگی کا سبب درشتی ہو۔ یہ ایک ایم طاقت میں دہی جانی چاہئے۔ یہ ٹی بی میں مبتلا ہونے کے رجحان والی طبیعت والے آدمی میں منظر ہوتی ہے اور ٹھنسیوں کے دہنے سے۔

نیکم فاس - یہ دو آئی درمیانی تباہی جو کہ کسی بھی قسم کی مرگی کی وجہ سے ہو جہاں برو مائیڈ کی لمبی لمبی خوراکیں استعمال کی گئی ہوں۔

غش کھانا

میکس - معمول سے جوش سے، اگر ہسٹیریا ہے۔

اوپیم اور ایکونائٹ - جب ڈر جائے۔

سلفر اور فاسفورس - مہرک سے۔

سلفر، کونیم اور پوڈوفائیلیم - پاخانہ کے بعد۔

میگنیشیا کارب - جب کھانا کھانے کے بیٹھے۔

الیومنا - جب کھڑا ہونے کے لئے مجبور کیا جائے۔

کلر پوڈک - جب بیٹھے کیئے مجبور کیا جائے۔

لائیکوپوڈیم - تھوہا - میوریکس - حیض سے پہلے اور بچے لیٹنے سے۔

ایسٹیک ایسڈ - غشی کے دورے کمزور - قلت خون والے - سردی والے - زردی اور دم کے رنگ والے چہرے - بکیر اور نہ بکھنے والی پیاس -

امونیا کارب - کوئلے کے بخارات کی وجہ سے۔

اوپیم - کوئلے کی گیس میں سانس لینے سے غش کھانا - افگنے والا - مددکش اور بغیر تکلیف کے۔

ایسافٹڈ - انزال کے بعد غش۔

اگریکس - مجامعت کے بعد۔

سپیا - شدید سردی اور زیادہ کام کی وجہ سے۔

نکسوس کاٹنا۔ جب دیر تک کھڑا رہے یا بغیر کسی ظاہری وجہ کے قبض اور بلکہ کار بجان،
جب ایک آدمی خون دیکھے یا کسی کو شدید تکلیف میں مبتلا دیکھے۔

پٹرولیم۔ دل کی دھڑکن کے بعد
بریسرنگ و لگرس۔ گاڑی میں سواری کرنے پر۔
سپائیکلیا۔ دل کی تکلیف کی وجہ سے۔
آرٹیکا ماٹ۔ مشینی زخموں کی وجہ سے۔
کوکس۔ ناک سے خون بہنے سے
چائنا۔ اگر خون بہنے کی کمزوری سے۔

سردرد۔ آدھے سردرد۔ (درد اعصاب بھی دیکھئے)

بیلادونا۔ تپکن والا درد اور پھٹنے والا درد سر۔ کنیٹیوٹوں میں آگ کی طرح سرخ اور گرم جھڑ۔
چہرہ خون سے بھر پور۔ تکلیف جتنی جلدی آئیں اتنی ہی جلدی جائیں۔ سوزج کی گرمی کی وجہ سے
سردرد۔ اچھلتی ہو بھر پور نبض کے ساتھ بیہوشی۔

جیلسمیم۔ تکلیف گڈی سے شروع ہو کر سر کو جائیں۔ ماتھے اور ڈیلے میں میں پھٹ
جانے کا احساس ہو۔ محسوس کرے جیسے کہ سر بھل پڑا ہے اور بڑا ہو گیا ہے۔ بیہوشی جیسے کہ سر
کے گرد سخت پیرا پٹی لپی ہوئی ہے۔

گلوٹائن۔ گیس کی روشنی میں کام کرنے سے سردرد سوزج کی دھوپ میں جبکہ دھوپ
سر پر پڑے۔ سر بہت ہی بڑا ہو۔ ٹو لگنا اور سوزج کی وجہ سے سردرد بغیر بیہوشی کے۔ ٹھنڈی
چیزیں لگانے سے یا سر کو اونچا کرنے سے یا لمبی نیند سے لیکن تھوڑی سی نیند بعض اوقات
زیادہ کر دیتی ہے۔ شدید درد سراسر کیوجہ سے کھڑکی سے کود جانا چاہے۔

تیرم میور۔ جب سردرد سوزج کے بڑھنے کے ساتھ بڑے اور دن کے گھٹنے سے سردرد
گھٹے۔ پسینہ کے ساتھ سردرد۔ جتنی زیادہ سردرد اتنا ہی زیادہ پسینہ۔ سکول کے لڑکے اور لڑکیوں
کا سردرد جس کی زیادتی آنکھوں پر زبردینے سے ہو۔ سردرد سے پہلے بڑھے بڑھے سردرد

بھٹورے لگنے جیسا سردرد جیسے کہ سر پر بھٹورے لگ رہے ہوں پھٹنے والا۔ دہانے والا جیسے کہ بالک میں کسا جارا ہو۔ خشکی میں کسا جارا ہو۔ جیسے کہ کھوپڑی پھل دی جائے گی۔ نظر کی ابتری کی طرح سردرد۔

سپانچیلیا۔ سردرد صبح کے وقت دماغ کی طرف میں شروع ہو۔ سر پر پھیل جانے لگے گڑھے تک جانے اور پھر بائیں کپٹی تک چلا جائے۔ آنکھوں کے دھیلوں میں دبانے والا ناقابلِ برداشت درد ہو۔ دردمند کے وقت غائب ہو جائے۔ احساس جیسے کہ سر چوٹی کے ارد گرد بھرا ہوا ہے۔

نیرٹم فاس۔ سردرد خون جھٹکا گارے۔ تو تھڑے دار۔ گہرے جو صرف ایک دن تک جاری رہے کہ جاری ہونے پر۔ پتے کی پتھری کا درد۔ پاؤں ٹھنڈے۔ خود کشی کرنے کا رجحان۔

سینٹگویریا۔ سپانچیلیا والی علامات سوائے اس کے کہ یہ دائیں طرف کی دوائی ہے۔ صفراوی سردرد بغیر زردی کے۔ خرابیاں اور کنیٹیاں سوجی ہوئی۔ بلیض اندھیرے کمرے میں کھنچا جائے اور اسے لیٹا پڑے۔ صفراوی قہش کمرے جو آفاقہ دیتی ہیں۔ تحصیلوں اور تلیوں میں گرمی۔ پھٹنے والا سردرد جس کی زیادتی سورج کی بلندی سے ہو۔ بھولی بھوک خوراک سے متعلق سوچنے اور سونگنے سے نفرت ہو۔ پلاٹینا۔ تشنجی درد۔ درد داہنی آنکھ سے پیچھے کی طرف بڑھے جو کہ تیزی سے شروع ہوتا ہے اور بہت زیادہ پانی سکلتا ہے۔ ایک ہزار طاقت میں دی جائے۔

سیڈرن۔ شدید ناقابلِ برداشت درد جو ہر روز ۶ بجے شام لوٹ آئے۔ تشنجی درد۔

برائی ادینا۔ جھکنے پر سردرد جیسے کہ ماتھے میں سے دماغ پھٹ کر نکل جائیگا حرکت پر زیادتی سردرد کھیلنے یا کھیل دیکھنے پر شروع ہو۔

مٹی لوٹس۔ شدید اجتماع خون والی اعصابی سردرد جو ٹیکیز بہت پر کم ہو جائے یا جس کو ٹیکیز بہتے پر آفاقہ ہو۔ اجتماع خون والا سردرد جیسے کہ دماغ ماتھے میں سے پھار کر نکل جائے گا۔ کالنسونیا۔ اگر ہوا سیر اور قبض کے ہمراہ سردرد ہو۔

چائنا آف۔ سردرد۔ اجتماع خون۔ ٹیکن والا اور کنیٹیوں پر بھٹورے لگیں بلکہ چپوے ہر روز زیادہ لیکن زیادہ دبانے پر آفاقہ درد۔

کالی بائی - اگر سردرد و صلی نظر کے ساتھ ہو۔ سردرد بھنے پر نظر ٹھیک ہو جائے۔

کالی ساٹھیم - مکمل کھانا کھانے کے بعد۔

کالی کارب - سردرد ہو جب نزلہ میں اخراجات بند ہو عا میں اخراجات شروع ہونے پر سردرد کو آفتاد۔

لیک ویک - سردرد تلی اور قبض کے ہمزہ یا حیض کے دوران جس کو زیادہ پشاک کرنے پر آفتاد ہو۔

روڈا - سردرد جو پڑھنے اور آنکھوں پر دباؤ ڈالنے سے ہو۔ آنکھوں پر دباؤ ڈالنے کیلئے پھولی کی دوا۔

اولینڈر - جیسے کہ سر کی کھوپڑی پر بہت زیادہ بوجھ رکھا ہوا ہے، جو سر کو کچل رہا ہے

جس کو اطراف اور بھینگا دیکھنے سے آفتاد ہو۔

آزیکا ایم - جب سردرد کی وجہ سے ہو۔ تکلیف اور درد۔ خراش مٹو یا تیز جیسے کہ دماغ

میں میخیں گاڑی جا رہی ہو۔ دماغ کی اتہری۔ درد کی تکلیف میں سر کو پانی میں ہلانے سے زیادتی

سر کو اونچا کرنے پر آفتاد۔

ہائپریم - ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ کی وجہ سے سردرد۔ یہ آزیکا کی بھیلی دوائی ہے حسیات

کو درد کرتی ہے جب آزیکا اجتماع خون اور خراش پر قابو پایا ہو۔

نکسو امیکا - شراب یا دوسرے محرکات میں ملوث ہونے پر سردرد پر درد تکلیف

جیسے کہ مٹیا لگا ہو۔ دباؤ والا۔ بھاری۔ کندہ بن۔ پریشان چکر۔ ڈوبنا اور سکتے جو ناگوار اور کھٹے

مادہ کی تلی اور تے کے ہمراہ پاخانہ نامکمل خوارش۔ شام کے وقت سردرد میں آفتاد۔

یکمو میل - پھر چڑے پن کے ساتھ سردرد۔ بلض ناراض اور غصے میں ہو۔ عام طور پر

یہ سردرد ان لوگوں میں ہوتا ہے جو آدمی زیادہ مقدار میں شراب استعمال کریں اور اسکے اثرات

کو زائل کرنے کے لئے افیم استعمال کریں۔ یا جو سخت کافی استعمال کریں۔ اعصاب کو سہلانے

کے لئے یا اعصاب کو سکون دینے کیلئے۔

چینیم سلف - کونین کے غلط استعمال کی وجہ سے کانوں کا بھنا۔ بھنساٹ۔ گرج

دونوں کانوں میں مائع اور آنکھوں میں شدید ٹیکن والا درد۔ خوراکہ ایکڑا طاقت کی دیکھائے۔

کالی میوور - جب چینیم سلف فیل ہو جائے تو یہ دوسری دوائی ہے کونین کے غلط استعمال

کے لئے سر میں جھینگروں کے بولنے جیسی آوازیں آئیں۔ ۱۰۰ طاقت میں دیا جائے۔
 ایموڈم - سرد درد جیسے کہ سخت پٹی سے سر باندھا ہوا ہو۔ گرم کرے یا آگ
 کے نزدیک جانے پر زیادہ ہو۔ ٹھنڈے کرے اور ٹھنڈی ہوا اور کھانکے دوران میں آفاقہ ہو۔
 پیسرس کو اڑھٹھو لیا - سر کے پھیلنے کا احساس ریڑھ کی ہڈی کی طرف سے سرد درد شروع ہو
 فائیو لاکا - سننے کی جس کی زیادتی کے ساتھ سرد درد کی زیادتی۔
 کلکیر یا فاس - سکول کے لڑکے، لڑکیوں کا سرد درد جو غور سے کتابیں پڑھیں۔ خاص
 طور پر وہ جو تیزی سے پڑھیں۔ جن کی ذہنی بڑھوتری جسمانی بڑھوتری کے مطابق نہ ہو۔
 تھو جوا - سرد درد جیسے کہ کھوپڑی میں منج گاڑی جا رہی ہو۔ یا پیشانی کی چڑھائی میں۔
 کافیا - درد سر جیسے کہ کھوپڑی میں منج گاڑی جا رہی ہو۔
 پیکرک الیڈ - تھوڑی سی بھی ذہنی مشقت سے دماغ کی نرمی کیوجہ سے سکول کے لڑکوں
 میں سرد درد پڑھنے کے بعد، امتحان کے بعد طالب علموں کا سرد درد۔
 روینیا - صفراوی سرد درد گیس کی علامات کے ساتھ۔ معدہ میں درد۔ کھینچتے
 اور تیزابیت محسوس کر لے کہ مر جاتے ہوئے پانی سے بھلا ہوا ہے۔
 کلورٹم - خونناک، گندہ بھاری پیشانی کا سرد درد جو کئی روز رہے۔
 ٹیزنولامپانیہ - جیسے کہ ہزاروں سوئیاں سر میں گاڑی جا رہی ہوں۔ شور مچھونے
 سے اور سخت روشنی سے زیادہ ہو۔ مالش سے آفاقہ ہو۔
 لیک ڈیفلمو - درد شقیقہ ہاتھ سے شروع ہو کر کھوپڑی تک جائے۔ تپکن کے
 ساتھ متلی تے۔ اندھا بن اور رضوی قبض حوض کے دوران میں زیادہ پیشاب کرے سے آفاقہ۔
 وریٹرم ایلم - اعصابی سرد درد جس کے ساتھ نظر ماتی رہے۔ چوٹی پر بہت ہی ٹھنڈک
 سرد چیزیں لگانے پر آفاقہ۔ ۲۰ طاقت میں بیچے۔ سرد درد جو چہرہ کو بدلنے تقریباً پاگل بنائے۔
 ڈائیولا اوڈورٹیا - سرد درد اچانک ظاہر ہو بغیر کسی وجہ ظاہری کے
 نفس میں بگاڑ کے ساتھ۔

بیچو تھمس - درد شقیقہ کی خاص دوائی - بے پرواہ اور بے حس - پیشانی کا درد -
 ناک جڑ پر آنکھوں کے اوپر کنپٹیوں میں سے جو ٹھنکے پر اور ہٹنے پر زیادہ ہو - ٹھنکے استعمال کیجئے -
 پلو تھمس - ہسٹیرائی سر درد کے لئے -

ایلیم سیٹ - سر درد جس میں حسی شروع ہونے پر آفاقہ اور اس کے بعد زیادہ -
 گلکیریا ایٹ - یہ خوش کرنے والا پیشانی کا درد - کام بند کرنا پڑے اور نہ جانے کہ وہ کہاں تھا
 اپنی فیکس - اعصابی سر درد جس میں متواتر تھوکنے کی علامت ہو - متوکلہ چمپا یا نیم کا ٹھا -
 سر درد جس میں جھوکی ہو -

الگنٹیا - غم کے بعد اعصابی سر درد - بہت زیادہ پیشاب آنے پر بند ہو جائے یا ختم
 ہو جائے - ہسٹیرا میں سر درد - درد ایسا کہ جیسے سوئی یا نیچ سر میں گاڑی جا رہی ہے -
 لوبیلیا انفلیٹا - دماغی بھلیوں کا درد - ۶ طاقت دو تین قطرے ہر دو گھنٹے کے بعد
 دن بھر میں ۶ مرتبہ ضرور دیجئے -

لائیکو پوڈیم - ننگا کرنے پر آفاقہ ہو -
 آرم میٹ - پاگل کر دینے والا سر درد جیسے کہ اس پر ہوا چل ہو اگر سپہ کوئی جھونکا
 محسوس کر رہا ہو - ٹھنڈے بہت زیادہ حساس - اپنا سر لٹایا چاہے
 سلینٹیا - سر درد کو لپٹنے اور ڈھلپنے سے آفاقہ ہو - اندھیرے میں زیادہ روشنی
 میں آفاقہ - اعصابی سر درد جو سکول میں زیادہ پڑھائی کرنے پر ہو -

اوسموڈیم - دباؤ یا آنکھ پر دباؤ - پکڑا اعصابی سر درد - ضعف اعصاب -
 اکیٹاریم - پیشانی کا اکھوڑی کا سر درد - آنکھوں کے ٹیلوں میں درد - دباؤ سے
 آفاقہ - تھوڑی سی حرکت سے بھی زیادتی -

بکس اسکٹا - تھوڑا سا بھی کھانا کھانے سے بہت زیادہ درد -
 پلیٹیل - آئس کریم کھانے سے سر درد - گیس کی وجہ سے سر درد جو گرمی سے زیادہ ہو -
 سپیا - سر درد ہٹنے والی تکلیف - سر کے داہنے طرف چھوڑ کے اور پیشانی کی ہڈی

تیزی سے بڑھنے والی تکلیف۔ اور بچاڑنے والے درد۔ بائیں کنپٹی میں۔ بائیں آنکھ کے اوپر سے کھوڑی تک بڑھنے والی۔ سردرد جو ٹیپریٹکین والی محسوس کرے جیسے کہ سر اوپر سے کھل گیا ہو۔ شوہر سے زیادہ۔ قہرسم کی خوراک سے نفرت۔ معدہ میں خالی پن کا احساس۔ کھانا کھانے کے بعد آفاقہ اور نیند کے بعد آرام۔

ٹیوٹرکولیم۔ ٹی بی کی ہسٹری والے خاندان میں آدمیوں کا سردرد۔ درد کی نیت ایسی ہو کر جیسے سخت لوہے کا پھللا سر کے گرد منڈھا ہوا ہو۔ ریڑھ کی ہڈی پر گیتے تکلیف دہ کپڑوں کا احساس۔ آرام آس۔ برف کی طرح سرد ماتھ، ٹانگیں اور پاؤں۔

سٹیف گیبریا۔ بڑا گوشت (گائے کا گوشت) کھانے سے سردرد۔ کانوں میں گرج کے ساتھ سردرد۔ سردرد جو باگل بنانے والی ہونا خاص طور پر پیشانی میں۔ تکلیف اندرونی دبیردنی وطن دبانے والی معمولی سا چھوٹے سے سردرد اور تکلیف بڑھیں۔

کلیریا یا ایڈورڈ۔ سر میں درد جس کو بالوں کو باندھنے سے زیادتی ہو۔ کرڈنلس میور۔ درد ثقیقہ بہت بڑی مقدار میں صفر اک تھے۔ داہنی طرف زلیٹ سکے یا کمر کے بن زلیٹ سکے۔ بغیر سیاہ صغراوی تھے کے۔

اینا کارڈیم۔ سردرد کو کھانا کھانے سے مکمل طور پر لافاقہ ہو جائے۔ حرکت اور کام کے دوران زیادہ۔ گیس اور اعصابی سردرد۔

چیلیڈنیم۔ شدید باگل بنا دینے والا سردرد جو بعض کو اپنے ماتھ کاٹنے پر مجبور کرے۔ کوکولس۔ سر کی پشت پر درد جیسے کہ یہ جھٹکے بعد دیگرے کھل اور بند ہو رہے ہوں۔ سردرد سائے کی طرح آئے۔ نیند کے دوران میں جو کچھ ہو رہا ہو شمن کے خواہ خراٹے سے رہا ہو۔ اعصابی سردرد گرانی کے ساتھ تپلی اور چکر۔ سر کی گدی کو درمکی شدت کی وجہ سے پڑے۔ ٹیلیڈائی۔ صغراوی سردرد۔ جلد پہرہ میں جلنے کا احساس، مانس بھی تھنوں کو ملا۔ آئرس ور۔ صغراوی سردرد جلنے اور تیزابیت کے ساتھ ٹپکن اور شدید درد۔ نظر میں تیز تھے سے درد کو آفاقہ ہو جو کڑی ہوتی ہے۔

سورائیم۔ بھوک کی وجہ سے سردرد۔ کھانا کھانا چاہے لیکن مطلوبہ مقدار حاصل نہ کر سکے۔
 ایونٹا سلیکیٹ۔ بال باندھنے سے سردرد میں اضافہ۔ دانتوں کو ایک دوسرے لگانے
 سے یا کٹنے حیض سے پہلے یا دوران میں۔ بھاری پن سے قدم اٹھانے سے سردرد میں اضافہ
 ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی بیٹوں۔ سرکوشیوں سے باندھنے سے سر ملانے سے اور چلنے سے سردرد
 میں آفت ہے۔

فلینڈیریم۔ درد جیسے کہ سر کی چوٹی پر وزن ہو۔
 کینا بس انڈیکا۔ احساس جیسا کہ سر چوٹی پر سے کھل اور بند ہو رہا ہو۔
 بیڈیاگا۔ ۲ بجے سے ۷ بجے شام کے درمیان شدت کی سردرد۔ چکر اور سر کا گھبراؤ
 ٹھنڈک سے زیادتی اور گرمی سے آفاقہ۔

کالمیا لیلیفولیا۔ چوٹی میں سردرد سورج طلوع سے غروب آفتاب تک۔ کھڑے ہونے سے
 اضافہ، چکر اور گھبراہٹ۔

جبرانڈمی۔ سردرد ہر روز بوقت دوپہر متلی سے تھکانا اور پسینہ۔
 نیٹرم سلیفوریم۔ سر کی جڑ میں درد جیسے کھلا گیا ہو۔ سر میں زخموں کی وجہ سے دماغی
 تکلیف جگڑے کانوں میں سوئیاں چبھیں۔ کنپٹیوں میں سوراخ ہوتے ہوئے محسوس۔ گانے
 اور مرطوب ہوا میں اضافہ ہو۔

سیلینیم۔ چاء یا شراب کا عادی ہونے کی وجہ سے سردرد۔ گرم موسم۔ زیادہ مطالعہ اور
 تیز خوشبوؤں سے اضافہ۔ سردی کے دوران پیشاب بڑھ جائے۔

پلوڈونائیلیم۔ جب سردرد اسہال سے بدلے۔
 پلمبیم۔ پیشانی یا سر کی چوٹی کا عام طور پر قوی اور مفردی تے خاص طور پر جب
 سردرد کے ساتھ ہو۔ گلے حلق میں سر کی طنز گولہ اٹھنے کا احساس ہو۔

فاسفورس۔ سردرد کو ٹھنڈی بیٹوں سے اضافہ ہو اور گرم کمزور اور گرم بیٹوں سے آفت
 دماغ کی جڑ میں ٹھنڈک کا احساس۔

پٹرولیم۔ سرکی کھوٹری کا ہندی قسم کا سردرد، متلی اور تے کے ہمراہ۔

لیکسس۔ حیض کے دوران میں شدید سردرد، خاص طور پر جب حیض کا بہاؤ کمزور ہو۔

سردرد میں درد بعض کی طرح حیض کے بہنے سے افاتہ۔ پھٹنے والا، پھوڑے لگنے کی طرح کا

سردرد۔ سرکی طرف خون کا زیادہ بہاؤ۔

کونیم۔ شراب کے مشروبات کی وجہ سے سردرد اور چکر۔ تیز چلنے والی چیزوں کو دیکھنے سے غصہ۔

ایومنا۔ سردرد متلی اور تے کے ساتھ۔ زکام میں مبتلا ہونے پر سردرد زناک

نخک اور بند۔ بڑے سردرد بدبو دار پھلکے ناک اندر پانی جیسا اخراج آنکھوں سے اور پیشانی

میں درد کے ہمراہ۔

سٹس کین۔ ہاتھ پر ٹھنڈے پسینے آنے سے سردرد میں اضافہ۔ جتنا زیادہ پسینہ

آئے اتنا ہی زیادہ ٹھنڈا ہوا اور سردرد میں اتنی ہی زیادتی ہو۔ کھانا کھانے سے افاتہ ہو۔

کلکریا آریٹیکم۔ اس دوائی کی یہ خاصیت ہے کہ درجس پہلویشا ہوا اس سے دہری طرف جس پر لیٹا ہوا نہ ہو چلی جاتی ہے۔ اور مریض حوا تراپنی حالت بدلتا رہتا ہے۔

امیر گریسیا۔ سردرد نیچے کی طرف دبانے والا۔ اور بھاڑنے والی تکلیف پیشیوں سے شروع

ہو۔ جب ناک صاف کرے سردرد ہو۔ داہنی آنکھ اور داہنی لپک میں جلون۔ کھانا کھانے کے بعد

اضافہ یا زیادتی سردرد۔

فلورک ایڈ۔ پیشاب کی خواہش کو پورا نہ کرنے پر سردرد۔

اگر کیس مس۔ پیشاب میں کمی اور قرض کی وجہ سے پافاتہ آنے پر افاتہ۔ دفعوں سے کھینچنے

اور بھاڑنے والی پیشانی میں درد۔

ایونن۔ سرکی چوٹی پر درد لگ جیسی جلن کے ہمراہ اور یہ اس کو دبانے جیسے کہ کھوٹری پکڑ

دی جائے گی۔ سخت دباؤ اور برف جیسی ٹھنڈی پیشیوں سے افاتہ ہو۔

امونیا کلرب۔ سر میں اعصابی اور گٹھیاوی دردیں۔ پیشیوں میں پھاڑنے والی درد۔

لوکٹا۔ دماغ میں گہری درد اس احساس کے ساتھ کہ سر سوجا ہوا ہے اور بہت بڑا ہے۔

اس کے ہر اجیض درہم برہم - اور دل کی دھڑکن اور دل بھی بڑھا ہوا محسوس ہو۔
 کلکیر یا کارب - موٹے آدمیوں میں مزین سردرد، جہرے - جہرے پر پسیز کے رعبان کے
 ساتھ - برف کی طرح ٹھنڈا اور ماتھے پاؤں کا مندر ہونا۔

لائیکو پرسیکم - تمام سر میں شدید درد لیکن آنکھوں کی پشت اور کپٹیوں پر جم جائے یا
 ٹھہر جائے بہت شدت کے ساتھ، مٹاکو کے دھوئیں سے مکمل آفتادہ گرم کرے میں یا باہر کی گرمی۔

سر میں رطوبت کا بھر جانا۔

میڈر ایملکس - صرف ایک قطرہ ایک خوراک دیجئے - دوسری صبح ناک کے راستے صاف
 مواد کا بہاؤ ظاہر ہوگا اور صرف ایک خوراک آرام دے دیگی - دوسری خوراک دیجئے اگر دوبارہ کا خطر ہو۔
 ایپس ایم - نالوکا اہمار - چہرہ پھولا ہوا اور زرد - مریض لا پرواہ - اُونگھنے والا۔
 خاموش - بعض اوقات تیز چیخ کے ساتھ چونک جائے - سرخ بخار کے بعد۔

زینکم میٹ - مریض اپنے سر کو گھمائے اور نیند سے جاگ جائے جیسے کہ ڈرا ہوا ہو - چوٹی
 گرم، پیشانی ٹھنڈی - دانت پیسے - آنکھیں روشنی سے حساس یا متاثر ہوں - منجندہ
 گھورتی ہوئی آنکھیں - ناک خشک - نیند کے دوران ٹھونک کا پھڑکن۔

ہیلی بورس - دماغ کی افسردگی نمایاں علامت ہے سر کو گھمانا اور پیچھے میں گھسیڑنا ہے
 سردرد کی وجہ بھی موجود ہوتی ہے - اگر شدید تشنج ہوتا ہے - دماغی جھلیوں کی سوزش اس کی
 پیچیدگی ہوتی ہے - پیشاب کم ہو جاتا ہے اور آنکھیں روشنی سے متاثر نہیں ہوتیں۔

کلکیر یا کارب } پہلی دوائی ہٹیلے نرم مریضوں کے لئے ہے - جن میں نالوکھلا غیر معمولی
 کلکیر یا فاس } بڑا سر - جلد ہٹیلی لٹک ہوئی سر پر پسیز - دوسری دوائی (کلکیر یا فاس) کے
 کے متعلق چھوٹے تھکے کوزہ بچوں کے متعلق سوچنا چاہیے - وہ ناراض اور بڑبڑاہوتا ہے - لیکن
 ہیزوں کے بہت خواہشمند ہوتے ہیں - پیش کے پٹھاندر دھنے ہوئے ہوتے ہیں۔

کالی آئیوڈ - یہ دوائی دماغ کا میاب ہوتی ہے جہاں خاندان میں سفلس کی تاریخ پائی

جاتی ہے۔ جینگان پن۔ لمبے ناس لینا اور نشیج پتلیوں کا فالج اور بہت زیادہ پھیلتا۔ بازوں کا خود بخود حرکت کرنا۔

مرک سال۔ بچک اور سرخ بخار کے بعد دماغ کی جھیلیوں میں پانی پڑنا۔ بچہ سر کو ادھر ادھر ہلاتا ہے۔ بچہ سر پر پسینہ کے ساتھ کراتا ہے۔

بیلادونا۔ حاد کیسوں میں چوٹی کی دوائی ہے۔ بخار، بخوٹا ہوا سی اور ہڈیاں۔ شدید سر درد سرخ اور خون آمیز آنکھوں کے ہمراہ۔

سلفر۔ خنازیر۔ کندھوں میں مبتلا دھجوں کے لئے مفید ہے۔ سو پسینے۔ بازوؤں کا ہلنا اور خاندانی مریضوں کے لئے۔

ایپوسٹیمم۔ دماغ کی جھیلیوں میں پانی۔ ماتھا آگے کی طرف نکلا ہوا۔ سر کی جڑ کھلا۔ رطوبت رسنے کی نوبت۔ مدہوشی۔ ایک بازو اور ٹانگ کی بلا ارادہ حرکت۔ ایک آنکھ کی نظر ضائع۔ اخراجات کم خاص طور پر پیشاب اور پسینہ۔

پانی سے ڈرنا (مرگی)

لافی سین۔ اس دوائی کے ساتھ علاج شروع کرنا چاہیے۔ ۲۰۰ طاقت کی ایک خرگ دے کہ ۴ گھنٹے کے بعد علامات کے مطابق درج ذیل ادویات دینا چاہئیں۔

بیلادونا۔ شدید ہڈیاں۔ مریض شدید غصے میں۔ ماتھا بے کانتا ہے، بھاگ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کی مخالفت کی جائے تو شیطان کی طرح لڑتا ہے۔ گلا خشک۔ سرخ پالش کیا ہوا اللہ پر درد۔ کھانسی۔ روشنی اور پلنے سے اضافہ۔ پہلے درجے کی دوائی ہے۔ سٹر امونیم۔ وہی علامات جیسے کہ بیلادونا میں لیکن اس سے کم یا الٹی۔ سٹر امونیم میں پانی پینے میں اضافہ نہیں بلکہ پانی دیکھنے ہی سے اضافہ مرض ہو جاتا ہے۔ یہ اس مرض کی نمایاں علامات ہے۔ آہستہ آہستہ بڑھوترانے کا ہڈیاں۔ دوسری سٹیج کی دوائی ہے۔ پاگل جانوروں کے کاٹنے کا علاج ہے۔

ہائوسائیمس - جب تواتر بے خوابی ہو۔ گلے کے پھٹوں کی متواتر نرم و نرم حرکت ہو۔
 کیتھرس - شدید غصے کا نذران۔ مجنوں مشتعل۔ شدید غصے کے دورے
 بھونک۔ پریشان تپے جینی جو غصے پر منتج ہو۔ حادثہ پاگل پن۔ یہ سب بڑھیں، جب اضافہ
 مرض ہو۔ حلق کو چھوٹے اور ٹھنڈا پانی پینے ہو۔ نگلنا مشکل ہو۔ درد کے ساتھ تنگی۔
 جلتے ہوئے۔ خشکی۔ شدید بخار۔

خون کا دماغ کی طرف بہت زیادہ چڑھنا

بیلا ڈونا - شدید تپکن والا درد سر۔ سرخ چہرے کے ساتھ۔ ٹھنڈی پیشوں سے یا
 سر کو نیچا اونچا کرنے پر افادہ۔

ایکونائٹ این - سرگرم۔ جلد خشک۔ تیز چھوٹی باریک تار جیسی نبض بہت
 پریشانی اور بے چینی۔ سب سے پہلے اس کے متعلق سوچنا چاہیے۔
 ہائوسائیمس - سرخ آنکھیں اور شرارے نکلے ہوئے کے ساتھ نذران۔
 گلوٹائمن - سر میں بھراؤ کے ساتھ تپکن دار سرد و سردی کی گرمی سے زیادہ اور ہلے سے
 زیادہ ہو۔

جیلسمیم - بھول خون مرکب چڑھتا ہوا۔ بہت زیادہ بھرا ہوا۔ کٹہ ذہن۔ لاپرواہ۔
 چہرے سے لاپرواہی کا اظہار۔

ورم درائسٹ - دماغ کی بڑیں اجتماع خون۔ سرگرم۔ آنکھیں خون کی طرح
 سرخ۔ ایک کے دو دکھائی دیں۔ نبض نرم اور سست۔

ورم اعصاب

ایکونائٹ این - دماغ میں اجتماع خون سوزج کی گرمی کی وجہ سے جذبات کی
 اپانک براہین تنگی۔ ورم اعصاب کے پہلے درجہ میں۔ شور اور روشنی میں زیادتی مرض۔

بیلڈونا۔ اجتماعِ خون اور دماغ کی سوزش یا ہیجان سرگرم اور ٹھنڈے پاؤں کے ساتھ۔ گردن کی شریانوں میں ٹپکن دار اسرور۔

گلوٹاٹن۔ احساسِ کمرہ بہت بڑا ہے اور خون سے بھرا ہوا ہے۔ پیچھے کی طرف جھکنے سے زیادتی۔ حرکت اور رنگا کرنے سے آفاقہ۔ اس میں بیلڈونا سے جو پیچھے کی طرف جھکنے سے آفاقہ اور سر کو ڈھانپنے سے اور حرکت پر زیادتی سے تقریبی کی جاسکتی ہے۔

ہائیوسائیکس۔ درم اعصاب ٹپکن کی ہری سر میں۔ سر کو ہلانے سے اور آگے کو سر کر کے بیٹھنے سے آفاقہ۔ بیلڈونا کے خلاف۔

الیومنا سلیکیٹ۔ درم اعصاب درد والے حصوں کے سن ہونے کے ساتھ۔ میگنیشیا فاس۔ دماغ میں اجتماعِ خون جب اچانک اسہال رک جائیں۔ اعصابی اور گنٹھیاوی سرور۔

(دیکھیے فالج۔ حرکت کی نااہلیت)

دماغ کی جھلیوں کا درم

بیلڈونا۔ شدید بنیان۔ لڑے تاکہ تصوراتی چیزوں سے بچ کر نکل جائے۔ سرخ خون کی طرح آنکھیں۔ گردن کی شریانوں کی پھر کن۔ نیند اس وقت ٹوٹے جب مریض ڈر کر جھجھکے شور اور روشنی سے متاثر ہو۔ بغض تیز اور اچھلتی ہوئی۔ درجہ حرارت اونچا۔ ڈھانپنے ہوئے حصے مندار۔ دانت پیسے۔

برائی ادویا۔ یہ بیلڈونا کے بعد اچھا کام کرتی ہے لیکن بدل بدل کر کبھی نہیں دینا چاہیے۔ جب بیلڈونا بیمار کو کم کر دے اور بغض کو دھما کر دے، کھانسی کم ہو جائے۔ یہ گنٹھیاوی مریضوں کے لئے بہت بہتر ہوتی ہے۔ سن ہونے کا احساس۔ احمقانہ اظہار۔ گردن کی سختی۔ پیٹ بھولا ہوا۔ ٹیوبرکولوسس۔ یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے علاج کے شروع میں دی جا چاہیے یہ ایک جہانی ساخت کے مطابق دوائی ہے۔ یہ ٹی بی میں جھلیوں کے درم کا علاج بھی کرتی ہے اور

حفاظت بھی کرتی ہے۔ ۲۰ ملاقات کی ایک خوراک دیجئے، ۶ سے ۱۲ گھنٹے تک کوئی اور دوائی نہ دیجئے
حتیٰ اگر مریض حالت علامات کے مطابق کوئی اور دوائی نہ چاہے۔

ایپس ایم۔ ٹی بی میں دم کی بھلیوں کی سوزش میں یا مادہ اخراج مواد جو پینسیوں کے
بنے یا نامکمل ہونے کی وجہ سے خارج ہو رہا ہو۔ مریض نیند میں چرخ کے ساتھ ملتا ہے۔

ہیملی لوکرس۔ جب ماتھے میں ٹھنکن، پتلیاں پھیلی ہوئی اور پھیلا جڑا کرے۔ ایک بازو اور ایک
دھانگ کی خود بخود حرکت یا بلا ارادہ حرکت۔ ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ۔ مریض پانی لینے میں لاپرواہ کرے۔ وہ
پہچ کو دانتوں سے پکڑے جب اس کے منہ میں پانی ڈالا جائے۔ آنکھیں روشنی سے متاثر نہ ہوں۔
مکمل بیہوشی۔ ٹی بی والی دم کی بھلیوں کی سوزش۔ مکمل یا نیم بیہوشی۔ سستی۔

کیوپرم میٹ۔ جب ادنیٰ آواز سے جیسے جس کے بعد شدید تشنج۔ اور انگوٹھے پہنچ جائیں
نیلے ہونٹوں کے ساتھ چہرہ زرد۔ ڈیلے متواتر گھومیں۔

ہائیوسائیمس۔ یہ دوائی اس وقت دینا چاہیے جب تشنج دب جائے۔ اور مریض لالعلق
اور بیہوش پڑا ہو بلکہ ہڈیاں کے ساتھ۔

گلوٹامائن۔ دم دماغ کی وجہ سے چمچ (جیسے کراپس میں) اس احساس کے ساتھ کہ
سر بہت بڑا ہو گیا ہے۔ تشنجی قے شدید اجتماع خون اور سر کی تپکن کے ساتھ۔ سوزش کی گری
اور عام گرمی ہے۔ دماغی بھلیوں کی سوزش۔

نرکم میٹ۔ دماغی سوزش میں پتھر ڈر کے ساتھ جاگ جائے۔ سر کا دماغ دھر گھمائے،
چلائے۔ نیند میں چونک جائے۔ قلت خون والے پتھوں جن میں بھوڑے پینسیوں کا رجحان ہو۔
سکڑاوا اثر و سانس تشنج کے ساتھ۔ بازو اور تمام جسم میں ڈرانے والے جھٹکے بیہوشی کے
ساتھ۔ تشنج جسمیں پیچھے کی طرف مڑے۔ تھوڑا سا چھونے سے، شہر سے یا پلنے سے دور شروع ہو جائے۔
مرک سال۔ دماغ کی سوزش، چوٹ کے مابعد اثرات۔ سوزش دماغ جو کان میں سے
اخراج کے دہنے کی وجہ سے ہو۔ اس دوائی کے استعمال سے ۲۴ گھنٹے کے اندر اندر اخراج
دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں اور تمام تکلیف ترک جاتی ہے یا غائب ہو جاتی ہیں۔

ایکونائٹ - سوزش دماغ کے ابتدائی مرحلے میں - دماغ میں اجتماع خون، غصہ یا دھوپ لگنے کی وجہ سے، ڈر کے ساتھ بخار بے چینی، خشک جلد اور شدید پیاس جلیسیم - ٹھوں کی مکمل یا نیم مکمل کمزوری کی وجہ سے (اپنا کام چھوڑ جانا کمزوری کی وجہ سے) نظر کی کمزوری - بولنے کی کمزوری -

الغیشیا - ہسٹریائی ریفیوئل میں غم کی وجہ سے نصف سر کا درد - کئی دفعہ خراب زیادہ یا کم مقدار میں -

بیلادونا - دمی وکثرت خون والے اور تندرست آدمیوں میں سردرد - نظام دوران دن میں اتاری کی وجہ سے سردرد - سردرد شدید - اچھلنے والا اور تکین والا ہو - آئرس ٹینکس - سردرد جو ہفتہ کے روز اٹھنے سے پہلے شروع ہو جائیں یا ان کے شروع ہو کر آدھے بائیں سر تک جائیں -

حرام مغز کی تہ کی سوزش

فالج بھی دیکھیے -

بیلادونا - جب حرام مغز کی تہ کی اوپر والا حصہ ملوث ہو - گولی لگنے کا سادہ جو ٹھہرا گھونپنے جیسا درد ٹھوں کا پھڑکنا، جیسے کہ بجلی کے شرارے سے چھوٹے جارے ہوں - شدید بخار -

برائی اونیا - سوئی گڑے جیسا درد، حرام مغز کی تہ میں بھاڑنے والا درد جو حرکت سے زیادہ - ٹھوں کی سختی اور سٹ ہونا -

آرنیکا ایم - حرام مغز کی تہ میں درد اور سوزش جب کسی چوٹ یا زخم کی وجہ سے ہائپرکیم - ہو - معمولی سی حرکت سے بھی درد - پھونے سے بہت زیادہ حساس بھرے ہونے یا چلنے کی کوشش سے ڈرے -

پلمسم - ریڑھ میں شدید درد - بخار اور تشنج -

اگر الگ الگ ایڈ - ٹانگیں سخت اور پُر درد -
 سکوڑاؤ اور سہا - جب مریض چلائے تو شدید تشنج -
 کیوپرم آسینکم - اینٹھن کے درد کو پاؤں سے دہانے سے افادہ - سُن اور ٹانگ میں
 فالج کا احساس بار بار پیشاب کی خواہش -
 سُرکیا فاس - حوام مغز کی تہی کی سوزش جس کے ہمراہ دل -
 ایومنا سیکیٹ - داغ میں اجتماعِ خون اور تہی اور رٹیہ کے اعصاب، نمایاں طہن
 اور ڈنگ لگنے جیسی درد -

اعصاب - (انگیوں کا سُن ہونا) متفرق میں دیکھئے

اکونائٹ این - سُن ہونے اور جھنناہٹ کی تازہ تازہ تکلیف -
 پلاٹینا - پھوٹی جگہوں میں سُن ہونے کا احساس خاص طور پر شام کے وقت اور بتر میں -
 دانتوں کا سُن ہونا - زبان پر جھنٹیوں کے ریگنے کا احساس - جب بیٹھے تو رٹیہ کی ہڈی کے
 آخری ہمرے کے سُن ہونے کا احساس - کانپنے کا احساس - سُن ہونے - چونٹیاں ریگنے اور
 اینٹھن کے دورے -

ہائیڈرو سائنگ ایڈ - احساسات کا اچانک اور مکمل طور پر کھوجانا -
 کوکا - ہاتھ اور پاؤں کا اندرونی حصہ سردی کے احساس کے ساتھ سُن ہونا - بازوؤں
 - اور ٹانگوں کی کمزوری -

آرینیکم - ہاتھ اور پاؤں میں ریگنے کا سُن جانے کے ہمراہ -
 مارفینم - کھڑے ہونے کی کوشش پر، گرنے پر، ٹانگوں اور پاؤں کا سُن ہوجانا - بائیں
 تلے کا برف کی طرح سُن ہوجانا - اینٹھن یا تشنج -

جلیسیم - بازوؤں کی کمزوری اور سُن ہوجانا - فالج کے اثرات، پٹھے کمزور - اور مرضی
 کے مطابق کام نہ کریں - تمام پٹھوں کے نظام کی کمزوری - حرکت کرنے تمام اعصاب کے ساتھ -

اگر کسی اہم - جسم کے حصے ٹھنڈے اور نیلے مردہ ہونے کا احساس ہے کہ ٹھنڈے جسم گئے ہوں۔
 لیکن جیسا احساس جیسے کہ چونٹیاں رنگ رہی ہوں۔

سیکل کار - انگلیوں کا سن ہونا - انگلیوں کے سروں میں سوئیر کا چٹبنا سن ہونا ہے
 جسی اور ٹھنڈک - رنگے کا احساس - گرمی سے زیادہ ہونا مرض کا۔

لیکسس - ہاتھوں اور انگلیوں کا سن ہونا - وتر یا بندھنی کا سکڑ جانا - صبح کے وقت
 اٹھے پران رلیضوں میں جو باتونی ہوں اور رات کے وقت یا صبح سویرے زیادہ ہو اور جوں جوں
 دن گزرتے اچھے ہوتے جائیں - گرمی اور نیند کے بعد مرض میں زیادتی -

اگر اناک الیڈ - بازوؤں کی پشت کا سن ہو جانا - انگوٹھے کے گولے کا سن ہو جانا
 اور سوجنے کا احساس - کندھے سے لیکر انگلیوں کے کنارے تک کا سن ہو جانا -

پلمسم - مڑھ پن اور بے جسی خاص طور پر دائیں طرف کی - اعصاب کے کام ڈھیلے ہونا
 اعصاب بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ہنچاوات نہ پہنچائیں - جلد کا بے جسن ہو جانا -

سکواڈ ائروڈا - بازو فالج سے سن ہو جائیں، تمام جسم کا سن ہو جانا - ہاتھوں کی ٹھنڈک -
 اگنیا - چلتے وقت ایڑیوں کا سن ہو جانا - اور مڑھ ہونا -

کو نیم - تمام جسم پر سن ہونے کا احساس - شدید کمزوری - کانپنا ٹھیکے کھانا اور ٹپوں کی انٹمن -
 ریفیننس - ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں کا تلیوں کا سن ہو جانا -

بیوفو - جلد پر مڑے بے جسی کے

کیڈیم سلف - جلد اور ہاتھوں اور پاؤں کے ٹپوں میں گہرائی میں چونٹیسوں کے رنگے کا
 احساس جھون کا دھوون کی مڑھ میں سن ہونا - فالج زدہ حصوں رنگے کا احساس -

امبر گریشا - تمام حصوں کی گھٹی ہوئی جسن - کمزور دوران خون - موسیقی ناقابل برداشت
 دکمن - ٹھنڈا پن - اور کانپنا اور بازوؤں کی سختی -

الیوفو - اعصاب کی پیغام دینے کی جس کمزور - جب ایک سوئی جھوٹی جائے تو ٹانگوں
 اور بازوؤں پر عرصی نہ ہوتے کہ دوسری بار یا اسی طرح پھر اور بار بار - پاؤں کی تلیوں کا سن ہو جانا

ہاتھوں اور پاؤں کے بے ربط ہونا۔

فاسفورس۔ جب سن ہونے کی وجہ جلتی ہو۔ برائٹ کی مرض ہو یعنی پنساب میں چربی آئے
سوئیاں بھنے کے ساتھ جسم کا سن ہو جانا۔ بازوؤں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا اور بے حسی اور
انگیلیوں کے سروں کا سن ہو جانا۔

اعصاب کی زود حسی

کافیا۔ بچوں میں زود حسی۔ زبکی کے بخار میں بازوؤں اور ٹانگوں میں ٹھنڈک تھوڑی
سی حرکت کو بھی زیادہ محسوس کرے۔ چھونے اور شور سے بہت زیادہ حساس۔ نظر۔ سننے
سو نگھنے۔ چھونے سے حساس۔ دردیں شور سے زیادہ ہوجاتی ہیں۔ زنا نہ اٹھائے قنائل
کی شدید حساسیت۔ اکثر بھستری یا جماعت نہ کرے۔ جسم کی گرمی اور حساسیت کی وجہ سے
کیہو میللا۔ جب کافیا ناکام ہو جائے تو یہ دوا موزوں ہوتی ہے۔ درد کے لئے
بہت حساس۔ درد کی وجہ سے جسم حساس۔ ڈھانچے میں ہارو ڈر جائے۔ اینٹھن اور تشنج
اسارم لیور۔ انگلی یا ناخن سے لٹن۔ سسک پر کھرجنا۔ کاغذ کا کھڑکھڑانا اور می
طرح چیزیں بہت ناگواری کا احساس پیدا کرتی ہے اور وقتی طور پر اس کے تمام خیالات اور
کاموں کو بچھڑا لیتی ہیں۔ ٹھنڈا۔ ہر حرکت سے کانپنے، تصور کرے کردہ ہوا میں ایک طرح
کی طرح تعلق ہے۔ چلتے وقت پھسلنے کا احساس ہو۔

نکسوامیکا۔ بیرونی اثرات کے لئے شدید حساس، روشنی، شور اور خوشبوؤں کیلئے
بیلادونا۔ معمولی سے شہد یا پلنے سے شدید حساس ان میں سے کسی کو بھی برداشت
نہ کر سکے۔ کھوپڑی حساس۔ بالوں کی کنگھی یا برش نہ کرنا چاہیے۔

سلفر۔ گندی بدبوؤں سے شدید حساس، لیکن خود گندی اشیاء کو کھائے اور منگھے۔

تھریڈون۔ احساس کہ درد کی صورت میں ہر جس اس کے جسم سے گزر رہی ہیں اس کے

بعد تسلی ہو عجیب و غریب قسم کی۔

ہمیں پھر نقوش سے محاسن، ماحول سے محاسن اور درد سے محاسن۔ مردی محاسن۔ جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ ضرورت سے زیادہ گرم کرہ چاہے۔ نرم ذرا کم رضی۔ ایک کینم۔ ذکی المحسن، روشنی اور شور سے ذکی المحسن۔ جب پڑھ رہا ہو تو صفحہ پر صاف نظر نہ آئے۔ اندھیرے میں اپنے سامنے چہرے دیکھتی ہے۔

ٹکسوامیرکا۔ بیرونی نقوش سے ذکی المحسن۔ روشنی، شور، خوشبوؤں، ہوا کے معمولی جھرنے اور اپنے ماحول سے ذکی المحسن۔ اپنی خوراک کے معاملے شدید ذکی المحسن۔ بہت قسم کی خوراکیں اسے پریشان کر دیں۔ حرکات کی شدید خواہش رکھے جو اس کو مستعد رکھیں۔ نڈرینج جلدی ناراض ہونے والا۔ گوشت سے نفرت اور اس سے زیادتی مرض ہو۔ اگر اس کے راستہ میں کوئی آجائے تو اسے دور بھینک دے۔ اگر کپڑے اتارتے وقت کپڑے کے کسی حصہ میں ٹہن پھنس تو وہ اسے توڑ دے یا بعض اوقات کپڑے ہی پھاڑ دے۔ نڈرینج کی کنٹرول ہونے والی حالت۔ اپنے طریقے سے لوگوں پر چڑھ کر ٹھونسنے چاہے۔ جب کسی چیز کی جزئیات یا کسی چیز کی تفصیلات بتائی جائیں تو ناراض ہو جائے اور دُور جانا چاہے۔ چیزوں کو توڑے اور بھاڑے۔ بُرا بھلا کہے۔ اپنے گھر ملا جائے اور گھر میں جھجک باتیں کرے۔ وہ لڑتا ہے۔ لعنت طاعت کرتا ہے۔ حمد کی وجہ سے توہین کرتا ہے اور اس کے کچھ حصہ کے بعد بلند آواز سے روتا ہے۔

آرمینیک ایلیم۔ سونگھے اور چھونے سے ذکی المحسن۔ کمرے کے ماحول سے شدید ذکی المحسن۔ انتہائی ذکی المحسن اور نازک مزاج چلے کمرے کی ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ کوکولس۔ سُن ہونا اور بازوؤں میں نالچ کا احساس بعض اوقات ایک بازو سُن بیٹھے کر سوجائے اور بعض اوقات دوسرا بازو سوجائے۔

سلیشیا۔ ہاتھ اور پاؤں کام کے دوران سوجائیں، شور سے ذکی المحسن۔ ایونما سلیسکٹ۔ اکیلے حصوں کا سُن ہونا اور درد والے حصوں کا سُن ہونا۔ گرمی کی لہریں سر کی طرف۔ گرمی کا سر میں اجتماع۔

بائیوسائینس۔ جلد کے ٹھہار کا ذکی المحسن ہونا جس کے نتیجے کے طور پر بعض نگاہوں کی خواہش کرے۔

اوپیم - شور سے ذکی الحس - یکھیاں دیوار پر چلتی سن کے اور ددر کے گھڑیاں کی آواز مٹے۔
 بیوفو - جلد کی کچھ کھریوں کا زیادہ حساس ہونا - دوسرے حصوں پر سن ہونے کا عمل۔
 پلمبسم - جلد کا انتہائی ذکی الحس ہونا - جس کے ہمراہ فالج اور طاق کا کم ہو جانا - وہ چھوٹا
 جانا برداشت نہیں کر سکتا جس سے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے - حادثہ تکلیف میں جلد ذکی الحس
 اور نرم تن تکلیف میں جلد کی جسی -

تھریڈون - اعصاب کا ذکی الحس ہونا - لٹن یا سلک پر کھڑچنا یا کاغذ کا کھر کھڑانا
 ناقابل برداشت - علامات آنکھیں بند کرنے پر بڑھیں -
 گریفائٹس - سردیوں میں سردی سے ذکی الحس اور گرمیوں میں گرمی سے ذکی الحس -

درد اعصاب

آر سینکیم ایلمیم - جب درد اعصاب طیر یا کی وجہ سے ہو - اور دورہ باقاعدہ وقوع سے
 ہو جن نمایاں علامات ہے - بایں ملتہ چشم اور بایں ٹانگ کا عرق السام یا لنگری کا درد
 کا عام طور پر اعصاب پر اثر ہوتا ہے -

میگنیشیا فاس - یہ دوائی دائیں طرف کو ترجیح دیتی ہے - یہ کسی بھی حصہ اعصاب
 کو متاثر کر سکتی ہے، آنکھ، کان، رحم اور ٹانگ، یہ ایک دورے کے خلاف دوائی ہے پٹول
 کے سکڑنے کے ساتھ شدید تکلیف - گرم پٹیسول سے دباؤ سے اور اندھیرے میں جانے
 سے انفاق ہو جاتا ہے -

اگریکس ایم - یہ چہرے کے عصبی درد اور دوسری قسم کے چہرے کے دردوں کے
 مفید ہے - دریں ہمیشہ - پھاڑنے والی - بھالانے جیسی تیز اور شدید ہوتی ہے - دریں
 معمولی سے چھوٹے سے بھی بڑھ جاتی ہے - ہمیشہ پٹول کی اینٹھن کے ہمراہ، جن پٹول میں
 اینٹھن ہودہ ٹھنڈے ہوں اور ان میں سختی ہو -

سیلاڈونا - جب اعصابی درد کے سہلے اچانک آئیں اور اچانک ختم ہو جائیں - شور،

روشنی اور حرٹ اور ہوا کے جھونکوں سے بھی زیادتی ہو۔ چہرے کے مصعب کے پانچویں جوڑ کا درد۔ داہنے اوپر کے اور نچلے جڑے کے حصے میں کاٹنے والا درد۔

کیمومیل۔ اس دوائی کی اس وقت فہرست پڑتی ہے جب مصعب، مارین، کرکین یا صوف کاٹی کا نقصان کرے جس سے وہ محروم ہو چکا ہے۔ دانت درد اور رحم کی ناقابل برداشت تکلیف کے لئے۔
آرجنٹم میٹ۔ جوڑوں اور اعصاب پھارنے والی دردیں اور کڑی ہڈی میں جو ٹھنڈی اور طوفانی موسم میں زیادہ ہوں یا برصی۔ حرکت کرنے پر آفاقہ، اگرچہ ٹھکا ہوا اور ناتواں لیکن تکلیف یا دردیں اتنی شدید ہوتی کہ مریض چلنے پر مجبور ہوتا ہے۔

آرجنٹم ٹائیریکم۔ پھارنے والی دردیں ٹانگوں کی بچے کی طرف سے کہ حرکت کرنے کی نالائحت میں۔ برہمی تکھے جیسا اور گولی لگے جیسا درد۔ ٹھنڈی ہوا۔ ٹھنڈا کمرہ۔ آئس کریم جیسی ٹھنڈی اشیاء پسند کرے۔ گہری زیادتی درد۔

سٹانم میٹ۔ اعصابی دردیں جو کہ اچانک شروع ہوں اور تدریجاً برصی اور تدریجاً کم ہوں۔ اگر درد دب جائیں تو یہ دق کی شکل میں ظاہر ہو۔ (یعنی درد کو بانے سے سلہ ہو جائے) یہ عورتوں کی دوائی ہے، جہاں شدید اعصابی درد بند ہوا اس کے بعد کثیر مقدار میں زردی بائل لیکوریا شروع ہو جائے۔ اس کو دق یا سل سے پہچانتے ہوئے۔

کالوسٹھس۔ پیٹ کے اعصاب کے اعصاب پر بہترین عمل کرتا ہے۔ دردیں کاٹنے والی مردہ والی۔ پیٹنے والی جن کو دبائے، دہرا ہونے سے اور چلنے سے آفاقہ ہو۔ درد اعصاب کے پھیل بکھانے سے، اٹلے چلے مشروبات خاص طور پر ٹھنڈے مشروبات سے۔ سر میں درد اعصاب آنکھوں میں ریڑھ کی ہڈی۔ انٹرویل میں حصہ کے بعد یا بری طوبتوں کے بعد۔ بعض کیوں میں سن ہو جانا۔ سوئیاں چھینا اور جھنڈنا ہٹ کی طرح، متاثرہ حصے میں جیسے چیزئیاں ریٹک ہوں۔ لنگڑی کا درد بائیں جانب ۲۰۰ طاقت استعمال کیجئے۔

چائنا آف۔ اعصابی درد بار بار کے اخراج خون سے۔ زیادہ عرصہ تک درد دھڑلنے سے یا متغیر دار بخار کے بار بار کے حملوں سے یہ دوائی محفوظ رکھتی ہے جب درد آنکھوں کے

گھروں کے نیچے جڑے کے اوپر پانچویں اعصاب میں ہو۔ یہ معمولی سا چھوٹے یا ہوا کے جھڑکے سے زیادہ ہوتا ہے۔ دورہ دار ہونا اس کی نمایاں علامات ہیں۔

تھو جا۔ شدید سونیاں لگنے کی طرح کی درد اعصاب کے ساتھ اور دانتوں میں منہ میں ٹھنڈک کے احساس کے ساتھ اور اوپر کے ہونٹ میں تشنج۔ بائیں طرف کا چہرہ کا درد اعضاء۔ زرتھوفاٹیل۔ گولی لگنے کی طرح کی اعصابی درد جیسے کربجلی سے تمام بازوؤں میں جسم کا درد۔

مزہیم۔ پلوں کے درد کے لئے بہترین دوائی ہے جس کے بعد ہونٹوں اور آنکھوں کے گھروں پر درد مندوار ہو جب وجہ دانت کا نامور ہو۔ درد والے حصے کا سن ہو جانا۔ زخار کے پھوں کی اینٹھن میں بھی نمایاں ہوتی ہے۔ جزارت اور چھوٹے سے زیادتی ہو۔

فاسفورس۔ چہرے کا درد اعصاب پر جب دماغ کی بہت زیادہ محنت یا جذبات کی بڑھ چکی دردیں جلد زار بھارتے والی اور کھینچنے والی۔ منہ کے پھوں کی ہر حرکت درد کو بڑھاتی ہے چکرا اور ہر قسم کے شور درد لائیں۔

برائی اونیٹا۔ یہ دوائی دائیں بازو کی اندرونی ہڈی کے اعصاب درد کے لئے خاص ہے۔ زیادہ زور لگانے اور حرکت سے تسکین برہتی ہیں۔ کہنی سے اوپر بازو میں مسلسل درد اعصابی درد غیر معمولی سردی کے ساتھ، غصہ کے بعد یا پیٹ میں بُری رطوبات۔

نیرٹرمیور۔ جب دورہ آئے اور ان کے دوران لوٹے۔ ضدی قسم کی قبض اور جلد کی خشکی۔ ساحل سمندر اور زیادہ نمک کھانے سے زیادتی ہو۔

کیپسکیم
پلسٹیل
وریکیم

آرنیکا
سٹیفیگر۔ پلانٹیکو۔ دانت کے درد کے لئے
دانت کے درد کے لئے

سکونٹیلیر یا۔ اعصابی سردرد کیلئے مفید ہے۔

کالی سائٹینٹم۔ کنپٹیوں کے حصہ پلوں کا دائرہ اور جڑے میں شدید درد۔ اوپر والے
بائیں جڑے کی درد کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ دماغ میں گومر کی وجہ سے شدید منہ زور درد سر
ایک ہزار طاقت یا اونچی طاقت میں دیجئے۔

کالی آیوڈ۔ بائیں آنکھ پر اعصابی درد سر، دھکن کے ساتھ۔

میگنیشیا کارب۔ حاملہ عورتوں میں متلی کے ساتھ دانت کا درد۔

سپائنجیلیا۔ بائیں طرف کا اعصابی درد بائیں آنکھ۔ بائیں کا گرھا۔ بائیں بازو کے

اعصاب میں دردیں گولی کی طرح۔ جلندار بھاڑنے والی جیسے کہ چہرہ اور گردن میں گرم سوئیاں گزر
رہی ہوں۔ گردن اور کندھے کی تکلیف گرمی سے کم ہوتی ہیں آنکھوں کی تکلیف سردی سے اچھی ہوتی ہیں
رٹشاکس۔ اعصابی درد کھل ہوا میں آنے کی وجہ سے یا پسینے کے بعد پانی پیگنے سے
حرکت شروع کرنے پر زیادہ تکلیف اور اس کے بعد حرکت کرنے پر درد میں افاق۔

نکسوامیکا۔ شراب پینے یا شراب کے غلط استعمال کی وجہ سے اعصابی درد۔ دریں شدید۔
ادیت نچش۔ کاٹنے والی۔ پکڑنے والی اور کھرچنے والی۔ بد ہضمی قے۔ ڈکار۔ اسہال اور قرض
ٹھنڈے پانی سے اور صبح کے وقت درد میں زیادتی۔ چہرے کا درد۔ گھنٹھادی۔ آدمی میں ٹھنڈ
کے احساس کے برابر۔

کالی بائی۔ درد اعصاب ہر روز ایک مقررہ وقت پر۔

پلمبم۔ مختلف اعصاب کا دم شدید کھینچنے والے اور انٹھن والے درد جو پیٹ سے
خروج ہوں اور جسم کے ہر حصے کو جائیں۔ پاخانہ سخت بھیڑکی میٹنگینوں جیسی گولیاں۔

سینٹگونیز یا سی۔ دائیں طرف کا اعصابی درد سپائنجیلیا جیسی علامت کے ساتھ۔
روٹا۔ ڈنگ لگنے والا۔ پھاڑنے والا اور جلندار دردیں۔ ٹھنڈ اور لیٹنے سے زیادتی ہو۔

عام طور پر مزین دردیں اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔

لائکوپوڈیم۔ لنگری کا درد ۲۰ طاقت یا سی ایم ٹوٹنسی میں دیجئے۔

نیفالیئم۔ لنگر کی کے درد کیلئے خصوصی دوائی، آرام کرنے اور پہلی حرکت پر شدید درد دیں ہوں یا نہیں۔
 نیرٹرم سیلف۔ سائیکوٹک اعصابی درد۔ چوتڑے جوڑ میں چلتے وقت درد اچانک ہو۔
 ویلیس راینڈ۔ اعصابی درد جو کہ آرام کرنے پر بڑھے۔

سٹراٹھیم کارب۔ جیرھار کے صدوں کے لئے بہترین دوائی ہے۔
 ہوراراز پلینس۔ ایک عجیب و غریب علامت کہ جتنی زیادہ تکلیف ہو مریض ہنستا ہے اس
 ہنسنے کو اعصابی درد کہا جاسکتا ہے۔

کمی کی فیوگا۔ شدید درد جو غروب ہونے پر رگ جائے لیکن جو نئی سوزج اُبھرے دوبارہ
 شروع ہو جائے۔ ایک خوراک ۲۰۰ طاقت میں دیجئے۔ مریض افسردہ لیکن باتونی ہوتا ہے شراب سے
 زیادتی مرض ہو۔

سُن ہو جانا۔

(دیکھیے اعصاب کا سُن ہو جانا۔ ریڑھ کی ہڈی کی تکالیف۔ حرکت کی نااہلی۔ آدھے دھڑ کا ناہنج فٹالچ)
 جیلیسیم۔ جھٹکے۔ تشنج۔ بجلی کی دردیں۔ سر درد۔ ڈکھن۔ لنگر اپن۔ ایک کے دو دکھائی
 دیں۔ آنکھ کے بالائی پھپر کا فالج اور فالج کی دوسری اقسام، ہاتھ پاؤں کا تھک جانا۔ گردن کا سخت
 ہونا۔ ذہن سست اور ٹھپوں کا نظام ڈھیلہ۔ دماغ اور جسم کا جزوی اور مرگ یا فالج۔
 اولینڈر۔ بغیر درد کے فالج۔

امبرگر لیسیا۔ تمام میں جس کی کمی۔ کمزور دوران خون۔ غیر متوازن۔

الیومنا۔ جب اعصاب کا پیغام بےجا نوالے نظام میں اتنی کمزوری آجائے کہ ہاتھوں اور پاؤں
 جسم میں پہلی دفعہ سوئی چھبونے سے محسوس ہو۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد دیکھے کہ سرخ لوما ریڑھ
 کے پچھلے پہر میں داخل کیا جا رہا ہے۔ بجلی کی طرح کی دردیں کمر اور پیٹ میں سے باہر کو بائیں ٹانگوں
 کا اتنا بھاری پن کہ انہیں مشکل سے ہلایا جاسکے۔ چل نہ سکے صرف دن کے وقت چل سکے اس وقت
 بھی احتیاط سے قدم اٹھائے۔ مہر کی جلد پر دباؤ دیکھے کہ انڈے کی سفیدی منہ پر خشک ہوئی ہوئی۔
 ہو۔ شدید جنسی خواہشات۔ بلا ارادہ منی کا اخراج۔ قبضہ۔ ایڑیاں یا سن ہوں یا شدید جلن ہو
 کریں۔ بچوں کا ٹانگوں کا فالج۔

پلمبم۔ فالج یا نیم فالج۔ قبض۔ دماغی اتری کے بعد فالج۔ کانپنا۔ ٹھوں میں دور سے گولی لگنے۔ برہمی لگنے سے درد جلد کا انتہائی حس ہونا چھڑنا بھی برداشت نہ کر کے کیونکہ یہ اسے تکلیف دیتا ہے۔ بازو کے ٹھوں کے فالج کی وجہ سے کلاسیاں بچے گر پڑیں۔ یہ پاؤں کے فالج کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے۔

سلفر۔ جب الکوناٹ زیادہ مقدار میں کھانے سے فالج ہو جائے تو یہ کام آتی ہے۔ حیض کے دبا جانے سے خاص ہیجان۔

آزینیکا انٹ۔ پیدائش کے وقت کا فالج۔ چھوٹے بچوں میں پیدائش کے وقت زخم ہونے کی وجہ سے جس کے نتیجے کے طور پر فالج ہو سکتا ہے۔ یہ دماغ یا ریڑھ کی ہڈی کے پیدائش میں استعمال ہونے والی جیٹی کے زیادہ دبانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔

رشاکس۔ متاثرہ حصوں کا سن ہو جانا۔ جھگک جانے یا زیادہ کام کرنے کے بعد یا ٹھنڈی زمین پر لیٹنے سے۔ وضع حمل یا بچہ جنم کے بعد۔ جنسی بے اعتدالیوں۔ تب لڑھ یا تب محرقہ۔ بازو کے جزوی فالج یا ادھر رگ۔ آنکھوں کے چھپرے کا فالج یا گر ٹپنا۔ ٹھنڈا پن۔ سن ہونا۔ جھنڈا ہٹ۔ اعصاب کے زخم کے بعد ڈکی وجہ سے فالج۔ آزینیکا کے ناکام ہو جانے کے بعد استعمال کیا جاسکتی ہے۔ فاسفورس۔ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ جلیں کے ہمراہ جیوشیوں کے رنگنے کی غصہ کی علامات کے ہمراہ۔ جنسی برائینگی جو پہلے پہل ہو کر ٹول نہ کی جاسکے لیکن بعد میں نامردی میں مبتلا ہو جائے۔ دماغ میں چربی کی تسلی جو کام کرنے کے۔ مطالعہ کرنے کے بعد یا توجہ مرکوز کرنے پر تھکائی کالی ہائیڈ۔ آنکھ کی ہسٹری والے متاثرہ اعصاب اور غددوں والے اشخاص میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دماغ کا گوٹھ اور اکثر جگر اور دوسرے غدد دیا غدد دی اعضا۔ بجلی کی طرح کی تکلیف اکثر سر میں زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت ٹانگوں کے یہ دردیں گرمی اور متاثرہ جگہ سے بل لیٹنے سے زیادہ ہوتے ہیں۔

پیکرک الیڈ۔ جب دماغی اور جنسی بے اعتدالیوں یا خون کی کمی کے سبب ہو۔ جنسی خواہشات کا وقت گزر چکا ہو۔ شدید کمزوری لاحق ہو۔ درد کو دماغی کام بڑھاتا ہے۔ کمزور حکما ہوا۔

اور ٹانگوں میں بھاری پن کا احساس جس کی وجہ سے چلنا دو بھر ہو جائے۔ بے حسی نمایاں ہو۔
 پیکریٹ آف آرٹرن۔ پکرک ایسڈ کے متبادل دیا جاسکتی ہے جب بے حسی کے ہمراہ
 شدید قلتِ خون بھی ہو۔ او

اوپیم۔ گلے کا کام نہ کرنا یا اس کا فالج جس کے نتیجے کے طور پر شرباتِ غلط راستے پر چلے
 جائیں اور ناک سے باہر چلے آئیں۔

کیورارے۔ عصبِ حرکت کا فالج۔ غیر شعوری عمل یا اضطرابی عمل کم ہو جائے یا ختم
 ہو جائے۔ عام فالج۔ اعصابی کمزوری۔ سرگرائی۔ تنگی تنفس۔ چکر۔ پلکوں کا گزرا۔ مٹھوں کا فالج
 یا اعصاب کو متاثر کر کے بغیر۔

ہائپرکیم۔ اعصابی حد سے کا بڑا اثر۔ سرکی وجہ سے دور سے جبکہ زخم ہوں۔ یا شخ۔ یہ
 جسمی کے ذریعے پیدا شدہ بچے کے چہرہ کے فالج کو بخوبی درست کر دے گی جب تک کام ہو جائے
 لا تھیرس سٹیموا۔ بازوؤں اور ٹانگوں کا فالج خاص طور پر ٹانگوں کا فالج۔ تشنجی فالج
 ٹانگیں کمزور۔ ٹانگیں نیلی۔ سوچی ہوئی جب بچے کو لٹکی ہوئی ہوں۔ گھٹنوں اور ٹخنوں کا لنگر این۔
 بچے فرش نہ چھوڑے یا بچے فرش سے اوپر نہ اٹھیں اور ایڑیاں فرش یا زمین پر نہ لگیں۔ مریض
 آگے کو جھک کر بیٹھتا ہے۔ مشکل سے سیدھا ہوتا ہے۔ عموماً کرے کہ ٹانگیں ذنی اور فرش نہ ہوا اس لئے
 زمین کو دیکھنا پڑے تاکہ پلوں کی راستائی کر سکے۔ چھونے پر اور غدار موسم میں زیادتی۔

میسلینیم۔ درمیانی مغل انگیز دوائی ہے جب بہترین منتخب شدہ ادویات کا کام ہو جائیں تو ۲۰
 طاقت کی ایک غورک خالی پیٹ دیجئے۔

کاسٹیکم۔ اکیلے حصوں کا فالج۔ آواز کے اعضاء حلقوم اور گلا۔ زبان۔ پلکوں۔ چہرہ۔ بازو۔
 ٹانگوں اور رشتہ۔ عام طور پر دائیں جانب ٹھنڈی ہوا لگنے سے جھونکے سے۔ تپ محرق کے بعد۔
 ٹائیس یا خاق کے بعد۔ سیسے کے زہر کے بعد فالج ٹائپ۔ ترتیب دینے والوں کا ٹائپ کے لفظ
 ہونٹوں میں پکڑنے کی وجہ سے زبان کا فالج۔ ایک ایم طاقت میں دیجئے یا اس سے اوپر کی طاقت
 دیجئے جب کوئی افادہ نہ ہو یا افادہ ٹھہر جائے۔

اگر خیمہ ٹاٹر کریم۔ چیلیم والی علامات رکھتی ہے۔ یہ وہاں پتھیلی دوا کے طور پر دی جاتی ہے
جہاں چیلیم کام کرنے سے رک جاتی ہے۔ پاگلوں کا فانیج۔ بیوقوف۔ احمق۔ آسانی سے بے انگیزتہ
ہونے والے۔ ایک لمحے خوش خرم دوسرے لمحے پاگل، بنلہ یا خفا یا فرط ہوئے۔ کمزور دماغ
ایک فقرہ بھی نہ لکھ سکیں۔ پٹھوں کی اینٹھن کی وجہ سے تیز چرخ۔ مرگی۔

اکیٹا سو میسا۔ رحم کی خرابیوں کی وجہ سے ریڑھ کی تکالیف کی صورت میں اضطرابی۔
اعمال کے لئے خاص طور پر مفرد ہے، جہاں کہیں کمر کا حصہ خاص طور پر متاثر ہو۔
اگر کیس مِس۔ ریڑھ کی ہڈی میں جھنجھناہٹ اور جلن جیسے کہ انتہائی سردی یا
برف کا ٹ رہی ہو جسم کے مختلف حصوں میں پٹھوں کا تشنج یا اینٹھن خاص طور پر پٹھوں کا
احساس جیسے کہ برف کی سوئیاں جلد میں پھوٹی جا رہی ہوں۔

نرنگم میٹ۔ ریڑھ کی ہڈی کا ایجان۔ کمر میں ہر وقت درد جو چلنے سے اچھا ہو یا
جس میں چلنے سے آفاقہ ہو۔ ریڑھ کے ساتھ ساتھ جلن۔
فائیسوٹنگما۔ جب ریڑھ کی ہڈی کی ہر عصب پُر ایجان ہو، جلد زار ہو اور اینٹھن کا
احساس کرتا ہو۔ ہاتھوں اور پاؤں کا سن ہو جانا۔ اینٹھن دار در دیں۔ کمر کے پٹھے سخت۔ بائیں
طرف کا فانیج۔ ہاتھ پاؤں میں گولی لگنے جیسا درد۔

کو کولس اند۔ پھوٹی کمر میں فانیج در دیں۔ پیٹ میں جھکیوں کا احساس۔ ایڑیوں کی سختی۔
تھو جیا۔ چھپک ٹا سیک لگنے سے بازوؤں کا فانیج اور دھن۔ ایک ایم طاقت کی دوائی
صبح و شام ایک خوراک دیجئے۔

سفلینیم۔ ٹرکھڑائی چال کے لئے عمل انگیزنے کے طور پر جو عموماً آتش کی وجوہات سے ہو۔
آرم میٹ۔ جزوی ادھر لگ یا فانیج جہیں خود کشی کا رجحان ہو، اپنے سے، ہر کسی سے
سرچنے سے نفرت کرے۔ خواہشات اور نفرتیں حد درجہ کی یا انتہائی درجہ کی شدید۔

آرمینک ایلیم ریڑھ کی ہڈی کا دق۔ جلد زار اور گولی لگنے جیسا درد جسم کے ہر حصہ میں
گرم سُرخی سوئیوں کے پھٹنے جیسی درد۔ گرم پٹھوں سے آفاقہ ہو۔ یا گرم چیزیں لگانے سے آفاقہ۔

کو نیم۔ فایح پاؤں سے شروع ہو کر اوپر کو جاتا ہے۔ جسے پھوٹے پر ٹھنڈے عموماً بلغم کو باہر نکال سکے اور نکل نہ سکے۔

کو کولس۔ ریڑھ کا نرم ہوجانا۔ چلنے میں دقت۔ ریڑھ کے کمر کے حصہ کی تکالیف بھٹی لمر کی کمزوری۔ جیسے فایح ہو گیا ہو۔ رانیں درد کریں۔ پاؤں کی تلیاں سوئی ہوئی عکس ہوں۔ ہاتھ اور بازو سوجائیں۔ بازوؤں کو سیدھا کرنا اور دیاں تھوڑی دیر کے لئے ٹھہرا ہونے تکلیف ہی سے کیا جاسکتا ہے۔ پلوں کا فایح۔ گلے کا فایح۔ جسمیں نکلا نہ جاسکے۔ بیٹھنے پر تلیاں جھکیں۔ ڈورسیر۔ ریڑھ کا ناسور جس کے بعد انگلیوں اور گھٹنوں کا ٹی بی ہو جائے ہر بندہ روز کے بعد ایک خوراک دیجئے۔

الیومنا میلکٹا۔ ٹانگوں کا بلا تکلیف فایح متاثرہ حصوں میں درد بھی۔ بازوؤں میں تاد۔ تمام بازوؤں، ہاتھوں اور پاؤں میں جھنجھساہٹ۔

زنگم فاس۔ حرکت نہ کر سکنے کے شروع شروع میں تیز بھالا لگنے جیسی درد۔ ہاتھ پاؤں کی شدید کمزوری۔ خاص طور پر ٹانگوں کی۔ ریڑھ کی ہڈی گرمی کر حساس۔ نیند کے دوران میں بے چینی۔ ہاتھوں اور پاؤں کا ہلانا۔

رعشہ۔

جلیسیم۔ اس دوائی کا بننا سب سے بڑھ کر علامت ہے۔ سر کے پھول کی کمزوری اور فایح خاص طور پر ہوتی ہے۔ لڑکھرائی چال۔ رعشہ کی چوٹی کی دوائی ہے یا دوا داشت کمزورہ دماغ مت اور پھولوں کا نظام ڈھیلا۔

آرجنٹم نائٹریٹ۔ یہ دوائی جلیسیم کی تکمیلی دوائی ہے۔ یادداشت کمزورہ۔ جلدی۔ سیخ یا ہوجائے اور ناراض ہو جائے۔ اچھا اور بڑا سہاں۔

اگر کیس مں۔ کانپنا۔ خارش اور ملنا یا پھلنے لگنا۔ پھول کی سختی۔ جلد کی متاثرہ جگہ خارش اور ریڑھ کی ہڈی بہت ہی حساس۔ لمس کو برداشت نہ کر سکے یا چھو یا جانا برداشت نہ کر سکے۔ البسنہ خیم۔ زبان کا رعشہ اور دل کا رعشہ۔

کو کولس۔ کھاتے وقت یا اور پھلتے وقت سر کا پٹا ہے۔ گھٹنے کمزوری کی وجہ سے نیچے
 ڈوب جائیں۔ چلتے وقت لڑکھڑائے، ایک طرف کو گرنے کا رجحان۔ جب چلے تو گھٹنے آواز پیدا کریں۔
 میگنیشیا فاس۔ کا پتے۔ ہاتھ کا ہٹنا۔ ایک ہزار کی طاقت ہر منہ پر ایک خوراک کافی ہے۔
 لتھائرئس۔ بازوؤں میں ریشہ کے ہمراہ ٹانگوں میں نالی کی کمزوری محسوس کرے کہ ہاتھ پاؤں
 سخت اور سکڑے ہوئے۔ ہاتھ پاؤں بھاری محسوس ہوں۔ محسوس کرے کہ فرش غیر ہموار ہے اور اسے
 آنکھوں کو زمین پر رکھنا پڑے تاکہ پاؤں کی رہنمائی کر سکیں۔

رٹاکس۔ جب ریشہ چلنے پر تکلیف سے شروع ہو جس کے چلنے پر آفاقہ ہو۔ متاثرہ
 جگہوں پر سختی ہو۔

فائیسوسٹیکما۔ ریشوں اور پٹھوں کا نمایاں ریشہ اور تشنج۔ حرکت سے زیادہ ہو یا ٹھنڈا پانی
 لگانے سے زیادہ ہو۔ دل کی دھڑکن اور پھر مکمل تمام جسم میں محسوس ہو۔

امبر اگر لیا۔ سن ہو جانے کے ساتھ ریشہ تھوڑی سی حرکت سے بھی ہاتھ پاؤں سو
 جائیں۔ ہاتھ پاؤں کی ٹھنڈک۔ ٹھنڈک اور سختی۔ انگلیوں کے ناخن ٹوٹنے والے اور پیرسوں۔
 ہیلو ڈرما۔ ہاتھ پاؤں کے اعصاب کا کا پٹنا۔ تھکا ماندہ محسوس کرے، بہت کمزور اور
 بے چین۔ غش کھائے، سُن ہونے کا احساس۔

زنگم۔ تمام جسم کا شدت سے کا پٹنا۔ (اینٹھن) ذہنی براہ کھنگلی کے ساتھ بچوں کی اینٹھن
 ریشہ۔ ہاتھ کا فالج، پاؤں کا فالج۔ لکھتے وقت ہاتھوں کا کا پٹنا۔

لرزہ۔ پٹھوں کی بڑھتی ہوئی کمزوری۔ ریشوں کی سختی (دیکھیے فالج)

میدورنیم۔ عام طور پر سوزاک سے یا سوزاک کے دبنے سے، ایک لم طاقت میں دیجئے۔
 پلمبم۔ ریشوں کی سختی کے لئے بہترین دوائی ہے۔ پٹھوں کی ملی ملی سختی۔ ایک طاقت ہر سہفتہ
 ایک خوراک دیجئے۔

ٹیزنٹولا ہسپا۔ پٹھوں کی ملی ملی سختی کا پٹنے کے ہمراہ۔ اینٹھن اور جھکے۔ ٹانگوں کا سُن ہونا۔

اگر انک لمیٹ۔ داغ اور ریٹھ کی ہڈی کی ملی جلی سختی۔ بھال لگنے جیسی گولی لگنے جیسی اور
جھٹکوں والی۔ تکالیف مختلف حصوں میں۔ سوزش ریڑھ۔ ٹھنوں کی کمزوری۔

دودھی۔ ذکی الحسی۔ دیکھے انٹھن۔ تشنج۔

کزاز۔ بدن کا اکثر کرکان کی طرح ہو جانا۔

ہائیدروسائینک الیڈ۔ پٹھوں کی مستقل اکڑن۔ خاص طور پر چہرے کے پٹھے جڑے
اور ریٹھ کے پٹھے۔ نظام تنفس درہم برہم، منہ پر نیلے داغ اور منہ سے بھاگ نکلنے کے ساتھ بازوؤں
کی سختی اور پیچھے کی طرف جھکا ہوا۔

لیکسس۔ تشنج کی وجہ سے منہ بند ہو جانا۔ (دند سکرٹی) اور خجہ کا تشنج۔ تنگی تنفس۔
کی وجہ سے نیلا پن اور مرضی دورے میں ہی سو جائے۔

درہم برہم الیڈم۔ تشنج کی وجہ سے منہ بند ہو جانا۔ سانس کی نالی کے منہ کے تشنج کے ہمراہ۔
چھاتی میں دباؤ جو تقریباً تقریباً سانس بند کرنے کے قریب ہو یا گھٹن محسوس کرے۔ ہاتھ اور
پاؤں اندر کی طرف کھینچ جائیں اور تپلیاں سکڑ جائیں۔ یہاں تشنج کم ہوتے ہیں۔ شدید کمزور
کرنے کی نسبت جب کہ سر کی نالی میں تشنج اول ہو۔

بیلادونا۔ چھوٹے بچوں میں کزاز۔ اینٹھن۔ اچانک ڈر جانا یا چونکنا یا تپلیاں پھیلی
ہوئیں۔ گھورنے والی آنکھیں۔ شدید تشنج لگے پٹھوں کی سختی۔ تشنج میں پیچھے کی طرف کھینچ جائیں۔
سٹر امونیم۔ کزاز تشنج چھوٹے سے اور زرخشی سے تکلیف بڑھے۔ داغ خون کی وجہ سے
درہم برہم ہو۔

کیمفر۔ یہ کزاز تشنج میں مفید ہے جبکہ منہ کے پٹھے کھینچ جانے سے دانت نظر
آئیں۔ شدید ٹھنڈک۔

کیوریم میٹ۔ تشنجی دورے سے پہلے کے ہمراہ جو کہ چوڑے یا تیزاب کے زخموں کی وجہ سے
بازوؤں میں پھینکے سے ہوں۔ چہرہ زرد۔ جڑے سکڑے ہوئے۔ منہ میں بھاگ۔ تشنج کی وجہ سے
سے پیچھے کی طرف جھک جائیں۔

سٹرکٹیم۔ تشنج جس میں چھاتی میں گھٹن اور دباؤ جب نکس وایکا ناکام ہو جائے تو یہ دوائی ہی استعمال کرائی جائے۔

انگچو اور ابرا۔ کزاز جو چوڑی یا اسی طرح کی دھولت سے ہو۔ جب دوسرے دار تشنج یا پٹھوں کے جھسکوں۔ سکتے جسم کے پیچھے کی طرف ٹھکے ہونے کے ساتھ تشنج یا انٹنشن۔ جھٹکے کر کے ساتھ ساتھ بھی کے جھسکوں کی طرح۔

فائیسوٹگما۔ کزاز تشنج۔ چلنے میں دقت یا فقدان حرکت۔ فالنج زدہ حصوں کا سن ہو جانا۔ انٹنشن دار درد بازوؤں میں۔ ریشوں کا عرشہ یا لرزہ۔

پسی فلورا انکم۔ کزاز کیلئے خاص دوائی ہے۔ اس کی مدد کچھ کے دس قطرے فی خوراک دینے چاہئیں۔ گردن اور کندھوں کے پٹھوں کی انتہائی سختی نکلنے میں تکلیف کے براہ نمایاں علامت غیر ارادی طور پر مس کرنا اور جھنجھنا۔

سکواوائرو سا۔ اچانک سخت جھسکوں کے براہ شدید توڑ مروڑ اس کے بعد شدید کمزوری، پٹھوں کی اکثر جو پھوٹنے سے دوبارہ جاری ہو جائے۔ سانس لینے کے لئے شدید دباؤ منہ کا بند ہو جانا۔ چہرہ گہرا سرخ منہ پر جھاگ۔ تشنج جس میں پیچھے کی طرف مڑ کر جھکے۔ بیہوشی۔ پیپ نکلنے والے زخموں میں یا جب بہتی ہوئی پیپ رک جائے۔

آرسنیک الیم۔ کزاز۔ لٹک کر خودکشی کرنے کے براہ خطرناک تشنج ہاتھ پاؤں میں توڑ مروڑ کے براہ نمایاں بخار۔ زہریلے مادوں کی وجہ سے۔

ایکونائٹ این۔ ڈر۔ پریشانی۔ پٹھوں پر دباؤ۔ جھنجھٹا ہٹ اور سس ہو جانا۔ ہائپرکیم۔ زخموں میں شدید دردیں۔ یہ نوزائیدہ بچوں میں حفظ ماتقدم کے طور پر دی جاتی ہے جن کی نام غیر تندرست ہو۔

سلیشیا۔ پیپدار زخموں میں یا جب پیپ کا اخراج بند ہو چکا ہو۔ نکسوا میکا۔ کزاز دار تشنج جس میں مریض پیچھے کی طرف مڑ کر جھکے۔ آنکھوں کی بد وضعی۔ چہرہ کی بد وضعی۔ تنگی تنفس کے براہ تھوڑے سے پھوٹنے سے روشنی سے، شور سے دور شرج ہو جائے اس کے متعلق خاص طور پر سوچنا چاہیے جب ہوش ہوا اس قائم ہوں۔ (دیکھئے عرشہ کا نینا)

دماغی رسولیاں۔

ٹیوبہر کو لینیم۔ علاج شروع کرتے وقت ۲۰ طاقت کی ایک خوراک دینا چاہئے۔ یہ مرض کو تباہ کرنے کی اور سرد درد دماغی رسولی میں جو کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ ٹھیک کر دے گی۔

کلکیر یا کارب۔ سرگھمانے پر سرد درد اور جکڑ۔ بھاری پن اور درد والا دباؤ جو کہ ناک تک پہنچا جائے۔ پریشانی جیسے کہ سر بہت بھرا ہوا ہے۔ کھوٹری میں سوئیاں چمچے جیسی درد۔ ٹھنڈے اور نندار موسم میں زیادتی۔ سر میں اور سر کے اوپر شدید ٹھنڈک۔

کلکیر یا فلورس { جب کلکیر یا کارب ناکام ہو جائے
کلکیر یا فاس { تویہ دوائی دی جانی چاہئے۔

مرک آئیوڈائیڈ۔ سر کے یا کھوٹری میں یہ دماغ کی ہڈیوں کی رسولی کو تحلیل کرتی ہے اور تندرست کرتی ہے۔

کالی آئیوڈائیڈ۔ سر کے طرفین میں بجلی کی طرح کی دردیں۔ آنکھوں اور ناک پر سرٹنے کی گرمی سے زیادتی۔ آتشکی تاریخ۔

ماپیریکم۔ آہستہ آہستہ بڑھنے والی رسولیاں جو چوٹ بڑھنے میں سے تیز ہو جائیں۔ تھوہجا۔ دماغ کی رسولیاں، شدید سرد درد اور آدھے سر کے درد کے ہمراہ۔ مریض جذباتی ہوتا ہے، حس۔ چڑچڑا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے میں لطف اندوز ہو۔ کھٹی اور تلکین اشیاء پسند کرے۔ پیٹ میں گیس گھونسنے کے ہمراہ قبض۔ ماتھے اور بازوؤں پر پسینہ۔

مرگی۔ بیہوشی۔ (ہیٹر یا کھینے)

لیکس۔ دماغ میں خون بہنے کی وجہ سے بے چین اور پریشان۔ ایسلی بورکس۔ مکمل بیہوشی۔ ہونٹوں اور کپڑوں کو کاٹتا ہے۔ بالکل باندھ کر دیکھتا ہے۔ بلا ارادہ آہیں بھرے۔

اویم - مکمل بے ہوشی - قبض - خراٹے دار تنفس -
 ہائیڈرو سائیک الیڈ - ہر چیز کے ڈر کے ساتھ بیہوشی -
 فاسفورس - جب ندیان کے ساتھ اول بدل کر -
 آفریکا مانٹ - بیہوشی مگر سوالات کا صحیح جواب دے - جب اس سے بولا جائے زخم
 ہونے کے بعد بے ہوشی -
 سکواڈاٹرسا - تشنج کے دوران بیہوشی -
 سنا - کھانسی کے دورے سے پہلے بیہوشی -
 گلوٹائمن - سن ٹروک، سورج کی گرمی لگنے سے سردی کے دوران بیہوشی -
 نکس ماسکاٹا - بیہوشی بائیں ٹانگ نہ ہلا سکنے کے ساتھ -
 ایتھوڑا -

کینا بس امریکا - ہر چند منٹوں کے بعد اپنے آپ کو گم پانا یا ہوش و حواس کھو دینا -
 بیلاڈونا - بیہوشی کے ہمراہ تشنج جیسے مریض پیچھے کی طرف مڑ کر جھکے -
 ہائیو سائیکس - بیہوشی - ندیان سے جاگ جلتے جب اس سے بولا جائے -
 کاسٹیکم - بیہوشی کا حملہ نیٹھے ہونے کے دوران میں آملت خون کیوجہ سے
خون کی نالیوں کا پھیلنا -

فریم - دل کی نسلوں کا تیز اور اچھلندہ چہرہ میں زیادہ خون کے بہاؤ فیض تیز اور کمزور لیکن تباہ
 قلت خون تنگی تنفس اور سانس پھوٹا ہونا - چہرہ پر سُرخ - سرخ چمکدار -
 گلوٹائمن - چھاتی میں دل کی دھڑکن ہی نمایاں نہیں بلکہ جسم کے ہر حصہ میں دھڑکن کا احساس
 چہرہ سُرخ، لیکن آنا چمکدار نہیں جتنا کہ فریم فاس میں ہوتا ہے -
 بیلاڈونا - نظام دوران خون پر تیزی سے اور انتہائی شدت سے عمل کرتی ہے - چہرہ
 سُرخ - لیکن دار خون کی نالیاں - ایک حالت سے دوسری میں جلدی جلدی تبدیلی -

خون حیض بہت زیادہ بہت جلدی اور بہت گندی ہو والا۔

چکر۔

چینم سلف - کان کی نس کی خرابی کی وجہ سے ماتھے میں درد اور چکر، کانوں کا بھنا اور

گرج بہرہ پن کے ہمراہ۔

کوکولس - چکروں کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ میٹھے اور سواری کرنے سے زیادہ چکر۔

تقہ بھی ہو سکتی ہے۔

چینو پوڈیم - سمعی نالی کے نش ہو جانے کی وجہ سے اچانک چکر نیم بہرہ پن جو کہ ادنیٰ

آواز میں بہتر ہو نسبت نچی آواز کے لیکن انسانی آواز کے لئے زیادہ۔ کانوں میں گھنٹیاں بھین

گرینفائٹس - صبح کے چلنے پر چکر۔ شام کو چلنے پر چکر۔ اوپر کی طرف دیکھنے پر اٹھنے

پر۔ ٹیڑھا کھڑے ہونے پر۔ لازمی لیٹنا پڑے۔ آگے کی طرف بھٹکنے کا رجحان۔

نیرٹم سلف - چکروں کے ہمراہ کانوں میں گھنٹیاں بھینے لگیں۔

میگنیشیا کارب - جب نیرٹم سلف ناکام ہو جائے۔ یہ دوائی دی جانی چاہیے۔

سیلا ڈونا - پرغون مریض میں کیرڈنڈ شریانوں میں تکیں کے ساتھ۔ بستر میں مرنے یا سر ہلانے

سے اس کو سر کو اوپر اٹھانے کے۔ چیزیں گومتی معلوم ہوں۔ بستر میں پڑا رہے۔

گلونائٹن - کھوڑی میں درد کے ساتھ چکر۔ سر کو ہلانے کے ساتھ چکر۔ خمار کا احساس

جب ٹیڑھا کھڑا ہو۔

جیلسمیم - آنکھوں کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے چکر۔ ایک کے دو دکھائی دیں۔

خمار کا احساس جب ٹیڑھا ہو۔ لاکھڑانے کا رجحان۔

نیکسوامیکا - گیس کی جگہ سے چکر۔ ایک جو کھانا کھانے کے بعد آٹیس یا صبح کے وقت چکرات

کی عیاشی کی وجہ سے۔

فیرم فاس - قلت خون کی وجہ سے چکر۔ سر کو ہلانے کی وجہ سے چکر۔ خمار کا احساس جب

خون بننے کی وجہ سے چکر۔ چہرہ زرد۔ پٹھے ڈھیلے ڈھالے۔ حملہ کے دوران سرخ چمکدار خون دل

کی دھڑکن تیز۔

تھو جا۔ جب آنکھیں بند کی جائیں۔

لیکسس۔ جب بائیں طرف گرنے کا رجحان ہو چکر میں۔ آنکھیں بند کرنے پر چکر۔
دوبنے کا احساس۔

سکولونڈرا۔ جب اندھے پن کے ہمراہ چکر ہوں۔

تھیرڈیون۔ آنکھیں بند کرنے پر، حرکت سے بیڑھا کھڑے ہونے پر۔ جہاز پر سوار کی کرنے
سے۔ چکر جو حتمی کا باعث بنیں۔ اور اندھا پن کے قے اور آنکھوں میں درد۔

سیلینیم۔ بستر یا نشت پر سے اٹھنے پر۔ ادھر ادھر چلنے پر حتمی کے ہمراہ قے اور بیہوشی
کھانا کھانے کے بعد۔

نایٹرک الیڈ۔ صبح سویرے اٹھنے پر لازمی لینا پڑے۔

لیک ویک ڈیفٹ۔ جب سوئی میں دھاگر ڈالنے کے لئے اپنے ہاتھ اونچے اٹھائے
جب بستر میں مڑے یا سر ہانے پر سے سر ہلائے۔

کونیم۔ شراب کے پینے سے چکر جیسے کہ ایک دائرہ میں گھوم رہا ہو اگرچہ خود کھڑا ہو بیٹھا ہو
یا بستر میں ہو۔ بستر یا کرسی چکر کھاتی ہوئی محسوس دے۔ چکر زیادہ سراطاف کو گھمانے سے بستر میں
مورنے پر چکر۔ سراطاف میں ایک دائرے میں محسوس ہو کہ گھوم رہا ہے۔

کیڈیمیم سلف۔ جب کمرہ میں ہو، بستر اور گرد گھومے۔

امبرا گریسیا۔ چند یا پر وزن کے احساس کے ہمراہ۔ سونے پر زیادہ خاص طور پر صبح کے
وقت کھانا کھانے پر زیادہ۔ لیٹ جانا پڑے چکر اور کیوجہ اور معدہ میں کمزوری کے احساس کیوجہ
سے عمر کی زیادتی کی وجہ سے چکر۔

سکواڈاٹروما۔ چکر اٹھنے پر چیزیں آنکھوں کے سامنے گھومیں تب آنکھوں کے سامنے
اندھیرا آجائے۔ تب اسے دوبارہ لیٹ جانا پڑے۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں۔ رخسار زرد۔
قوت سماعت کمزور۔ تنفس تکلیف سے۔ جھوک کی کمی اور بستر گھلا کر دے یا بستر پر پشیماب کرے۔
کیلیڈیم۔ آنکھیں بند کرنے پر چکر۔ آنکھیں بند کر کے کھڑا یا چل نہ سکے۔

لیک گینیم چکر جن کے ساتھ ہوا میں اڑنے کا احساس ہو یا جب لمبی ہوئی ہو محسوس کرے
 کردہ بستر پر نہیں ہے۔

لارو میروکسس - کھلی ہوا میں چکر - اسے لازمی لیٹ جانا پڑے۔

البیومنا - پاؤں کی تالیوں کے سن ہونے کے ساتھ چکر - لڑکھڑانی چال - دوسرا نقصان
 یعنی بازوؤں سے بے ربطی۔

مارفینیم - سر کی پھول سی حرکت سے بھی چکر۔

اسارم اوپرپ - چکر جیسے کو شراب پی رکھیں ہو - ہوا میں متعلق محسوس ہونا۔

مرکویلیس پریس - سیڑھیاں اترنے سے چکر۔

کلکیر یا سلف - مہینے اٹھنے پر یا شام کے وقت چکر کھلی ہوا میں آفاقی متلی کے ہمراہ چکر۔

اگر کیس ایم - جیسے کے وقت چکروں میں تھوڑے تھوڑے وقفوں سے چکر - زیادہ دھوپ سے

چکروں میں تیزی - چکروں کا حملہ - لڑکھڑانی چال کے ساتھ کھلی ہوا میں۔

فاسفورس - اوپر کی طرف یا نیچے دیکھنے پر چکر کھلی ہوا میں، کھانا کھانے کے بعد شام کے وقت۔

سینو تھیس - خطرناک چکر دائیں طرف مڑنے پر، بائیں طرف لینے سے چکر نہ ہوں۔

ٹیلیالی - سر چکرائے، متواتر متلی اور تے کے ہمراہ - چکروں کے ہمراہ ٹانگیں ڈالوں ڈول۔

ایلینتھس - سر چکرائے متلی کے ہمراہ - ایکالی یا تے کی کوشش اور کچھ تے - لڑکھڑانی چال بجلی

کی ہر کی طرح سر سے شروع ہو کر ساتھ پاؤں تک آئے۔

از جنٹم نائیریکم - گلی میں اپنے مکانات دیکھ کر سر چکرائے۔ یہ اسے لڑکھڑا دے وہ اوپر

نیچے نہ دیکھ سکے - آنکھیں بند کرنے پر چکر۔

کلکیر یا کارب - اونچی جگہ پر چڑھے تو چکر - نیز صیوں پر چڑھنے سے - پہاڑی پر چڑھنے سے،

اچانک سر اٹھانے سے یا گھمانے سے جبکہ آرام کر رہا ہو - یا بیل رہا ہو پھلکی طرف یا اطراف کی طرف گھومنا

میوٹیک ایسٹ - کھلی ہوا میں گھومے اور ڈالوں ڈول چال جب چلے تو لڑکھڑائے۔

رانوں کی کمزوری کی وجہ سے۔

سٹیف سگیرا۔ چکر جب بیٹھا ہوا ہو۔ گول دائرہ میں چلنے سے آفاقہ۔
ایکونائٹ این۔ ڈر کی دہرے چکر۔ اچانک ڈر سے۔ ڈر کا خوف رہے کہ کتا اس کا
بیچھا کر رہا ہے یا چور بیچھا کر رہا ہے یا دائیں طرف لڑکھڑانا۔ متلی کے ہمراہ چکر خاص طور پر جب
اٹھے۔ سر بلانے پر زیادتی جس وقت آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے۔
ایموڈم۔ چکر من بائیں طرف ٹھیک لگا کر یا ٹھیک کر کھڑے ہونے سے زیادہ ہوں۔
پلسٹیللا۔ چکر جن کو چلنے سے آفاقہ ہو۔ چکر جیسے کرنشے سے ہوں۔ خاص طور پر بیٹھے ہونے
کی صورت میں۔ سر بھاری۔

رہوڈ ڈینڈرون۔ بستر میں چکر جب ادھر ادھر چل رہا ہو تو آفاقہ ہو۔
سیلسک الیڈ۔ بائیں جانب کرنے کا رجحان کے ساتھ چکر اور ارد گرد کی چیزیں دائیں
طرف کرتی معلوم دیں۔ کان کی نس کیوجہ سے چکر۔
ایوماسلیکیٹ۔ چکر صبح و شام بیٹھے ہونے کی صورت میں۔ چلتے وقت۔ اچانک ہر کو
موڑنے پر۔ آنکھیں بند کرنے پر۔ جن کو لینے سے آفاقہ ہو۔
بروڈیم۔ چکر پیچھے کی طرف کرنے کے رجحان کے ساتھ۔ پل عبور کرتے وقت اور چلتے
ہوئے پانی کو دیکھ کر یا اپنے سامنے تیز حرکت ہونے پر چکر۔
بریا کا رب۔ ہر چیز اس کے ساتھ بلے جیسے کہ جہاز میں۔



تیسرا باب

انتکھیں
اور
نظر

74

آنکھیں اور نظر، پھوڑا

آنکھ کے پردے کا پھوڑا۔

کلیر یا میور۔ آنکھ کے پردے کا پھوڑا۔ (دھند۔ نظر کی کمی۔ دیکھئے نظر)۔

تکلیف دہ بینائی۔

آنکھ کا دور و نزدیک دیکھنے کیلئے غیر موزوں ہونا یا سیٹ نہ ہو سکتا۔
 { سنا
 آرٹھریٹک } مطالعہ کرنے پر آنکھوں میں درد ہو۔ الفاظ دھندلے معلوم ہوں۔
 نظر کی جگہ بادل سا چھایا رہنا۔ ملتے پر تکسین ہو۔ (عصب بینائی، آنکھ
 کا پردہ شبکی بھی دیکھئے ناکارہ ہونا)۔

نکسوامیکا۔ آنکھ استعمال کرتے وقت یا دیکھتے وقت پردہ شبکی کا سکڑنا۔ شدید
 تکلیف کے ساتھ۔ روشنی کا برداشت نہ کر سکتا۔ صبح کے وقت زیادہ تکلیف۔

فامفورس۔ عصب بینائی کا موتیا بند کے ساتھ ناکارہ ہونا۔
 آرسینک الیم۔ عصب بینائی کا مہا کو نوشی اور مہا کو جبانے کی وجہ سے ناکارہ ہو جانا۔

پلکوں کی سوزش و سوزش

پٹرو لیم۔ پلکوں کی سوزش۔ پلکوں کے کناروں کی سوزش۔ پلکوں کا گر جانا۔
 کرالسوفاریم ایسڈ۔ پلکوں کی سوزش۔ پردہ قرنیہ کا دم۔ روشنی سے خوفزدہ، اندرونی
 طاقت استعمال کیجئے۔ بیرونی طور پر ہم گرین ایک ادس ویزلین میں ملا کر ہم بنا کر لگائیں۔
 ماربلینیم۔ چپکے بعد چپکے کے برے اثرات کی وجہ سے پلکوں کی سوزش ہو۔

گر لیفائیٹس - پکوں پر ٹھنسیاں جو سُرخ ہوں - ان کے کنارے پہلوں اور پھلکوں کو کھانا بنا دیا ہو۔ پکس موٹی، پکس سرخ اور سوچی ہوئی پکوں میں چرنے یا چھدنے اور خون بہنے کا حجام مرک کار - خاص طور پر جب آتش کی وجہ سے پکس موٹی - سُرخ - سوچی ہوئی اور پھنسی والی گری سردی اور چھونے سے زرد جس - کھلی ہو یا ٹھنڈی پٹنیوں سے زیادتی - آنکھ کے ڈیوں میں درد اور خارش -

ہیپر سلفر - حاد کیسوں میں پہلی حالت گزر جانے کے بعد جب پیپ بنا شروع ہونے والی ہو یا شروع ہو چکی ہو - پکس سوج جاتی ہیں - لیکن دار درد کے ساتھ چھونے پر زرد جس ہوں، گری سے زیادتی اور سردی سے افادہ ہو -

الیومنا - مزین دانے دار پکس - یعنی بھتیاں موٹی - آنکھوں کے پھر کانچے گرنا - سختے مکمل طور پر بالوں سے ننگے ہو جائیں -

پلسٹیل - آنکھوں کی سوزش - امیرانہ زندگی اور چرپسی خوراک سے پہرہ پر دانے گواہ بننا نکلنے کا رجحان - آنکھوں سے بے ضرر اور بہت زیادہ رطوبت کا اخراج -

کلکیر یا کارب - غیر صحت مند پکوں کی آنکھوں کی سوزش - تزن کی طرح کے پیٹ والے نیچے - خناز میں مبتلا رہنے والے نیچے جن کے سر پر بہت زیادہ پسینہ آئے پکس سرخ اور سوچی ہوئیں - کلکیر یا آئیوڈ - پکوں کی سوزش - خاص طور پر ٹانگوں کے بڑھنے کے ہمراہ رسٹاکس - پکوں کی سوزش جس کے ہمراہ بہت زیادہ گیدہ ہو -

میزریم - پکوں کا اور سر کا اگر میا جیس صحت زیادہ موٹے پھلکے اور سخت ہوں - کو نیم - پکس سخت - موٹی اور وزنی، پکوں کا - ناک کا اور رخاؤں کا کینسر - نظر بھی دیکھئے اور اندھا بن -

سیلی بورکس - جب وجہ نامعلوم ہو -

سلیشیا - جب اپنا تک چھوڑے ظاہر ہوں -

فیرم میٹ - بستر یا میں -

فاسفورس - بجلی کی ضرب کے بعد -

جلیسیم - آنکھ کے بالائی پتھر کا فانیج یا پتلیاں پھیلی ہوئی، میٹریا سے یا نم سے۔ آنکھ سے خون
سننے کی وجہ سے اندھاپن -

لوڈسٹا - عصب بینائی کے فانیج کی وجہ سے اندھاپن -

کالی میوور - جب برف کی وجہ سے اندھاپن ہو - ہر طرف دھواں اور دھند دکھائی دے -

گلونائن - سر کے، دماغ کی پھلیوں کے درم کے دوران یا بعد میں اندھاپن -

سلفر - یہ دوائی ۲۰۰ کی طاقت میں بطور عمل انگیز دی جاتی ہے

لایکوپوڈیم - رات کے اندھرتے کے لیے چوٹی کی دوائی ہے - سب سے پہلے یہ دی جانی چاہیے -

ایپانک - اندھاپن کاٹنے والے درد کے ساتھ -

چائٹ آف - اگر لایکوپوڈیم کا کام ہو جائے تو یہ دی جائے محسوس کرے کہ آنکھوں میں ریت ہے -

پیروسلینیم - آنکھوں کی سوزش کے ہمراہ اندھاپن -

فائیو سولگما - رات کا اندھاپن یا سہموتیا یا دور کی نظر کمزور کے ہمراہ یا اسکے بغیر -

زنکلوں بکسوس - حاملہ عورتوں میں رات اور دن کا اندھاپن -

ہائیو سائیمس - رات کا اندھاپن، تھرقہ رٹ اور جھبکوں کے ہمراہ -

گلونائن - دماغ کی پھلیوں میں درم -

کالی بائیکرومیکم - سردی سے پہلے اندھاپن - نظر ابھی ہو جاتی ہے جو نہی دروازہ ہوتی ہے -

مانسی نیلا - شدید سوزش کی وجہ سے اندھاپن -

آنکھوں کا چھپکنا -

لایکوپوڈیم - اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے آنکھوں کا چھپکنا - مریض زود در زود ہوتا ہے

اندھیرے سے ڈرتا ہے - ایکلے پھٹے جانے سے چہرے کے پٹھوں کے تشنج یا انٹینس سے -

بیلادونا - پرغون مریضوں میں آنکھوں کا چھپکنا -

یوفرنریا۔ آنکھوں کا لگنا بھینکا۔

کالی بائیکرومیک۔ مرگی کے مریضوں میں لگنا آنکھوں کا بھینکا۔

کروکس { پڑھنے کے دوران میں یا
کلیریا کرب { بعد میں ہلکوں کا بھینکا۔

چمک۔

لووٹا۔ آنکھیں بغیر چمک کے۔

یوفرنریا۔ آنسوؤں اور گید کے ساتھ جلن اور کاٹنا اس لئے آنکھیں جھپکے۔

ایلیم سپا۔ جلن جیسے کہ دھوئیں سے ہو۔ آنکھوں کو ملنا چاہے، آنکھوں سے پانی کی طرح کا نزلہ۔

روٹا۔ محسوس کرے جیسے کہ آنکھوں میں رات کے وقت آگ کے گولے ہیں۔

کریوزوٹ۔ گید کے ساتھ جلن جس میں زیادتی چمکدار روشنی سے ہو۔

آئرس ٹیلنیکس۔ بغیر آنسوؤں کے جلن آنکھوں میں۔

کاسٹیکم۔ آنکھوں میں جلن جیسے کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر چمکتا ہوا کوئلہ رکھا ہوا ہے۔

اگرکس ایم۔ آنکھوں میں جلن جو آنکھوں کے پوٹوں کو آپس میں جوڑ دے۔

موتیا بند۔

کاسٹیکم۔ دور کی نظر کے شدید کمزور ہونے کے ابتدائی مراحل میں (ایک ایم طاقت کی

خوارک دیجئے) شبکہ پر پردہ صبح نہ آنا۔ اور قریب کی چیزوں کا صحیح نظر نہ آنا۔ سر کے درجہ جھوٹے

پیشوں کی کمزوری۔

کلیریا فلو اور سلفر۔ بعد کے مراحل میں سلفر ۲۰۰ طاقت پندرہ دن کے بعد ایک خوراک

دی جائے اور اس سے ایک دن پہلے اور بعد میں کوئی دوائی نہ دی جائے۔ باقی ماندہ دن کلیریا فلو

۳۰ دن میں تین دفعہ پانچ گھنٹے کے وقفے سے دیں۔

فاسفورس۔ موتیا بند کے لئے ایک اچھی دوائی ہے۔ آنکھوں کے سامنے سیاہ تیرتے ہوئے بھجے۔

نظر کے آگے رنگ۔ آگ کی گرمی سے آنکھیں سوزش زدہ معلوم ہوں۔ آنکھوں کے آگے دھندہ براہ

ایک ایم کی خوراک مرت ایک بار دیجئے۔

سلفر۔ موتیا بند پٹ میں ڈوبنے کے احساس کے ہمراہ۔ گرمی چہرہ تک چڑھے۔ ہنسنے کو جانتے ہوئے غشی کا احساس ہو۔ کلکیر یا فلور کے ساتھ ہر نپیرہ دن کے بعد بطور عمل انگریز دوائی دیکھائی، سلفر ایسڈ موتیا بند سخت زبان کے ہمراہ جو کارڈ بورڈ کی طرح سخت ہو۔

ایسڈ ٹیم

آرم میٹ۔ اوپر نیچے کی طرف دبانے والی درد یا باہر کی طرف سے اندر کی طرف یا آنکھوں کی بڑیوں کے ارد گرد تکلیف چھوٹنے پر زیادتی اور روشنی سے حساس۔

کالی ایسڈ۔ آنکھ کے سیاہ پردہ کی آنکھ کی وجہ سے کسی بھی قسم کی تکلیف کی ما بہترین دوائی ہے۔ خاص طور پر جہاں دھند یا آنکھ کے سفید گارٹھے مادہ جو حد کے پیچھے آنکھ کے غلاف کو پرکے ہوتا ہے کا دھندلا پن۔

مرک کار۔ آنکھ اور آنکھ کے ارد گرد شدید۔ آنکھ کے سیاہ پردے کا دم جبکہ پردہ عینہ یا انگریز پردہ بھی ملوث ہو۔

فاسفورس۔ جب چند جہاں یا روشنی سے خوف کے ہمراہ چیزوں کی مختلف ٹیکس اور رنگ جن میں سرخ نمایاں رنگ دکھائی دے۔ آنکھوں کے آگے سیاہ دھبے آئیں۔

پروٹس سپن۔ شدید درد جیسے کہ آنکھوں کے ڈیلے کڑے کڑے کر کے دبانے جارہے ہیں۔ تیز گولی لگنے جیسی کھلنے والی، کاٹنے والی درد، آنکھ میں سے اسی طرف کو مرک جائے۔

ہیپر سلفر۔ جب آنکھ کے سیاہ پردے میں پیپ بننا شروع ہو چکی ہو۔ آنکھیں چھوٹنے سے زود حس ہو۔ دردیں شدید اور پکین مارچ کو گرم پٹیوں سے افاتر ہو۔

فائوٹولا۔ پلکیں بہت سخت سرخ سوچی ہوئی اور آنکھ کے اندر پیپ۔

ڈبوسا۔ آپٹک ڈسک اور پردہ شبکی کی گریں بڑھی ہوئی اور تکلیف دینے والی۔ آپٹک ڈسک میں اجستار خون

ٹیوٹر کو لینیم۔ جب اچھی طرح منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو مابین تو یہ بطور عمل انگریز کلام کرتی ہے۔ صرف ۲۰۰ کی یا اس سے اونچی ایک خوراک دیجئے۔

پلکوں کی بیماریاں

جبرامٹی - پلکوں کو کم آہنگ کرتے ہوئے تشخ کے دورے یا پلکوں کے ٹپوں کا مہیاں -
 کھڑا صلا پر سے متعیشیوں کے بغیر ہر چیز دھندلی عکس ہو اگرچہ قریبی چیزیں صاف طور پر نظر آئیں
 نظر بہ وقت تبدیل ہوتی رہے - آنکھیں استعمال کرنے پر تلی اور جکڑ -
 فائٹوکلما - آنکھوں کے ارد گرد اور پلکوں میں اینٹھن - پلکوں کے ٹپوں کا تشخی عمل -
 اگر کیس ایم - اگر پلکوں کا تشخی اور عام روش کے ہر پلکوں کی اینٹھن ہو -
 رنگ دار دیکھنا - فریب نظر -

فاسفورس - رنگوں کے اندھے پن کے لئے ایک بہترین اور عام دوائی ہے -
 سٹرامونیم - اشیاء اس طرح نظر آئیں کہ انہیں خون کی آلائش ہو یا خون کا رنگ نظر آئے -
 آرسنک الیم - اشیاء سبز نظر آئیں -
 کیسکیم - اشیاء سیاہ نظر آئیں -
 اکیٹا سٹکٹا - اشیاء نیلی نظر آئیں -
 کیسفورس - اشیاء چمک دک والی نظر آئیں -
 انٹیولیم - نظر رنگدار شدید چمک دک -
 سٹرامونیم - سرخ کی بجائے چیزیں سیاہ نظر آئیں اور یاہ چیزیں بھوری نظر آئیں -
 سنا - اشیاء زرد نظر آئیں -
 اگر کیس ایم - آنکھوں کے سامنے رنگوں اور شکل و صورت کا دھوکہ -
 ڈیجٹالیس - زرد اشیاء سفید نظر آئیں -
 کاربونیم سلف - سرخ اور سبز اشیاء سفید نظر آئیں -
 ہائیوسائیمس - اشیاء سنہری نظر آئیں -

بیلادونا۔ سُرخ اشیاء زرد نظر آئیں۔
 کوئیم۔ اشیاء سُرخ نظر آئیں۔ قوس و قزح کے رنگوں جیسی۔ پٹیسوں والی۔ دودھ نظر
 آئیں، روشنی سے نفرت۔ نظر کی کمزوری

آنکھ کے سفید پردے کا درم۔ آشوب چشم
 (دیکھئے آنکھ کا درم)۔ تھیلی۔ جوف۔

گلکیریا فلور۔ پلکوں پر تھیلی۔ ۶ یا ۲۰ طاقت میں دیکھئے!
 ٹائٹرک الیڈ۔ جب گلکیریا فلور ناکام ہو جائے تو یہ دوائی دی جانی چاہیے۔
 سیٹیفیکریا۔ گواہ بنیوں کے بعد پلکوں پر تھیلی نما ابھاروں کیلئے بہترین دوا ہے
 پرودہ شبکی کا علیحدہ ہو جانا۔ ایک کے دو نظر آنا۔ آنسو۔ پانی جیسے اخراج
 رنگ بدل جانا۔

سیٹیفیکریا۔ نیلے یا سیاہ حلقے آنکھوں کے ارد گرد۔
 سائیکامین۔ آنکھ کے گرد نیلے حلقے۔
 چائٹنا۔ قلتِ خون کی وجہ سے آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔
 دریرٹرم البم۔ ہیضہ کے حملہ کے دوران میں یا بعد نیلے حلقے۔ یہ بزرگ ملقوں کو بھی
 ٹھیک کر دیتی ہے۔

نیرٹرم کارب۔ زرد چہرے کے ساتھ نیلے حلقے
 فاسفورس۔ حیض کے بعد نیلے حلقے۔

سنا۔ پیٹ کے کیڑوں یا قلتِ خون کی وجہ سے نیلے حلقے۔
 نکسوامیکا۔ زرد حلقے

سیکل کار۔ آنکھ کے ڈیلے گڑھوں میں دھنسے ہوئے اور نیلے ملقوں سے گھری ہوئی۔
 اکتیا آ۔ آنکھیں بڑی۔ دھنسی ہوئی اور سیاہ ملقوں سے گھری ہوئی۔

برہمیں دی۔ آنکھیں دھنی ہوئی۔ نیلے یا سیاہ حلقے گہرے بھورے۔
مینسی نیلا۔ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔

آنکھوں کے ڈیلے

ایوڈیم } آنکھوں کے ڈیلے کا باہر کو
لائیکوپس ویر } نکلے ہونا۔ دی گئی ترتیب
کالی میوز } میں دوائی استعمال کیجئے۔
اگیشیا۔ آنکھوں کے ڈیلے گھڑی کے پنڈولم کی طرح۔ ادھر ادھر حرکت کریں۔ اگرچہ دم
پر ایک جگہ پر جانے کی انتہائی کوشش کرے۔ یہ حرکت منہ سونے پر ہی کرتی ہے۔
دیکھے آنسو۔ ہالوں کا گڑا۔ بلیکس۔

آنکھوں کا کبھی کھلنا، کبھی بند ہونا۔ جھپکنا

اگرکس ایم۔ } یہ ادویات دی گئی
سائیکلین } ترتیب میں دی
نیزم میوز } جانی چاہئیں۔ (دیکھے مگوٹریڈرول۔ ریشٹراگاؤ۔)
سبز موتیا۔

فاسفورس۔ سبز موتیے کی چوٹی کی دوائی ہے اگر یہ ناکام ہو جائے تو لایکوپڈیم۔
اوریشیا دیجئے۔

سپائنجیلیا۔ بائیں طرف کے شدید درد کیوجہ سے سبز موتیا ہو۔
پروٹس سپائنجلیا۔ اگر سپائنجیلیا ناکام ہو جائے تو یہ استعمال کرائی جائے۔
ایسپرلفر۔ } دانے دار پوٹے دی گئی
گرفایٹس۔ } ترتیب میں استعمال کرائیے۔

لوہ کیس۔ دانے دار پوٹے جب پکیں آنکھ کے اندر کی طرف مڑ جائیں اور اُسے متوہم کر دیں۔
 پوٹوں کی بلغی جھلی کا موٹا ہونا۔ پچلے پوٹے مکمل طور پر لٹے ہوئے۔ پوٹوں کو کھولنے میں تکلیف
 پسٹیل۔ جب لوہ کیس ناکام ہو جائے تو پکوں کے اندر کی طرف مڑنے کیلئے اچھی دوائی ہے۔
 جلیسیم۔ بزموتیہ کیلئے مخصوص دوائی جبکہ سرد در گردن کی گدڑی سے شرج ہو۔

اومیم۔ بزموتیہ میں جب مریض قوس قزح کے رنگ دیکھے۔ آنکھ کے اوپر پینے گید
 کے ہمراہ شدید درد۔ روشنی کے گرد بزموتیہ یا دائرہ۔ آنکھ میں بڑا ہوا دباؤ۔ روشنی سے خوف۔ نظر
 لہو۔ آنکھوں اور سر میں تیز یا شدید درد۔

سلفر۔ جب اچھی طرح سے منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ بطور عمل انگریز
 کام کرتی ہے۔ پیٹ کے گڑھے میں جلن۔
 کالو سنٹھس۔ لنگڑی کے درد اور معدہ کی گیس کے ہمراہ بزموتیا۔
 (دیکھے پکوں کی سوزش۔ پوٹے کے دانے)

خون بہنا۔

کرڈیلکس ہور۔ آنکھوں سے خون بہنا۔ پردہ شبکی سے بغیر سوزش کے خون بہنا۔
 لیکس۔ آنکھ کے پردہ شبکی سے آنکھ کے اندرون خانہ خون بہنا۔ یہ نکلا ہوا
 خون جذب کر لے گی۔

جلیسیم۔ خون کا نکلنا جس کے نتیجے کے طور پر انڈھا پن لاحق ہو جائے تو اس کے
 یہ بہترین دوا ہے۔ ۲۰ کی طاقت صبح و شام دن میں دو دفعہ دی جائے۔
 فاسفورس۔ جلیسیم کے ناکام ہونے پر دی جائے۔

آزوریکالیم۔ جب زخم کی وجہ سے خون بہے ۱۰۰ کی طاقت ہر روز صبح کے وقت خالی پیٹ
 ایک دفعہ دیجئے۔

سلفر۔ پوٹوں سے خون بہے۔

آنکھوں کے بالوں کا گرنا۔

کالی کارب۔ آنکھوں کی جھنڈوں پر سے بالوں کا گرنا۔

انتھرم۔ جب کالی کارب ناکام ہو جائے تو جھنڈوں کے بال گرنے میں یہ دوائی دیکھائے

الیومنا۔ پلکوں کے بالوں کا گرنا۔

رسماسکس۔ پلکوں کے بالوں کا گرنا۔

پلسٹیللا۔ آنکھ میں بال کا احساس۔

آنکھ کے سفید پردے کا ورم۔

سبز نوتا بھی دیکھئے۔

الکوناٹ نیپ۔ ٹھنڈک سے۔ زخم سے۔ گرد و خراب سے۔ جراثیمی سے۔ خنازیر کے برص

بوسے غددوں کے بہراہ۔

الٹیک الیڈ۔ جب سخت مواد آتا زنا مشکل ہو۔

میلادونا۔ جب آنکھیں نوں کے گولے کی مانند اور بہت ہی سرخ ہوں۔ کافی سوچی

اور پردہ۔

مرک کار۔ آنکھوں کے دکھنے کے لئے یہ بہترین دوائی ہے۔ یہ عادیہ مزمن کیسوں میں

کچھ وقت کے لئے دی جائے تو آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔

یو فریز یا۔ آنکھوں سے تیزابی یا پھیلنے والے پانی کے اخراج کے ساتھ۔

آسٹھم ٹامیریکیم۔ بہت زیادہ پیپ والا اخراج۔ قرنیہ دھندلا۔ پلکیں دکھنے والی۔ موٹی

سوچی ہوئی اور زخموں سے پُر صبح کے وقت بڑی بوٹی۔ رطوبت نظر کو روکتی ہے جھکنا اثر پونچھ جاتی

ہے۔ نزلاؤں زخم بنانے والی۔ قرنیہ کی دھندلاہٹ۔ ٹھنڈی پٹیاں لگانے سے آفات۔

کالی ایوڈ۔ آنکھوں سے بہت زیادہ گاڑھا ہوا اخراج

کریوزوٹ۔ سوچی ہوئی سرخ، آسانی سے خون ہے۔

ماؤ بلیئم۔ چپک میں مبتلا ہونے کے بعد۔

اپس میلیفیکا۔ پوٹوں کی سوزش ڈنگ لگنے جیسے درد کے ساتھ۔ گولی لگنے جیسے
درد کے ساتھ۔ روشنی سے خوف۔

رٹاکس۔ گاڑا پیپ دار اخراج۔ بہت زیادہ سوزش۔ بہت زیادہ گرم۔ گید بے چینی
آدھی رات کے بعد شدت۔

آرم میور۔ وراثتی آتشک کی وجہ سے سوزش۔ جلن دار گیہ۔ روشنی سے کچھ خوف۔
روٹاجی۔ آنکھوں میں زیادہ دباؤ کی وجہ سے درد جو ٹھنڈک پر زیادہ ہو۔
(آر جینٹم نائٹرکیم کے الٹ)

سلفر۔ پوٹے سو بجے سو بجے ہوئے اور آسانی سے خون ہے۔
الیومنا سلیکیٹ۔ آنکھوں میں درد شام کے وقت آنکھوں میں جلن۔ جیسے کہ حریر
میں درد ہو۔ کھلی ہوا میں سوزش خارش کہ ہمراہ پوٹوں میں جلن۔ آنکھوں میں درد جیسے کہ
ریت کے ذرات سے ہو۔

مینسی نیلا۔ آنکھوں کی شدید سوزش جو کچھ دنوں کیلئے اندھا کر دے۔
ہیمپ سلفر۔ آنکھوں کی سوزش۔ بدبودار۔ گاڑھے پیپ دار اخراج کے ساتھ قرنیہ
کے زخم۔ خونی اور بدبودار اخراج کے ساتھ۔

پرودہ قرنیہ کا ورم۔ آنسو۔
قرنیہ بغیر زخم کے موٹا ہونا۔ آنسوؤں کے نیچے بھی دیکھیے۔

کلیریا کارب۔ ٹھنڈ لگنے سے آنسوؤں کی نالی بند ہو جائے
اندر کی طرف بڑھنے والی پلکیں۔
بورکیس۔ پکوں کا اندر کی طرف جھکنا۔

پلسٹیلہ۔ پکوں کا اندر کی طرف جھکنا جب بورکیس ناکام ہو جائے۔

گر لفاٹس۔ پکلیں تابو میں نہ رہیں اور اندر کی طرف ادا آنکھ کے مفید پردہ پر سوزش پیدا کریں۔

دور کی نظر کی کمزوری۔ (نظر کے تحت بھی ادویات دیکھیے)

کلکیر یا کارب۔ آنکھوں کے بہت قریب ناک کو چھونے ہی کے قریب ہی پڑھ سکے۔
فائیسوسگما۔ جب پلکوں کے تشنج کی وجہ سے ہو۔ بنزوتیا اور دور کی نظر کی کمزوری کیلئے جوئی کی دوائی ہے (دیکھیے رات کا اندھا پن)

چائنا آف۔ ٹائیسس بخار کے بعد دور کی نظر کی کمزوری اسپہال کے ہمراہ۔ ہٹ
اگر کیس ایم۔ پلکوں کے پٹیوں کے تشنج جو پوٹوں کو چھوٹیں۔ دور کی نظر کمزور۔ نظر کی دھندلاہٹ
ہر چیز دھندلی سی نظر آئے جیسے کریہ مٹری کے جلے سے ڈھانپی ہوئی ہے۔
فاسفورس۔ موسم ہتی کے گرد ہار یا دائرہ نور۔ سیاہ انعکاس یا شرارے اور آنکھوں کے سامنے
سیاہ دھبے۔ صبح کے وقت اچھا نظر آئے یا آنکھوں پر اتھکا سایہ کرنے پر اچھا نظر آئے۔

نایٹرک الیڈ۔ دور کی نظر کی کمزوری جس کے ساتھ سیاہ دھبے آنکھوں کے آگے ناچیں۔
اٹک یا پارے کے غلط استعمال کی وجہ سے دور کی نظر کمزور۔

کاربوئیٹیم سلف۔ دور کی نظر کمزوری۔ تکلیف دہ بینائی۔ قوس قزح کے بنیادی
رنگوں میں تمیز نہ کر سکتا۔ مختلف قسم کے رنگ نہ دیکھ سکتا۔ دھندلا پن اور عصبی پٹیوں کی کمزوری۔
کلکیر یا فلور۔ قرنیہ کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ کافی عرصہ تک استعمال کر لائی جائے۔
نیفٹھیلین۔ قرنیہ اور عدسہ آنکھ کے لئے۔

میلکینشیا کارب۔ ناسور یا زخم کے بعد قرنیہ کے لئے۔
سلیٹشیا۔ چھوٹی چیمپک کے بعد قرنیہ کے لئے کافی عرصہ تک استعمال کرنا چاہیے۔
آجنٹم نایٹرکیم۔ ناسور یا زخم کے بعد قرنیہ کی دھندلاہٹ۔
اسٹوبتھیم۔ آنکھوں میں درد (آنکھ میں سوزش)
روٹا۔ مطالعہ کی وجہ سے درد۔

بیلادونا۔ سوزش کی وجہ سے۔ سرخ خون رنگ آنکھیں۔ شدید درد۔
 سپائیکلیا۔ جب سر کی بائیں جانب درد ہو بائیں ڈیلے میں جائے۔
 سینگونیریا۔ جب سر کی بائیں جانب اور دائیں ڈھیلے میں جائے۔
 نیٹرم میور۔ سر درد جب ایک طرف سے یا دونوں طرف سے آنکھ کے دونوں ڈیلوں میں جائے۔
 میڈرن۔ بائیں آنکھ کے اوپر درد، مجامعت کے بعد۔
 اوسموڈیم۔ آنکھوں میں دباؤ کا احساس جیسا کہ باریک پرنٹ سے ان پر دباؤ ہو۔
 خواہش کر دور کی چیزیں دیکھی جائیں۔

روشنی سے خوف (نور ترسی)

بیلادونا۔ روشنی برداشت نہ کر سکا۔ خشک اور وحشی ہوئی آنکھیں۔ آنسوؤں کے بغیر۔
 روشنی سے خوف کے لئے یہ چوٹی کی دوائی ہے۔
 گریفائیٹس۔ سوزش کی روشنی میں روشنی سے شدید خوف بہت زیادہ آنسوؤں کے ہمراہ
 نکسوامیکا۔ شراب نوشی یا رات کی عیاشی دہ کارے کے بعد روشنی سے خوف کیلئے
 نمایاں دوائی ہے۔ کثرت شراب نوشی عصب بھر میں خراب پیدا کر دے جو اس دوائی سے ٹھیک ہو جائیگی
 وماغی سیان اور عصبی سیان کا اس سے علاج کیا جاسکتا ہے۔
 مرکوریس۔ آگ کی روشنی آنکھ کو بہت خیر کرتی ہے یا چندھیاتی ہے۔ آنکھیں آگ یا دن کی روشنی
 برداشت نہ کر سکیں۔

اکونائٹ این۔ سردی کی وجہ سے تکلیف دہ سوزش اور روشنی سے خوف یا کسی تیزابی چیز
 کے آنکھوں میں پڑ جانے سے۔
 رسٹاکس۔ روشنی بالکل ہی برداشت نہ ہو سکے حتیٰ کہ رات کو بھی آنکھیں نہ کھولی جاسکیں
 تیزابی اخراجات اور سرخی کے ہمراہ استثنائی سوزش آنکھ۔
 گلونائٹ۔ جب بیلادونا نام کام ہو جائے تو یہ استعمال کرنا چاہیے۔

یوفرنیزیا۔ روشنی سے بہت زیادہ خوف۔ بہت زیادہ جلن دار بانی آنکھوں سے ہرے مصنوعی روشنی کو
 برداشت نہ کر سکے۔

کلکیر یا کارب - عام قسم کی روشنی کو بھی برداشت نہ کر سکے - سورج کی روشنی میں کھڑے ہونا ممکن -

آنکھوں کے آپریشن کے بعد کی تکالیف -

آرنیکا مانٹ - آپریشن کے بعد اثرات کیلئے بہت ہی کامیاب دوائی ہے -

ایکس ایم طاقت میں دیکھو -

اگنیشا - کنپٹیوں میں شدید درد -

رسٹاکس - سر میں گولی لگنے جیسی دردیں -

لیڈم پال - آنکھ کے لگے خانے سے خون بہنا - انگری پر دہ کاٹنے پر -

برائی اونیا - سر درد قے کے ہمراہ -

اسارم - جھٹکوں والی درد قے کے ہمراہ -

کروکس - آنکھوں میں تھوڑے لگنے اور جھٹکے دار درد -

تھوجا - کنپٹیوں میں ڈنگ لگنے جیسے درد -

سینا - عذرا چشم کے زائید ملبر کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے

سٹرانٹیا - چیزیں ایسی نظر آئیں جیسے کہ خون میں ڈوبی ہوئی ہوں -

آنکھ کے بالائی پھیپے کا فایہ - لقوہ -

جلیسیم - آنکھ کے بالائی پھیپے کا لقوہ - بلیکس وزنی - مریض انہیں مشکل سے کھول سکے

آنکھوں کے ذیلی اکھیں حرکت پر زیادتی خناق کیوجہ سے - دماغ کی جھلیوں کے درم کی وجہ سے -

جنبات یا ٹھنڈا تر موم کیوجہ سے ٹھوں کا فایہ -

رسٹاکس - گنٹھیاوی مریضوں میں گیلے یا تر موم کیوجہ سے -

سپیا - جب حیض کی بے قاعدگیوں سے منسلک ہو -

کالمیا ایل - گنٹھیا دی رلیض میں جب پکیس سخت معلوم ہوں -
 کاشیکم - گنٹھیا دی رلیضوں میں جب آنکھ کے پٹھے سردرد کا باعث ہوں، خشک ٹھنڈ
 لگنے سے۔ جلیسیم سے کونایج کرتی ہے اور رسا کس سے زیادہ فالج کرتی ہے
 ایبومنا - بڑی آنت کے جمود یعنی کام نہ کرنے کے نتیجے میں قبض کے ساتھ منسلک ہوتی
 ہے۔ یعنی قبض مذکورہ بالا کے ساتھ۔

کوکولس - آنکھ کے پچر کا فالج دفعہ یا کے بعد جب جلیسیم ناکام ہو جائے۔
 آنکھ کے عصب کی بیماریاں -

پرودہ شبکی

ڈبوسیا - پرودہ شبکی میں اجتماع خون پرودہ شبکی کی سوزش۔ پرودہ شبکی کی رگیں بڑی
 اور تکلیف دہ خاص طور پر دریدیں۔ آنکھ کے پھوٹے پھوٹے اُبھار سوجے ہوئے۔ پرودہ شبکی
 میں سے خون کا اخراج۔ آنکھ کے ڈیلے کے اوپر کے حصہ میں درد۔

فاسفورس - پرودہ شبکی میں اجتماع خون۔ آنکھیں روشنی سے پُر حس اور ملکی یا ملبی روشنی
 میں نظر تیز روشنی کے ارد گرد مار۔ پرودہ شبکی کی سوزش۔

پلسٹیل - آنکھ کے عصب اور پرودہ شبکی میں اجتماع خون اور سوزش، سر میں شدید
 درد کے ہمراہ جس کو کھلی ہوا میں افاقہ۔

برائی اونیٹا - پرودہ شبکی کی شدید سوزش یا اجتماع خون نظر کے سامنے نیلا ہٹ کی
 جھلک تیز درد آنکھ میں سے اور اس کے اوپر۔ حرکت سے زیادہ۔

مرک کار - آنکھ کے پرودہ شبکی کی سوزش، خاص طور پر رات کو زیادتی۔ آگ کی چمک
 سے حساس۔ البیون والی سوزش۔ پرودہ شبکی کے لئے۔ چوٹی کی دوائی۔ چربی کی تنزی۔ آنکھ
 کے کسی حصہ میں سے یا کمزور دریدوں میں سے خون بہنا یا دیگر جسمانی تبدیلیاں یا گلوے میں
 ایسی تبدیلیاں اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔

اگر یکس ایم - آنکھ کے عصب کی لاغری کی بہترین دوائی ہے دن میں ۶ دفعہ کافی مقدار میں۔

ایپس میلیفیکا - الیومن والی سوزش پرہ شبکی ہپوٹوں کی سوزش اور عام استقامتی حالت، مریض اونکھ محسوس کرے۔ سوپا میں کم اور کم پیشاب۔ پرہ شبکی کے نیچے مواد۔ آنکھ کے ٹیلے کے نیچے حصہ میں درد پرخون چہرہ کے ساتھ۔ آنکھوں میں دگم لگنے جیسی درد سوجھ ہونے پوڑوں کے ساتھ۔ پرہ شبکی کا الگ ہونا۔

آرسینک الیم - الیومن والی سوزش جب مریض بے چین ہو خاص طور پر رات کے بعد تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاں کے ہمراہ۔ پیشاب مقدار میں کم اور چربی یا الیومن ہلا۔

جیلیمیم - الیومن والی سوزش پرہ شبکی محل کے دوران میں سفید دھبے اور پرہ شبکی میں سے خون کا بہنا یا نیکنہ نظر کی کمزوری اچانک ظاہر ہوتی ہے۔ پرہ شبکی زخم یا دور نظر کی وجہ سے الگ ہونا۔ ہر سفتہ $\times 20$ طاقت کی ایک خوراک درماہ تک دیں اور پھر ایک ہزار طاقت کی ہر پندرہ دن بعد ایک خوراک دیں۔

لیکس - پرہ شبکی میں خون بہنے کی چوٹی کی دوا ہے۔ اس کے استعمال سے خون کا بہاؤ اور تری سے سوزش غائب ہو جاتی ہے۔ آنکھ کے عصب اور پرہ شبکی کی سوزش اور اجتماع خون۔

کروڈیلس - یہ دوائی پرہ شبکی میں خون کے بہاؤ کو جلدی سے جذب کر لیتی ہے جب کہ کٹے کی وجہ سے ہو۔ یہ پرہ شبکی کی سوزش کو مٹاتی ہے۔

بیلادونا - پرہ شبکی کی سرگی یعنی فاس کے اچانک کام پھوڑ دینا خاص طور پر جب سر درد اور اجتماع خون کی وجہ سے سر درد۔ آنکھوں اور پرہ شبکی میں مسلسل درد۔ آنکھ کے اعصاب کا اور سوزش کے ہمراہ۔ روشنی سے خوف۔ ٹیکن والا درد۔

آرم میٹ - پرہ شبکی کا الگ ہونا۔ اور والا حصہ سیاہ نصف جسم سے دھانپا ہوا اور نچلا نصف دکھائی دے۔ پرہ شبکی میں مسلسل درد اور سوزش، نظر میں دھندلاہٹ ہو سر میں درد اور آنکھوں کے ارد گرد درد اور دھن۔

چائنا۔ { پرہ شبکی کی قیادت خون
نیرم فاس } جس کی وجہ سے نظر کی کمزوری۔

کو نیم۔ روشنی کے لئے شبکیہ کا زرد جس ہونا، آنکھوں میں گہرے درد کے ہمراہ نظر کی کمزوری
 آسم مائٹ۔ زخم کی وجہ سے پردہ شبکیہ کا الگ ہو جانا۔ پردہ شبکیہ میں خون کا بہنا۔
 نیفقتھلین۔ پردہ شبکیہ کا الگ ہو جانا۔ زخم متباند۔ پردہ شبکیہ سے آنکھ کے کالے
 پردہ پکھوں میں رطوبت کا اخراج خرنیہ کی دھندلاہٹ پردہ شبکیہ پر ریسج کا پہنچ جانا۔ پردہ شبکیہ
 پر رطوبت کا جماد۔

نیرم سلیسلیکم۔ پردہ شبکیہ پر ریسج کے ذریعہ خون کا بہنا۔ پردہ شبکیہ سے البیون والا
 خون ہے۔

بھیننگاپن۔ (دیکھیے اینٹھن۔ تشنج)

جلیسیم۔ بھینگاپن کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔
 سائیکلین۔ اگر جلیسیم نام کام ہو جائے تو یہ دوائی آزمائی جائے۔
 ہائیوسائیمیل۔ جب دماغی امراض کی وجہ سے بھینگاپن ہو۔
 ڈونٹھرنیم۔ جب زہر کے خلاف ادویات کھانے کے بعد اثرات کیوجہ سے بھینگاپن ہو۔
 توسی ایم طاقت دیکھے۔

میگنیشیا فاس۔ آنکھ کے ڈیے کا متواتر حرکت کرتے رہنا۔ بھینگاپن۔ تشنجی بھینگاپن
 آنکھ کے اندے کا باہر نکل آنا۔

کائیکم۔ آنکھ کے اندے کا بڑھ جانا۔ قرنیہ کا باہر گوا بھارا کمزور نظر۔
 ایکس اکوفولیم۔ قرنیہ کی سوزش۔ آنکھ کا اندہ گوشت کا لوتھر ا دکھائی دے۔ آنکھ
 کے حلقوں میں درد کی رات کے وقت زیادتی۔ آنکھ کی گٹھیا دی سوزش۔ مدد نکچو یا پوٹنی میں
 دی جائے۔
 ایپس ایم۔ قرنیہ کا ابھار۔

گوما نجھیاں۔

پلسٹیلہ۔ گوما نجھیاں خاص طور پر سب سے پوٹے پر
 سٹیفنگیر یا۔ گوما نجھنیوں کے لئے بہترین دوائی ہے جو کہ عام طور پر پلسٹیلہ کے ناکام
 بار بار ہونے والی گوما نجھنیوں ہونے پر دی جاتی ہے۔ میرے تجربے کے مطابق میں نے یہ دوائی
 گوما نجھنیوں کے ہر قسم کے کیسوں خواہ حاد ہو مزمین، خواہ نچلے یا اوپر والے پوٹے پر پوٹوں
 کے کناروں پر سگری ہوئی۔
 ہیسپرلر۔ جب بار بار گوما نجھنیوں کے نکلنے کا رجحان ہو اور جب سٹیفنگیر یا ناکام ہو جائے۔
 ایونٹا سلیکیٹ۔ گوما نجھیاں سوجے ہوئے پوٹوں کے ساتھ۔ آنکھوں کی سُرخی آنکھوں
 میں درد دکھن جیسے کہ بہت ہو۔ (گندے مادے کی تھیل) بھی دیکھے جب گوما نجھنیوں میں سختی
 پیدا ہو جائے۔
 انسو۔

یوفرسر نریا۔ جب اخراج خراشدار اور آنکھوں میں یہ جان پیدا کرے۔
 ایلیم سیٹیا۔ جب اخراج بے ضرر ہوں۔
 رسٹاکس۔ جب آنسو بہت زیادہ ہوں۔ ناک اور آنکھ سے آنسو لانے والی نالی کے بند
 ہونے کی وجہ سے آنکھوں میں جلن
 مرک کار۔ سوزش کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہے۔
 سلیٹیا۔ آنسوؤں والی نالی کی سوزش یا رکاوٹ کی وجہ سے جب رسٹاکس ناکام ہو جائے۔
 پٹرو لیم۔ آنسوؤں والی نالی کی سوزش پیپ کے ہمراہ۔
 فلورک ایسٹ۔ پھوڑا یا رکاوٹ آنسوؤں والی نالی میں۔
 (دیکھیے آنکھ کی سوزش۔ ٹکڑے)

رسولیاں -

زخم میٹ - اوپر والے یا نچلے پوٹوں پر ناڑی جال
کلکیر یا کارب - جراثیموں کی تھیلیوں والی رسولیاں -

کونیم - { پوٹوں پر دانے
سٹیفگیریا -

کالی بانی - پالی پس - کثیر سوراخوں والا بھوڑا پوٹوں کے پیچھے -

تھو جا - آنکھ کے پوٹوں پر گومڑ جبکہ ٹیکوں کی وجہ سے دب گئے ہوں یا
جب ٹیکے اثر نہ کریں -

کیلیڈیم - بہت زیادہ تمباکو نوشیوں، جہاں تمباکو نوشی بھول جانے کا باعث بنے -
دماغی یا غیر حاضری - یہ گومڑ کو آرام دیتی ہے اور تمباکو نوشی کی عادت کو دور کرتی ہے -

تشنج
اگر کچس ایم - آنکھوں کا تشنج اور جھٹکے - ڈھیلیوں کی پنڈولم کی طرح کی حرکت کا بھی علاج
کرتا ہے - نیند کے دوران یہ تمام حرکات بند ہو جاتی ہیں... اکی طاقت میں دیتے!

ریفینس - پوٹوں کا مسلسل تشنج جو آنکھ کے ڈیلیوں کی محوری گردش کی وجہ سے نظر کو
تقریباً بند کر دیتے ہیں -

مینزیریم - پوٹوں کا تشنج - دائیں رخسار اور معدے کے پٹھوں کا تشنج - تکلیف دہ تشنج -
میگنیشیا فاس - آنکھوں کے قریب تشنج اور جھٹکے یا بہت زیادہ دیر تک پٹھوں کی اکڑن -
جس کی وجہ سے بھینکنا بن -

قرنیہ کے ناسور یا پھوڑے -

ہیپرسلفر - قرنیہ اور آنکھ کے اگلے طبق میں پھوڑا - شدید تکین والی درد کے ساتھ پھوڑے
کا گلنا سڑنا - روشنی سے شدید خوف -

مرکس کال - سطحی یا گہرے ناسور یا پھوڑے کا سرایت کر جانا۔ زیادہ مقدار میں پھیلنے والا مواد ہونا۔
سیلشیا - قرنہ کے گلے سڑنے والے زخم یا پھوڑے۔ مزمن پھوڑے۔ پردہ قرنہ کے درم
کے بعد نظر کی دھندلاہٹ -

گریفا ٹیس - گارھی کریم کی پیپ کے ساتھ پھوڑے یا ناسور۔
پلسٹیلر - آنکھ کے نیلے حصہ میں زخم یا پھوڑے ناسور مریض نرم طبیعت اور
گیس کی تکالیف والا ہوتا ہے۔

نظر - اندھاپن - (دور کی نظر کی کمزوری)

فامفورس - ٹائیفاؤنڈنجا کے بعد - جنسی بے اعتدالیاں - رطوبات کا اخراج اور
آسانی بجلی کے حملہ کے بعد کا اندھاپن - نظر کے اعصاب کے نالج کی وجہ سے اندھاپن -
فائیسوسنگما - رات کا اندھاپن - سہموتیا - اور دور کی نظر کی کمزوری -
پائیلو کارپس - اس دوائی سے دور کی نظر کمزوری درست ہو جاتی ہے۔ پھوڑے
سے استعمال کے بعد آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ آنکھوں میں گرمی اور جلن۔ پپٹوں میں
اینٹھن۔ آنکھوں پر معمولی دباؤ سے بھی سوزش یا ہیجان۔
زنکولس بلب - حمل کے دوران میں عورتوں میں دن رات کا اندھاپن -
سائیکیکلیمن - خارش کو دبانے سے نظر کا کم ہو جاتا۔ بادل یا پردہ آنکھوں کے آگے
حائل ہونا۔ آنکھوں کے آگے دھند یا دھوئیں کا ہونا۔ نظر کے دائیں نصف حصہ کا میج ہونا۔
آئیوڈم - نظر کا اچانک جاتے رہنا۔
کوکولس انڈ - نظر کمزور اور نظر کا درجہ برسم ہونا۔ آنکھ اور نظر کو سیٹ کرنے والے
پٹھوں کی نالج کی وجہ سے کمزوری۔

لوڈسٹا - عصب بینائی کے نالج کی وجہ سے اندھاپن۔
امبر اگریسا - آنکھ کے کسی ظاہری نقص کے بغیر آنکھ کی نظر میں اعصابی کمزوری۔

سلف۔ آنکھوں کے سامنے بادل یا پردہ ہو، دھواں یا دھند صبح جاگنے پر زیادتی۔

نیرم میور { چیزوں کا ایک نصف نظر آئے یعنی یا تو دایاں نصف حصہ
چینم سلف { نظر آئے یا بایاں نصف حصہ نظر آئے۔

اگر کیس ایم۔ کمزوری کم نظری یا نزدیک بینی۔ نظر کا دھندلا پن۔ غیر واضح نظر۔ ہر چیز دھندلی نظر آئے۔ آنکھوں کے بھٹکا اور شجہ جو بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ نظر کے آگے دھند اور مکرئی کے جانے کا احساس۔ آنکھوں کے آگے رنگوں اور چیزوں کا دھوکر۔

گریٹی ادلا۔ سر کی طرف خون کے اجتماع کی وجہ سے نظر کا جاتے رہنا۔

میفاٹیس۔ نزدیک مینی الفاظ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں۔ باریک لکھائی نہ پڑھ سکے۔

لیتھم کارب۔ چیز کا دایاں نصف نظر نہ آئے۔

آرم میٹ۔ پچھلا نصف یا اوپر والا نصف نظر نہ آئے۔ اوپر کا نصف سیاہ جسم سے ڈھانپا ہوا۔ اور پچھلا نصف سیاہ جسم سے ڈھانپا ہوا اور پچھلا نصف دکھائی دے۔ بڑے الفاظ میں فرق نہ کیا جاسکے۔ آنکھ کے آگے زرد اجسام تیریں۔

یسپیا۔ مادہ منور کے اخراج کے بعد نظر میں دھندلاہٹ۔ بکڑی ہوئی تپلیاں، جس کی وجہ سے نظر میں دھندلاہٹ و کمزوری، کوئی سا نصف حصہ نظر نہ آئے۔

گریفاٹیس۔ عام فانی کی وجہ سے اندھا پن۔ نظر سے دُور آگ کے ٹٹاتے ہوئے ٹیڑھے ٹیڑھے راتے۔

لائیکو پوڈیم۔ رات کا اندھا پن۔ کسی چیز کا صرف نصف حصہ نظر آئے۔ نیند کے دوران آنکھیں نصف کھلی ہوں۔

چائنا۔ پردہ شبکیہ میں قلتِ خون کی وجہ سے رات کا اندھا پن۔ آنکھوں کے گرد نیلا رنگ۔ آنکھوں میں دباؤ۔

بوٹھراپس لانسیویٹس۔ دن کا اندھا پن۔ پردہ شبکیہ میں خون بہنے کی وجہ سے

اندھاپن۔ سورج نکلنے کے بعد مشکل اپنا راستہ دیکھ سکے۔

ایکونائٹ این۔ اجتماع خون کیوجہ اچانک اندھے پن کے دورے۔ یہ دائمی ابتدا

میں دی جانی چاہیے۔

کاسٹیکم۔ اچانک اور اکثر نظر کا بند ہونا جیسے کہ آنکھ پر باریک پردہ تنا ہوا ہو۔ نظر کی دھندلاہٹ
جیسے کہ دھندلا آنکھوں کے آگے پردہ ہے۔

جیلیمیم۔ سرگرمی کے ساتھ اچانک اور مکمل اندھاپن۔ آنکھیں بوجھل اور دھندلی نظر۔

جلق کی وجہ سے نظر کا نہ رہنا۔ نظر کے میدان کا اوپر والا نصف نقص دار۔

لیکنٹھس۔ جب کھلی باز دھڑکسی چیز کو دیکھا جائے تو نظر دھندلا جائے جب
بھروسہ کن دائرے نظر آئیں۔ آنکھیں چمکدار اور تپتیاں پھیلی ہوئی سرخ رخاروں کے ہمراہ۔
مرکریکس۔ اندھے پن کے چند لمحوں کے دورے۔ آنکھیں روشنی یا آگ کی چمک سے
بہت زیادہ حساس۔

سکوٹا واٹر دوسا۔ شدید سرگرمی کے ساتھ نظر کا غائب ہو جانا۔ دماغ کی غیر حاضری۔
کی وجہ سے خاص طور پر طے وقت جب پڑھائی کے دوران الفاظ ادھر ادھر نظر بے قاعدہ نظر آئیں۔
ٹائپینیم۔ شروع میں صرف نصف چیز نظر آئے۔ تمام کار حجاب۔ نامردی بجماعت کے
دوران سرعت انزال کے ساتھ۔

پلسٹیللا۔ احساسِ کنظر کی دھندلاہٹ دور کی جاسکتی ہے آنسو تپتیاں سکڑی ہوئیں۔

سیلشیا۔ پانے کیوں میں جہاں مطلوبہ صبح منتخب کی گئی مستقل اثر نہ کریں۔

الیومنا سلیملیکٹ۔ دھندلی نظر۔ رات کے وقت مصنوعی روشنی یا نظر کے زیادہ
استعمال سے کم نظر آئے۔ دھند جیسی۔ کمزور نظر۔

ڈیوولسیا۔ آنکھیں ٹھنڈی محسوس کریں۔ تھکی ہوئی ہوں۔ چیزیں اوپر کو اٹھی ہوئی نظر
آئیں۔ ہر طرف دیر سے چہرے نظر آئیں۔ نظر کے دھم یا نظر کا فریب۔ ایک کرسی کو اپنا انتظار
کرتی ہوئی محسوس کرے جبکہ کرسی نہ ہو۔ تصور کرے کہ اندھیرا ہے جبکہ صاف چمکدار دن ہوا پتی گمشدہ

گھڑی کو اپنے سر کے اوپر ہوا میں سے پکڑنے کی کوشش کرے۔ دونٹ کے فاصلہ پر سے نہ پڑھ سکے۔ کئی دنگ شلا نیلا۔ پیلا اور سرخی مائل بھورا نظر آئیں۔ عصب بنیائی میں اجتماع خون عصب بنیائی کا فانیج شرابی نہیں سکڑی ہوئی۔

سنا۔ جیسے کہ جالی میں دیکھ رہا ہو آنکھیں پونچھنے پر آمادہ ہو۔

دریٹم ورائیڈ۔ اجتماع خون کی وجہ سے نظر کی کمزوری یا عصب بنیائی کے ہجیان سے۔ موم تہی کے ارد گرد بزر دائرے ظاہر ہوں جو چکرات پر سرخ ہو جائیں۔

دورٹا۔ دوران مطالعہ آنکھیں آسانی سے تھک جائیں۔ زیادہ مطالعہ کی وجہ سے نظر میں دھندلاہٹ۔ مطالعہ کے دوران گرمی اور جلن محسوس۔ مطالعہ کے دوران آنکھوں کے اندھوں میں درد۔ مطالعہ کے بعد یا باریک بینی کے بعد نظر دھندلا جائے۔

میدورینم۔ آنکھوں کے آگے جھللاہٹ۔ دھندلی نظر سیاہ یا بھورے دھبے نظر آئیں۔ چیزیں یا تو دگنی نظر آئیں یا چھوٹی۔ آنکھوں میں ریت یا لکڑی کی کڑیوں کا احساس۔

کونیم۔ جس وقت کسی چیز کو دیکھا جائے یا چھوٹی سے چھوٹی چیز پر نظر ڈالی جائے نظر جھپکے لیکن جو نہی نظر چھڑائی تو سب کچھ دھندلا اور گڑبڑ محسوس ہوتی کہ مضبوطی سے چیزوں کو پکڑا جائے۔ لائیں حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوں۔ چیزیں سرخ نظر آئیں۔

کیوپرم میٹ۔ اخراجات کے دہنے یا پھوڑے پھندیوں کی وجہ سے اندھاپن اس کے ساتھ تشخ بھی ہو سکتا ہے۔

فیرم میٹ۔ رات کے وقت چیزوں کو اندھیرے میں دیکھنے کی اہلیت۔

کاربونیم سلف۔ ہر چیز دھندلی سی نظر آتی معلوم ہوں۔ جیسے کہ چیزوں پر مڑی کا جالا تنا ہوا ہو۔ بن یا سرخ۔ دانیں آنکھ کا اندھاپن اور بانیں آنکھ کی نظر کی بہت کمزوری کے ہمراہ۔ عصب بنیائی کی لاغری۔

ایسڈ فاس۔ دور کی نظر کی کمزوری۔ آنکھوں کے آگے سیاہ پٹیاں اور صرف قریب پڑی ہوئی چیزیں حرکت کرتی معلوم ہوں۔

نوٹ:۔ مندرجہ بالا اندرونی استعمال کی ادویات کے علاوہ دوزخ ذیل آنکھوں کی درزشیں کرنے کی سفارش کی جاتی ہے تاکہ نظر کو اچھا کیا جاسکے۔

(۱)۔ ہٹانے دھونے کے بعد آنکھوں کو ٹھنڈے پانی میں کھولا اور بند کیا جائے۔

(۲)۔ دن کے کسی وقت آنکھوں کو جان بوجھ کر چھپکا جائے خاص طور پر رات کو دیر تک آنکھوں پر دباؤ پڑنے کے بعد۔

(۳)۔ آنکھوں، پتھروں کے نیچے آہستہ آہستہ پھینچنا دن کے خاتمہ پر۔

(۴)۔ آنکھ کے گوشوں میں آنکھوں کو متواتر ہلانا۔

ایک کے دو نظر آنا

کاسٹیکم۔ آنکھ کو دائیں طرف گھمانے سے ایک چیز کو دو دیکھے۔

جیلسیم۔ آنکھ کو کسی بھی گھمانے سے ایک کے دو نظر آئیں۔ لیکن سر کو بیدھا کرنے پر ایک نظر آئے۔ آنکھ کے بالائی پتھر کا نالیج بھی ہو سکتا ہے۔

ہائوسائیمس۔ نظر کا دھوکا مریض ایک کے بجائے دو دیکھے۔

الیومن۔ موم بتی کی روشنی میں چیزوں کو دوہری دیکھے۔ پیپ دارا شوب چشم۔ آنکھوں کی متواتر دھکن۔

سینیکا۔ دوہرے نظر آنا پتھر کی طرف جھکانے سے آفاقہ۔ دونوں آنکھوں سے دیکھنے پر دوہرے نظر آئے لیکن جب ایک آنکھ سے دیکھے تو ٹھیک نظر آئے۔

گرفیائیس۔ جب لکھے تو الفاظ دوہرے نظر آئیں۔ الفاظ ابیس چلیں جب مطالعہ کریں۔ پلیم۔ جب دونوں آنکھوں سے دیکھے تو دوہرے نظر آئے۔ لیکن جب ایک آنکھ سے دیکھے تو صحیح نظر آئے۔

سٹرامونیم۔ الفاظ یا چیزیں دوہری نظر آئیں۔

دریہم درمید۔ ایک کے دو نظر آئیں۔ سر میں اجتماع خون کی وجہ سے سر درد کے برابر۔
 آدم فولیٹم۔ ہر چیز دہری نظر آئے ایک چیز دوسری میں گڈمڈ معلوم دے آنکھوں میں شدید دباؤ
 آدم میٹ۔ دہری چیزیں نظر آئیں اور چیزیں ایک دوسری میں ملی جلی معلوم دیں۔
 چیزوں کا رنگ دار نظر آنا۔ نظر کا دھوکہ

بایوسائٹس۔ آنکھوں کے آگے سُرخ دھبے۔
 روتا۔ موم بجی کی روشنی سرخ ہالے سے گھڑی ہوئی محسوس ہو۔
 تھوجا۔ آنکھوں کے آگے تنگے اترتے نظر آئیں
 اٹروپن۔ جس کی چیز پھٹی دیکھے سایہ نظر آئے۔ نظر کے دھوکہ کو ٹھیک کرے ہر چیز اپنے
 قد سے بڑی نظر آئے۔
 سائیکلیم۔ آنکھوں کے سامنے آگ کے شعلے اور چمکدار شرارے۔ آنکھوں کے جلنے
 اور جھلمانے کی وجہ سے پڑھ کر نہ سکے۔ دُھندلی نظر۔ چیزیں جیسے کہ دھوئیں اور دُھند میں نظر
 آئیں۔ ایک کے دو دکھائی دیں۔

امونیم کارب۔ آنکھوں کے آگے زرد دھبے نظر آئیں۔
 فاسفورس۔ آنکھیں بند کرنے پر آگ کا سمندر معلوم ہو۔ مطالعہ کے وقت الفاظ سرخ معلوم ہوں۔
 سلفر۔ سیاہ دھبے آنکھوں کے آگے تیری یا قریب کی چیزیں کافی دور معلوم ہوں۔
 بیلاڈونا۔ آنکھوں کے آگے شعلے۔ آنکھوں کے آگے تیز روشنی۔ چیزیں لمبی یا کٹی نظر آئیں۔
 سیڈرن۔ چیزیں رات کو سرخ اور دن کے وقت زرد نظر آئیں۔
 سٹرونیئم۔ چیزیں سیاہ کی بجائے سرخ نظر آئیں۔ چیزیں بہت چھوٹی نظر آئیں۔
 پتیزن سیاہ۔ ڈیڑھی میٹرھی دور اور ترھی نظر آئیں۔
 ایلنٹھس۔ رات کے وقت آنکھوں کے پوٹے بند کرنے پر آنکھوں کے سامنے چمکدار روشنی۔
 ارجنٹم نائیٹرکیم۔ مجھ سے دور اور اہم آنکھوں کے سامنے سے اترتا ہوا صورت آنکھوں کے سامنے
 سے گزریں۔

آدم میٹ۔ ایک کے دو نظرائیں اور دوسرے میں گھس جائیں حب چیزوں پر دیکھے تو شدید درد۔ آنکھیں بند کرنے پر کم تکلیف یا درد میں افاتہ۔

نایٹرک ایسڈ۔ آنکھوں کے آگے سیاہ دھبے ناچیں۔

دریٹم ورائیڈ۔ بڑے بڑے بنز دائرے موم بنی کے ارد گرد ظاہر ہوں جو پکڑ آئے پر کسرخ بن جائیں۔

الیومنا۔ موم تہی کے گرد زرد مار۔ آگ جیسے دھبے دیکھے بغیر تارے۔ جیسے کہ دُھند یا پر میں سے دیکھے۔

کالی کارب۔ آنکھوں کے آگے بہت سے رنگ یا مختلف رنگ اور چمکدار دھبے چیزیں زرد پر دسے میں لپٹی ہوئی معلوم ہوں۔

مرکیورس۔ دائیں آنکھ کے آگے ہمیشہ سیاہ کپڑے یا مکھیاں مارتی نظرائیں۔ آنکھوں کے اندر دُھند۔ نظری کمزوری یا دُھندلاہٹ۔ آگ کی روشنی کو برداشت نہ کر سکے جو بچکا چوند ہو۔ سپیا۔ آنکھوں کے آگے آگ کے دھبے جب روشنی پر دیکھے جھللائے۔ آنکھوں کے آگے سیاہ دھبے۔ آگ کے ٹیرے میڑھے شعلے۔ رنگوں کا پڑ پچ بھگمٹا۔

سنا۔ نظر زرد۔

گرینفائٹس۔ جب لکھے تو الفاظ دہرے معلوم ہوں، وہ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں جس وقت مطالعہ کریں۔

میڈیریم۔ آنکھوں کے آگے جھللاہٹ۔ دُھندلی نظر۔ سیاہ یا بھوسہ دھبے آنکھوں کے آگے ایک کی دو چیزیں نظرائیں۔

دیکھے آنسو۔ آنکھوں سے پانی بہنا۔



یہ تھا باب

کانوں اور سُننے
کی
نیمساریاں

جلن۔

آرم میٹ۔ جب ٹھنڈی ہوا میں چلے تو کانوں میں جلن ہو۔
 سینگوینریا۔ سرخ رخساروں کے کانوں میں
 مرک مال۔ جلن گہری بائیں کان میں زیادہ۔
 امونیا میور۔ جب ٹھنڈی ہوا میں چلے تو کانوں میں جلن۔
 اگرکیس مس۔ کانوں میں جلن، سرخی اور خارش جیسے کہ شدید ٹھنڈی زد میں ہوں۔
 بہرہ پن۔ (دیکھیے چکڑا)

کالی میور۔ بہرہ پن کے لئے عمومی دوا ہے۔
 ہیمپلر۔ کان میں سوراخ یا پھوڑے کی وجہ سے بہرہ پن۔
 فیرم پیکریم۔ مقلوں کی وجہ سے یا شور والے علاقے میں رہنے کی وجہ سے اعصابی
 بہرہ پن۔ خون کی نالیوں میں تبدیلی کے بغیر۔ نالیوں کا بہرہ پن۔
 مرک ڈلس۔ بڑی عمر کے لوگوں میں نزلاوی بہرہ پن اور کان و حلق کے درمیان
 نالی میں رکاوٹ سے۔ بخار موسم میں زیادتی۔
 سکوناد اوروسا۔ دماغ کی جھلیوں کے درم کی وجہ سے بہرہ پن
 ہائیڈروسائٹک الیڈ۔ کافی عرصہ تک ہر ہفتہ ایک خوراک بدل بدل کر دینے۔
 پائیلو کار پیٹم۔ جب کان کے اندرونی حصہ میں خرابی کی وجہ سے بہرہ پن ہو۔ شور میں جیسے
 کہ گاڑی میں اچھا سنائی دے۔

گرنفائٹس۔ ایسا بہرہ پن جس میں شور کے اندر اچھا سنائی دے۔
 میگزیم۔ کان میں اگر میا کے بعد یا جب مزمن نزلا کی وجہ سے۔ کان اور حلق کے
 درمیان نالی میں رکاوٹ سے کان کا پردہ کھینچا ہوا یا زخم زدہ۔ پردہ کی بھلی موٹی ہوئی ہو۔ ہر

کھانے کے بعد یا پہلے ۳ طاقت کی ایک خوراک دیجئے۔ جب بہرہ بن اگزیا کے دہنے کی وجہ سے ہو تو خالی معدہ صبح کے ایک خوراک دیجئے۔

پلسٹیلہ۔ سردی کی وجہ سے یا چھپک کے بعد یا سرخ بخار کے بعد، غدار موسم میں زیادتی نزلہ کی وجہ سے کان اور ملق کے درمیان نالی کی بندش یا رکاوٹ، کوئین کے غلط استعمال سے آیوڈم۔ کان اور ملق کی نالی میں رکاوٹ کی وجہ سے نیچر میں تکلیف اور گلے بیٹھنے کیساتھ بریٹاکارب۔ کم سنائی دے اور جھٹنے کی آوازیں۔

کالی آرسینکیم۔ کئی سال پرانا بہرہ بن۔

میٹھائیس۔ مزمن بہرہ بن یا پیدائشی بہرہ بن اس سے ٹھیک کیا جاسکتا ہے۔ ۲۰ طاقت سے علاج شروع کر کے اونچی طاقت تک استعمال کیجئے۔ یہ کم از کم ۶ ماہ یا ایک سال تک دی جانی چاہیئے۔ ٹیوبرکولینم کی ۲۰۰ x طاقت کی ایک خوراک ہر ماہ دینی چاہیئے بطور عمل انجیکٹ۔ اس سے دودن پہلے اور دودن بعد کوئی دوسری دوائی ہرگز نہ دی جائے۔

ورسیکم۔ کان میں رکاوٹ کی وجہ سے بہرہ بن۔ محسوس کرے کہ کان ڈھانپا ہوا ہے۔ کاسٹیکم۔ جب غدار موسم میں اچھا سنائی دے۔ کان کے اعصاب کے فائدے کے لیے جو ہے مہر بن۔ سلیشیا۔ بہرہ بن جس کی زیادتی غدار موسم میں ہو

لیڈم۔ کان سے بہتے ہوئے مواد (زکام) کے دہنے کی وجہ سے بہرہ بن۔

دسکالیم۔ نزلہ دی بہرہ بن کانوں میں آواز کے ہمراہ۔

آرسینکیم آیوڈ۔ بہرہ بن جس کے ہمراہ افسردگی ہو جس کی زیادتی رات کے وقت ہو۔

میگنیشیا کارب۔ بہرہ بن جو ڈیریا ٹھنڈکی وجہ سے ہو۔

میڈورینٹیم۔ تقریباً دونوں کانوں کا مکمل بہرہ بن۔ نیم بہرہ بن یا غیر مستقل بہرہ بن۔

محسوس کرے کہ دائیں کان میں کیراٹھک رہا ہو اور کان کی نالی کی اندرونی دوار میں سوراخ کراہے۔

سلیسیک الیڈ۔ کانوں میں آوازوں کے ساتھ بہرہ بن کان کے عصب کے پکڑ کے ساتھ۔

فاسفورس۔ بہرہ بن خاص طور پر انسانی آواز کے لئے۔

چھینو پو پو ایتھھر۔ زیادہ اونچی آواز نئے لیکن انسانی آواز کے لئے تقریباً بہر انسان کی آواز اچھی طرح نے جب کار یا پشور بس میں سوار ہو۔ ناموش کرے میں رگسن سکے۔
لو بیلیا الفلیٹا۔ اخراجات کے دینے یا اگزیما کے دینے کی وجہ سے بہرین۔
گلے میں گولی لگنے جیسی درد۔

در طیم ایلیم۔ بہانے کا بہرین۔

اخراج۔ کان کا درد دیکھے کان کا بہنا۔

اکونائٹ۔ سردی سے کان درد

پلسٹیل۔ جب اکونائٹ ناکام ہو جائے اور گاڑھا سادہ اخراج زردی مائل (نردیا بی نائل) کانوں سے نکلے۔

بیلڈونا۔ کھودنے والی۔ سوراخ کرنے والی اور پھارنے والی درد جو اچانک آئے اور شدید ہو۔ یہ دوائی اس درد کے لئے جو پلسٹیل کے لئے شدید ہو۔

سیلشیا۔ کان سے بدبودار پیپ کا اخراج جس کے ہمراہ ہڈیوں کا گلنا سڑنا اور ہڈیوں کے پھوٹے پھوٹے ٹکڑے۔

ہیمپسلفر۔ جب کانوں میں پھنسیاں اور پھوٹے ہوں۔

اکلیا سیکٹا۔ جب ناقابل برداشت درد ہو۔ ناک صا کرتے وقت پھینکتے وقت اینٹھن دار درد کیو میللا۔ ناقابل برداشت درد ہو جو گرمی سے زیادہ ہو اور رات کے وقت زیادہ ہو تقریباً پنجوں کے کان درد کے لئے مخصوص دوا ہے۔

جیلیمیم۔ موقوتی حیض پر کان درد۔ کلن بھرے ہوئے اور گرم محسوس ہو۔

ٹیزنٹولا اسپانیہ۔ جب جھپٹا ماتی ہوئی کان درد بچکی کے ہمراہ۔

کالی میور۔ کان کے غدود سو جے ہوئے۔ کرکر کی آواز جب کوئی چیز نکل جائے۔

میگنم۔ جب درد کان سے نکل کر دانت تک پہنچے۔

سپائیجیلیا۔ جب کان کی میل کے جمیع ہونے سے جو کان کے اعصابی ٹٹے کو دبائے۔
کیپسیکم۔ کان در درات کے وقت شدید ہو چکی دار چھوڑا۔ کان کے درمیان حصہ
کی سوجن۔ کان کی جگہ کے پھٹنے کے ہمراہ کپنی کی ہڈی کے بنیادی حصہ کی دھکن اور پھٹنے والا
سر درد کے ہمراہ اور سردی۔ کان گرم درد گھٹے تک جائے۔

اومیم۔ جب تک صاف کی جائے تو کان درد ہو۔

میگنیشیا فاس۔ خالصتاً اعصابی کان درد کے لئے مفید ہے۔

آرم آر سینکم۔ کان سے بدبودار، گندہ پیپ دار۔ گاڑھا زرد اخراج۔ کان درد
کان کے پیچھے۔ کان کے اندر جلن اور جھین دار در دیں۔ بہت اچھی طرح سنائی دے لیکن
بعد میں کم سنائی دے لیکن آخر کار بالکل ہی نہ سنائی دے۔

ایتھوزا۔ کان میں انگلی ڈالنے یا انگلی سے کان کے سوراخ کو چوڑا کرنے پر رافقہ۔

شور

کالی میور۔ گٹھی کے چلنے شور اور پرندوں کی آوازوں کیلئے چوٹی کی دوائی ہے نکلنے
پر یا ناک پر جھٹنے والی درد اور کرکرن۔

کالی آئیوڈ۔ گانے اور سول سول کی کانوں میں آواز جیسے کہ جھٹ پر بارش برس بری
ہو یا قریب دریا بہ رہا ہو۔

کالی سلف { جب اتنے وقت کانوں میں شور۔
بریا میور

کریوزٹم {
پٹرولیم۔ دوران حیض کانوں میں شور۔

لیڈم پال۔ کان میں گھنٹیاں بجنے یا طوفان کی آواز جیسا شور کانوں میں ہر طرح کی گرم۔

فیرم میٹ

دریڑم ایلم [خون حیض آنے سے پہلے کانوں میں شور۔

الیومنا۔ جب اتے وقت کانوں میں کرکر کا شور۔

ایلو۔ اچانک چٹنا اور کرنا بائیں کان میں بستر میں جانے سے قبل جیسے کر شیر ٹوٹے

ایک خاص علامت ہے۔

وکلم الہم۔ کانوں میں شور نزلادی بہرہ بن کے بہراہ۔

نایٹرک الیڈر۔ کانوں میں گرج۔ جب چبائے تو کرکن۔

مانسنیلا۔ محسوس کرے جیسے کہ کان بند ہوں۔ گھنٹیاں بجنے۔ گرجنے اور ڈھول کی

آواز جیسا شور اور کان میں آوازیں۔

میورٹیکم الیڈم۔ کانوں میں سن کی آوازیں اور شور۔

گرافیاٹیلس۔ دھماکہ یا بندوق کے سطلے جیسا شور۔

بمریڈ ایکرب۔ جب ناک صاف کرے تو شور کی گونج۔ دھماکے دار شور بہرہ بن کے بہراہ۔

کینابلس انڈیکا۔ کانوں میں شور۔

ڈاکامارا۔ رات کے وقت کانوں میں ہنسنے کا شور۔

کاسٹیکم

لائیکولوڈیکم

فاسفورس

سیپیا

گونج اور صدائے بازگشت
اپنی ہی آواز کی گونج سنے
اور صدائے بازگشت سنے

کان درد

کان درد بھی دیکھئے۔ کان کے اخراجات۔

کالی بائیکرومیکم۔ جب کان کا اخراج پچکنے والا ہو۔

ہمپسلفر۔ جب کان میں بھوڑے کی وجہ سے اخراج ہو کان میں سوراخ بھی اس سے

ٹھیک ہو جاتا ہے۔

سورائینم۔ جہاں مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دی جائے۔ کان بدبودار اخراج
آرم میٹ۔ جہاں کان سارا دھول ضائع ہو جائے یا ہڈیوں کا گلن ہو۔ گندی بدبودالا مواد
خارج۔ کان میں جھنجھٹا ہٹ اور سرسبٹ کے ساتھ کان میں اخراج۔

ٹیلیویریم۔ اس کی ۶ طاقت بہت دیر تک دینے کا کان بہنا ٹھیک ہو جاتا ہے جبکہ زیادہ
طاقت ناکام ہو جاتی ہے۔ بدبودار اخراج پھیلی کے چورے جیسی بدودالا خون کے ساتھ ہلا ہوا۔
پتلا اور پانی جیسا اخراج جو پھیلنے والا اور جلن دار ہو۔

پلمیٹیل۔ جب اخراج سادہ ہوزرد یا ہنری نائل رنگ کا ہو۔
گرفیٹس۔ چکنے والا۔ بدبودار چٹنے والا۔ شہد کے رنگ کا جلد کو پھیلنے والا
جہاں جلد پر نگے مریض ٹھنڈے اور رنگا ہونے سے زیادہ مواد کے اخراج میں اور نائلسز
میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

سکارلٹیم۔ جب سرخ بخار کے بعد اخراج ہو۔
سٹریپٹوکوکین۔ جب سٹریپٹوکوکین کے اثرات کی وجہ سے اخراجات ہوں ۲۰۰ قات
میں دیتے۔

گیرٹنز۔ متعفن حالات میں جبکہ بچہ پتلا کمزور اور ڈھیلے ڈھالے بچوں والا اور زرد
چہرے والا، ذہنی طور پر بے چین۔ اندھیرے میں اور کیلا ہونے سے ڈرے۔
ہائیڈرٹس۔ پیپ دار پیپ کا اخراج جس کے ہمراہ یا جس سے پہلے تمام بطنی عضلات
سے نزلہ ہو۔

وائیولا اوڈورٹیا۔ کانوں میں جھنجھٹا ہٹ اور گدگدی۔ ر کے ہونے اخراج کو بچہ
شروع کر دے یا اخراج کو چند دنوں میں ٹھیک کر دے (دونوں کانوں سے اخراج بہترین
کے ہمراہ مدرنگچر کی ایک خوراک میچ کر دے۔

کلکیریا کارب۔ سفید رنگ کا پیپ دار وسادہ اخراج۔
سیلشیا۔ ہڈیوں کے ناسور کی وجہ سے بدبودار اخراجات۔ ان میں ہڈیوں کے

چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔

مرکیوس - درمیان کان سے پیپ کا بہاؤ، پتلے اور پھیلنے والے اخراجات خاص طور پر
آتش کی نوعیت کے۔ ٹانسلز کی سوزش کی وجہ سے کم سائی دے۔ زیادہ مقدار میں بنزہ گاڑھی،
خراشدار۔ پیپ دار اور بدبودار اخراج کانوں سے۔

ایتھنوزا - دائیں کان سے زرد اخراج جھنجھنے والی درد کے ہمراہ جس کو کان میں انگلی ڈال
کر بلانے سے افادہ ہو۔

نایٹرک ایسڈ - کانوں سے زردی مائل سفید اخراج۔ آنکھوں سے آنسوؤں کے ہمراہ
پھولا ہوا چہرہ اور گھوٹے کے پتیاں جیسی بدبودار۔

سینی کولا - مچھلی کے ہکین پانی کی طرح کا کان سے اخراج۔

ایپس کورٹیس - کانوں سے زرد یا بنزہ اخراج کان سے۔

کلکیر یا سلف - کانوں سے بدبودار اور پیپ دار اخراج گاڑھی اور خون آمیز پیپ کے ہمراہ۔

کاربوئیم سلف - کانوں سے خون آمیز۔ بدبودار۔ ناگوار اور پیپ دار اخراج۔ کان سرخ
کانوں کے پیچھے پھنسیاں۔ کانوں میں شور۔

کالی آئیوڈ - کان سے کافی مقدار میں گاڑھا بنزہ اخراج۔ مریض گرم ہوتا ہے جو ٹھنڈی
افادہ محسوس کرتا ہے۔

کان کے پردہ میں سوانح

سیلشیا ۲۰۰ - ہر پندرہ دن کے بعد یہ دوا دی جائے۔

ہیرسلفر - یہ چار چار گھنٹوں کے وقفوں سے چار دفعہ دی جائے سوانح سیلشیا والے

دن کے یہ کافی لمبے عرصہ تک یعنی چھ ماہ سے آٹھ ماہ تک دی جائے۔

میل -

کوئیم - کانوں میں میل کا اجتماع۔

پانچواں باب

ناک اور گلے کی بیماریاں

ہنجرہ - حلق - گلا - اور - ناک وغیرہ !

تاک - غدود نما -

بسیلینم - اس دوائی کے ساتھ علاج شروع کرنا چاہیے اور ہر پندرہ دن کے بعد ۲۰۰ طاقت کی ایک خوراک دی جانی چاہیے۔ دوسری علامات کے مطابق ادویات کے ہمراہ جس دن یہ دوائی دی جائے اور اس کے دو دن پہلے یا دو دن بعد کوئی دوائی نہ دی جائے۔ اگر لیفنس نیوٹیس - غدود نماؤں کے لئے بہترین دوائی ہے یہ ۲۰ طاقت میں دی جانی چاہیے۔

کلکیر یا کارب - زرد موٹے بچوں میں جلن کے پاؤں ٹھنڈے اور رات کو سر پر پسیہ تے کلکیر یا فاس - پتلے اور کزن بچوں - زرد چہرے والوں - ہومیو پیتھک میں اس کی بہت سفارش کی جاتی ہے۔ بچہ جو جڑا اور خدی ہو، بغیر کام کے پھینکے۔

کلکیر یا ایوڈ - بعض کیسوں میں اچھی یا سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ مرک آئیوڈ - ایک اور دوائی جو غدودوں کے علاج میں یاد رکھنی چاہیے۔

ٹائیڈراسٹس - غدودوں کے لئے مخصوص دوائی۔ بلغمی جھلی زرد اور اس کی بہت زیادہ لمبائی بریٹا آئیوڈائیڈ - اگر بچہ ذہنی طور پر کمزور ہو تو غدودوں کے لئے بہت کارآمد دوائی ہے۔ ٹیسٹس کین - کٹھنڈالا یا بچہ یا خنزیر کی سوزش اور گے کے غدود سے پیسہ آنا۔ کوئے کے بچے شدید جلن، خشکی و درد کرنے کے لئے ننگے

بیرونی علاج

ٹائیڈراسٹس مدرنگر ۱۰ گرام

خالص کلیرین ۴۰ گرام

مندرجہ بالا آمیسو سے اچھی طرح بھگوئے ہوئے روئی کے پھائے یا بڑے رات

کو سوتے وقت ناک میں دیئے جائیں یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے اور یہ غدد دونوں کو کمزور کر دیں۔

ناک سے خون بہنا

برائی اونیہا۔ یہ شاندار دوائی ہے سب سے پہلے دی جاتی ہے۔

علی فولیم۔ یہ نیکیر کی عمومی دوائی ہے جبکہ اس کی وجہ معلوم نہ ہو اور جب برائی اونیہا ناکام ہو جائے۔

ٹریلیم۔ ناک سے خون بہنے کے لئے شاندار دوائی ہے۔ جبکہ خون چمکدار سرخ یا گہرا ہو اور لوٹھڑے دار ہو۔ اس کا مدد کچھ ہوتے ہوئے خون کو جو ناک یا دانت میں سے بہہ رہا ہو اس کو بند کر دے گا۔

آرنیکا مانٹ۔ جب چوٹ کی وجہ سے ناک کا ٹھنڈا پن۔

امونیا کارب۔ صبح کے وقت منہ دھوتے وقت ناک سے خون بہنا۔

گرفیٹائٹس۔ جب خون نکلنے سے پہلے چہرہ اور کے ہمراہ گردن پر سرخی ہو یعنی سر کی طرف خون کا اجتماع ناک سے خون بہنے کے ہمراہ۔

کوکولس۔ گہرا تاردار خون۔

ہیما میلنس۔ جب خون گہرے رنگ کا ہو۔

میلی لوٹس۔ چہرے پر سفید اور شدید سرخی۔

فاسفیورس۔ اکثر اور کافی زیادہ خون بہنا۔ خون بہنے والی طبیعت یا رجحان۔

آرم ٹریٹلم۔ متواتر ناک کو چھپڑتے رہنا حتیٰ کہ خون بہنا شروع ہو جائے۔

وائیرا۔ ناک سے خون بہنے کی بڑی دوائی اگرچہ بہت مدت سے خون بہہ رہا ہو۔

فیڈرم سلف۔ حیض سے پہلے حیض کے دوران میں اور بعد میں ناک سے خون بہے۔

کروٹیلنس میور۔ بوڑھے اور تباہ شدہ صحت والے لوگوں میں ناک سے خون بہے جب

دوسری ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دی جا سکتی ہے۔ خون میں نقص سپرہ پر سنی کے ہمراہ چکر اور بے ہوشی۔

امونیم میور۔ نٹھنوں سے خون کے پھیلنے۔

اگر کیس۔ ناک صاف کرتے وقت خون بہے۔

یوپی اوٹم۔ ناک سے خون بہے جب حیض رگ جائے۔

آرسینک ایلیم۔ ناک سے بہت خون بہے۔ جلد درد اور ایمان کے ساتھ۔

ایکھجور دی۔ چمکدار سرخ خون اور جسم کے ہر حصہ پر اجتماع خون کیلئے مخصوص درائی ہے۔

پلسٹیل۔ دبے ہوئے حیض کے ساتھ ناک سے بہنے کے لئے کارآمد درائی

ہے۔ ناک میں رکاوٹ اور سوزش، ذائقہ اور بو جاتی رہے۔

مرک مال۔ ناک کی درد کرنے والی سوزش۔ گندی ناک والے بچے۔ اکثر اور

بہت زیادہ نکیر۔

تھلاپی برسا۔ آہستہ ناک سے خون بہے۔ ناک کی جڑیں معمولی درد۔ خون اور مواد

کافی بہہ جانا۔

بووسٹا۔ صبح سویرے ناک سے خون بہے۔ ناک اور سر میں گرلہ۔

رسٹاکس۔ رات کے وقت ٹیٹھا کھٹے ہونے پر۔

زکام۔ ٹھنڈ۔

دیکھئے زکام حاد و مزمن۔ بخار کا ہی اور آنک۔

اگر کیس۔ بغیر زکام کے ناک سے صاف پانی بہے۔

نیرٹم میور۔ پانی کی طرح کے شفاف اخراجات جو آلہوں کی طرح کی چھنیاں

پیدا کریں۔ ذائقہ اور بو جاتی رہے۔

الکونائٹ۔ شروع میں یہ بہترین دوائی ہے، لیکن یہ حالت بغیر علاج کے گزر جاتی ہے۔ ابتدائی درجہ مریض بخار میں مبتلا ہوتا ہے اور ناک میں خشکی اور بھنجنا سہٹ کے ساتھ بے چینی۔ برائی اونیہ۔ سر میں اجتماع خون کے ساتھ ناک بند۔ ناک سے سانس نہ لے سکے۔ چھاتی میں خشک کھانسی کے ساتھ درد فلو کے لئے شاندار دوائی ہے۔

فیرم فاس۔ سردی زکام کے لئے مخصوص ہے، ابتدائی درجہ اور ۲۰ x ۲۰ قش دی جائے۔ جیلسمیم۔ ناک سے سادہ گاڑھا مواد بہنے کے لئے اچھی ہے۔ اس میں چھینکیں، سرد درجہ کمر میں ٹھنڈک اور مسلسل درد مریض سست اور کمزور ہوتا ہے۔

آرسینک البم۔ اس میں پانی کی طرح جلد ار اور پتلے اخراجات چھینکیں اور جیلسمیم کی طرح بازوؤں میں دردیں۔ فلو کے لئے بہترین دوائی ہے۔

کاربوووج۔ معدہ کی خرابی کی وجہ سے زکام۔ جب زیادہ گرم کمرے میں جائے تو چھینکوں کے ہمراہ زکام۔

ایلمیم سیڈیا۔ جب ناک سے جلن دار پانی اور آنکھوں سے سادہ پانی بہے۔ ٹھیلوں کی دکھن اور تھکاوٹ محسوس کرے۔ کھلی ہوا میں آفتادہ اور گرم کمرے میں زیادتی۔ پھولوں کی خوشبوؤں اور حسین لڑکیوں کے لئے محاسن۔

یو فریزیا۔ ایلمیم سپا کے الٹ۔ دونوں میں آنکھوں اور ناک سے مواد کا اخراج۔ یو فریزیا میں آنکھوں سے اخراجات جلد ار اور ناک سے سادہ۔

سورائینم۔ اس دوائی کے متعلق مزین زکام میں سوچنا چاہیے اور ا۔ ایم طاقت میں دی جانی چاہیے۔ اگر بہتری ہو تو کوئی دوسری دوائی دینے کی ضرورت نہیں۔ ناک سے پانی کا سا اخراج۔ گرد اور تباہ کو کے دھوئیں سے زیادتی۔ ناک میں گد گدھی اور خارش۔

لائیکوپریکیم۔ گھر سے باہر زکام میں زیادتی۔ اسپیکاک۔ دم گھٹنے کے دوران کے بعد زکام۔ زکام سے آواز کا مکمل جاتے رہنا۔ بخور کی آواز کی جھیلیوں میں اجتماع خون۔

لیٹھا مائینر۔ مزمن زکام جس کے ساتھ ناک کے پچھلے حصہ میں نزلہ لگا کرنا۔ ناک کا گوڑا
اور ناک کا بند ہو جانا۔

ڈولکا مارا۔ خشک زکام تھوڑی سی کھلی جگہ میں جانے سے زکام ہو جائے۔ جھگنے
سے یا انداز جگہوں پر رہنے سے کھلی ہوا اور رات کے وقت زیادتی۔ ٹھنڈے، انداز
موسم میں ناک بند ہو جائے۔

پلسٹیل۔ جب ناک سے گاڑھا زرد مواد ہے۔ یہ عموماً پتے ہوئے زکام کے لئے
مفید ہوتی۔ پیاس کا نہ ہونا اس دوائی کی نمایاں علامت ہے۔ زکام جس کے نتیجہ کے طور
پر بڑا اور ذائقہ جاتا رہے۔

آرسنک آئیوڈ۔ یہ دوائی آرسنک آلبم کے آخری درجوں میں مفید ہوتی ہے۔
دونوں دوائیوں میں فرق کمی و بیشی کا ہوتا ہے۔ جبکہ آرسنک آلبم کا مریض گرمی میں یا گرم پیشیا
میں افادہ محسوس کرتا ہے۔ اور آرسنک آئیوڈ کا مریض گرمی سے شدت محسوس کرتا ہے۔

مائینڈرائسٹس۔ اس دوائی کے تحت مواد گاڑھا۔ نہ بہنے والا۔ رسی دار۔ زرد خون
آمینر اور جلن دار ہوتا ہے۔ ناک میں پھنسیاں یا ناسور ہو سکتے ہیں۔ کھلی ہوا میں افادہ ہوتا ہے۔
ناک بند۔ رسی کی طرح کا مواد ناک کے پچھلے حصہ سے گلے میں کھینچا جاتا ہے۔
سنا برس۔ مزمن زکام کے لئے۔

سمبل۔ ناک اور حلق کا زکام۔

سینکونز یا نائٹ۔ ناک کے پچھلے حصہ کا زکام۔ سانس کی نالیوں اور منہ
کا مزمن زکام۔

گلکیر یا سیلف۔ زکام کے پرانے کمیں۔ کھلی ہوا میں افادہ۔ خشک زکام۔ ناک سے
خون آمینر، پھیلنے والا، بدبو دار۔ پیپ دار، گاڑھا، زرد یا سبز مواد خارج ہو۔ ناک سے
گندی بدبو۔

مرک کار۔ ناک کا زکام۔ گاڑھا۔ جلندار، چپکنے والا۔ اور خراش دار۔

تھیرڈون - ناک کے زکام - خُدی - کارٹھے زرد یا بنری اُبل زرد اخراجات - پھینکنے کے شدید درد
سیلشیا - پاؤں کا پسینہ دہنے کی وجہ سے زکام ناک -
سائپس نائیکرا - حاد زکام جھینکوں اور آنسوؤں - ناک اور آنکھوں میں جلن - ناک میں خشکی یا
 جلن دار اخراجات -

آئیوڈم - گاڑھا بنری اُبل بنر مواد کا ناک سے اخراج - یہ جلاتا ہے اور پھیلتا ہے - مریض
 فوراً ہی لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے - جب تک تکلیف ہوتی ہیں اور بہت بھوکا ہوتا ہے - دماغ کی
 کھوٹری میں ناک کی نالی میں سوزش - سونگھنے کی حس کا ختم ہونا - ناک اور حلق کی نالی کا بند ہونے
 کی وجہ سے بہرہ بن - گلا بیٹھ جانا - ٹانسو کا بڑھنا - جھوٹی خشک جھونکنے والی کھانسی - آ رہنے
 جیسا تنفس - جلن اور دم گھٹنا -

کالی ہائیڈرو آئیوڈ - گاڑھا زردی اُبل اخراج - گرم کرے میں زیادتی - ناک میں پکا
 زخم اور جلن - بیرونی ناک دبانے سے بہت دکھے - سارا چہرہ درد کرے اور مریض بہت بے چین
 ہوتا ہے - کھلی ہوا میں چلنا چاہے - جو لے تھکاتی نہیں - اسے بری نہیں لگتی -
 نکسو امیکا - گرم کرہ میں ناک بند ہو جانا -

کاجوپٹم - تھوکنے کا مسلسل حیران - کافی مقدار میں سفید گاڑھے مواد کو تھنوں سے
 حلق کے راستے کھینچے -

نایٹرک الیڈ - ناک کا نزلہ، ناک میں شدید خارش اور نیش کے ہمراہ - اخراج جلن دار
 پانی جیسا رات کے وقت زرد - بدبودار - جلانے والا - اوپر کے ہونٹ کی سوزش کے ہمراہ
 ہر سردی کے موسم میں زکام - جو نہی ایک زکام سے آرام کرتا ہے مدد آلیتا ہے -
 کافیا -

سلس کینا - مزمن ناک کا نزلہ - زیادہ مقدار اور شدید پھیکیوں کے ہمراہ جو سرد موسم میں
 شدید اور ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے زیادتی - پیسہ کی زبردست خواہش - بلغمی جھیل پر اثر کرے
 جو گاڑھا، زرد اور بدبودار مواد خارج کرتی ہیں - پرانا اور تکلیف دہ زکام - ناک اور پھپھائی کو مٹا

کرنے کے بعد زخمی محسوس کرے۔ جب چھاتی اور ناک دوبارہ مواد سے بھر جائیں تو افاقہ ٹھکی ہو۔
 میپیا۔ خشک زکام۔ نختے دکھیں۔ سوچے ہوئے، پھوڑے پھنسیوں والے، بڑے بڑے
 بند کرنے والے مواد کا اخراج، شور سے گاتے اور خوشبوؤں سے بہت حساس۔ چیزوں کے
 پکنے کی بو سے جی تھلائے۔

انٹیم ٹارٹ۔ چھاتی کا زکام جو سردی آنے پر سفید بلغم کے اخراج۔ کمزوری پسینہ اور ٹھنڈ۔
 چہرہ کی زردی نیلا ہٹ کے ساتھ۔

میسر پلفر۔ ناک۔ کان۔ گلا پنجرہ اور چھاتی کا زکام۔ کوئی بھی بلغم جھلی اس سے مستثنیٰ نہ ہو۔
 زرد اور بدبودار اخراج نزلہ پھینکیوں۔ جب ٹھنڈی ہوا میں جائے تو چھینکوں کے ہمراہ ہوتا ہوا نزلہ
 ناک سے پانی جیسا بہتا ہوا نزلہ شروع ہو۔ اور آخر کار گاڑھے۔ زرد اور بدبودار اخراج پرتوج
 ہو۔ یا ختم ہو جائے گلے میں نکلنے ہوئے درد ہو جیسے کہ لکڑیاں چھتیاں ہوں۔ ہاتھ یا پاؤں
 بستر سے باہر نکلنے سے تکالیف میں زیادتی ہو۔

میدورنیم۔ ۲۰۰۔ ناک کا سردی زکام۔ ناک پھیلے حصہ میں رکاوٹ بو کے ذائقے کے ساتھ۔
 سفید یا زرد مواد۔ یہ اس وقت آزمائی جائے جب دوسری ادویات ناکام ہو جائیں۔
 مرکب سال۔ گاڑھا سبزی مائل زرد۔ جلن دار۔ متعفن اخراج جو ناک ہڈیوں کو متاثر کرے
 ناک سے خون بہے۔ خون آمیز اخراج رات کے وقت زیادہ اور دن کے وقت افاقہ ہو۔

آرم آر سینک۔ پرانے سخت زکام میں بہت ہی اچھی دوائی ہے۔ ناک ہڈیوں کا نامور نزلہ زکام
 بہنے والا ہو یا خشک، غونی اخراج، متعفن۔ بدبودار۔ سبزی مائل۔ پیپ دار۔ گاڑھا یا پانی جیسا
 پتلا۔ زرد رنگ کا۔

میگنیشیا کارب۔ خشک زکام جس میں منہ کے راستہ ہی سانس لیا جائے۔

امونیا کارب۔ خشک بند زکام جو رات کو زیادہ ہو۔ مریض منہ کھول کر سانس لیتا ہے،

ناک نہ صاف کر سکے۔ چھاتی کا زکام جو سردی کے موسم میں زرد بلغم کے اخراج کے ساتھ ہے۔
 نیفتھیلین۔ حاد زکام زیادہ مقدار میں پھیلنے والے اخراج کے ساتھ اور بہت زیادہ چھینکیں۔

فائٹولا کا۔ بہت زیادہ پریشان کن اور کافی دیر عرصہ سے زکام۔ طویل سخت، پرانا زکام۔
 ناک ٹڈیوں کی تباہی کے ساتھ ناک کی مکمل بندش۔ جب سواری کرے تو لازمی منہ سے سانس لے۔
 ایلنٹھس جی۔ نزلہ بہت زیادہ خراشدار پھیلنے والا۔ جلد زہاں بھی چھوٹے ننھے دیکھیں اور
 پھد جائیں۔

کالی آئیوڈ۔ آنکھوں، ناک اور گلے کا مزمن نزلہ زیادہ ہنر پیپ کے اخراج کے ہمراہ جو
 بعض اوقات بہت بدبودار ہوتے ہیں۔ زکام تھوڑی سی سردی سے دوبارہ لگ جاتا ہے جس سے
 ناک سخت ہو جاتا ہے۔ اور سوج جاتی ہے۔ ہڈی کا سوراخ۔ ناک میں سے بولے۔ بیٹھی ہوئی آواز
 گلابیٹھا ہوا آواز بالکل ہی نہ رہے۔ گرمی سے اور لبتری گرمی سے زیادہ ہو۔

کالی کارب۔ ناک کا کھلی ہوا میں کھل جانا۔ جلن اور سردی کے ہمراہ جو بہت شدید تر
 ہے ناک گرم کمو میں بند ہو جاتی ہے۔ جب ناک صاف کی جاتی ہے تو ناک صاف کرنے پر زبرد
 سے افادہ محسوس ہو۔

کیڈیم ملفر۔ ناک کا نزلہ زکام جو ناک کی ہڈی کو ناسور کی وجہ سے تباہ کرنے تک بڑھتا
 ہی جائے۔ ناسور ہڈیوں میں دردیں پھینک۔ زکام۔ پھیوڑے اور چھنیاں۔
 برومیم۔ حاد زکام، بہت چھینکیں۔ ناک میں جلن۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے
 ٹھنڈ کا احساس۔ ناک سے خون بہے۔ ناک میں چھنیاں۔ یہ جون جولائی کے زکام کے لئے
 مفید ہے یعنی گرم موسم کا زکام۔

ایومون۔ زکام نزلہ کا رجحان جو گلے میں گرے، جو لوگ متواتر نزلہ زکام میں مبتلا رہوں
 اور جن کے ناسلز بڑھے ہوئے ہوں اور سخت ہوں۔

یالم پیرو۔ سانس کی نالیوں کا نزلہ زکام۔ بہت زیادہ پیپ وار ملغم کا اخراج۔ کمزوری،
 ادھتپ دق۔

سینٹا۔ بار بار چھینکیں جو باقاعدہ کو گرم کر دیں۔ ناتوانی اور شکل سے سانس لیں۔
 ایومنا۔ مستقل نزلہ زکام کی حالت، ناک اور گلاب خشک اور بند۔ آنکھوں کے اوپر

ماتھے میں درد۔ ناک میں بڑے بڑے سبز چھلکے۔ زمن نزلہ۔ نظر میں کمزوری جیسے کہ دھوئیں یا چھند میں دیکھ رہا ہو۔

بخار کا ہی۔ بخار جوناک اور گلے کو متاثر کرے (دیکھیے نزلہ زکام)

نیو بیکو لینیم۔ بخار کا ہی میں سب سے پہلے اس دوائی سے علاج کرنا اچھا ہوتا ہے، بعض اوقات حملہ کو کم کر دیتا ہے اور بعض اوقات مکمل صحت مند ہو جاتا ہے۔ پندرہ دن میں ایک ہی خوراک دیں۔ اس کے بعد چار خوراکیں دیجائیں۔ اس کے بعد ہر چھ ماہ بعد دی جائے۔ تقریباً ۲ سال تک ۲۰ طاقت میں دی جائیں۔

سورائینیم۔ جو مرض سردی سے متاثر ہوں، ان کے لئے مفید ہے۔ ۲۰ طاقت کی ایک بطور عمل ایگز دوسری ادویات کے ہمراہ دی جائے

سبائو ویلا۔ زیادہ بہنے والا نزلہ اور شدید پھیپھیں جوڑنے کا نام نہ لیں۔ ٹھنڈ میں زیادتی دے کی قسم کا بخار کا ہی۔

شکٹا پلیمویریا۔ جب برا نکائیس کا رجحان بھی ہو۔

سیکیسینم ۲۰ ایک یا دو گزن پانی کے ۱۲ چلے گئے چھوٹے میں حل کریں۔ ایک چمچ ہر دو گھنٹوں کے بعد۔

آرسینک آئیوڈ۔ بہت زیادہ پھیپھیں اور کافی مقدار میں ناک سے جلندار پانی جو نہوٹ کو جلاتا ہے۔ آنکھوں سے آرسینک البم کی طرح جلندار پانی لیکن آرسینک البم کا مریض گرم پیشوں اور ناک میں گرم پانی لے جانے سے اتفاق محسوس کرتا ہے۔ آرسینک آئیوڈ گرم کمرہ میں زیادتی محسوس کرتا ہے اور کھلی ہوا اور ٹھنڈی بیٹیوں سے اتفاق ہو۔

آرسینک البم۔ پانی جیسا تپلا ناک سے اخراج، ہيجان اور پھیپھوں کے ہمراہ۔ بے چینی۔ کوزنیو کالی سلف۔ بہت زیادہ پھیپھوں کے ہمراہ۔ آنسو پانی جیسی رطوبت۔ ناک کی سُرخی، بعض اوقات برانکائی دم۔

مرک کالی آئوڈ۔ پانی جیسی بہت زیادہ طوبت۔ ناک سے پھینکوں۔ کھانسی اور آنکھوں سے پانی بہنا کے ہمراہ۔

سناپس ٹائیگر۔ بخار کا ہی زکام کے ہمراہ پھینکیں۔ آنسو۔ آنکھوں میں غارش اور جلن خشک ناک یا خراش دار مواد ہے۔

کارلوتیج۔ پانی جیسا اخراج ہیجان کے ہمراہ جو چھاتی تک جائے، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے گلے کے ساتھ۔

ایلیم سیپا۔ جب ناک سے پھیلنے والا اور آنکھوں سے سادہ پانی بہے۔ ایسا احساس جیسے کہ سحر میں یا جھگڑے کے پچھلے کانٹے ہوں۔ گرم کمرہ میں زیادتی۔

نیفتھلین۔ بخار کا ہی کے لئے مخصوص بطور حفظ ماتقدم اور علاج کے لئے۔ آنکھوں اور ناک سے پھیلندہ پانی، پیوٹے سوچے ہوئے۔ دئے کار جہان۔

سلفر۔ بخار کا ہی یا اندوں، مکھن۔ جانوروں کی چربی بھلی وغیرہ سے الزحی کیو جیسے دوسرے۔ یہ دوائی بطور عمل انیگز استعمال کی جائے جبکہ اچھی طرح منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں۔ پروں سے یا پروں والا سر بانہ استعمال کرنے سے بخار کا ہی۔

سیپا۔ صبح کے وقت بستر میں پھینکیں۔ بادل والے موسم میں، مجلس میں یا چھبڑی ظاہر کی جائے زیادتی۔ رشتہ داروں سے لاپرواہ۔ فرض شناس۔ پیاس نہ ہو۔ ٹھنڈ میں زیادتی۔ رشتہ داروں۔ بدبودار سانس۔ چہرہ زردی مائل۔

یوفرنیزیا۔ آنکھوں سے زیادہ مقدار میں جلن دار اخراج اور ناک سے سادہ پانی کا اخراج۔ آئوڈم۔ ناک سے گاڑھا بنری مائل زرد مواد۔ یہ علامت ہے اور پھیلتا ہے۔ مریض علامت ظاہر ہونے پر کمزور ہو جاتا ہے اور بہت جھوک محسوس کرتا ہے۔ بخار کا ہی کی دوسری علامات۔

سینگولریا۔ پھول موٹکھے یا خوشبوؤں سے بخار کا ہی۔ بچوں سے حساس۔ ہاتھ پاؤں جلیں مریض انہیں آرام کے لئے بستر سے باہر رکھے۔

سٹیفگیٹا۔ پھینکیں زکام کے ہمراہ یا اس کے بغیر پہلے پہل گامی طوبت پھر تلی طوبت

ناک سے نکلے۔ عارض۔ سینے کی ہڈیوں میں تیز مار یک پھانسیں۔ پھانسی میں نکلے۔
 کلکیر یا فاس۔ بغیر کام کے پھینکیں۔

کالی اٹیوڈ آئیوڈم ناک کی دھکن اور جلن کے ہمراہ گارڈا زردی مائل اخراج جس کی زیادتی گرم کمر میں ہو۔ باہر سے ناک دباؤ سے بہت دکھے۔ تمام چہرہ بہت درد کرے اور مریض بہت بے چین ہوتا ہے۔ گھلی ہوا میں چلنا چاہتا ہے جو اسے تھکاتی نہیں۔ بخار کا ہی کی درد والی علامات۔
 اوزینا۔ ناک مزمن بیماری بدبودار اخراج جس کا انحصار ناک پھنسیوں یا ناسور پر ہو۔
 آئنگ کی ادویات کے نیچے بھی دیکھے۔

آرم میٹ۔ یہ چوٹی کی دوائی ہے۔ لُٹو کی گہرائی میں تباہی ناک ہڈی کا ناسور۔ بدبودار اخراج پھیلائے والی درد۔ رات کو زلیوتی۔

آرم آر سینکرم۔ ناک کی مزمن بیماری ناک میں عارض اور بندش کے ساتھ۔ ناک ہڈیوں میں درد اور جلن اور پھیدنے کے ساتھ ناسور جیسی درد۔ اکثر پھینکیں۔ ناک سوچی ہوئی۔
 ایپوزیم۔ ناک کی کڑی ہڈی کے ناسور کے مزمن کیس میں تھنوں کے درمیان کا گٹھڑا پرہ۔ تھنوں کے نیچے کی ہڈی اور ناسور کی ہڈی۔

تھوجا۔ پتلے زردی مائل سبز اخراجات کے ساتھ مزمن نزلہ مرک کار۔ ناک میں ناسور۔ پھیلنے والا اخراج۔ خاص طور پر گارڈا چکنے والا ناک سے اخراج ہو جو ہمیشہ جلندار درد کے ہمراہ ہو۔

مرک وائیو۔ ہڈیوں کی دھکن کے ہمراہ

میزریم۔ ناک اور چہرے کی ہڈیوں میں جلندار درد کے ہمراہ

پٹرولیم۔ ناک کے پہلو میں ٹھوس یا پھلکے اور چیرے۔

پلسٹیل۔ زرد سادہ اخراج کے ہمراہ جس کی شام کے وقت زیادتی ہو۔

ایڈراٹس۔ بہت زیادہ اور خونی اخراج پھنسیوں کے رجحان کے ساتھ۔

کلکیر یا کرب۔ ناک کی جڑ پر سوزش اور پھنسیاں۔ گارڈے پیدا بدبودار اخراج کیساتھ۔

ٹیوٹر کو لے گئے۔ یہ بطور عمل انگریزی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات مرض ناک کی ٹی بی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

کالی آئیوڈ - آستھکی مزمن نزلہ۔ ناک کی ہڈیوں کا گلن سٹرا جو چھٹی ہوجاتی ہیں۔ ناک کا کافی مقدار میں ہنزا اخراج۔

ناک کا گوڑا

ملنا مائٹز - ناک کے گوڑا کیلئے چوٹی کی دوائی ہے۔ ۹ طاقت میں استعمال کیجئے! ٹیوٹر کو لے گئے۔ اگر ایک پہلو پر لیٹے تو ناک بند ہوجائے۔ سینگو میز یا سی - جب بیمار سردی کے ہمارہ۔ تھوہا۔ ناک کا گوڑا۔ ناک کی ٹی بی نالی سوزش کے ہمارہ۔ بُری بو۔ پتلے ہنزا اخراج کے ہمارہ جس میں سونگھنے کی حس نہ رہے۔

گلکیر یا کرب { یہ دونوں بھی ناک کے گوڑا کے لئے
ناٹرک ایسڈ { انتہائی مفید ہیں۔
الیومن - بایس طرف کی ناک کی نالی کا گوڑا۔

ناک کی نالی کی شکل کا بھوڑا

کالی بایرکارب - { سلیشیا - ۲۰۰ طاقت ہر پندرہ روز بعد دیجئے۔ دو دن پہلے اور
سلیشیا { دو دن بعد کوئی دوائی نہ دیجئے۔ وقفے کے دوران سے
کالی بایرکارب - ۲۰ طاقت دن میں چار دفعہ ہر چار گھنٹے کے بعد دیجئے۔
آئیوڈیم - ناک کی نالی کا بھوڑا۔ گولی لگنے جیسی بھوڑا لگنے جیسی سر میں درد کے
ساتھ اور نچلے جبڑے میں خاص طور پر نزلہ زکام کے حملہ کے دوران میں جس کی زیادتی آگے
کی طرف بھجکے رہے۔

کالی آیوڈ۔ ناک کی نالیوں میں پھانسنے والا اور جھکے سے چھیننے والا۔ کھودنے والا اور سلسل درددالا نزلہ زکام بار بار ہو۔ ناک سرخ اور سوجی ہوئی۔ اخراج گاڑھا سبز اور بدبودار۔

گندی بو

اینا کارڈیم۔ بو بدترین۔
 سلیشیا۔ ناک کے زکام میں۔
 میسلفر۔ پرانے پنیئر کی طرح کی بو۔
 مرک سال۔ حلق کا زکام نزلہ۔ پرانے نزلہ و زکام میں۔
 کالی بایکارب۔ گندی بو پانی جیسے اخراج کے ہمراہ۔
 آرم میٹ۔ جب ناک صاف کرے تو گندی بو آئے۔
 سلفر۔ گھنڈانی بوؤں کا شمار۔ گھنڈا ناسانس یا گندا بہت ہی بدبودار پاخانہ۔
 اعضائے تناسل سے گندی بو۔ جو اس کے کپڑوں کے علاوہ کمرے میں سونگھی جاسکتی ہے۔
 تمام اخراجات بدبودار اور خراشدار۔ گندی شدید بدبو کے ہمراہ۔ دھونے کے باوجود اینٹل میں سے چھیننے والی گندی بو آئے۔

بو کم ہو یا نہ ہو

ایموننا۔ بو کی حس گھٹی ہوئی۔ بہنے والا زکام نزلہ۔ ناک کے سر کی نوک چری ہوئی
 نتھنے دکھیں اور سرخ ہوں، چھوٹے پر زیادتی۔ گاڑھے زرد مواد کے ہمراہ پھلکا۔
 آرم میٹ۔ پوشیدہ آتش کی وجہ سے ناک کی خرابی میں بو کی حس گھٹی ہوئی۔ مزمن نزلہ۔
 از جنم تاثر یکیم۔ ٹائیفاؤڈ بخار میں بو کی حس گھٹ جائے۔

مینز پریم - ناک کی خشکی کے ہمراہ بو کی حس جاتی رہے۔
 مرکز کار - گلے کی دھکن کے ہمراہ گلے کی دھکن۔
 پلیٹیلہ - زکام کی دھ سے بو کی کمی
 نیٹرم میور - جب گاڑھے مواد میں پلیٹیلہ ناک کام ہو جائے تو یہ دی جلتے۔
 کیو پریم میٹ - پیشانی میں نزلہ زکام۔
 الیپس - برانے نزلہ میں ناک کی بھلی کی سوزش۔
 تھو جہا - ناک سے بدبودار سبز اخراج کے ہمراہ ناک کی نالیوں کا پھوڑا،
 بو کا جلتے رہنا۔ ٹھنڈے درم ناک۔
 بنیز واک الیڈ - سونگھنے کی حس کا نہ رہنا، احساس جیسے کہ ناک کی جڑیں کیڑا ریگے۔
 کالی آئیوڈیٹم - بو کی حس کا نہ رہنا۔
 میگنیشیا میور - نزلہ زکام کے بعد ذائقہ بو کی حس کا نہ رہنا۔

بو سے بہت زیادہ حساس

گریفا میٹس - پھولوں کی خوشبو سے حساس - خوشبو بہت زیادہ معلوم ہو۔
 کالچیکم - خوراک کی بو اُسے آپے میں نہ رہنے دے اندوں کی بو متلی اور قے لاحق کرے۔
 بیلا ڈونا - تمباکو کی بو۔
 سلفر - عمل انگیز دوائی کے طور پر عموماً بہت ہی حساس خوشبوؤں کے لئے۔
 فاسفورس - تیز خوشبو میں کھانسی کا باعث نہیں پھولوں کی خوشبو سے بیہوش ہو جائے۔
 سیپیا - پکانے کی بو متلی کا باعث بنے۔
 سلفیو ک الیڈ - کافی کی بو کے لئے بہت ہی حساس۔
 نکس و امیکا - پھولوں کی خوشبو سے چکڑے۔

بوکے وہم

سلفر۔ بوکے وہم کے لئے اس دوائی سے شروع کیجئے! اگر یہ کام نہ کرے تو مندرجہ ذیل علامات کے مطابق دی جاسکتی ہیں۔

گریفائیٹس۔ چلے ہوئے بالوں کی بوکا وہم۔

اینا کارڈیم۔ چلے ہوئے اسفنج اور امغریوں کی پیٹھوں کی بوکا وہم۔

کروٹن ٹنگ۔ پاخانہ کی بوکا وہم۔

چائنا۔ مردار کی بوکا وہم۔

بیلڈونا۔ گلے میں اندڑوں کی بو یا مچھلی کے چورے کی بو۔

پلسٹیللا۔ پرانے بدبودار نزلہ کی بوکا وہم۔

گلکیریا کارب۔ گلی سٹری کھا دی بوکا وہم۔

یوفوریم۔ چوہے کی بوکا وہم۔

سینی کولا۔ بچے کے اعضائے تناسل سے مچھلی کے چورے کی بوکا وہم، نہانے کے بعد

بچے کے حصّہ مچھلی کے چورے جیسی بو دیں۔

چھینکس، خراٹے۔ (دیکھئے بھلا کا ہی)

لمنا مائٹز۔ ناک میں بندش کی وجہ سے خراٹے۔ ناک کی ہڈیوں کی رصورتی کی وجہ سے

ہیپوزیم۔ ناک کی سوزش اور سُرخی۔ خراٹے۔ مندی نزلہ زکام کے پہلے۔ کڑی ہڈیوں کا

ظاہر ہونا۔ ریڑھ کی ہڈی کا ناسور یا اس کا بڑھ جانا۔

ادیم۔ درمیں مرگی میں غشی۔ زچگی کے تشنج۔ کھلے منہ کے ساتھ۔ چہاتی میں اجتماع

خون کے ساتھ خراٹے۔

پلسٹیللا۔ بے قاعدہ دردِ زہ کے تشنج کے بعد خراٹے۔

دبّے

سلفر - بھورے اور سیاہ دبّے ناک پر -
سپیا - ناک پر زرد کاٹھی -

حلق - گلا -
دوسرا حصہ

تنگی تنفس اور گلے کی دکھن دیکھئے - گھٹنا یا بند ہونا -
کیمو میلا - جب حلق میں کوئی چیز پھرتی ہوئی معلوم دے - جیسے کہ وہ دم گھٹ جائے -
سائیکلیا - ناک کے پچھلے حصہ سے کافی مقدار میں مواد کی وجہ سے دم گھٹے -
لیکس - جیسے کہ کسی نے پکڑ رکھا ہو جس کی وجہ سے دم گھٹے صبح اٹھنے یا
بیدار ہونے پر زیادتی - دورے دار - گرم مشروب نگلنے پر - گرم چائے نگلنے پر یا گرم شراب
نگلنے پر زیادتی -

کیکٹس - دل کی تکلیف کے ہمراہ دم گھٹے -
مینفائٹس - کھاتے وقت یا پیتے وقت دم گھٹے -
ایسڈ نائٹریک - کھاتے وقت یا پیتے وقت پھوٹا سا ذرہ حلق میں چپکے جیسے کہ
حلق ہو گیا ہو - دم گھٹے - بڑی مشکل سے نکلے چہرے کو بگاڑ دے اور سرینچے کی طرف ہٹ جائے -
سکوما اور صما - حلق میں تیزی لمبی کے ٹکڑے یا کسی اور زخم کی وجہ سے گلابند ہو جانے
گلا گھٹنے اور دم گھٹنے کا ذریعہ -

میگنیشیا فاس - گلے میں دورے دار تنگی کے ساتھ دم گھٹنے کا احساس - پہلے
ٹانسٹر کا بڑھ جانا تب چھت کی سرخی خشکی مشکل سے نکلے -
میدوریم - سانس کی نالی کے تشنج - سبزہ میں کٹ کٹ کی آواز کے ہمراہ - ہوا مشکل سے
باہر خارج کی جائے لیکن اندر لے جانی جائے -

برومین - سانس کی نالی کا تشخ -

کروپ کھانسی

غیر خفاتی -

درم ہنجرہ بھی دیکھئے

اکونائٹ نیپ - مرض کے شروع میں - نکلے وقت گلے میں تکلیف - خشک گہری
جھونکنے والی کھانسی - تیز ہنجرہ - بے چینی - ڈرا ہوا - گلے اور ہنجرہ میں جلن - ٹھنڈے پانی
کی چاہت یا خواہش جس کو نگلنا مشکل ہو -

پیوینجیا - گلا بیٹھا ہوا کروپ کھانسی - درم ہنجرہ کے ساتھ کھانسی ایسے عکس ہو -
جیسے کہ کڑھی تیز پر آراجل رہا ہو -

کالی بائیکرو میکم - تنگی و تنفس گلا بیٹھا ہوا - گھردری کھانسی - سانس کی آواز جیسے
کہ دھات کی نالی میں سے ہوا گزر رہی ہو -

بیلادونا - جھونکنے والی کھانسی جب کھانے تو چہرہ سرخ ہو جائے - جلد گرم خشک
بھرو پز تیز نبض - سوچے ہوئے سرخ ٹانسنز -

سینگو نیر یا می - جب ہنجرہ میں جلن اور خشکی ہو - بھاری کروپ کھانسی - خرفراہٹ اور
سیٹی دار سانس - سیٹی دار کھانسی -

ہیپر پلفر - ٹھنڈی ہوا لگنے سے کروپ کھانسی اور درم ہنجرہ کے اکثر حملے - گلا بیٹھا ہوا -
خشک جھونکنے والی کھانسی - سیٹی دار سانس - کھر کھڑاتی ہوئی اور دم گھٹنے والی کھانسی - صبح کے
وقت زاید - بچہ کا کھانسی کے دورے کے وقت دم گھٹے -

فاسفورس - جب گلا کافی دیر تک بیٹھا رہے - مرض دورے کے آثار دکھائے -
انٹم ٹارٹ - ٹھنڈا چہرہ - نیلا - جو ٹھنڈے پینے سے تریو - نبض سست آواز بے آواز
آراجلے جیسا تنفس جیسے کہ ہوا کے راستے رطوبت سے پر ہوں جو باہر نہ نکلے -

محبوکس - آدھی رات کے وقت کروپ کھانسی کے دورے شدید خرفراہٹ والی کوسے

کی مٹی آواز والی اور دم گھٹنے والی کھانسی۔

لیکسس۔ گلے کا ناسور۔ سرخ، سیاہی مائل، دھندلا سا۔ خالی نگلنا مشکل نہایت
ٹھوس چیزوں کے ہنجرہ بھونے پر تکلیف محسوس کرے۔ شدید کمزوری۔

خفاق

لیکسس۔ ناک سے تپلا خراشدار بانی ہے۔ گلا گہرا سرخ۔ گہرا بھورا نیلا ہٹ کے
ساتھ۔ بھٹی بائیں طرف نمایاں جب مرض دائیں طرف کو جائے۔ گردن کے غدودوں کی سوزش
اؤنگھ۔ نبض باریک۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے۔ سونے کے بعد زیادتی۔ تپلی مشروبات اور تھوک کا
نگلنا مشکل۔ ہر دو گھنٹے کے بعد ۲۰ طاقت میں دیجئے۔

لیک کینیم۔ لیکسس کے غلات سیاہی اطراف بدلتی رہتی ہے، اکثر بائیں طرف کو دھکن
اور سوزش۔ اچانک مخالف سمت میں چلی جاتی ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد پہلی جگہ آجاتی ہے۔
بھٹی بھوری زرد اور دہی کی طرح۔ اگر بھٹیاں بن جائیں تو وہ شیشے کی طرح چمکیں۔ گلے کا فالج
پس مشروبات پینے پر ناک میں چلے جائیں۔

میلادونا۔ گلے کی سوزشی حالت کے لئے۔ شدید تکین والی درد، سردرد۔ تشنج
اور اینٹھن۔

کروٹیلیس۔ جب تو آتر خون ناک سے بہے۔ خوف منہ کی بلغھی جھیلیں سے خون ناک اور نچائے۔
ناجا۔ جب ہنجرہ پر حملہ ہوا ہو۔ مریض گلے کو بچنے دم گھٹنے کے احساس کے ساتھ۔
بدبودار سانس۔ چھوٹی گلا بیٹھی ہوئی کھانسی، ہنجرہ میں دھکن کا احساس یا نالی کے اوپر کا
حصہ دھکن محسوس کرے۔

لائیکوپوڈیم۔ ۴ بجے سے ۸ بجے شام زیادتی مرض۔ دائیں طرف زیادہ متاثر ہوتا ہے۔
بچہ نیند سے ڈرا ہوا اٹھتا ہے۔ ناراض اور جڑبڑاتا ہے۔ تھنوں کی پکھوں کی طرح حرکت
اس کی نمایاں ترین علامت ہے۔ گلے میں تنگی کا احساس، کوئی چیز نیچے نہ جائے۔ خوراک اور

مشروبات واپس ناک تک جائیں۔

ایپس۔ جب گلے میں سوزش ہو، ڈنگ لگے۔ جیسے درد کے ساتھ۔ یہ شدید درد والی یا بغیر درد کے سوجن ہو سکتی ہے۔ گرمی سے زیادتی زبان کے کنارے پر درج ہے۔ اذکھ اور بے شتی۔ بڑھا ہوا کوا۔ پھولا ہوا چمکدار، سُرخ چمکدار جھٹے پیشاب کم مقدار میں پیکھ سوجن، بیکھ مرک سائٹس۔ نقصان رسانی میں سخت بُرے کیسوں میں۔ اچانک خناق کا حملہ شدید کمزوری۔ حالت نزع۔ چھوٹی تیز اور وقفہ وار نبض۔ جھلی بھری مائل اور کافی جاگرتی ہوئی ناک تک پھیل جائے۔ ایک ایم یا سی ایم طاقت کی طرف ایک خوراک دے سچے م بریم۔ جب زیادہ گرمی یا گرمی کے موسم میں بچے کو پلٹنے سے رات کے وقت۔

دُقیقہ ہیم۔ یہ بطور عمل انجینر دوائی کے استعمال کی جائے۔ علاج اسی دوائی شروع کرنا چاہیے۔ ۲۰۰ طاقت میں دی جانی چاہئے۔ ناک سے خون بہے شدید کمزوری کے ہمراہ شروع میں تقریباً حالت نزع جیسی حالت نبض کمزور۔ تیز اور قوت حیات کمزور۔ بغیر تکلیف کے نکلے۔ لیکن مشروبات تے کر دے یا ناک کے ذریعہ واپس کر دے۔ سانس اور اخراجات بہت ہی بدبودار۔ فائٹول اکا۔ جب درد گلے سے کانوں تک جائے۔ نکلے وقت۔ جب نکلے تو زبان کی جڑ پر بہت درد۔ جلن جیسی جلتے ہوئے کوئلہ یا آگ یا گرم سُرخ لوبے سے ہو۔ خشکی نکلے میں مشکل کا نپتے ہاتھوں کے ساتھ۔ گلے میں گولے کا احساس۔ لگاتار نکلنے کی خواہش، گہری سُرخ نیلی یا راکھ کے رنگ جیسی پھل۔ گرم مشروبات نہ پنی سکے۔

جلیسمیم۔ خفای فایج کے لئے شاندار دوائی ہے۔ تکلیف خواہ کہیں بھی ہو خناق کے نتیجے پر حلق کا فایج۔

آرم ٹرٹفلیم۔ جلن اور تنگی منہ اور گلے کی دکھن۔ ناک سے خراشدار اخراجات ہو۔ تھنوں اور اوپر کے ہو کو پھیل دے۔

کینتھرس۔ کئی بار پیشاب کرے، پیشاب کرنے سے پہلے، دوران اور بعد میں جلن۔ پیشاب میں البیومن۔ خون یا بھلکے سے ہوتے ہیں۔

کالی بائیکرو میکم۔ جب چھتے والی، وقفہ دار، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والی بہت چھوٹی جگہ پر مرکوز ہو سکیں۔ زبان زردی مائل بھوری، فرے ڈھانچی ہوئی ہو۔ کوادھیلا گلے میں ڈاٹ کے احساس کے ساتھ۔

میوسٹریک الیڈ۔ پھیلی ہوئی کلاہری سرخی۔ کوادھیلا ہوا۔ ٹانسل اور حلقوم یا زرخہ سوجا ہوا۔ ننگنے کے ناقابل، آواز بیٹھی ہوئی۔ پچھلے جڑے کے غدد سوجے ہوئے۔ گہرا سٹراہواخون ناک سے اگرچہ بخار زیادہ نہیں ہوتا لیکن کمزوری بہت ہوتی ہے۔
 نائٹریک الیڈ۔ کھانا پینا علی طور پر ناممکن۔ رسا ہوا مواد کوٹے کو ڈھانپ لے چھین جیسے کے نوکدار لکڑی سے۔ شیشے کے ٹکڑے سے یا گرم تار سے۔ قموک، بخار۔ کمزوری اور کھانسی۔ پیشاب سے گھوڑے کے پیشاب جیسی تیزبو آئے۔

آواز کا بیٹھ جانا۔ حاد

آئریکا مانٹ۔ آواز کے استعمال کی وجہ اس کا بیٹھ جانا جیسے کہ داغلوں میں نکلنے والوں میں اور مقررہ میں۔

آرم ٹرائفلم۔ زیادہ کام لینے اور زکام لگنے۔ پبلک کے مقررین بولی دینے والے۔ اداکار اور گلنے والے۔ اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے۔ ہوا کے بھونکے سے زکام میں مبتلا ہو جائیں اور آواز بیٹھ جائے جو کہ اس دوائی سے فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔

سپونجیا۔ جیسا کہ آرم ٹرائفلم میں۔ ہنجرہ چھونے سے حساس اور نکلنے کا عمل تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ان علامات کے ساتھ سپونجیا اور آرم ٹرائفلم میں اول بدل کر دیکھ جاتی ہے کھلی ہوئے آواز کا جلتے رہنا۔

جیلسم۔ جب ہنجرہ مکمل طور پر نالغ زدہ ہو جائے، ہسٹیریا یا کسی اور وجہ سے اعلیٰ طور پر آواز کا بیٹھ جانا جیسے کے دوران آواز کا بیٹھ جانا۔

پلمبسم۔ جب پلمبسم ناکام ہو جائے تو اس کے متعلق سوچنا چاہیے۔ کاسٹیکم زیادہ مدد نہیں کرتا۔ آواز کے ٹپھوں کے فلاح کی وجہ سے۔ آواز بیٹھ جانے کے پرانے کیس۔

سیلا ڈونا۔ گلے میں اجتماعِ خون کی وجہ سے، درم برہم شدہ آوازیں تکلیف کی وجہ سے۔ کاسٹیکم۔ آواز کے ٹپھوں کی کمزوری کی وجہ سے۔ آواز کے بیٹھنے کی تکلیف زیادہ صبح کو تیز فاسفورس۔ سوزش اور مواد کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے آواز میں رکاوٹ۔ کھلی ہوا لگنے سے آواز کا نہ ہونا۔ بہت زیادہ لیسڈر اسپنڈ اور جلد کے انتہائی ریمان کی وجہ سے۔ ٹھنڈے پانی کی پیاس۔ شام کے وقت آواز زیادہ بیٹھے۔

ریو میکس۔ سخت لیسڈر مواد کے زیادہ اکٹھے ہو جانے کی وجہ اور بخیر کے متواتر کھرنے کی وجہ سے۔

برومیم۔ زیادہ گرمی لگ جانے سے آواز کا بیٹھ جانا۔

مرک سال۔ آواز بیٹھنے کے مخصوص دوائی ہے۔

اپریکاک۔ آواز کا مکمل طور پر بیٹھ جانا یا، بخیر میں مواد اُگنے کی وجہ سے۔

انٹم کروڈ۔ گرمی لگ جانے کی وجہ سے آواز کا جاتے رہنا۔

اگنیشیا۔ ہسٹریائی کیسوں میں آواز کا جاتے رہنا۔

کالی میور۔ زکام کی وجہ سے آواز کا بیٹھ جانا۔ چکنے والی سخت مواد۔ بخک، کٹیپ

اور بھونکنے والی کھانسی۔

بریا ایوڈ۔ رکاوٹ کی وجہ سے آواز کا جاتے رہنا۔

صدیگا۔ تنگی تنفس کے ہمراہ آواز کا بیٹھ جانا۔ البیومن والے مواد کا زیادہ جمع ہو

جانا۔ چھاتی میں جلن۔ درد اور سوزیاں جھنڈنا۔

لیکسمس۔ صوتی ٹپھوں کے فلاح کی وجہ سے آواز کا بیٹھ جانا۔

مینٹھا پیرٹیا۔ اونچا پڑھنے سے آواز کمزور ہو جائے۔ یہ گانے والوں کی مدد کرتی

ہے تاکہ آواز بچھنے نہ پائے۔

الیومنا - گانے والوں اور بولنے والوں میں آواز کا بیٹھ جانا۔ زکام، نزلہ کے گلے میں گرنے سے جب بولے یا گائے، آواز کا پھٹ جانا یا بیٹھ جانا یا آواز کے زیادہ کام کی وجہ سے۔
الیومن - آواز مکمل طور پر جاتی رہے۔ آواز کا مزمن طور پر جاتے رہنا۔ یہ سب تازہ زکام کی وجہ سے ہو۔

رٹٹا کس - آواز کا بیٹھ جانا جس کو بولنے سے انافقہ ہو جاتی میں پھیلنے کا احساس۔
سانس دبا ہوا اور شدید پھینکین۔ آواز کچھ دیر استعمال کرنے پر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بولنے یا گانے کی صرف ابتدا میں آواز کا بیٹھ جانا۔

کابلو دوج - بخار کا ہی کی وجہ سے آواز کا بیٹھ جانا اور گلے میں دھکن۔ پانی کی طرح کا اخراج پھاتی تک سہجان کے ہمراہ۔

سمبوسکس نامیگرا - آواز کا بیٹھ جانا۔ گہری خالی کھانسی کے ہمراہ۔ پھاتی میں دباؤ۔
اکثر پھاتی جھٹیاں لے سبے چینی اور پیاس۔

پلسٹیللا - جب آواز مکمل طور پر جاتی رہے۔ ڈھیلی سی کھانسی کے ہمراہ ناک سے کالھی زرد رنگ کی رطوبت کا اخراج۔

کوکا - آواز کا جلتے رہنا۔ بولنے کے بعد آواز بیٹھ جائے۔ ہر نصف گھنٹہ کے بعد پانی یا چھ قطرے مدثر کچھ کر کے دیکھئے آواز کو استعمال کرنے ۲ گھنٹہ قبل یہ عمل شروع کریں۔

میلنڈریم - چھوٹی جھپک یا بڑی جھپک کی وجہ سے آواز کا بیٹھ جانا۔

اکونائٹ این - سرد خشک ہوا لگنے سے آواز کا جلتے رہنا۔

سنا - آواز کا بیٹھ جانا جب ٹھنڈی ہوا لگے۔ جب اکونائٹ، ناسفون اور سپونجیا نام ہوا میں

شرامونیم - بولنے کی طاقت نہ رہے۔ صرف بیٹھی ہوئی، ٹوٹی چھوٹی آواز جو دھکن کے

ساتھ ہو سے بدل کر بول سکے۔ کوپ بھونکنے والی کھانسی۔ شدید شرجی کو کچھ کچھ نرسک۔

ابروڈینیم - گھٹتے کو جسے جوڑوں، گانٹھوں میں درد کی وجہ سے آواز کا بیٹھ جانا۔

آرٹھرمیٹ - مقررہ کی آواز کا بیٹھ جانا یا پیشہ ور گانے والوں کی آواز کا بیٹھ جانا۔

گانے والوں کے حلقوں کی مزن سوزش۔

کلیر یا فاس - آواز کا بیٹھ جانا، مریض کو بولنے سے پہلے یا گانے سے پہلے جھجھو سے
 طوبت صاف کرنا پڑے۔

آر جنٹلم ناٹریٹ - گانے والوں میں ہنجور کی مزن سوزش۔ اونچی آواز نکالنے پر کھانسی۔
 میگلنم - اگر آر جنٹلم ناٹریٹ کے نام ہو جائے تو مقررہ آواز گانے والوں کے لئے جان کن
 دروائی ہے۔ گے میں طوبت کا اجتماع جتنی صاف کرے اس سے زیادہ بن جائے۔

اگر الک الیڈ - دل کی تکالیف کے ساتھ آواز کا جاتے رہنا۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ
 اول بدل کر آواز کا جاتے رہنا۔

آواز کا بیٹھ جانا۔ مزن

برمیٹا کارب - آواز کا بیٹھ جانا۔ آواز کا بیٹھ جانا کھانسی کی وجہ سے۔ ہوا کی نالیوں

میں بلغم کا اجتماع کی وجہ سے آواز کا جاتے رہنا۔ زبان کا فالج۔ مزن کیس۔

کاربو وچ - ضدی قسم کے کیس۔ صبح و شام اور بولتے وقت زیادتی۔

ہیپرسلفر - آواز کا مزن طور پر بیٹھ جانے کے لئے شاندار دروائی ہے۔ خاص طور پر

جب مریض میں پارہ کی انویات، دوران علاق استعمال کرائی گئی ہوں۔ آواز کا جاتے رہنا اور
 خشک کھانسی جھونکنے والی، جوانوں میں صبح و شام یا جب ٹھنڈی ہوا میں جائیں۔

سلفر کیس کو مکمل کرنے کے لئے

کلیر یا کارب دیئے جانے چاہئیں، بعض کیسوں

سلیشیا - میں یہ ناگزیر ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرے کو آزما یا جاسکتا ہے۔

نیشو آرس - حیض کے دینے سے آواز کا بیٹھ جانا۔

فالج

ڈنچیر یا - ڈنچیر یا کے ساتھ گلے کا فالج جب شروبات پیئے تو ناک کھراستے واپس آجائیں۔

حلقوم کی سوزش

- سیلا ڈونا۔ نیچوں اور کوسے کا دھبیلہ ہو جانا۔ گلے میں کالی مچھلی کا احساس ہونا۔
 سینکڑوں نیر یا نائٹرکیم۔ دائیں طرف کی گلے کی سوزش زیادہ۔ مزین کیسوں میں گلے کی سوزش۔
 گوانیم۔ بعض اوقات یہ درد ختم کر دیتی ہے۔
 زنکم میٹ۔ جب گلے کی سوزش شراب، تمباکو یا کسی اور میجان کی وجہ سے ہو۔
 فائیو لاکا۔ گلا گھرا سرخ یا نیلا سرخ، کھردرا، تنگ اور گرم محسوس ہو۔ کانوں میں گولی
 لگنے جیسی درد، پانی بھی نہ پی سکے۔ یہ گنٹھیاوی دردوں کو بھی دور کرتی ہے۔
 سٹس کیناڈینس۔ یہ گلے اور ناک سے نکلتی ہوئی سوں سوں کی آواز کیلئے بہت اچھی ہے۔
 لڑی بلغم کا اخراج۔ حلق میں بلغم کا گرنا اور اسے کھرتے رہنا۔ بعض اوقات گلے میں ریت کا
 احساس۔ گلے کی خشکی اور گرمی۔ بریض کو اکثر پانی پینے کے لئے مجبور کرتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں
 سانس لینا تکلیف کو زیادہ کر دیتا ہے، ٹھنڈی ہوا سے متاثر ہونا اس دوائی کی نمایاں ترین علامت۔
 سینکڑوں نیر یا کین۔ بلغمی تھلی کی سُرخ اور ہموار پن۔ چمکدار اور دلہن شدہ ہونا۔ تھوک کی
 کمی کے ساتھ۔ یہ دوائی مندرجہ بالا علامات کے لئے جو مادی ہوں یا مزین بہترین دوائی ہے۔
 کالی میوور۔ کیسوی سوزش گلا کے لئے بہترین ادویات میں سے ایک ہے۔ بھوری یا
 سفید مواد نکلنے کے ہمراہ۔ ٹانسلز سوجھے ہوئے اور پھولے ہوئے ناسور کے پھولنے کے ہمراہ
 ایومنا { یہ دونوں ادویات خشک زکام،
 ایومن { گلے کی سوزش تھوک کی کمی کے ہمراہ۔
 لائیکوپوڈیم۔ خشک زکام کے لئے بہترین ادویات میں سے ایک ہے۔ ناک رات
 کو بند ہو جائے۔ تھوک یا مواد نہ ہو۔
 شکا پال۔ سادہ اور مزین خشک زکام، ناک کی جڑ میں دباؤ اور پھڑکے احساس کے
 ہمراہ، ناک صاف کرنے کی مستقل خواہش۔

دھکیا۔ مزمن گلے کی سوزش اور حلق کی سوزش، جہاں صاف بولنے کے لئے متواتر گلا صاف کرنے کی خواہش ہو۔ بہ طاقت میں دی جائے۔

سیسپیا۔ ننگے پر گلے میں چھنے والی اور خراش دار درد۔ جب بولے اور گائے تو آواز بیٹھ جائے۔ بلغم کا کافی اخراج بعض اوقات خون ملی بلغم یا خونی لکیر والی بلغم اور بے شکل اور زور لگا کر اکھاڑی جاسکے۔

کالی بائی۔ گلے کے زیادہ بڑھ جانے کے لئے بہترین دوائی ہے۔ بھلی کی ہڈی کا احاس گلے میں کھنکارنے کے ساتھ۔

حلق کی سوزش۔ مزمن

مرک سال۔ دیکھنے والا۔ پرورد۔ جھین دار دلد اور جلنے والا گلا۔ موسم کی تبدیلی پر پھنسیاں سی ظاہر ہوں۔ متواتر ننگے کی خواہش۔ آواز کا جاتے رہنا۔ بدبو دار سانس۔ مرک کار۔ گلا سرخ خشک سوجا ہوا۔ سخت گھٹن کے احاس کے ہمراہ، کوا سوجا ہوا۔ ننگے میں دقت۔

آرمیکم ایوڈ۔ جب غیر موافق حالات ٹی بی کے پس منظر کے ساتھ۔ کالی بروم۔ حلق کی نااطاقی کی حالت میں۔

کالی ایوڈ۔ حلق میں شدید سوجان کے ساتھ۔ آرجنٹم میٹ۔ گانا گانے والوں کے گلے کی مزمن سوزش۔ کالی بائیکرومیکم۔ مزمن گلے کا ناسور۔

نزلاوی۔ نزہ کی وجہ سے گلے کی سوزش

آرجنٹم نائٹرکیم { یہ دی گئی ترتیب
ایومنا۔ } میں دی جانی چاہئیں۔

گلکیر یا ایوڈ - خنزیری اور سوکھا سان کی طبیعت والے لوگوں کے لئے۔

پیشیا - گرمی گولی نکلنے۔ ہڈیوں کے یا کنکریوں کے نکلنے کا احساس۔ مریض ہمیشہ اپنے گلے میں ہڈیوں اور بھلی کی ہڈیوں کا احساس کرتا ہے جو کہ وہاں نہیں ہوتا۔ پیشیا اس احساس کو شادیتا ہے۔ اگر یہ ناکام ہو جائے تو درج ذیل ادویات دیجئے۔

الگیشیا - یہ گلے میں رکاوٹ کے احساس کے لئے شاندار دوائی ہے۔
سٹس کینا - حلقوم۔ گلے اور ناک میں ٹھنڈک کا احساس۔

گنٹھیاوی گلے کی سوزش

لائیکو لورڈم - حلقوم یا گلے چھوٹے پٹھوں کا گٹھیاوی درد۔ نکلنے میں تکلیف یا وقت یا گلے کو تھوڑا سا بھی دبائے، یا بلغمی بھلی زرد۔ سوزش نہیں ہوتی۔ گلے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ لیکن گنٹھیاوی تاریخ، تشخیص مرض کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔

سوچا ہوا۔ دکھتا ہوا

بیلادونا - حاد کیسوں گلے میں اجتماع خون اور مرنجی۔ گلے کی خشکی۔ ٹانسلز سوچے ہوئے اور بڑھے ہوئے۔ دائیں طرف کی سوزش اور رکھن اور درد دائیں کان تک بڑھے۔ سب اڈیلا۔ گولے یا کسی اور چیز کا احساس جس کو مریض متواتر نکلنے کی کوشش کرے۔ گرم مشروبات سے آفاقہ ہو۔

میگیشیا کارب - گلے میں پھنسیاں حیض کے دوران۔ پھنسیاں بائیں سے دائیں، یا دائیں سے بائیں منتقل ہوں، حیض کے بعد غائب ہو جائیں۔

لیکس - گلا دکھے یا سوزش گلا۔ ٹانسلز بڑھے ہوئے۔ خنق۔ ٹھوس خوراک آسانی سے گلے کے لیکن مشروبات نکلنے میں مشکل ہو۔ گرم مشروبات سے زیادتی مرض گلے میں گولے کے چھنے ہونے کا احساس۔

سٹس کینا وینس - ٹھنڈی ہوا نکلنے یا ٹھنڈا سانس لینے سے زیادتی۔ گارھی زرد بلغم

نزد جھاگ جیسی بلغم جو من مقامی ذرائع سے ہی صاف ہو۔

مرک بن آئیوڈ۔ جب مرض بائیں طرف سے شروع ہو۔ خالی نکلنے یا خوراک نکلنے سے زیادتی۔

کالی آئیوڈ۔ پلٹنے یا سوزش کے میں جو تمام نرم نسیجوں۔ کوتا اور نرم تالو کو تباہ کر دیں۔

لیکینیٹھس۔ گلے میں سوزش یا دکھن۔ گردن کی سختی کے ہمراہ۔

فائٹولا کا۔ جب درد کان تک جائے۔ کوتا بڑھا ہوا۔ بھلی گہرائی سرخ یا راکھ کے رنگ

کی گرم مشروبات سے زیادتی۔ دائیں طرف گلے کی سوزش اور درد دائیں طرف کان تک بڑھے۔

مشکل سے نکل سکے۔

گوائیکم۔ گلے کی دکھن سے حساس۔ گرمی سے زیادتی مرض۔

اگریکیس مس۔ گلے میں تشنج اور گلے سے ایک عجیب قسم کی بے اختیار آواز نکالے

جو دم گھٹے جیسی ہو۔

ایلیس میل۔ تب محرقہ میں یا خناق کے بعد پھپھوں کا طاقت کھو بیٹھا۔ حلقوم کی کڑی

ہڈی کے سببان سے۔ گلے میں سوجن کے ہمراہ۔ ڈنگ لگنے والے درد۔

انہیم۔ فالج میں۔

ہیمپریفلر۔ تیرخصتی جیسی دکھن گلے میں۔ ٹانسز کی پیپ اور پھوڑے۔

نکسوامیکا۔ تمباکو نوشی کے پڑھیاں گلے۔ شرابیوں اور واعظوں کے گلے کی دکھن۔

اور تمباکو نوشی، شراب نوشی یا واعظ کی دہر سے گلے میں خراش۔

اگنیشیا۔ محسوس کرے کہ ہڈی نکل رہا ہے جو ادھر ادھر لٹک رہی ہے زچگی میں۔

سٹرامونیم۔ پھپھوں کی سکڑن یا تشنجی سکڑن۔ تشنج کے ہمراہ۔ گلے کی خشکی پچھلے جبے

کے خورہ میں تکلیف۔ دماغ کی جھلیوں میں درم میں بیٹھی ہوئی پھٹی ہوئی آواز میں

بات کر کے جو دکھن میں تبدیل ہو سکے۔

لیکس۔ خناق میں ٹانسز کے بڑھ جانے میں۔ گلے کی خشکی میں۔ ہر دو سرور رکھو

بڑھ جانے میں دائیں طرف سے شروع ہو۔

لوہیلیا الفیلٹا۔ کوئی چیز دل سے اٹھتی ہوئی معلوم ہو جو خوراک کو پیچ جانے سے روکے۔

لائی سین۔ مشروبات ناک سے بہہ نکلیں گئے میں سوزش اور دکھن سے کالی کارب۔ خوراک راستے میں ہی رہ جائے، منہ بند ہونے کی وجہ سے اور قے کی وجہ سے اور قے کی وجہ سے (خوراک کی نالی کی گھٹن کی وجہ سے)۔
آرم ٹرائفلم۔ ایگرٹوں یا فنکاروں، بولی دینے والوں اور مقررؤں کے گلے کی سوزش۔
برٹیا کارب۔ مزمن ناسلے کے بڑھنے سے۔
ایوڈم۔ جھجھ میں گھٹن۔ بھراؤ اور دباؤ کے ہمراہ دکھن۔

سوزش۔ سوالونگ

دفتمر نیم۔ جب مشروبات پیئے وقت ناک سے واپس آجائیں۔
لائیو لوڈیم۔ جب خوراک یا مشروبات ناک کے ذریعہ اُلٹ دی جائیں۔
لیک کنٹیم۔ جب پیئے تو مشروبات ناک کے ذریعہ واپس آجائیں۔ نگلنے کا عمل مشکل تقریباً ناممکن اور تکلیف کا نون تک جائے۔
نایٹرک ایسڈ۔ نگلنے کا عمل بہت مشکل۔ چہرہ کو لگاڑنے اور سر کو پیچے کر لے ایک جمیع بھر مشروبات بھی نہ نگل سکے جو کانوں تک جانے والی شدید درد کا باعث بنیں۔
آکونائٹ این۔ مشکل سے نگل سکے حتیٰ کہ کھاتے وقت گردن کی پشت کو ماتھ بجا پڑے۔ گردن میں جلن اور درد۔ کان کے پچھلے حصہ میں درد اور جلن۔
رسٹاکس۔ تھوکنے میں دقت۔ چھوٹی جھپک میں سرخ بخار میں۔ خناق میں تقریباً نگل ہی نہ سکے۔

سٹرامونیم۔ گلے کے شدید تشنج کی وجہ سے نگلنے میں دقت۔
لیکس۔ مشروبات کی نسبت ٹھوس اشیاء آسانی سے نگل سکے۔ گرم مشروبات رکاوٹ پیدا کریں۔

۔ سیلا ڈونا - گلے کی دھکن اور سوزش کی وجہ سے یا ٹھوس یا مشروبات نگلنے میں دقت وہ بعض اوقات ناک میں یا ناک سے باہر نکال دیئے جاتے ہیں۔

ہائیموسائیمس - گلے زبان - حلقوم اور گلے کی کڑی ہڈیوں کے پٹھوں کا سخت ہو جانا، مشروبات ناک سے باہر آجائیں یا ہوا کی نالی میں چلے جائیں۔

جیلسمیم - خوراک کی نالی کا نالی نگلنے کی طاقت نہ رہے۔

کاسٹیکم - خوراک غلط راستے نیچے جائے یا ہوا کی نالی میں چلی جلنے یا ناک کے پچھلے حصہ میں حلقوم اور خوراک کی نالی کے نالی کی وجہ سے۔

سکوٹاواٹر دوسا - خوراک کی نالی کی اینٹھن یا تشنج جو نگلنے کی طاقت کو ہٹا دے یا مغز کو کرے۔

درم لوزتین یا ٹانسلز کا درم

ایکونائٹ این - شروع میں ہی اس دوائی کے متعلق سوچنا چاہیے۔ پریشانی بے صبری اور دھکن نمایاں علامات ہیں۔

سیلا ڈونا - جب ٹانسلز ہوا گلے سے سوزج جائیں تو یہ دوائی دی جائے۔ دھسرخ اور خون سے پر معلوم ہوتے ہیں۔ چپکن والی درد جو کانوں تک جائے۔

سیلیشیا - شدید درم لوزتین دھسنے والی دردیں۔ جب چھوڑا چھٹ جائے اور اسے آرام نہ آئے۔

مرک آئیوڈ - جب بائیں طرف درد ہو تو درم لوزتین یا ٹانسلز کے لئے بہترین دوائی ہے۔

سٹریپٹوکوکین - تیز بخار کے ساتھ درم لوزتین ہو تو عمل انگریز کے طہ پر یہ دوائی دیں۔

فائیٹولا کا - جب درد کانوں میں گولی لگنے جیسی آئے۔ بلغمی جھلی اور ہنجرہ میں دھسوں

کی طرح زخم ٹھنڈے مشروبات اچھے ثابت ہوں جبکہ گرم مشروبات اچھے ثابت ہوں جبکہ گرم

مشروبات نگلنے مشکل ہوں۔ گلے کی سوزش گہری سرخ یا تقریباً نیلی آواز کا بیٹھ جانا اور خشک کھانسی۔

ایمپریسلفر - جب پیپ ناگزیر ہو۔ گلے میں ناسور۔ پھانسی یا پھلی کی ہڈی کا گلے میں احساس

کانوں تک درد برہے۔ گرم مشروبات افاقہ دیں۔

ایپس میل۔ گلے کی سوزش۔ ڈنگب لگنے جیسی اور بلن دار ٹھنڈے آفاتہ ہو۔
 زبان اور کوا سوجا ہوا اور پھولا ہوا۔ کوا لٹکا ہوا اور گھٹن کا باعث ہو نتیجتاً موت کا خطرہ ہو۔
 برٹیا کا رب۔ ٹانسلز کے بڑھنے میں چوٹی کی دوائی ہے بچے آہستہ آہستہ ٹریس اور
 ذہنی طور پر پس ماندہ ہوں۔ ناک کے پچھلے حصہ میں نزلہ ناک سے خون بہنے کے برابر۔ (کام میں
 مبتلا ہونے پر ٹانسلز میں پیپ۔ کھلی ہوا۔ خشک موسم اچھا رہے۔ ۲۰۰ طاقت مزمن حالت
 میں اور ۶ طاقت میں حالت میں۔

لارو میروس۔ گلے کی تشنجی گھٹن اور گلے کی نالی کی تشنجی گھٹن۔ مشروبات گلے کی نالی
 اور معدہ کی نالی میں آواز پیدا کرتی ہوئی جائیں۔
 اویم۔ جب مشروبات پینے پر پیچھے نہ جائیں بلکہ ناک سے باہر نکلیں۔ گلے کی نالی کا
 فالج۔ مشروبات غلط راستے پر چلے جائیں۔
 برومین۔ سانس کی نالی کا تشنج اور کھچاؤ۔

اگیشیا۔ نکلنے پر گلے کی تکلیف اور درد کو آفاتہ ہو یا نکلنے کے عمل کے دوران میں
 تکلیف میں زیادتی ہو۔

پیشیا۔ صرف مشروبات ہی نکل کے تھوڑا سا ٹھوس بھی منہ بند کر دے۔
 ٹیوبرکولینم۔ یہ دوائی بطور عمل انجینز کے ایک ماہ کے دوران ایک خوراک ۲۰۰ طاقت
 میں دی جائیں۔

تھوجا۔ یہ دوائی بطور ۲۰۰ طاقت میں برٹیا کا رب سے بدل کر ہر ہفتہ میں ایک دفعہ
 دی جائے۔ مزمن ٹانسلز میں یہ ادویات اس ہفتہ میں ہر گز نہ دی جائیں جب ٹیوبرکولینم
 دی جائے۔

ایڈوڈم۔ شدید بھوک کے ساتھ وزن میں کمی ہونا۔ فوری بھوک بہت زیادہ پیاس کے
 ساتھ۔ تھوڑی سی محنت کے ساتھ پسینہ آجائے اور بہت کمزوری۔ ٹانسلز اور تھائی رائیڈین
 کا بڑھ جانا۔ گرم اور نمدار موسم میں۔ کھلی ہوا اور خوراک کھانے سے آفاتہ۔ کان اور حلق کی نالی میں

رکاؤٹ کی وجہ سے بہہ پن -

مرک پروٹو آئیوڈ - ٹانسلز بہت زیادہ بڑھے ہوئے - ناک کے مزمن نزلہ زکام کیساتھ -

لائیکوپوڈیم - جب مرض دائیں سے بائیں طرف جائے اور گرم مشروبات سے آفاقہ ہو -

لیکس - جب مرض بائیں سے دائیں جائے اور گرم مشروبات سے نیا دقتی مرض ہو -

تھوک کی لمبی تاریں - خاص طور پر رنگ دار ناراض لوگوں کے لئے ہے -

گن پاؤڈر - جراثیم کی وجہ سے ٹانسلز بڑھ جائیں -

رسٹائکس - گلے کا گنٹھیا جو ٹانسلز بڑھانے والا ہے - اثر انداز ہو - گلے کی - استسقامی موجن

مشروبات نگلے وقت گھٹن کا احساس -

اگنیشیا - زیادہ تکلیف خاص طور پر جب خوراک کے علاوہ مشروبات نگلے -

مرکیورس - دائیں طرف کے ٹانسلز میں تکلیف شروع ہو لیکن ٹھنڈے مشروبات

سے آفاقہ - زبان گہری فرسے ڈھانچی ہوئی شدید جھنجھے والی گندی بدبو قبض -

مرکیورس بن آئیوڈ - خناق - گلے کی زہر آلودگی کی وجہ سے خون میں زہر کا پھیل جانا -

ناترہنا بائیں سے دائیں طرف کو ہو -

برٹیا میور - جب نگلے وقت گلے میں درد اور گلے کے بند ہونے کا احساس ہو

کلکیریا فاس -

کلکیریا کارب - ایم اینڈ میو برکولینم - ایم - ہر نپدرہ روز کے بعد ادا دل بدل کر دینے

سے مزمن ٹانسلز کو ٹھیک کر دیتی ہے جو ایسے بچوں میں جن میں موٹے ہونے کا رجحان ہو اور مٹی

پلستر اور کاغذ وغیرہ کھانے کا رجحان ہو - اوپیک ادویات ۲۰۰ طاقت میں درواہ تک دی جائے

۱ - ایم طاقت میں استعمال کرنے سے پہلے - اگر یہ ناکام ہو جائے تو برٹیا ۲۰۰ اور تھو جا ۲۰۰

طاقت ہر سہفتہ اور میو برکولینم ۲۰۰ طاقت میں ہر ماہ ایک خوراک -

ایمون - جب ٹانسلز بڑھتے رہیں اور سخت ہوں - نزلہ کے رجحان کے برابر جو گلے میں



ٹانسلز دُور کرنے کے بعد کی تکالیف

سٹریٹو کو کمین۔ ٹانسلز دُور کرنے کے بعد کی تمام تکالیف مثلاً جب رلیض زرد۔ پیلا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بھوک نہ رہے سبے پرواہ ہو۔ ہر ماہ ایک۔ ایم طاقت میں ایک خوراک دیجئے۔
 کلکیر یا کارب۔ ٹانسلز کے دُور کرنے کے بعد ناک کے پچھلے حصہ کا نزلہ اور سانس کی نالیوں کی تکالیف کیلئے ۲۰ طاقت ہر رفقہ ایک خوراک دیجئے۔
 سلفر۔ دل میں جلن۔ مٹھائیوں کی زبردست خواہش دن کے وقت بھوک نہ ہو۔
 رات کے وقت کھانے کیلئے شدید رغبت و بھوک۔ موسم کی تبدیلی کے وقت علامات میں زیادہ طوفانوں سے پہلے۔ غارش۔

حلق کا کوا

ایس۔ حلق کے کوئے کے بڑھے ہوئے کیلئے مخصوص اور چوٹی کی دوائی۔
 مانسفیلا۔ حلق کے کوئے بڑھے ہوئے کے لئے جس میں گلابی طرح سوجا ہوا ہو۔
 مرکالر۔ تھوڑا سا مرکال کی چھوٹی طاقت میں حلق کے کوئے پر لگائیے فوراً مستقل طور پر آرام کر دے گا۔
 ہائیوسائیمس۔ حلق کے کوئے کا بڑھ جانا، سرسراہٹ والی کھانسی کے بہارہ جو لپیٹ جانے پر زیادہ ہو۔

الیومن۔ جب حلق کا کوا ڈھیلا ہو گیا ہو، حلق میں پھیلن کے ساتھ۔

تمسیر احمد

نرخرہ۔ حنجرہ

(کروپ کھانسی۔ حنجرہ یا ہوا کی نالی کے اوپر والے حصہ کی سوزش بھی دیکھئے۔)

درم نرخرہ

اکوناٹ این - جب پُرجہاں کھانسی ہو بخار - بے چینی - اور پریشانی کے ہمراہ -
خشک گرم جلد اور آواز بیٹھی ہوئی -

سپونجیا - عام طور پر اکوناٹ کے چھ گھنٹہ بعد دی جائے یا جوہی سانس لینے کا عمل
باریک اور تیز ہو اور جھونکنے والی کھانسی آواز کا بیٹھ جانا اور اس کا جلتے رہنا، ہوا کی نالی کے
اوپر والے حصہ میں درد کے ہمراہ -

ایلیم سپیا - گلابیٹھا ہوا - سخت - بچنے والی - تشنجی کھانسی جو بخار میں مستقل رہا رہے
اور بھانسنے والی درد - تکلیف کے ساتھ - شدید نرخرہ کی کھانسی -

لیکسس - گلا حساس - مشکل سے نکلے، گرم مشروبات تکلیف کو بڑھائیں جب
مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دی جائیں -

کالی بائی - جب گارھی چپکنے والی اور تار دار بلغم ہو تو یہ دی جائے -
کاسٹیکم - جب آواز کے پٹھوں کی کمزوری ہو سخت کھانسی جس کے ہمراہ پیشاب خارج ہوتا ہے -
فاسفورس - خشک پُرجہاں زرد اور تلخ خون والا بخار - آواز جھلے کے کافی دیر
بعد تک بیٹھی رہے -

مینگنم - خشک بیٹھی ہوئی آواز کے ہمراہ کھانسی -

کلورم - اگر ۱۲ یا ۳۰ طاقت میں دی جائے تب بھی مفید ہوتی ہے -
سیلینیم
نیٹرم میورس { ٹی بی والے مریضوں میں درم بخار -

سمبوکس نائیگرا - لیس دار کف کا بخار میں اکٹھے ہو جانا - آواز کا بیٹھ جانا - دم گھٹنے والی
عالی گہری کھانسی - بے چینی اور پیاس کے ہمراہ - سون سوں کی آواز کے ساتھ سانس -
کاربوووج - ٹی بی یا اس کے علاوہ جب زکام ناک شروع ہو اور آنکھیں پھپھاتی اور منہ میں بیٹھ جاتا ہے -


سیدیل سیرولیا۔ ہنجرہ کی دق۔
ریو میکس۔ پڑھ جان متواتر سرسراہٹ ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے زیادتی۔

نرخرہ یا ہنجرہ کا تشیخ

بروزیم۔ سینے کی ہڈیوں کے پیچھے۔ تشیخ گھٹن۔ سرسراہٹ اور جلن کے ہمراہ۔ سانس اندر کی طرف
لے جانا جو کھانسی پیدا کرتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے بہ نسبت سانس خارج کرنے کے۔ غدد بڑھے ہوئے
خاص طور پر کان کے پاس کے غدد اور غدد در قیہ۔

کیو پیم میٹ۔ سانس کی نالی کے اوپر کے سرے کا تشیخ سانس رککنے کے عمل پر۔ چہرہ نیلا
انگوٹھا تھیلی کی طرف بچھن جلتے اور انگلیاں اس کے اوپر چڑھ جاتیں۔

کلورم۔ سانس کی نالی کے اوپر کے سرے کا تشیخ سانس رککنے کے ہمراہ۔ نرخرے کی ہڈی
کڑی کا تشیخ ہوا کی نالی کا تشیخ۔ نرخرے خالصتاً سوجان کیوجہ سے۔ آواز کے ٹھوٹوں کے تشیخ کیوجہ
سے تنگی تنفس۔ وحشیانہ نظر۔ گھوڑے اور باہر کو ابھری ہوئی آنکھیں چہرے کے نیلے پن کے ہمراہ۔
بروزیم کے برخلاف کلورم کا مریض آسانی سے سانس لے سکتا ہے لیکن مشکل سے خارج کرتا ہے۔
کلکیر یا کارب۔ ہنجرہ کے تشیخ جب اعصابی تکلیف کی وجہ سے نہ ہو یہ ایک جسمانی بناوٹ
کے مطابق دوائی ہے۔





مسوڑھے، دانتوں
مُتہ اور زبان کی
بیماریاں

پھوڑے اور سوزش

مرکیورس - مسوڑھے کے پھوڑے سے پیپ نکلے۔ مسوڑھے سوجے۔ انفعیج کی طرح اور ان میں سے خون نکلے۔ سانس بدبودار۔ بستر کی گرمی اور رات کو زیادتی مرض۔
 امپیریلفر - یہ اس وقت دی جائے جب حقیقتاً پیپ نکلتا شروع ہو جائے۔ یہ پھوڑے کو بٹھانے اور ختم کرنے کا دباؤ اعلیٰ کرے گی۔ $2 \times$ طاقت میں استعمال کیجئے۔
 سیلیشیا - جب امپیریلفر ناکام ہو جائے تو یہ استعمال کی جائے۔
 ہیکلا لاوا - مسوڑھے کے پھوڑوں کے لئے بہترین دوائی خاص پرلوسیدہ گلے ہوئے دانتوں کے $2 \times$ طاقت میں استعمال کیجئے۔

بیلادونڈا - جب مسوڑھوں میں تپکین والا درد ہو۔

مرک آئیوڈ - یہ دوائی بیلادونڈا سے اول بدل کر دی جائے جب شدید دردیں ہوں۔
 کلکیریا فلور - جب کیلیم کی کمی اور دانتوں کا انجیل زہر ہے تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔
 آرنیکا مانٹ - مصنوعی دانتوں کے ختم ہونے کے بعد مسوڑھوں میں درد اور سوزش۔

مسوڑھوں سے خون نکلتا

مرک سال - مسوڑھوں کے ناسور اور ان سے خون بہے۔ خارش جلیں اور مسوڑھوں کی مرنجی۔
 فاسفورس - مسوڑھوں کے ناسور اور ان میں سے خون بہنے کے لئے شاندار دوائی ہے
 اس دوائی سے علاج شروع کیا جائے خشک دوسری ادویات کی صاف علامت ظاہر ہو جائیں۔
 کلکیریا فلور - مسوڑھوں سے خون بہے دانتوں کے گلنے کے ہمراہ۔

کاربونیوٹکج - جب دانت مسڑھوں سے علیحدہ ہو جائیں اور ڈھیلے ہو جائیں۔ دانت
جلدی جلدی لگیں۔ جب دانتوں کی صفائی کی جائے تو خون بہے یا تھوڑا سا بھی دانتوں کو
چوسنے پر خون ہے۔ دونوں سرد اور گرم یا نمکین خوراک سے تکلیف ہو۔

لیکس - مسڑھوں سے خون بہے پانی کی شدید پائس کے ہمراہ۔ گنٹھیاں میں مبتلا
ہونے کا رجحان۔ دانتوں کے ارد گرد سے خون ہے۔

انٹم کروڈ - مسڑھوں سے اور دانتوں سے جلد علیحدہ ہو جائیں اور آسانی سے خون ہے۔
سٹیف سگیر یا - اسفنج کی طرح کے مسڑھوں کو جن کو خوراک یا انگلی کے چھونے سے
آسانی سے خون بہنا شروع ہو جائے۔

ٹیرنٹیجھ - پیناب میں البیومن کے اخراج کے ہمراہ مسڑھوں سے خون ہے۔

کاسٹیکم - دانتوں کے ماسور میں آسانی سے مسڑھوں سے خون ہے۔

سڈرن - حیض کے دوران مسڑھوں سے خون ہے۔

کلکیر یا کارب - حیض کے دہنے کی وجہ سے مسڑھوں سے خون ہے۔

سلفر - ٹائیفائیڈ بخار میں مسڑھوں سے خون ہے۔

البیومن - مسڑھوں سے خون بہے جو دانتوں سے پیچھے ہٹیں۔ دانتوں کا گلنا۔

منہ کی دکھن اور زخم

آرٹیکلیم البم - منہ اور زبان پر شدید خشکی اور جلن۔

ہائیدر وکسٹوٹائل - پوٹاشیم کلورائیڈ کے غلط استعمال کی وجہ سے۔

لیکس - بلغمی بھتی کے قریب گہری اور غوانی رنگ کا اظہار۔

مرک سال - جب تنوک اور دکھن ہو۔

ٹائبرک الیڈ - تیز جھجے والی درد ،

خاص طور پر ٹھانسیوں کے رستیا ہونے کی صورت میں۔

کیلنڈر والا۔ پائیوریا کے لئے سوٹی کی دوائی ہے۔ کچھ وقت کیلئے ۲۰ قطاںیں دیجئے۔
 کلکیریا رینالس۔ پائیوریا کے لئے شاندار دوائی بتائی جاتی ہے۔
 مرکورس۔ سفید اسفنج کی طرح کے مسوڑھے منہ سے بدبو آئے ۶ ملاقات میں استعمال کیجئے۔
 سیلشیا۔ درد والی سوزش۔ مسوڑھوں میں پیپ کا بننا۔ مسوڑھوں کے پھوڑے۔
 گن پاؤڈر۔ جب مسوڑھوں میں پیپ بنے اور پیپ خارج ہو۔
 کالی کارب۔ پائیوریا منہ سے بُری بدبو آئے اور دانت پلے۔
 پلانٹیکو مچر۔ دانت دکھیں اور چھوٹنے سے حساس ہوں۔ چاقو مارنے والی اور
 سوراخ کرنے والی تکلیف۔
 کریوزوٹم۔ بیمار دانت گندی بو کے ہمراہ۔ کھینچنے والی۔ تپکن والی درد۔ مسوڑھے
 ناسور زدہ اور ان سے جلدی خون ہے۔
 بیٹیشیا۔ مسوڑھے گہرے سُرخ اور بدبو دار۔ مسوڑھوں سے خون اُبلے۔ بدبو دار
 تھوک (دہن کے تحت درد اعصابہ بھی دیکھیے)

درد اعصابہ

سٹیفیگیبریا۔ یہ بہترین دوائی ہے۔ سب سے پہلے دی جائے۔
 کوکسیلا۔ دوسرے نمبر پر یہ دوائی دی جائے۔
 گوٹر۔ رسولی۔

میگنیشیا کارب۔ دانتھک ٹیبلٹ کی رسولی۔

نائٹرک ایسڈ - مسوڑھوں کے گوڑ یا رسولی اخروٹ کے برابر -

پھوڑا یا ناسور

مرکب کار - جب ناسور کے ہمراہ بہت زیادہ پانی کی طرح کا تھوک ہو -
کریوزوٹم - جب مسوڑھ سے ہلکے نیلے سرخ - نرم - اسفنج کی طرح کے جن سے خون بہے ،
اور سوجے ہوئے -

فیٹرم میسور { نائٹرک ایسڈ
یہ ادویات مسوڑھوں کے
ناسور کے لئے مفید ہیں -

جبراً کرکڑانا دوسرا حصہ

رسٹاکس - جبراً کرکڑانا - گنٹھیا کے ہمراہ یا اس کے بغیر -
نائٹرک ایسڈ - اگر رسٹاکس ناکام ہو جائے تو یہ استعمال کی جائے -
گریٹیم - جبراً کی پردہ کرکڑکن -
آرم ٹرانزفلم - نکلے وقت جبراً کے جوڑ میں تکلیف جیسے کہ موج آئی ہوئی ہو -

گلنا سٹرنا

بڈی کا گلنا سٹرنا دیکھیے - ایپولس بھی دیکھیے -
تھوجا - اگلے بڑے دانوں کے پیچھے دانوں کے ناسور -
کلکیر یا کرب - جب تھوجا ناکام ہو جائے تو یہ دی جائے ۲۰۰ طاقت یا سی ایم
طاقت کی خوراک ہی استعمال کرائی جائے -
برانی اونیا - نچلے جبراً کے بائیں طرف کے زاویے کی سوزش یا رسولی -

پہلے ایٹیکم { اگرچہ مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دی جائیں۔
 ایک کیسٹم - میگنٹس پوس آرک - جڑے میں سوزش اور تکلیف خاص طور پر بائیں جڑے میں۔
 ٹھنڈک کانیاں احساس۔

دانت بند ہو جانا یا جڑوں کا نہ کھلنا

اکٹیا پائیکٹیا - جب اوپر کے جڑے میں درد ہو۔
 میگنٹیا فاس - جڑوں کا نہ کھلنا۔ ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہونے کی وجہ سے تکلیف۔
 انگیچورا - جڑوں کا نہ کھلنا۔ ہونٹ پیچھے کی طرف کھینچ جائیں۔ دانت نظر آئیں۔

جڑوں کا کھلنا سڑنا۔

انگیچورا دیرا - یہ ۲۰۰ کی طاقت میں دی جانی چاہیے۔
 فاسفورس - بائیں طرف کے پچھلے جڑے کا کھلنا سڑنا۔
 سیلشیا - یہ مختلف طاقتوں میں دی جانی چاہیے، اگرچہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں۔
 اگر کیس ایم - اوپر کے جڑے کی ٹہنی میں درد اور دانتوں میں درد۔

ہونٹ۔

تیسرا حصہ

خون بہنا۔

آرم ٹرانفلم - ٹائیٹائیڈ بخار وغیرہ میں ہونٹوں سے خون کا بہنا۔ مریض ہونٹوں کو چبا کر
 حکم ان میں سے خون ہے۔

لیکس - بخاروں اور خناق میں ہونٹوں سے خون ہے۔

برومیم - کالی کھانسی میں ہونٹوں سے خون ہے۔ (دیکھئے ہونٹوں کا ناسور، بخار کے

بچے - متفرقات کے بچے کینسر دیکھے)

بچالے پھٹے ہوئے

آرم سلفیو رینیم - ہونٹ پھٹے ہوئے -
آرم ٹرائفلیم - ٹھنڈی ہوا سے پھٹے ہوئے ہونٹ -
برائی اونیٹا - ٹائیٹائیڈ بخاریں اسہال میں -
نیزم میور - ملیریا کے بخار کے بعد ہونٹ پھٹ جائیں -
سیدیا - درد میں ہونٹ پھٹ جائیں

انٹم کروڈ
کنڈورا انگو - { منہ کے کناروں پر تکلیف دہ پیرے -
زینک میٹ

تیپھے کی طرف کھینچ جائیں -

انگسچور - ہونٹ تیپھے کی طرف کھینچ جائیں - دانت نظر آئیں -
سوزش -

کیدیم سلف - ہونٹوں کی سوزش -

رسولی

کنڈورا انگو
کونیم
کاربوووج
سٹیفگیڈیا - { یہ ادویات مریض کی حالت کے مطابق دی جائیں - ایسے کیسوں میں کونیم
سخت رسولی میں اور سب سے پہلے دی جانی چاہیے - اور نرم رسولی میں
سب سے پہلے سٹیفگیڈیا دی جاسکتی ہے -

فاسفورس - سخت قسم کے گولڑوں یا رسولیوں میں دی جا سکتی ہیں۔ یا سب سے پہلے لٹھ
 سلفر - کی عام حالت کو دیکھ کر یا مندرجہ ذیل میں سے ایک یا دو ادویات دینے
 سیلیشیا - کے بعد جب مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام رہیں۔

ہونٹوں کا تشخ

اولیم انجیل - ہونٹوں کا تشخ -

چوتھا حصہ

منہ

منہ کی خشکی

آر سینک البم - تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ تھوڑے پانی کی پیاس
 کے ساتھ منہ کی خشکی -

برائی اونیا - کثیر مقدار میں لمبے وقفے کے ساتھ پانی کی پیاس زیادہ -

نکس ماسکٹا - منہ کی بہت خشکی - زبان اتنی خشک کہ منہ کی پھٹ کے ساتھ چپک
 جائے۔ تھوک کپاس کی طرح ہو۔ گلا خشک - سخت پیاس نہ ہو -

لیکس - منہ اتنا خشک ہو کہ لٹھ زبان باہر نہ نکال سکے

الیومن - منہ گلا اور زبان خشک - برف جیسے ٹھنڈے پانی کی پیاس - منہ میں جلن -
 زخم شدہ گندا - اور اسفنج کی طرح کا -

نکس و امیکا - سانس بدبودار - کھانا کھانے کے بعد منہ کی خشکی یا صبح کے وقت
 منہ کی خشکی -

پلسٹیللا - سانس بدبودار - شام کے وقت یا رات کے وقت منہ کی خشکی -

آرم میٹ - سانس بدبودار لڑکیوں میں بلوغت کے وقت -

آرم ٹرائفلم - منہ سے گندی بدبو -

کیسٹیکم - گرم چھنے والی گندی ہوا پھپھڑوں میں سے نکلے، کھانتے وقت گلے کا ذائقہ گندہ ہو۔
 ہائپوسائٹیس - منہ خشک - زبان جیسے کہ جلا ہوا چٹرا ہو چڑے کا ہی ذائقہ ہو۔ زبان منہ
 میں خشکی کی وجہ سے کھڑکھڑاتی ہے۔

براڈیامیوس - منہ خشک - زبان پھٹی ہوئی - مسوڑھوں سے خون بہے۔ لیسڈرٹھوک
 منہ کو بھر دے۔ منہ سے گندی بدبو آئے۔ جلد میں جلن اور جھجھک۔

مرکیوریکس پریٹیس - منہ اور گلا خشک منہ میں کھانڈ نہ بگھل سکے یا حل ہو سکے کھانا
 کھانا کھانے سے خشکی میں زیادتی - سانس گرم اور سہوٹوں کو خشک کر دے۔

ایپیس - منہ کی خشکی میں یہ دوائی مفید ہے۔
 ایسڈ فاس - زیادہ تر کے مریضوں میں منہ کی خشکی کے لئے مفید ہے۔

لیورینغم نائٹ }
 فاسفورس }
 کے لئے یہ ادویات مفید ہیں۔
 سلیسیلک ایسڈ - منہ خشک زبان پر چلنے والی چھوٹی چھوٹی جگہیں منہ میں زخم اور
 دکھن اور بدبو دار سانس۔

دریٹریم ایلیم - سینہ کے دوران میں شدید پیاس۔
 منہ کھولنا۔

لیکس }
 کاسٹیکم }
 منہ کھولنا مشکل ہو۔

اوپیم - نیند کے دوران منہ کھلا ہو۔
 بیونو - مرگی کے حملہ سے پہلے منہ کھلا ہو۔

لائیکوپوڈیم }
 سلفر }
 منہ بند نہ کر سکے۔

زبان کے نیچے کا گومڑ - تندوا -

تھوچا - نیسی یا دیدیوں کی گانٹھیں زبان پر یا منہ میں -

امبرگریسا - بدبودار سانس کے

ہائیدروفوبیم - جب دقت کے بعد تندوا توقع ہو یا تندوا دقت کے بعد نفی ہو جائے

کلکیر یا کارب - اگر مذکورہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دی جاسکتی ہیں -

مرک سال - سخت اور جسامت میں بڑا - یہ تھوچا سے اول بدل کر دی جائے -

تھوک

مرک سال - سادہ تھوک، منہ اور مسوڑھے دکھیں - حمل کے دوران بھی - نیند کے

دوران میں تکیہ بھگو دے -

نیٹرم میور - خضبی قسم کا تھوک - منہ زبان پر پھوڑے یا ناسور کے ہمراہ - ہونٹوں کے زاویے اور منہ کی اندرونی دیواریں - متواتر اور شفاف تھوک سے پُر -

ایٹھیک الیڈ - جلن دار پانی کی منہ بھر کر الٹی بہت ہی تھوک کے ہمراہ - دن اور رات - کھٹے پانی کی الٹی -

آئیوڈم - پارے کی دھج سے تھوک - اگر پہلی دوائی

ناٹریک الیڈ { ناکام ہو جائے تو دوسری دوائی دی جائے -

آئرس ور - اعصابی درد کے ہمراہ تاردار تھوک -

ایلیم شامیوا - کھانا کھانے کے بعد بہت ہی زیادہ مقدار میں تھوک - بول چال کے

دوران منہ سے پھوارا گرے -

جبرائلی - حمل کے دوران اعصابی وجوہات سے -

مرکورس - { بدبودار اور گندہ تھوک -

پیکرک الیڈ - سفید بھاگ دار تھوک تاروں سے فرش تک لکے -

کالی بائی - تار دار تھوک -

سائیکلین - نمکین تھوک -

الکیشیا - شیش یا کھٹا تھوک -

وریم البم - بے ذائقہ تھوک - شدید کمزوری جسم ٹھنڈا - غش کھانے کا رجحان -

منچرس کون - سوتے وقت سرٹانے پر بہت زیادہ تھوک ہے -

ایپی فیکس - پسندیدہ تھوک - سردی کے دوران تقریباً متقل تھوک کی خواہش

سلفر - تھوک جس خون کی ملاوٹ ہو اور بواسیر کے رجحان کے ساتھ -

پلسٹیل - جب زیادہ تھوک متلی اور خوراک سے نفرت کے ہمراہ - حمل کے دوران -

آرسنک البم - شدید کمزوری - لاغر - کمزور اور زرد لوگوں میں غشی کے ہمراہ - دل کی

جلن خوراک کی تہ - حمل کے دوران -

کیمو میل - مٹھاس والا تھوک -

کریوزوٹم - حمل کے دوران تھوک زیادہ -

کالچیکیم - منہ کا تھوک جس کو ننگلے پر جی متلائے -

بریٹامیور - منہ سے گندی بو کے ساتھ تھوک کی زیادتی -

بریٹاکارب - نیند کے دوران تھوک منہ سے ہے -

منہ کی دیکھن

بیلادونا - منہ سرخ خشک اور جلن اور بغیر یا کس کے -

کیپسکیم - منہ کی سادہ سوزش جلن کے ہمراہ -

نیٹریم میور - نقشہ دار زبان کے ساتھ، منہ کی سوزش اور سرخ نشان - منہ اور زبان

گرم خشک اور جلے ہوئے معلوم ہوں -

ہیپر سلفر۔ منہ کے کناروں پر بھوسا دار دافع۔ تھوڑی پرچھنیاں۔ نرم تالو کا ناسور جو حلق کے کوڑے کو کھا لیتا ہے اور نرم تالو کو تباہ کر دیتا ہے اور بعد میں منہ کی چھت کی ہڈیوں والا حصہ تباہ کر دیتا ہے۔ منہ سے شدید ناگوار بو سڑے ہوئے پنیر جیسی آتی ہے اور پارسے کا غلط استعمال۔
 مرک کار۔ منہ کی زخم دار سوزش۔

میوٹیک الیڈ۔ چھالوں والا منہ۔ زبان کی کھجلی یا خارش۔ بار بار ہونے والے ناسور۔ آدم ٹرائفلم۔ منہ میں بہت زیادہ مکھن۔ زبان کی سرخی۔ اٹھے ہوئے دانے۔ ہرنٹ اور منہ کے کونے پھٹے ہوئے ناک دکھے۔

ریوم۔ سونے کے بعد منہ بدبو دار کف سے بھر جائے۔
 بورکس۔ بلغمی جھلی ننگن دار جیسے کرملی ہوئی ہو۔ منہ خشک۔ منہ کی سوزش پیاس اور تھکے کے ہمراہ۔ چھوٹے پرچھالوں سے آسانی سے خون بہے۔

ہائیڈروکوتائیل۔ زبان نرم جس پر دانتوں کے نشان پڑ جائیں۔ احاس جیسے کہ یہ جل گئی ہو۔ خاص طور پر زبان کا اگلا حصہ یا سامنے والا حصہ۔
 سوراٹینیم۔ زبان کی لوک خشک اور جلی ہوئی محسوس ہو۔
 سینگونیاز۔ منہ کی چھت اور گلی کی چھت محسوس کرے کہ یہ جلی ہوئی ہے یا گرم پانی سے دھوئی گئی ہے۔

ہائیڈراکٹس۔ خاص طور پر چھالوں والے پردہ منہ کے لئے مفید ہے۔ زبان شدت سے ڈھاپی ہوئی۔ نیسجی ناسور منہ میں، منہ سے چپکانے والا کف۔
 بیٹیشیا۔ غددوں کے ناسور۔ گہرے سرخ یا بیگنی رنگ کے۔ گزہ اور بدبو دار بہت زیادہ تھوک۔ زبان پر درد بھٹی ہوئی اور ناسور دار (ریل و دق)۔ پارسے کے اصل یا ماخذ والی آرٹیکلیم۔ منہ میں اور زبان پر سرخی اور نیگیوں چھالے۔ کالوں اور مسوڑھوں کی ناسوری سوزش بنجار کے ہمراہ ناسور کے درمیان میں سیاہ نقطوں والا حصہ شدید مچھنی اور کمزوری۔

ناٹرک لیڈ۔ پارے کا غلط استعمال یا آتشک کی وجہ سے ناسور۔ تھوک خراشدار اور بدبودار۔ منہ کے کناروں کو پھیلنے والا۔ دانت زرد نظر آئیں ڈھیلے ہوں اور گرہیں۔ یہ ناسور اور گنگرین قسم کی زخموں کو تندرست کرتی ہے۔ منہ سے گندی بدبو۔

ایتھوزا۔ دودھ خارج کرتا ہے منہ اور گلے کی عمومی چھالوں والی حالت جن کی وجہ سے ننگلے میں دقت ہو۔ معدہ کی خرابی کی وجہ سے بچہ دہی کی صورت میں۔ دودھ خارج کرتا ہے تیزی سے قے کرنا یا منہ بھر قے کرنا اور پھر اس کے بعد کمزوری۔

فاسفورس۔ منہ کے زخموں کی وجہ سے منہ کی دھکن اور سٹروں سے خون بہے۔ مفید یا زرد لیکر سٹروں پر۔ عام بدنی کمزوری۔

مرک سال۔ جہاں پارے کے استعمال کا کوئی نشان نہ ہو۔ منہ کے زخموں کی وجہ سے منہ کی دھکن کے لئے بہت مفید ہے۔ سٹروں کے زخم بہت زیادہ تھوک کے ہمراہ بدبودار سانس اور رات کو تکلیف میں زیادتی۔

سیسیا۔ زبان میں تکلیف یا درد جیسے کہ بل گئی ہو۔
الیومن۔ منہ کا پکنا اور اس میں خشکی۔ ٹھنڈے۔ پانی کی پیاس۔
سفلینم۔ منہ کا پکنا۔ منہ کے زخم رات کے وقت سونے پر بہت زیادہ مقدار میں تھوک
مرک سال کی طرح سر ملنے کو خراب کرے۔

نیزم سلف۔ جب منہ میں چھوٹے چھوٹے چھالے ہوں یا بہت ہی حساس قسم کے چھوٹے جن کو ٹھنڈا پانی منہ میں رکھنے پر افاقہ ہو۔

ہیلی بورس نائیگر۔ منہ کے چھالے بہت زیادہ تھوک کے ہمراہ کے لئے مفید
دوائی ہے۔ سرخی نابل زرد کناروں کے ساتھ زخم۔ زبان کا سُن ہونا اور سوج۔ گلے میں کڑوا ذائقہ۔
سلیفوک لیڈ۔ منہ میں چھالے۔ زبان بہت ہی سوجی ہوئی، بہت زیادہ مقدار میں تھوک
سانس بدبودار۔ منہ سے خون بہے۔

لیکس۔ منہ کے اندر چھالے اور رنگی جگہیں جلیں اور دھکن کے ساتھ سٹروں

سوچے ہوئے۔ انفج کی طرح کے خون بہے زبان سوچی ہوئی جلتی ہے۔ کانپتی ہے۔ سرخ
خشک اور کناروں سے پھٹی ہوئی ہوئی۔

بولنے میں تکلیف ہو

سیدرن - حیض کے دوران بولنے میں تکلیف ہو۔
جیلسمیم - زبان کے بھاری پن کی وجہ سے بولنے میں تکلیف ہو۔
امونیا کارب - درد کے ہمارا بولنے میں تکلیف -
کیوپریم میٹ - جب گلے میں تشنج کی وجہ سے ہو۔
مرکوریس - منہ اور زبان کے کانپنے کی وجہ سے بولنے میں تکلیف آواز لرزہ کھڑے۔
اگرکس ایم
روٹا { جب زبان میں تشنج ہو۔
سٹر امونیم
ڈلکا مارا - جب زبان کی سوزش کی وجہ سے ہو۔
لیکس - جب ٹائیفائیڈ بخار میں
آرڈنم ٹمیٹ - جب لیسڈر تھوک کی وجہ سے -
سٹانم - جب چھاتی یا گلے کی کمزوری کی وجہ سے
کالی بروم - ہچکچاہٹ سے بولے یا بولنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرے -
ہائپرکیم - آواز کانپے۔
کیمومیل - بولنے میں تکلیف کے ساتھ الفاظ پھوڑ جائے۔
نکسوامیکا - الفاظ اور رکن تہجی پھوڑ دے -
لائیکوپوڈیم - غلط الفاظ اور غلط رکن تہجی استعمال کرے۔
گلونائن - گفتگو مشکل اور غیر واضح - مشکل سے بول سکے۔

بیوقوف۔ لڑکھڑانا اور ہکھلانا جب غیر مربوط گفتگو سمجھ میں نہ آئے۔ تو ناراض ہو جائے۔
کو کولس۔ گفتگو غیر واضح۔

امونیا میور۔ مجمع طریقہ سے نہ بول سکے۔

تھو جا۔ ایک قسم کے رکن تہی بولے۔

اکونائیٹ این۔ گفتگو کا پتی ہوئی اور ہکھلاتی ہوئی۔

بولنے کی طاقت جاتی رہے

لیکسس۔ بولنے کی طاقت مکمل طور پر جاتی رہے۔ زبان کو منہ سے نکال دینا۔

ہائیوسائیمس۔ اگر ڈر کیوجہ ہو تو زبان کی حرکت ناکافی مت ہونے اور لڑکھڑانے کے ساتھ۔

سٹرائٹیم کارب۔ ٹائٹنڈ ہنھار کی وجہ سے۔

کاسٹیکم۔ جب عضو کے فالج کیوجہ سے۔

نکسوامیکا۔ مرگی کے حملہ کے بعد۔

اکٹیلیرس۔ ایک بھی رکن تہی نہ بول سکے اگرچہ کوشش کرے۔

فیرم پچرکیم۔ پبلک میں تقریریں کرنے والوں کی آواز کا بیٹھ جانا یا ناکام ہو جانا۔

تھو کنا۔

کو کولس۔ تھوکنے کی لگاتار خواہش۔

کرڈیلس ایچ۔ سیاہ خون تھو کنا۔

ایپی فیکس۔ اعصابی سردرد کے ہمراہ لگاتار تھو کنا۔ لیڈر تھوک کے ساتھ۔

سٹرامونیم۔ منہ پر جھاگ کے ہمراہ لگاتار تھو کنا۔

کاجو بیٹم۔ لگاتار تھوکنے کا رجحان۔

ہکلانا۔

سٹرا مونیم۔ ہکلانے کی چوٹی کی دوئی ہے۔ لفظ بولنے سے کافی دیر تک دی جائے۔
چہرہ کو بھگارتے اور بولنے کے لئے کافی کوشش کرنا پڑے۔

بودستا۔ بچوں میں ہکلانا۔

کالی بروم۔ ہکلانا۔ آہستہ اور بولنے میں مشکل محسوس کرے۔

کلکیر یا کارب۔ بڑی۔ بھاری اور سخت تالو کی وجہ سے ہکلاہٹ۔ سی ایم طاقت
میں دی جائے

ہائیوسائیمس۔ جب ہائیوسائیمس نام کام ہو جائے تو درج ذیل دیکھئے۔

نیرٹم کارب۔ زبان کے بھاری پن کی وجہ سے ہکلانا۔

سکوٹا وائروسا۔ جب اپنے الفاظ کو نگل جاتا ہے۔

کاسٹیکم۔ جب جوش یا انتہائی ناراضگی کی وجہ سے ہوا زیادتی ہو۔ زبان کی فانی حالت
کی وجہ سے ہکلانا۔

آرچنٹم ہائیوسائیمس
لائیکو پورٹیم
وریرٹم ایلیجم
جب ہائیوسائیمس بخار کی وجہ سے۔

لیکس۔ نامی رجن تہی مثلاً ایکس۔ ایس۔ وی۔ ٹی۔ اے پی ہر ہکلانا۔

سیدرن۔ عورت میں مباشرت یا جنسی فعل کے ہکلانا۔

بیوفو۔ ہکلانا اور راکھڑا۔ جب اس کی بے ربط گفتگو سمجھ میں نہ آئے تو ناراض ہو جائے۔

دیکھیے منہ کا دکھنا۔ منہ کا سوج جانا۔

منہ کا ذائقہ

چائنا۔ ہر چیز جسکے پانی کا ذائقہ بھی کڑوا معلوم ہو۔

اکونائٹ این۔ ہر چیز کا ذائقہ سوائے پانی کے کڑوا معلوم ہو۔

برائی ادویا {
 نیرم میور
 پلسٹیل
 سلفر

جب خوراک کا ذائقہ کڑا لگے دی گئی ترتیب میں دیجئے حتیٰ اگر کسی خاص
 دوائی کی علامات ظاہر ہوں۔

کریوزوٹم - پانی پینے کے بعد خوراک کا ذائقہ کڑا معلوم دے۔

کاربووٹک {
 یوریکس

کھانا کھانے سے پہلے ذائقہ کڑا۔

سائیکامین - نمکین ذائقہ۔ ذائقہ کم یا بگڑا ہوا۔

کیمفر - ہر قسم کی خوراک کا ذائقہ بڑھا ہوا۔

دریٹم ورائیڈ - پانی کا ذائقہ میٹھا معلوم دے، مٹھائیوں سے نفرت۔

مرک سال - روٹی کا ذائقہ میٹھا معلوم دے۔

کیویرم میٹ - دھاتی ذائقہ۔ چکنا اور میٹھا ذائقہ۔

رٹماکس - ذائقہ کھٹا یا ترش۔ دھاتی اور گرےس کی طرح کا۔

نکس وایکا - ذائقہ بڑا۔ ترش ہر قسم کی تبدیلیوں کے ساتھ۔ دودھ کا ذائقہ پریشان

کُن - جیسے کہ خواب ہو۔

بووڈسٹا - خون جیسا ذائقہ

لائیکو پوڈیم - ہر چیز پر کھٹی یا ترش معلوم دے۔

نیرم میور - کھانے کے بعد بھی کافی دیر تک ذائقہ رہے۔ نمکین ذائقہ

کیپیکم - گندا ذائقہ جیسے کہ رٹا ہوا پانی ہو۔ جب کھانے تو منہ میں جھنجھنے والا برا ذائقہ۔

بائیڈرائٹس - بڑا ذائقہ جیسے کہ صابن کا ہو۔ زبان کی نوک پر ذائقہ ہو۔ یہ میٹھا یا نمکین ہو

ایوڈیم - خوراک کا عجیب سا ذائقہ ہو کھانے کے عرصہ بعد تک ذائقہ ہو۔

کوکولس - میٹھا دھاتی ذائقہ تھوکنے کی لگتا ہوا خواہش کے ساتھ۔

میدورنیم۔ تانبے جیسا ذائقہ زبان پلستشدہ۔ خساروں اور ہونٹوں کے اندر دنی طرح پڑے۔
 مرکوس۔ نیکیں ذائقہ۔ میٹھا۔ دھاتی۔ شیرہ جیسا یا گندہ اندوں جیسا۔
 پلیسٹیل۔ گلے سٹرے گوشت جیسا ذائقہ، تے کے رجحان کے ساتھ۔ منہ میں جلی
 ہوئی چیزوں کا ذائقہ، کڑوا، اہر چیز کا ذائقہ کم۔
 سٹرمونیم۔ ذائقہ کڑوا۔ تمام چیزوں کا ذائقہ کڑوا معلوم ہو۔ ذائقہ جاتا رہے۔
 وریٹریم البم۔ منہ میں ذائقہ کی کمی۔ بے ذائقہ تھوک۔ پسینے کے دوران شدید پیاس
 دیکھے مٹکھنا۔ ناسور۔

پانچواں حصہ

دانت

دانت کا ناسور۔

کلکیر یا فلور۔ دانت کے ناسور اور گلے سٹرنے، دانتوں کی پالش اتر جانے کیلئے چوٹی کی
 دوائی ہے۔ دانتوں کی پالش کا اتر جانا۔ دانتوں کا غیر قدرتی ڈھیلپن تشکیل کے ساتھ یا تحلیل کے
 بغیر۔ دانت اپنے غلاؤں میں ڈھیلے ہو جائیں۔

سٹیفسگیر یا جب دانت سیاہ ہو جائیں۔ ان میں گہری دھاریاں پڑ جائیں گنا سٹرناسور
 ہو گئے ہوں۔ تھوڑا سا چھوٹے پر بھی حساس ہوں۔ یعنی دکھیں۔ کھانے یا پینے پر دکھیں۔ دانت درد
 دودھ کے دانت اچھی طرح نہ بڑھیں۔ ان پر سیاہ دھبے ہوں اور ٹوٹ پھوٹ جائیں۔

مرک سال۔ دانتوں کا گنا اور ڈھیلے ہو جانا۔ سٹورھوں سے خون ہے۔
 پلانینگو۔ تیزی سے گنا اور ڈھیلے ہو جانا۔ سٹورھوں سے خون ہے۔
 کریوزوٹم۔ جوں ہی دانت ظاہر ہوں، وہ سیاہ ہو جائیں اور گلیں سٹریں۔
 فلورک ایسڈ۔ دانتوں کا جلد ناسور یا آسٹوڈ کا ناسور۔

تھوجا۔ دانت جڑوں میں گل جائیں جب کہ سر یا باہر کے حصے تندرست ہوں۔
 ایسڈ فاس۔ زرد دانت۔ سٹورھوں سے خون ہے۔ سوجے ہوئے۔ دانتوں سے دھڑکیں۔
 سٹورھوں پر درد والی کانٹھیں۔

سقلیتہم۔ دانت ٹوٹ پھوٹ جائیں اور زرد ہو جائیں۔ سورتھوں کے سروں پر دانت گل جائیں اور ٹوٹ جائیں۔

یہ سورتھوں کو لینہم لو۔ جب دانت بالکل نہ بڑھیں یا نہ ظاہر ہوں۔ یہ دوائی دانت پیدا کر دے گی۔ بچوں کے دانت گندے نظر آئیں اور تقریباً سب زنگ کے ہوں۔ اس دوائی کی ایک خوراک دانتوں کو صاف کر دے گی۔

پتھر تھکس۔ عقل ڈاڑھ کے سیکھے وقت کی تسکلیف کے لئے بہترین دوائی ہے۔ آرنیکا مانٹ۔ معالج دندان کے پاس جانے سے پہلے ایک یا دو خوراک اس دوائی کی لینا چاہئیں۔ یہ اپریشن کے صدمہ سے محفوظ کر دے گی۔ اپریشن کے بعد دو یا تین خوراکیں ہر گھنٹہ کے بعد لی جائیں۔

ایپیکاک۔ دانت نکالنے کے خون ہے اگر خون چمکدار سرخ اور زیادہ مقدار میں ہو۔ فاسفورس۔ اپریشن کے بعد دانتوں کے خلاؤں میں سے خون ہے۔ ہر پندرہ پندرہ منٹ بعد اس کی دو یا تین خوراکیں دیجئے۔ خون بہنے کو روک دے گی۔ اور صدمہ سے نجات دے گی۔ دانت بے رنگ بھورے۔ کھوکھلے۔ سورتھوں سے خون ہے۔ دانتوں کے خلاؤں سے مواد ہے۔ جڑے گلنا سڑنا۔

میشریریم۔ تیزی سے گلیس ٹریس۔ اور دانت لمبے معلوم ہوں۔ سلیشیا۔ سوکھے مسان میں مبتلا بچوں کے دانتوں کا گلنا سڑنا۔ کلکیریا فاس۔ دانت نکلنے میں دیر کریں یا جلدی گل ٹریس جائیں۔ چھوٹے سے یا دبائے جانے سے حساس ہوں۔

کلکیریا کارب۔ موٹے بچوں میں دانتوں کا گلنا سڑنا۔ دانت ظاہر نہ ہوں، جہاں ظاہر ہوں وہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے۔ اوپر والے بد نما حصے سیاہ ہوں۔ یہ خون کو روکنے والی دوائی ہے۔ دانت اکھاڑنے یا نکالنے کے بعد خون کو منجمد کرنے میں بہت زود اثر دوائی ہے۔

سکاربو وک۔ دانت تیزی سے گلیس۔ اسٹیم کی طرح کے سورتھ۔ آسانی سے خون ہے گرم یا

ٹھنڈی یا ٹمکین خوراک سے حیرنے پھارنے والی دروہیں ہوں۔

نیرم سلف - دانت ڈھیلے ہو جائیں اور سائیکوس حالت میں چلے جائیں اور گر جائیں۔ دانتوں سے سوڑھے علیحدہ ہو جائیں۔ دانتوں میں گرم اشیاء سے درد، ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی ہوا سے اٹکتے۔
(ناسور بھی دیکھئے۔)

دانتوں کی بدنمائی

تخلیفیم - بچوں میں بد نما دانت - ٹوٹے چھوٹے۔ دھبے دار۔ جلدی گلیں۔ کپکپ کے
دانت - شدید درد۔ دانت کی جڑ میں کیڑے رنگنے کا احساس۔
دانت گرنا۔

مرک وائیو - سادہ قسم کے کیسوں میں
فاسفورس - سوڑھوں میں پیپ پڑنے کی وجہ سے دانت گریں۔
دانت کا ناسور

سلیشیا - دانت کا ناسور۔ سوڑھوں کے چھوٹے۔ دانتوں کی جڑوں میں چھوٹے۔ سوڑھے
سرد ہوا سے متاثر ہوں۔

ایسڈ فلوریکم - دانت کا ناسور جس سے متواتر خونی اور ٹمکین مواد نکلے۔ دانت گرم
محسوس ہوں۔ اوپر کے جڑے کے دانت اور ہڈیوں پر اثر کرے۔
علاجیگی۔

کارل بوویج - سوڑھوں کا دانتوں سے علیحدہ ہونا۔ دانت ڈھیلے ہو جائیں۔ ابغیج کی
طرح کے سوڑھے۔ دانت تیزی گلیں۔ سوڑھوں سے خون بہے۔ ٹھنڈا اور گرمی سے درد۔
الیومن - دانت ڈھیلے ہوں اور گلیں۔ سوڑھے ہٹ جائیں سوڑھوں سے خون بہے۔

دانت درد

آرم ٹرائفلیم x۲۰۰ گلی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی دانتھ میں درد خاص طور پر بائیں طرف کی دانتھ۔
چینیٹو پوڈیم - جب درد کو ٹھائیوں سے آفاقہ ہو۔

کافیا کروڈر - جب منہ میں برف کی طرح کا ٹھنڈا - پانی رکھنے سے درد میں آفاقہ ہو۔
x۲۰۰ طاقت میں خوراک دیتے۔

کلیسریا کارب - دوران حمل میں دانت درد جو ٹھنڈک اور آرام سے زیادہ ہو۔ ادھر
ادھر چلنے سے آفاقہ۔

پلسٹیل - منہ میں ٹھنڈا پانی رکھتے یا کھلی ہوا میں چلنے پر درد میں آفاقہ۔ حاملہ عورتوں
میں اعصابی دانت درد۔ مریض کو پیاس نہیں لگتی، پسینہ زیادہ آتا ہے۔ گرم چیزوں اور گرمی کی
گرمی سے درد میں زیادتی۔

فاسفورس - جب پانی یا تھوہ ڈوبنے سے درد زیادہ ہو۔ دھوون عورتوں میں دانت درد۔
ہیکلا لاوا - دانت درد۔ مسوڑھوں کے پھوٹے۔ جبروں میں سوزش۔ دانتھ کے نیکس۔
کیورورٹم - گلے ہوئے دانتوں کا درد۔ سکولوتی مسوڑھے۔ دودھ کے دانتوں کا دقت
سے پہلے لگنا۔ د زرد۔ گہرے ہوں اور بھر گل جائیں۔

ایلیم پیپا - جب درد کو ٹھنڈی ہوا یا ٹھنڈے پانی سے دھوئے آفاقہ ہو۔ دانت
کو خلال کرتے سے اور چوسنے سے درد میں آفاقہ۔

بیلادونا - دانت میں تپکن دار درد۔ اور دانت کے بڑھے ہونے کا احساس۔

نیٹرم میور - دانت درد۔ دانت بہت حساس۔ اندر ہوا لیجانے زبان کے دباؤ۔

اور خوراک کے دباؤ سے درد۔ دانت ڈھیلے ہو جائیں۔ دانتوں سے کانوں تک کھینچنے والی درد۔

میکنیٹس پولس آرک - دانتوں میں درد۔ پچھلے بائیں جبرے کی سوزش کے ہمراہ۔

ایک زخار سرخ اور گرم۔ جسم ٹھنڈا۔

اگر یکس ایم - دانتوں میں درد اور اوپر کے جبرے کی ہڈی میں۔

لانسکوپوٹیم - مسوڑھے سوچے ہوئے گرم اور نرم - پھیلا لگتی ہوئی دانت درد، گرم شربت
سے افاقہ - دانت کو چھونے سے یاد باؤ ڈالنے سے زیادتی -

سیمیا - حمل کے دوران میں دانت درد -

انٹم کروڈ - خلاء والے دانتوں میں درد - بعض اوقات درد سر میں جذب ہو - رات کی وقت
اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ درد - دانت کو زبان سے چھونے سے شدید درد - اعصاب کو بھارتی
والا درد - کھلی ہوا میں پلٹنے پر افاقہ، ہر کھانے کے بعد، گلے طرے دانتوں میں کاٹنے والی تکلیف -
نیرٹم کارب - مٹھائیاں اور میٹھے پھل کھانے کے بعد دانتوں میں درد -

بسمتھ - منہ میں ٹھنڈا لینے سے دانت درد کو افاقہ -

چاؤنا اون - بچے کو دودھ پلاتے وقت دانت درد -

کلیمٹس - گلی سٹری دار ٹھنڈے درد - رٹلی کا ٹکڑا اکھیں آنے پر شدید درد - ٹھنڈے
پانی پر افاقہ - تباکو نوشی پر زیادتی درد -

مرک سال - جب گلے ہوئے دانت کی جڑ پر سوزش ہو - دانت سیاہ - گندے اور گلیں -

تیکن دار دانت درد جو رات کو زیادہ ہو - یا نمدار موسم میں زیادہ ہو - دانت طبیعے معلوم ہوں -
اور دیکھیں - ٹھنڈی یا گرم اشیاء لگنے سے زیادتی ہو -

اگنس کانس - گرم نمک یا گرم مشروبات سے دانت درد میں زیادتی -

فاسفورس - جب پانی ہاتھ ہاتھ ڈوبنے سے درد زیادہ ہو، دھوین عورتوں میں دانت درد -

کیمو میلا - جب گرم خوراک یا گرم مشروبات سے درد زیادہ ہو - ناقابل برداشت درد -

ناقابل برداشت تکلیف تمام دانتوں کی قطار میں درد جو کانوں اور چہرہ تک آ کر کرے - دانت
درد کہ دن کے وقت افاقہ رات کے وقت جو نہی مریض گرم بستر میں جاتا ہے درد ہو -

سٹیف سیریا - دانت درد جو اکھمیں تک جائے - سیاہ، ٹوٹے دھوٹے والے گلے ٹرنے

والے پرت دار، چھونے اور ٹھنڈی اشیاء سے بہت متاثر ہوں - حیض کے دوران دانت درد گلے
دانتوں کی جڑوں میں کاٹنے والا درد - گلے ہوئے دانت کو چھونے سے درد -

کلکیر یا فلو۔ دانت درد کے لئے جب کیلیم کی کمی اور دانت پالش نہ ہو سکے کے لئے بہترین دوائی ہے۔ جب کوئی خوراک دانت کو چھو جائے تو دانت درد۔
 پلاٹینیکو میجر۔ دانت درد جو کانوں تک جائے۔ اس کا مدرکچر اور پرنکچر لگایا جاسکتا ہے یہ فوراً درد کو بند دیتا ہے۔

کوئینسیلا۔ دانت، مسوڑھوں اور منہ کا اعصابی درد جس کی زیادتی رات کو ہو۔
 ایلم ایٹمیس۔ دانت درد جس میں دانت کو دانت سے دہانے پر افاتہ۔
 میگنیشیا کرب۔ حیض کے دوران اور حیض سے پہلے اور حمل کے دوران دانت درد چہرے کے بائیں طرف۔ درد اگرچہ دانتوں کی جڑیں بالکل صحیح ہوں۔
 نیٹرٹم سلف۔ دانت درد کو گرمی سے زیادتی۔ ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی ہوا سے افاتہ۔ مسوڑھے دانتوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ ڈھیلے ہوں اور گر پڑیں۔
 کاربووٹیج۔ گرم۔ ٹھنڈی یا نمکین خوراک سے کھینچنے والی اور بھانٹنے والی دریں مسوڑھوں سے خون بہے۔ انفج کی طرح مسوڑھے جب دانت صاف کرے، خون بہے۔
 مسوڑھوں کا دانتوں سے علیحدہ ہونا۔ دانتوں کی ساری قطار زیادہ لمبی اور بہت نرم خلم ہو۔
 ریفلینس۔ حمل کے ابتدائے میں دانت درد۔
 رسوڈوڈینڈرون۔ طوفان سے پہلے یا طوفان باد باراں کے دوران دانت میں درد۔
 آئرلیکمانٹ۔ دانت اکھاڑنے کے بعد۔ دانت بھرنے کے بعد یا سوراخ کرنے کے بعد خون نکلنے کے لئے مفید ہے۔

سپانچیلیا۔ گلے ہوئے دانتوں میں بھانٹنے والی درد جو دانتوں تک کی ہڈی کو متاثر کرے۔ تکلیف دہ جھٹکے، گلے ہوئے دانتوں میں ٹھنڈک سے یا ٹھنڈے پانی سے سر کو بٹانے پر رکھنے تکلیف میں زیادتی۔ سر کو اٹھانے پر افاتہ۔

ایوٹن۔ دانتوں سے خون بہے، مسوڑھے گلے۔ اور دانتوں سے پرے ہٹ جائیں۔ دانت ڈھیلے ہو جائیں۔ دانت اکھاڑنے کے بعد خون نکلے۔

کاٹنا

کاٹتا ہے

متفرقات -

زبان کا کینسر - سرطان

الیومن - زبان خشک - سیاہ شام کے وقت - جلن دار درد - دھن کا احساس زبان کی نوک پر چھین دالا درد - سختی کا رجحان جب کبھی بھی سوزش زبان پر ہو -

فاسفورس - زبان کا سرطان - جیسے کہ زبان کے درمیان میں سوراخ، زبان سوچی ہوئی - کن رے اور پیر کو ابھرے ہوئے اور سخت - شدید خون بہنے کے ساتھ زبان کا کینسر یا سرطان - ہر ہفتہ - ۲ طاقت کی ایک خوراک دیجئے -

ایپس ایم - گوڑ - سختی - سخت کینسر یا کھلا ہوا سرطان - ڈنگ لگنے جیسی جلن دار درد - زبان خشک - سوچی ہوئی - نہ نکل سکنے کے سوزش - بھٹی ہوئی، دکھتی ہوئی - سرطان زدہ یا دھوٹے سے دھانی ہوئی - زبان کا سرطان

آرسینک البم - زبان نیلی یا سفید - نیلے رنگ کے ساتھ سرطان زدہ - جب آرسینک کی نمایاں علامات ہوں تو یہ پوٹینسی کی صورت میں دینے پر شفا ہو جائے گی - جب علاج بالمثل زیادہ سادہ حالت میں درکار ہو تو چھوٹی پوٹینسی بہتر کام کرتی ہے - جیسا کہ اس حالت میں آرسینک ملٹان زدہ نیچوں پر اور سرطان زدہ نظام پر بہت اچھا کام کرتا ہے -

آرسینک بائیڈرائیڈ - زبان کا سرطان - دانتوں کا نشان زبان پر ہو - کن روں کی طرف کڑواؤ - بائیڈرائسٹس - زبان بڑھی ہوئی مگر سست قاعدہ ناسور - گردہ دار جنس، منہ گم اور خشک - کندھ اور انگوٹھ - زبان کا سرطان، منہ کے کونوں پر تکلیف دہ چیرے - زبان کی اوپر والی سطح پر تکلیف دہ گوڑ یا پھنسیاں یا زبان کی نوک کے دائیں طرف -

کالی سائینٹم - زبان کی دائیں طرف سرطانی چھوڑے۔ ہونٹ اور بلغمی جھلی زرد۔ زبان گہری سفید پالش کے ساتھ۔

آرم میٹ - منہ کا دھاتی ذائقہ۔ زبان ہلکی بھوری قرص کے ساتھ پالش شدہ۔ ذائقہ نہ ہو۔ انگلیں۔ منہ میں کڑوا ذائقہ۔ خشکی کا احساس۔ ذائقہ نہ رہے۔ زبان چمڑے کی طرح سخت اور ہل نہ سکے۔ سوزج غریب سے لیکر سوزج طلوح ہونے تک زیادتی۔ خودکشی کا رجحان۔ شخصیت ٹوٹی چھوٹی، آشک یا پارے کے اثر کی وجہ سے۔

آرم میور۔ زبان میں بُرا ذائقہ۔ ذائقہ مطلقاً جاتا رہے۔ سرطان۔ زبان چمڑے کی طرح سخت۔ مشکل ہے۔ سُرخ خشکی۔ زبان پر پھنسیاں۔

بیمبر واک الیڈ۔ ہلکے نیلے رنگ کی زبان۔ پیشاب بہت بو والا۔ اور بہت رنگدار۔ سطح زبان اسفنج کی طرح گہرے رنگات اور پھیلتے ہوئے زخم۔ منہ کے بائیں طرف سرطانی گومڑ۔ جبڑوں کے اتصال یا جبڑوں کے جڑنے والی نرم جگہ پر آخری داڑھ کے پچھے۔

کلکیر یا کارب۔ پھٹی ہوئی یا چری ہوئی زبان۔ پارے کے خلط استعمال کی وجہ سے زبان کی سوزش۔ سفید پالش والی زبان۔ ناگوار ذائقے کے ساتھ گندی زبان۔ زبان، ہونٹ ہاتھ سفید اور ٹھنڈے ہوں۔ جب نگلیں تو بائیں طرف کی زبان کی ہڈی کے نیچے زبان کے نیچے تکلیف۔ زبان کے نیچے خدرود سوجے ہوئے۔ زبان اوپر کی طرف کو مٹی ہوئی گول و نیم شفاف گول، آثار چٹھاؤ والا گومڑ۔ کمبوتر کے انڈے کے سائز کا۔ تیندوا۔ سرطان یا زبان کے آنکشی گومڑ۔ چھوڑے۔ پھٹی ہوئی، چری ہوئی زبان۔ زبان کے نصف پہلو کی سوزش۔

آرسینک البم۔
ہائیو سائیکس۔ { زبان بھوری

نیرطم سلف۔ زبان پر علیحدہ علیحدہ سرخ ٹکڑیاں۔

ٹارٹریکس۔ نقشے دار زبان جو دھبوں کو صاف کر دے۔ گہرے سرخ نشان چھوڑتے ہوئے نرم دھبے جو حساس ہوں۔

کالی میوور۔ نقشہ دار زبان۔ زبان پر بھوری مائل سفید پالش یا تہہ۔

درزیں یا شگاف

بیلادونا۔ درزوں والی یا شگاف شدہ خشک چھلکی ہوئی زبان۔
 میکل کار۔ درزوں والی خشک زبان۔ زبان کی نوک میں بھیجنے والے جو کہ زبان سخت معلوم ہو۔
 زنگولس الیس۔ پھیکا اترتا ہوا اور درزوں والی زبان۔
 ارم ٹر الفلم۔ بھٹی ہوئی زبان پر درز زبان، خون ہے۔ زبان کی سوزش جس کے ہمراہ ناک سے
 جلن دار اخراج۔ زبان اور گلے کی فابجی کمزوری۔ ننگن شکل ہو۔ خوراک اور شربت ناک کے
 راستے باہر نکل آئیں۔ زبان سرخ زبان پر سرخ دانے نکلے ہوئے۔ زبان تقریباً ننگی معلوم ہو۔
 رچس وی۔ زبان درمیان سے بھٹی ہوئی ہو۔
 کالی بائی۔ زبان بھٹی ہوئی ہو۔ گلاس کی تہ کی طرح چمکے۔
 کنڈورائلو۔ تکلیف دہ شگاف۔
 ہائیوسائیمس۔ زبان سخت۔ بھٹی ہوئی، خون ہے مشکل سے بولے یا بول سکے۔
 زبان اطاعت نہ کرے یعنی مرضی کے مطابق الفاظ ادا نہ کرے۔

زبان خشک

ہائیوسائیمس۔ زبان منہ میں کھمکھانے اور جلے ہوئے چمڑے کی طرح خشک ہو۔
 میوڑیک الیڈ۔ چمڑے کی طرح خشک ٹائیفاؤڈ بخاریں۔
 کیمر۔ ٹائیفاؤڈ بخاریں دبے ہوئے پیشاب کے ہمراہ زبان خشک۔
 فاسفورس { اسہل میں زبان کی خشکی
 مرک مال { دی گئی ترتیب میں دیکھئے۔
 بکس ماس۔ رات کے وقت اتنی خشک زبان جیسے کہ ریزہ ریزہ ہو جائیگی۔ زبان منہ کی چھت
 سے چھٹ جلتے۔

بیلادونا۔ منہ میں ایک ٹکڑے کی طرح کھٹکھٹائے۔

برائی اونیا۔ پیاس کے ساتھ زبان کی خشکی۔

پلسٹیللا۔ بغیر پیاس کے زبان کی خشکی۔

سیکل کار۔ زبان خشک بھٹی ہوئی۔ خون کی طرح کی روشنائی زبان سے نکلے۔ گہری

پالش۔ زبان کی نوک کی جھنجھناہٹ اور سختی۔

سوزش

مرکیورس۔ زبان کی شدید سوزش اور باہر نکلنا۔ منہ میں میٹھا ذائقہ۔ زبان مٹھیلی
دھالی۔ دانتوں کے نشانات کے برابر۔ رات کے وقت سارے منہ میں زبان گردش کر کے کو پیر
کرتی ہوئی۔

اکونائٹ۔ اگر شدید بخار ہو تو مرکیورس کے بعد دی جائے۔

کینتھرس۔ اگر سوزش جلنے یا جھلے جلنے کی وجہ سے ہو۔

ایلیس ایم۔ حاد سوزش۔ خشک زبان دنگ لگنے جیسی جلن دار تکلیف لگے میں۔

ایسٹراگزنگ۔ اگر زبان سوچی ہوئی۔ پُر درد جلن دار اور یا جھاگ دار ہو۔

بنزداک ایسٹ۔ زبان کی سوزش اور زخم۔ جب جوڑوں کی دردیں۔ طوفانی موسم اور سردی

کی وجہ سے اچانک بند ہو جائیں۔

پلسٹیللا۔ جب خون کے بہاؤ کے رکنے اور گٹھیاؤ کی تکلیف کی وجہ سے سوزش زبان ہو

بیلادونا۔ جب تکلیف تیزی سے مرکیورس کی ساتھ ٹھیک ہو، جب تکلیف تیز کم نہ ہو تو خرابہ قسم کی۔

آرینیکم البم { جب کنگرین کی علامت کا خدشہ ہو،

یکس { تو ان ادویات کے متعلق سوچا جائے۔

کرڈیلیس سور۔ زبان اپنی عمومی جامت سے دگنی سوج گئی ہو، ایک بھی لفظ نہ بول سکے

زبان اتنی زیادہ سوج جائے کہ منہ میں جگہ ہی نہ رہے۔

زبان پر لگانے کے لئے۔

آرنیکا۔ آرنیکا مدرٹیکو کے بیس قطرے چھہ چاٹے والے پانی کے چمچوں میں ملائیں اور دن میں تین دفعہ غرارے کرائیں۔

آرنیکا یورینس۔ مندرجہ بالا طریقہ سے تیار کردہ لوشن کا آمدا ثابت ہوتا ہے جب متورسی سی ظاہری تبدیلی کے ساتھ یا جب جلنے یا پھلنے جانے تکالیف ہوں۔

زبان کا اعصابی درد

مینگنم۔ زبان کا اعصابی درد۔

اگر کیس ایم۔ { زبان میں جلن کے ساتھ اعصابی درد کے لئے
آر سیکنگم البم۔ { دی گئی ترتیب میں ادویات استعمال کریں۔

زبان کا فالج۔

کاسٹیکم۔ فالج کے لئے چوٹی کی دوائی ہے، جب فالج کی وجہ سے تھکلاہٹ ہو یہ سب سے پہلے استعمال کی جائے۔

ڈاکامارا۔ زبان سوجی ہوئی اور سخت فالج زدہ محسوس ہو، باہر نہ نکالی جاسکے۔

جیلیم۔ زبان بہت موٹی اور سوجی ہوئی اور شکل بول سکے۔

پلیسم۔ یہ ایک اور بہت اہم دوائی ہے اگر اور ادویات اثر نہ کریں تو اسے ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

لیکسس۔ جب مریض زبان باہر نہ نکال سکے تو یہ دوائی استعمال کی جائے۔

زبان چمڑے کی طرح معلوم ہو۔ بمشکل بول سکے۔

بریٹاکارب۔ بوڑھے لوگوں میں زبان کا فالج۔ بوڑھے لوگوں میں زبان کی سختی۔ عمر کے

پہلے بوڑھا ہو جانا اور ٹھنوں کا جواب دے دینا۔ (منہ کے زیر عنوان تیندوا منہ کے زیر عنوان

تیندوا۔ ناسور یا زخم۔

ایسڈ میور۔ بار بار منہ کے زخم۔ اسفنج کی طرح کا گوشت۔ سوچن، سختی اور زبان کا فالج۔
لایکو پوڈیم۔ زبان کے پتھے زخم۔

نایٹرک ایسڈ۔ کالی کھانسی میں زبان کے پتھے زخم یا ناسور۔
مرکبویکس۔ گندے اور بغیر درد کے ناسور یا زخم۔ آتشکی سوزائیس
گریفائیٹس۔ جب آتشک کی وجہ سے ناسور یا زخم ہوں۔

کاربوزکج۔ جلن دار تکلیف کے ساتھ بہت ہی بدبودار اخراج۔ شام اور رات دوران
کالی بالی۔ زبان زخموں والی۔ موٹی خشک۔ ہموار، سُرخ اور بھٹی ہوئی،
شیشے کی طرح چمکے۔

ہیٹینیا۔ زبان سوجی ہوئی۔ پردرد اور بدبودار۔ سیاہ خون سے ڈھانپی ہوئی۔
مکھے۔ ننگی اور چمڑے کی طرح خشک یا جیسے کہ لکڑی کی بنی ہوئی ہو۔ چھالوں کی ٹھنڈیاں
بین کے سرے سے زیادہ بڑے ناسور نہ ہوں۔ سیاہ اور بدبودار ہوں۔

امونیم میور۔ زبان کی نوک پر جلن دار دانے۔

یوپی روٹم۔ زبان اُبھری ہوئی ہو اور کانٹھوں سے پُر ہو۔

کنڈورا مکھو۔ زبان پر بند منہ والے زخم یا پھوڑے۔

سلفیورک ایسڈ۔ سوجی ہوئی زبان پر زخم۔ منہ میں چھلکے کافی زیادہ تھوک مانس بدبودار۔



ساتواں
باب

پھاتی، پھیپھڑوں
کی بیماریاں
اور
کھانسی

چھاتی اور پھیپھڑے

بہلا حصہ

ہوا کی نالیوں کی سوزش

اکونائٹ این۔ ابتدا میں جب بخار تیز ہو، ٹھنڈک لگنے سے پھیپھڑوں میں اجتماع خون، پسینے کو روکنے اور ٹھنڈی ہوا لگنے سے پانی جسے خونی لکیریوں والی بلغم کا اخراج، لیکن کبھی بھی گارڈھالور خونی لکیریوں والا نہ ہو۔ غیر ضروری پریشانی اور بہت زیادہ پریشانی اور بے چینی۔

برائی اویا۔ خشک کھانسی جو سر کو تکلیف دے جسم کے دروازوں کو بھی ہلا کر رکھ دے۔ بخار میں پانی کی بہت زیادہ مقدار میں پیاس اور لمبے عرصے کے بعد زیادہ پانی پئے۔ مریض چپ چاپ لیٹ جانا چاہیے۔ اور اس کی مرضی ہو کہ کوئی اسے بلائے بھی نہیں۔

اپریکاک۔ کھانسی اپنی خوراک ہٹ کی آواز کے ساتھ۔ بلغم ساری چھاتی میں۔ کھانسی کے دروں کے ساتھ کھڑکے۔ تے اور کھٹن کا احساس۔

انٹرمٹارٹ۔ اپریکاک جیسی علامات ہوں سوائے شدید کمزوری اور ٹھنڈے پسینے کے۔ بلغم ساری چھاتی میں کھڑکھڑائے۔ خوراک ہٹ۔ ڈھیلی کھانسی لیکن بلغم نہ خارج ہو۔ مشکل سے سانس آئے۔

بیلارڈونا۔ سانس جھوٹے، تیز تیز۔ دباؤ کو لے، مشکل سے خشک کھانسی، تنگی آواز بھاری۔ آواز بھٹی ہوئی۔ بعض اوقات آواز باسکل نہ سکلے۔ پیشاب گہرا بہت کم مقدار میں۔ جلد گرم اور خشک لیکن ڈھانپے ہوئے حصوں پر سرد۔

ہائیموسائیمس۔ خشک کھانسی لگاتار جب لیٹے تو زیادہ ہو۔ ٹیٹھے پر اور آگے کو بھانکے آواز۔ سٹکٹا پلم۔ ناک بند۔ ناک اور گھٹے میں رطوبت ہوا کی نالیوں کی سوزش کے ساتھ۔ کانوں میں اور آنکھوں کے ڈھیلیوں میں دھیمے دھیمے درد کے ہمراہ سرد۔

ریومیکیس۔ گلے میں گدگدائی کی وجہ سے کھانسی جو ٹھنڈی ہوا سے ہو۔ ہوا میں درجہ حرارت

کی تبدیلی ہونے سے یا کھانے سے زیادہ ہو۔ جو نئی مریض لیٹر میں جا کر اپنے آپ کو کپڑوں میں پٹیا ہے۔ دمی ہوا بار بار استعمال کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کافی اچھا محسوس کرتا ہے اور کھانسی نہیں ہوتی۔ کھڑکی کھولنے سے، منہ اور ناک کو کھلا پھوڑنے پر ناک میں گدگدائی اور کھانسی شدید ہو جاتی ہے۔

ایمپیرسلفر۔ جب کھانسی ڈھیلانے پر کھڑکھڑاہٹ۔ کمزور کرنے والی۔ دم گھٹنے والی۔ گھٹن میں کھانسی ایک نایاں علامت ہے۔

فاسفورس۔ نیم مادہ اور درینک ٹھیک نہ ہونے والے نرم کیسوں، لمبے پتے، زیادہ بڑھے ہوئے یا دق والے لوگوں میں۔ چھاتی میں دم گھٹنے والی اور حنجہ میں تگلی۔ آواز بیٹھ جائے بلغم کھڑکھڑائے۔ خونی اور بلغم نیکین اور میٹھا سا ذائقہ رکھتی ہو۔ کھانا کھانے کے بعد زیادہ کھانسی۔ کمر بوزوٹ۔ سانس کی نالیوں کی سوزش۔ خطرناک بو والی سانس اور بلغم۔ مریض کے قریب کوئی آدمی جانا پسند نہ کرے۔

مرکبوس۔ سوچی ہوئی نالیوں (سانس کی) کار کام۔ نیچے چھاتی تک کھڑدراپن اور دھکن، خشک دھکن والی تشبیہ کھانسی جو بہت کمزور کرنے والی ہو۔ پانی کی طرح کا بلغمی افراج تھوکر زرد اور پیپ دار بلغم۔

سلفر۔ عمل انگیز کے طور پر کام کرنے والی دوائی جب غیر جذب شدہ دھبے ہوں اور اچھی طرح سے منتخب شدہ ادویات کام نہ کریں۔

یوہرکولینم۔ ایک اور بہت اچھی دوائی علاج کے شروع میں دمی جانی چاہیے۔ جب مندرجہ بالا ادویات مرض کو ٹھیک کرنے میں ناکام رہیں۔

سانس کی نالیوں کی مرض سوزش۔

نیفتھالین۔ سانس کی نالیوں کی سوزش دباؤ اور دبی ہوئی کھڑکھڑاہٹ والی بلغم۔ چلنے پر کڑواہ دمی یا سانس کا تیز ہو جانا۔ تنگی تنفس اور غرغراہٹ رات کے وقت۔ تکلیف دہ

تشنجی کھانسی جس میں بلغم مشکل سے خارج ہو۔ یہ دمے میں مفید ہے۔ کالی کھانسی بنجار کاہی۔ پھیپھڑوں کی دق اور تشنجی کھانسی کے لئے مفید ہے۔
 گرانڈیلیا۔ پھیپھڑوں اور معدہ کے اعصاب پر عمل کرتی ہے پہلے یہ خون کے دباؤ کو ادخا کرتی ہے نتیجتاً بغض کو تیز کرتی ہے اور خون کا دباؤ کو کم کرتی ہے اور بغض کو دھما کرتی ہے باقی علامات اس کی کیفیتیں سے ملتی جلتی ہیں۔

نوٹ :- مندرجہ بالا دونوں ادویات میں اتنی زیادہ کسانیت ہے کہ یہ ایک یا دو گھنٹے کے بعد ادل بدل کر دی جاسکتی ہیں۔ مریض کی علامت کے مطابق ۴ طاقت میں استعمال کیا جانا چاہیے۔
 یہ دونوں ادویات اکثر کیسوں کو قابو میں کر لیتی ہے اور رجب پہلے دی جانی چاہئیں۔ دوسری علامات کے ظاہر ہونے پر دوسری ادویات دی جانی چاہئیں۔

کیپیکم۔ مزین براکٹائٹس گندے سانس کے ہمراہ گہرے سانس باہر کی طرف بھرنے اور بلغم کے اخراج میں۔

اومیری۔ بچوں کے پھیپھڑوں اور ہوا کی نالیوں۔ ہوا کی نالیوں اور منویا اور چھچک میں مبتلا ہونے پر۔ دیگر علامتی ادویات کے ہمراہ ہر سہفتہ ایک خوراک دیجئے۔

بلیسی لینیم۔ مزین دم گھٹنے والا نزلہ، پیپ دار بلغم کے اخراج۔ ۲۰۰ طاقت میں ہر سہفتہ ایک خوراک دوسری علامتی ادویات کے ہمراہ۔

ڈروکیرا۔ مزین براکٹائٹس میں مفید ہے۔ تشنجی کھانسی جس میں آدھی رات کے بعد زیادتی ہو۔ خشک کھانسی۔ اونچی گہری آواز پیدا کرنے والی جس میں مریض اپنی چھاتی پکڑنے پر مجبور ہو۔ ٹھوس خوراک لینے میں تکلیف ہو۔ بلغم کا بخجہ میں اجتماع۔

انٹم آرسینکیم۔ جب سانس مشکل سے آئے۔ تیز سوز، ساں ساں کرے۔ کھڑکھڑائے نمایاں تنگی نفس بے چینی۔ جلد غم دار ادل بدل کر گرم اور ٹھنڈی۔

انٹم ایوڈ۔ کھانسی کے اکثر دورے۔ گاڑھی۔ بھاری زردی مائل پیدار بلغم خارج ہو۔ کالی بائیکرومیکم۔ دھیل دھالی ایٹھی دار کھانسی۔ بلغم کے بخجہ، حلق اور نالیوں میں جم

جانے کی وجہ سے کھڑکھڑاہٹ تاردار اور چپکنے والی بلغم۔ بلغم بہت شکل سے اکھڑے۔
 اور کھانسی اکثر تے پر منتج ہو۔ اکثر بلغم کا اخراج بند ہو جائے تو گنٹھیا شروع ہو جائے۔
 کالی سلف۔ ہوا کی نالیوں کی بلغمی جھلیوں کی سوزش کے بعد چھاتی میں کھڑکھڑاہٹ۔
 بغیر اخراج بلغم کے کھڑکھڑاہٹ۔

کاسٹیکم۔ چھاتی میں خاص طور پر سینے کی ہڈیوں کے۔ تھکے تکلیف گیری خشک کھانسی
 کی وجہ سے چھاتی میں دھکن کے ساتھ کھڑکھڑاہٹ۔ چھاتی کی تنگی گہرے گہرے سانس لے۔
 کھانسنے وقت۔ اکثر بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جائے۔

کاربوووج۔ شام کے وقت گلے کا بیٹھ جانا۔ سنجہ اور ہوا کی نالیوں میں دھکن اور
 کھڑکن یا خراش۔ چھاتی میں دباؤ، بوڑھے لوگوں میں ہوا کی نالیوں کی سوزش۔ کافی زیادہ
 زرد بدبودار بلغم خارج ہو۔ ہوا کی نالیوں سے اخراج خون۔
 انٹیمٹارٹ۔ چھاتی میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز۔ بغض تیز اور کمزور، بھیمپڑے کمزور اور
 جزوی طور پر فالج زدہ۔

آرسینکیم البم۔ سانس کی نالیوں کے علاوہ، آنکھوں، ناک اور حلق اور انٹریوں سے
 پتلے جلن دار پانی کا اخراج۔ شدید بے چینی اور کمزوری۔ تھوڑے تھوڑے وقفے پر تھوڑے
 ٹھنڈے پانی کی پیاس۔

سکوٹیللا۔ بہت زیادہ لیسدار اور چپکنے والی بلغم۔ لیسدار اور چپکنے والی بلغم کی
 نوعیت کی وجہ سے مریض کو بلغم اکھاڑنے کے لئے کافی دیر تک کھانا پڑے۔
 پلسٹیللا۔ بہت زیادہ زرد بلغم یا بیب دار اخراج گلے سے، ناک سے، آنکھوں سے
 مریض ٹھلی ہوا میں آنا تو محسوس کرتا ہے۔ پیشانی میں سرد روی ہو سکتا ہے۔

امونیم کارب۔ بلغم کا خارج نہ ہونا اس دوائی کی نمایاں علامت ہے اگر بلغم خارج ہو
 تو اس کے ساتھ خونی لکیریں ہوں۔ دل کی دھڑکن۔ کمزوری اور بغض کی تیزی ہوتی ہے۔
 لیڈم۔ جب نسجوں میں ہوا کی موجودگی ہو۔

نارسیس - مزین کیسوں میں اسے ۳ طاقت میں دیتے!
 کلورم - جب برانکائیٹس کے بعد سانس ٹرک جائے۔
 سیبل سیر - مزین برانکائیٹس ہوا کی نالیوں میں پھیلاؤ کے بعد۔

ہوا کی نالیوں کی بلغمی جھلیوں کی سوزش

ٹیوبوکلینیم - ہوا کی نالیوں کی بلغمی جھلیوں کی سوزش کی چوٹی کی دوائی ہے اور مرض کے شروع میں ۲۰۰ طاقت کی ایک خوراک دی جائے۔ دوسری ظاہر ہونے والی دوائی جیمیس گھٹنے کے بعد دی جائے۔

اپریکاک - چھاتی میں کھڑکھڑاہٹ تپ اور متلی کار حجاب جھینکوں کے ساتھ دم گھٹنے کا احساس اور گھٹن۔

برائی اوریا - جب خشک کھانسی اور پائسن زیادہ پانی کے لیے وقفے کے بعد رلیض خاموش ہو کر لیٹنا چاہے یا بے چین ہوتا ہے، چھاتی میں درد کیوجہ، سانس مشکل سے لے اور تکلیف دہ ہو۔

چیلنڈوم - دائیں پھیپڑا ساثر ہو۔ جلد اور پھوٹا سانس تنگی تنفس چھوٹی تھکا دینے والی کھانسی۔ کھڑکھڑانی والے شکل سے بلغم خارج ہو۔ دائیں کندھے کے جوڑ کے نیچے سونیاں لگنے جیسا درد۔ ناک کے تھنوں کا پھڑپھڑانا۔

آئیوڈین - دائیں طرف کا نمونہ زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ۔ بلغم خون کی لکیریں کے ہمراہ۔ چھاتی مشکل سے پھیلے۔ مشکل ساں ساں کرتی ہوئی۔ عمل تنفس یا سانس پھیپڑوں کے پردوں سے اخراج۔ کھانسی جس کی زیادتی۔ کمرے میں گرمی سے اور نندارہم سے۔ فاسفورس - خشک کھانسی بہت کم بلغم کا اخراج اور چھاتی پر دباؤ۔ ڈھیلی کھانسی خون آئینہ اور پیپ دار بلغم کا اخراج۔ ۲۰ طاقت سے کم ہرگز نہ دینا چاہیے۔

آر سینک آئیوڈ - یہ آر سینک البم کی علامت رکھتی۔ لیکن یہ کسی بیٹی میں مختلف ہے۔ آر سینک

ایلم کا مریض گری سے آفتابہ محسوس کرتا ہے جبکہ آریٹمک ایلم کی علامات کا مریض گرم بیوں یا گرم چھوٹوں یا گرم کمرے میں جانے پر زیادتی محسوس کرے

گلیسرین - انفلوئنزا والاٹمونیا - بہت زیادہ اخراج اور تنگی تنفس - دونوں بھیچڑوں کا جسم جانا یا جام ہو جانا۔

لو بیلیا انفلیٹا - بچپن کی بھیچڑوں کا سانس کی نالیوں کی سوزش اچھاتی کی تکالیف کا نامکمل آرام، خاص طور پر پی پی کے خدرشہ۔

انٹرمٹ - کھلے ہوئے دھوئیں والے ہر سانس کے ساتھ پھڑپھڑانے والے نتھنے بھیچڑے بلغم دار، بلغم سے بھرے ہوئے۔ اٹھانا مشکل ہو۔ چھاتی میں کھڑکھڑاہٹ۔ شدید کمزوری اور عمل کی کمی۔

لائیکو لوڈیم - انٹرمٹ کی طرح کی علامات کے لئے، لیکن جب وہ کام کرنے میں ناکام ہو تو ہر سانس کے ساتھ نتھنوں کا پھڑپھڑانا اور تکلیف دائیں طرف سے شروع ہو اس دوائی کی نمایاں علامات ہیں، اچھا رہے کے ساتھ۔

سفر - یہ ایک عمل انگیز کے طور پر کام کرنے والی دوائی ہے۔ بھیچڑوں کے دھبوں کے سلسلے میں اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ جب ایسے دھبوں کی وجہ سے بخار ہو تو اس کو دور کرتی ہے۔ برے حال اور بگڑے ہوئے کیسوں کے لئے مفید ہے اور مورک طبیعت۔ لیٹی کے رجحان کے ہمراہ۔ کمزوری اور بیہوشی۔

خنازیر - بھیریں

برومیم - بھیچڑے کے دائیں جھڑ پر رات کے وقت ۲ ملاقات کی ہر روز ایک نوک دی جائے۔
سانس کی نالیوں کا سردی کا زکام
بریٹاکارب - بوڑھے لوگوں میں دم گھٹنے والی کانسٹی - بھیچڑوں میں دھوئیں کا احساس

جس کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو۔

گلیسرین - الفلوئیز اور نمونیا بہت زیادہ نزلہ زکام اور تنگی تنفس، دونوں بھیچڑوں کا جام ہو جانا۔ یا جم جانا۔ ۲۰۰ طاقت میں دبیجئے۔

آرم ٹر افلم - جب بخیرہ کی کھانسی کے ہمراہ۔

یہ بھیچڑے کے پردے کی سوزش - ذات الجنب

برائی اونیا - جب تکلیف بھیچڑے کے پردے کی سوزش کی نوعیت کی ہوں جن میں سوئی جلنے اور بھالا لگنے جیسی نوعیت کی ہوں۔ اور حرکت کرنے پر زیادہ ہوں۔ جب مریض آرام کر رہا ہو یا تکلیف والی طرف لیٹ جائے تو ان میں آفاقہ ہوتا ہے۔

وزنکولس ملب - بھیچڑوں کی بھلی کی سوزش، استعمال یا جلدور اور چپکنے کے ہمراہ چھاتی کے پٹھوں میں درد اور دکھن۔ بھیچڑوں کی بھلی کی سوزش کے لئے چوٹی کی دوائی ہے مریض درد والی جگہ پر دباؤ یا بھجوتے جانے کو پسند نہ کرے۔

آر سینکلم البم - جب بہت زیادہ بے چینی، تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس ہو اور نمایاں کمزوری ہو۔ دریں جلن دار نوعیت کی ہوں، جن کو گرمی اور گرانش سے آفاقہ ہو۔ دمہ والا سانس اور تنگی تنفس۔

آر انیا ڈایا { ان ادویات کی ڈاکٹر کلارک نے جسمانی ساخت کے مطابق سفارش کی ہے جب جسم میں پانی بھر گیا ہو
اپریکاک { اور بھیچڑوں کی بھلی کی سوزش دھندلنے والی جگہ کے ہمراہ۔
نکسوا میکا {

کینتھرس - یہ دوائی بھیچڑوں کی بھلی دوسری ٹیج جس میں چھاتی میں شدید گرمی اور جلن کا احساس ہو۔ بہت زیادہ مقدار میں اخراج ہو۔ امعاء مستقیم اور مقبرین جلن ہو بیلا ڈونا۔ پتوں میں بھیچڑوں کی بھلی دوسری ٹیج جس میں چھاتی میں تشنج کے ہمراہ۔
اجتماع خون کی قسم کا ہو۔

ایپس میل۔ جب رطوبت کا اخراج زیادہ ہو لیکن کینتھرس کے مقابلہ میں سوزش کم ہو رطوبت کی زیادہ مقدار کی وجہ سے تنگی تنفس اور سانس میں گھٹن۔

اسکلی پایز۔ جب برائی ادویا نام کام ہو جائے تو ان کا خیال سنیکا۔ { کچھ یا ان کے متعلق ضرور سوچئے !

کالی کارب۔ پھیپھڑوں کی مزمن سوزش تیز ہوئی۔ جھنجھے جیسے پھلانگنے والی جلن دار دردیں، چھاتی میں ٹھنڈک کے ہمراہ۔ کھانسی اور دمردالا سانس۔ صبح تین بجے زیادتی۔ حرکت کرنے پر دردوں میں زیادتی یا تکلیف والی طرف لیٹنے زیادتی۔ ٹھنڈی چیزیں لگانے سے عارضی افادہ۔

سٹانم۔ چاقو گھونپنے جیسے درد۔ آگے کی طرف کھینکے خاص طور پر بائیں طرف زیادتی۔ آرسینک آئیوڈ۔ پھیپھڑوں کی پیپ نکلتے والی سوزش، سانس خارج کرتے وقت شدید کمزوری تیز دبی ہوئی کھانسی۔

ایپر سلفر۔ جب پیپ اکٹھی ہو جائے۔ تپق اور کمزوری نمایاں ہو ٹھنڈک کے بار بار حملے کے ہمراہ۔ بخار اور پسینے۔ زیادہ دیر تک پیپ رہے۔

سلفر۔ پھیپھڑوں کی جھلیوں کی مزمن سوزش اور اخراج، سانس پھوٹا چھاتی سوراٹیم { میں دباؤ اور کمزوری۔ سوراٹیم خاص طور پر اس وقت کمزوری ہوتی ہے جب بدبودار سانس اور بہت ہی بدبودار پیپ۔

سلیشیا۔ بلا تکلیف پیپ کا اخراج کافی عرصہ سے تپلی بدبودار پیپ آہستہ آہستہ کمزوری لاحق ہو۔

پھیپھڑوں کے پردوں کی سوزش کی ادویات دیکھیے۔

پسلیوں کی تکلیف۔ نمونہ۔

ایکونائٹ۔ ابتدائی درجہ میں جب تیز بخار سے پہلے سردی لگے۔ پھیپھڑوں میں اجتماع خون

سخت خشک تکلیف دہ کھانسی، پتلی خون کی لکیر والی بلغم کا اخراج لیکن کبھی بھی گاڑی خون والی نہ ہو۔ غیر ضروری پریشانی۔

دریٹرم وائٹڈ۔ پھیپھڑوں میں شدید اجتماع خون۔ دل کی شدید دھڑکن جو تیز نبض سے ظاہر ہو، متلی۔ اٹھنے پر غشی۔ زبان درمیان سے ذرا نیچے سرخ۔

برائی اونیا۔ جب پھیپھڑے ٹھوس ہو جانا شروع ہو جائیں۔ کھانسی سخت اور تکلیف دہ۔ سانس لینے پر دباؤ۔ آرام سے لیٹ جانا چاہیے۔ پہلے ۹ طاقت میں دتجے مہ جب آفاذ شروع ہو جائے تو ۲۰ طاقت میں دتجے۔

انٹم ٹارٹ۔ برائی اونیا۔ انٹم ٹارٹ نکام ہو جائیں تو یہ دی جائیں یہ ۲۰ طاقت میں دی جائے۔

فاسفورس۔ برائی اونیا کے ساتھ آدل بدل کر دی جاسکتی ہے۔ جب کھڑکھڑاہٹ والی آواز۔ چھاتی میں پانی جلے اور پھیپھڑے کے فایع کا خطرہ ہو۔

سلفر۔ جب پھیپھڑوں سے رطوبت رسے تو یہ دوائی نہیں بھولنی چاہیے۔ یہ نہ مل ہونے والے پھیپھڑوں میں دھبوں کو بننے سے روکتی ہے اور شفا دیتی ہے

چیلڈ وینیم۔ نمونیا صفراوی علامت کے ہمراہ۔

ٹیوبرکولینیم۔ بطور عمل انگریز دوائی کے استعمال کی جانی چاہیے۔ ساختی خرابیوں اور زہر کو دور کرنے والی دوائی ہے۔

نکس و امیکا۔ - نمخی اور مند موسم میں بہت جلد متاثر ہونے والے اشخاص میں

اپریکاک (اس مراد سے ایسے مریض جو مند ر ہائش سے بہت جلد متاثر ہو
ارانیاد و ایادیمیا جاتے ہوں۔ یہ مریض اپنے جسم میں بہت زیادہ رکھتے ہیں ایسے مند
موسم یا مند ر ہائش سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ دائیں پھیپھڑے کا مونیہ کی وجہ سے
ٹھوس ہو جانا۔ بائیں پھیپھڑے بالکل ٹھیک۔ آدل بدل کر اچھے ہوں یا متاثر ہوں۔ ٹھنڈی گرمی
کریں۔ دی گئی ترتیب میں یہ ادویات استعمال کی جاسکتی ہیں۔

سینگا۔ جو نمونہ پھیپھڑوں کی سوزش کے ہمراہ ہو چھاتی۔ چھاتی میں درد و حرکت کرنے پر اچھا محسوس ہو۔ کھانسی اور دم آرام کرنے پر اچھے ہوں۔
ایڈوڈیم۔ جب پھیپھڑوں کا انجماد شروع ہو چکا ہو۔ اور تنگی تنفس نمایاں ہو۔ بخار اور متاثرہ طرف ٹی بی والی سرخی ہو۔

سٹرکٹیا فاس۔ جب انسٹم ٹارٹ ناکام ہو جائے تو یہ دوائی انسٹم ٹارٹ کی تمام علامات رکھتی ہے جیسا کہ چھاتی میں کھڑکھڑاہٹ۔ کمزور تیز نبض۔ تنگی تنفس، ٹھنڈے پسینے وغیرہ کمزور دل کے ہمراہ۔ یہ تین طاقت میں دی جانی چاہیے۔ مریض کی حالت کے مطابق ہر گھنٹہ کے بعد دی جانی چاہیے۔

سٹائم ایڈوڈائیڈ۔ نمونیا کی آخری سٹیج میں جمے ہوئے حصے کا حل ہونے کا عمل شروع ہو چکا ہو، باقی حصوں کو بغیر جمے ہوئے چھوڑ کر۔ غیر تحلیل شدہ نمونیا میں جب سلفور ۱۰ طاقت ناکام ہو چکا ہو۔ گرائڈیلیا۔ دل میں چربی کے اجتماع کے ہمراہ انسٹم ٹارٹ والی علامات میں ضروری ہے۔ سونے سے ڈرے ایسا نہ ہو کہ سوتے میں دل ذیل ہو جائے۔ لازمی باگتار ہے۔ دیکھنے کے لئے کر دل دھڑکتا ہے۔

سٹروٹینتھس۔ نمونیا کے دوران میں دل کے ذیل ہونے کو روکنے کے بہترین دوائی ہے۔ نبض تیز، کمزور اور بے قاعدہ۔ چوٹی کے قریب سوئی لگنے جیسی اور اینٹھن وارد دریں۔

تپ دق۔ ٹی۔ بی۔

فاسفورس۔ ٹی بی کے علاج کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ یہ پھیپھڑوں اور لمبی ٹہریوں کے لئے خاص لگاؤ رکھتی ہے۔ مریض غالی چھاتی والا یا مرغی کے چوزے جیسی چھاتی والا اور خون تھوک سکتا ہے یا خون تھوک کے۔ گلابیٹھا ہوا۔ شدید سرسراہٹ والی کھانسی جو ہسنے یا بولنے پر زیادہ ہو چھاتی میں دباؤ کے ہمراہ۔ ۲ طاقت سے کم یہ دوائی ہرگز استعمال نہ کیجئے۔

ٹیوبو کو لینیم۔ یہ ایک عمل انگیز دوائی ہے۔ ۲۰۰ یا اس سے اوپر کی طاقت ہر مہینہ بعد یا پندرہ روز بعد دوائی کی طاقت کے مطابق ۲۰۰ یا ۱۰۰ طاقت استعمال کیجئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی گولیاں کی صورت میں ۴ یا ۵ گولیاں ایک خوراک میں استعمال کریں۔ یہ بہتر ہے کہ ایک ڈرام کی شیشی میں گولیاں ڈال کر اس کے دو یا تین قطرے ڈال دیں اور ان کو جھٹکے دے کر ہلکا کر رکھ چھوڑیں۔ کیونکہ قطرہ کی صورت میں دوائی کا استعمال مرض کو بڑھا سکتی ہے جس کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے۔

آر سینکیم آئیوڈ۔ جب نلویا انفلوئنزا بڑی وجہ مرض ہو۔ کمزوری اور لاغری نمایاں علامات ہیں۔ شدید پیاس لگتی ہے۔ لیکن ٹھنڈا پانی معدہ میں بے چینی پیدا کرتا ہے اسلئے مریض گرم مشروبات استعمال کرتا ہے۔

آئیوڈم۔ جب غدود متاثر ہوں تو یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ مریض عموماً گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ خشک غیر صحت مند جلد اور کافی زیادہ بخار ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ لاغر ہوتا رہتا ہے۔ لگاتار اور تنگ کرنے والی کھانسی ہوتی ہے۔

کلکیریا آئیوڈائیڈ۔ جب ماسا لیتی غدود متاثر ہوں تو یہ دوا دی جاتی ہے۔ شدید کمزوری صحت بدلیوں اور کھال کا ڈھانچا پیٹ، بہت زیادہ تنا ہوا۔ غدود بڑھے ہوئے اور دانے دار۔ پاخانہ کی کمی دفعہ حاجت ہو۔ پاخانوں کا رنگ سبز یا مختلف رنگوں کا بہت زیادہ گیس ہمراہ۔ جلد بہت خشک سوائے رات کے پسینوں کے ۶۰ یا ۳۰ طاقت عام طور پر استعمال کی جاتی ہے ٹیوبو کو لینیم لوبو۔ اگر ۱۰۰ یا ۱۵۰ ایم طاقت میں دی جائے تو یہ حفظ تالقم کے طور پر اور شفاء دینے والی ہوتی ہے، زندگی میں صحت ایک یا دو خوراکیں دی جائیں ۳ یا ۴ ملہ کے وقفے سے۔

کاربو انیمیلس۔ پھیپھڑوں کی دق کی آخری میٹج کے لئے ہے۔ دم گھٹنے والی آواز میٹھی ہوئی۔ کھانسی جو تمام دماغ کو ہلکا کر رکھ دے، سبز بدبودار بلغم اور پیپ خارج ہو۔ بدبودار تھوک میٹھا۔ بدبودار اور تنگی تنفس۔ سیبل سر۔ خجھرہ کی ٹی بی کیلئے مخصوص ہے۔

گیلیکیم ایسڈ۔ جب پھیپھڑوں سے خون بہنے کے ہمراہ۔ بہت زیادہ بلغم کا اخراج اور رات کے پسینے۔

چینیم سلف۔ جسم کے گھل جانے کے ساتھ یعنی ٹی بی کے مریض کی آخری سٹیج میں جب شدید، نحیف و ذرا ہر جائے۔

(۱)۔ وزن میں کمی (۲)۔ سالوں تک لگاتار کھانسی رہے (۳) جب کھانسی بند ہو جائے تو دماغی طرف چہرے میں درد یا اندام موسم میں زیادتی۔ (۴) ہر سوچتھے دن مرض کی زیادتی۔ دوسرے معنوں میں یہ دوائی ٹی بی کے مریض جس میں پانی زیادہ ہو گیا ہو کے لئے بہتر ہے۔

فامفورس } بخار شام کے وقت ٹھنڈ کے ہمراہ واپس ہو۔ وزن میں کمی۔ رات کو
کالی نائٹرکیم } پسینے اور معمولی کھانسی (تین ہفتوں کے بعد متواتر ہر دو گھنٹے کے بعد
اول بدل کر استعمال کرنے کے بعد بخار جاتا رہا، لیکن ایک سال کے

بعد یا زیادہ عرصہ بعد بیماری کی واپسی کا خدشہ ہوتا ہے۔ نکسولامیکا اور آرکسینکیم الیم اول بدل کر دینے سے یہ رجحان ختم ہو گیا۔

سٹانم آئیوڈس x ۳۰۔ صاف رنگت والے اور لمبی پلکوں والے لوگوں میں ٹی بی کے لئے مفید ہے۔ گلے میں سرسراہٹ کے ساتھ کھانسی ہو۔

ویکسینم x ۲۰۔ ٹی بی کے دوران کھانسی کے لئے عمل انگیز کے طور پر کام کرنے والی دوائی ہے۔

اویمیم x ۲۰۰۔ جب پیشاب سے نفثہ جیسی بو آئے، مولی جیسے ڈکار اور پس جیسا پسینہ ہو۔ سانس کی نالی میں جھپٹن ہو۔

لایکوپس ورج۔ دق کی ابتدائی سٹیج میں (بائیں چوٹی تاثر ہو) پاخانے کے ڈھیلا ہونے کے ہمراہ۔

کوکولس انڈ۔ حنجہ کی دق جس کے بعد ہوا کی نالیوں کا نزلہ۔ نکام ہیکس ٹوسٹا۔ جب پھیپھڑوں سے خون آنے کے ہمراہ۔ لگاتار آواز کا بیٹھ رہنا۔

خشک سرسراہٹ والی کھانسی رات کے وقت زیادتی جو سونے نہ دے۔ تنگی تنفس ٹیڑھیاں چڑھنے پر زیادتی
سلفر۔ ایسے لوگ جو ٹوٹ بھوٹے گئے ہوں زرد اور کمزور چمکے والی۔ خشک کھانسی مندار اور مکی۔
پاؤں اور ہاتھوں کی جلن۔ ۲۰۰× کی طاقت میں دی جانی چاہیے اور دہرائی نہ جائے کیونکہ یہ ٹی بی
کی حالت کو دوبارہ آسکتی ہے۔

الٹو نایسی۔ ہلکا بخار، پچپش کے ہمراہ طاقت استعمال کیجئے۔

کلکلیہ یا فاس۔ جب برفیض بہت کمزور ہو جائے تو ایک ایم طاقت میں استعمال کیجئے۔

لیکمنتھس۔ رات کے پسینوں۔ خشک کھانسی۔ درد اور گردن میں سختی،
بہتر ہے پر سرخی کے دائرے ٹائیفائیڈ بخار یا ٹائیفو مونیام میں بھی بہتر ہے۔

بکس لیکونیڈا۔ پھیپھڑوں کی دق کی تیزی سیلج میں پیپ دار اخراج۔ بدبودار اور
ذائقہ تفسیری کرتی ہڈی کی پسلی میں درد کے ہمراہ۔

گوایکم۔ ٹی بی کی بڑھی ہوئی سیلج بائیں پھیپھڑے کی چوٹی پر پھیپھڑوں کی جھلتی میں
میں درد۔ بدبودار مواد کے تھوک کے ہمراہ ۴ گرام بیٹن کو ۹۹ گرین بک شوگر ملا کر چاقو کی
لوک پر آنے والا آمیزہ دن میں چار دفعہ کھلائے۔ ٹی بی کے لئے بہتر ہے۔ بڑی تعریف کی ہے۔
یہ بربا سا نسا۔ ہوا کی نالیوں کی ٹی بی۔ رات کے پسینوں اور جسم کے وزن میں کمی کے ہمراہ
اکثر ہوا کی نالیوں کے نزلہ زکام کی وجہ سے۔

سیکرم لیکٹس۔ جسم کے کھٹنے کی آخری سیلجوں میں پچپش یا اسہال۔

سٹائم۔ کافی زیادہ سبز رنگ کے مواد کے اخراج کی وجہ سے کمزوری۔ ٹی بی میں حرکت
کا میٹھا ذائقہ۔ چھال میں کمزوری محسوس کرے۔ بمشکل بول سکے۔

تھو جا۔ یہ دوائی بطور عمل انگیز کے دی جانی چاہیے، ایسے مریضوں کو جو آٹنک
میں مبتلا رہ چکے ہوں۔ ۱۔ ایم طاقت میں دیا جائے۔

سفلینم۔ یہ دوائی بطور عمل انگیز کے دی جانی چاہیے۔ ایسے مریضوں کو جو آٹنک میں
مبتلا رہ چکے ہوں۔ ایک ایم کی طاقت میں دی جائے۔

کو نو بارک۔ ٹی بی کے مزمین اسہال۔ بہت زیادہ اور کمزوری کرنے والے۔

کافی مقدار میں مدر پتھر میں دستیاب۔

دوسرا۔ حجزہ کی ٹی بی کے لیے مخصوص۔ گھٹنے کے جوڑوں یا جسم کے دوسرے حصوں کی ٹی بی۔

سیلیسیا۔ صدمہ پیدا کرنے والی کھانسی۔ بہت ہی ناگوار بو والی بلغم جوانی کی تہہ میں پیٹھ جائے۔ بلغم ڈھیلوں کی شکل میں۔ زرد یا سبز۔ ٹھنڈے یا مند اور موسم میں زیادتی۔ اور ٹھنڈے مند اور موسم میں زیادتی۔ اور ٹھنڈے خشک موسم میں افاتہ۔ دق کی نزلاوی قسم۔ لائیکو لوڈیم۔ پنچوں کی دق جو چھپک اور کالی کھانسی کے ہمراہ گردن اور پھپھاتی کی پٹ غیر موزوں بڑھوتری میں تنگی تنفس۔ پیٹ کا تن جانا۔ سبز مواد کا اخراج اور پھپھاتی میں کھڑا۔ سینشو۔ جیض کی رکاوٹ کی وجہ سے دق۔

کھانسی

حصہ دوسرا

دومہ۔

دومہ ایک خطرناک بیماری ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج آسانی سے نہیں کیا جاسکتا۔ حادثہ میں تکلیف کو عارضی طور پر روکنے والی ادویات دینے کے بعد ایک ڈاکٹر کو جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے ادویات کی طرف توجہ دینا چاہیے تاکہ مریض کو مستقل شفا نصیب ہو جائے۔ جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے نمایاں یا بڑی بڑی ادویات دوسری موزوں ادویات کے ہمراہ دی جائیں وہ یہ ہیں۔

(۱)۔ ٹیوبرکولیم (۲) متھوجا (۳) نیٹرم سلف (۴) میسٹرورینم (۵) سفلینم۔ مندرجہ بالا ادویات بطور عمل انگیز دی جاتی ہیں۔ ۱۔ ایم یا سی ایم طاقتوں میں زیادہ موزوں ہوتی ہیں۔ ان ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے مریض کو دو یا تین دن قبل یا بعد دوسری کوئی دوائی ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ اگر مندرجہ بالا ادویات میں سے کوئی اپنا اثر دکھانا

شروع کر دے تو مزید دوائی دینا بند کر دیں۔

خوداک کے معاملے میں ایک ہدایت بھی ضروری ہے۔ سفید آٹا یعنی میدہ اور سفید کھانڈ یا ان سے بنی ہوئی اشیاء، گوشت اچھلی، دودھ اور علوہ وغیرہ سے پرہیز کیا جائے۔ سالم گندم کا آٹا، شہد، سلاڈ، تازہ سبزیاں، پنیر اور اندوٹوں کے ہمراہ کھائیں۔

اگوناٹ ۹۹ [حملے کے دوران آدل بدل کر دونوں دی جائیں۔ یہ بطور حاضی علاج

اپریکاک ۹۹ [کے کام کرے گی۔ کھانسی اور سانس کے عمل روک سکے۔ بل میں کام کرنے

والوں کے دمہ کے لئے بھی اگوناٹ فائدہ مند ہے۔ اپریکاک تشنبی قسم کے دمہ جس میں چھاتی پر بہت وزن یا پریشانی کے ساتھ۔ سال سال کی آواز۔ کوتاہ دمی یا چھوٹے چھوٹے سانس دم گھٹنے کا احساس۔ حرکت پر زیادتی۔ لگاتار کھانسی جس سے تھ واقع ہو۔ چھاتی بلفم سے پُر یا بھری ہوئی۔ ہاتھوں اور پاؤں پر ٹھنڈے پیتے۔ دمہ جلدی امراض کے ہمراہ۔ ۲۰ طاقت میں متعالجئے زنجبار۔ گیس کی تکالیف کی وجہ سے دمہ۔ آواز بیٹھ جائے۔ حنجرو سے نیچے شدید مشکل سے سانس لے چھاتی میں موٹیاں چھین۔ صبح کے وقت دمہ کی زیادتی۔

کالی کارب۔ یہ دوائی عموماً دی جاتی ہے۔ جب دمہ کا دور خصوصی طور پر آچھی رات کے پرے یہ مریض کو مجبور کر دیتا ہے۔ وہ خاص طریقے سے بیٹھ جائے جس میں اس کو نافذ ہو۔ موسم کی تبدیلی اور ٹھنڈی ہوا کے چھوٹوں سے متاثر ہو۔ پُرسیمان روز جس۔ مختلف قسم کے خوف اور تھوڑے سے۔ میلا ڈونا۔ جب دمے کی شدید دور سے ہوں، گھٹے اور چھاتی کی گھٹن کے احساس کیساتھ جیسے کہ مریض دم گھٹ کر رہ جائے گا۔ تشنگ کے خلاف دوائی ہے۔

اسپیڈ وپرم۔ ایسا دمہ جس میں مشکل سے سانس آنے کے لئے مؤثر دوائی ہے ۲ طاقت یا ۲ طاقت میں دیتے۔

گرانڈیلیا۔ جب غیر معمولی بلفم کا اجتماع ہو، سوتے وقت سانس اور تنفس رک جلتے پھیلے ہوئے دل کے ساتھ سبجوں میں ہوا ہو۔ بوڑھے لوگوں میں دمہ ہوا کی نالیوں کی سوزش کی وجہ جو شش معدوی عصب میں فالج کا باعث ہو۔ بھوک والپس لانے کے لئے شاندر دوا کی ہے

دل کی دھڑکن اور تنگی و تنفس کے افاقہ کے لئے۔

کاربوئیئم سلف۔ تحلیف والے سانس اور تیز تنفس والے دمہ کے لئے ابھی دوائی ثابت ہوئی ہے۔ شراب کے استعمال سے خواب محنت والے لوگوں کے لئے۔

پلموولیس۔ بہت زیادہ سیٹی دار سانس۔ کھڑکھڑاہٹ اور پھیپھڑوں میں پانی جمع ہونا۔
 پلاٹا اورمی۔ دمہ۔ سانس کی نالیوں کی سوزش کے ساتھ یا اس کے بغیر کے لئے شاندار دوائی ہے۔ تنگی و تنفس گارمھی پیپ دار بلغم کے ہمارہ۔ حملہ کے دوران ۲ یا ۳ ملاقات میں دی جا سکتی ہے۔

کلوریم۔ سالہاں کی آواز کے ہمارہ دمہ جب لیٹا ہوا ہو تو ناک اندر لے اور ہونٹوں سے سانس باہر لے جائے۔

امبروسیا آرٹ۔ بخار کا ہی کے ساتھ ریگ وڈ کے زرد دانوں کو دیکھ کر۔
 اریلیا رمیوما۔ دمہ نزلہ زکام سے ادل بدل کر جائے، بہت زیادہ سالہاں کی اور سیٹی دار تنفس لیٹنے پر یا رات کے وقت تھوڑی نیند کے بعد تھوڑا گرم اور مکین ہو جائے لگے میں سر سر اٹھ اور چھاتی میں گھٹن کے ساتھ کھانسی۔ دم گھٹنے سے بچنے کے لئے بیٹھنا پڑے۔

کالی بانی۔ جب دورہ یا دمہ کا حملہ مباشرت کی وجہ سے ہو یا مباشرت کے بعد ہو۔ صبح سویرے زیادتی۔ تاردار اخراج اس کی نمایاں علامت ہے جو کافی مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ سانس کی نالیوں کی سوزش کی وجہ سے دمہ۔

کالی فاس۔ اعصابی دمہ میں۔ ایک ایم طاقت بطور عمل انیگز دوائی کے دیجئے۔
 کالی نائٹریم۔ شدید تنگی و تنفس۔ بیہوشی۔ متلی۔ دھیمی چھین دار دار چھاتی میں جلن دار درد۔ کافی اخراج بلغم۔

کالی سلف۔ زرد بلغم کا اخراج۔ چھاتی میں بہت کھڑکھڑاہٹ۔ وقت سے سانس آئے۔ بولنے کے تقریباً نااہل۔

ایونٹا سلیکیٹ۔ سانس لینے کا عمل کھانسی سے پکڑا جائے۔ دمر والا سانس چھاتی میں
کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ۔ کھانسی سے سانس مشکل سے آئے۔

سلفر۔ جب دمر بھینسیوں کے دبنے یا ان اول بدل کر۔ دمر ظاہر ہو جو بھینیاں غائب
ہو جائیں یا اس کے الٹ یعنی ہو۔

لائیکو پوڈیم۔ جب دمر غصہ یا جذبات کی وجہ سے ناک کے نچھنے پٹھکے کی طرح ہلیں۔
اصحابی دمر۔ ٹھنڈا محسوس کرنے والے مریضوں میں دمر جو ہمیشہ زکام میں مبتلا ہوں۔ جلدی ٹھک
جانے والے اور کمزوری کرنے والے۔ جب زکام لگے بلغم دایں پھیپھڑے میں جم جائے۔ دمر کے ہمراہ
معدہ میں سبب لگنے کی طرف اور کپڑے ڈکاروں کے ساتھ معدہ میں اینٹھن۔ ۴ بجے سے ۸ بجے شام
دمر کی زیادہ ہو۔

ناجا۔ سانس مشکل سے لے لیٹ نہ سکے۔ بہت زیادہ پھیپھڑے کی جھانسی لینے میں مدد
دیں۔ پھیپھڑوں کی جنگلی سانس مشکل سے لے نبض آہستہ۔

نیرٹرم سلفٹ۔ نمدار موسم یا بارشوں کے موسم میں حملے۔ جب مریض ہر موسم کی تبدیلی کے
ساتھ حملوں کا نشانہ بنے۔ صبح سویرے دمر کے حملے۔ ڈھیلی کھانسی نمدار زیادہ نمدار لیسدار
بہتری نایل زرد بلغم۔ مواد کھڑکھڑائے۔ کھڑکھڑاہٹ۔ آوازوں۔ زیادہ مقدار میں سفید گاڑھی
اور تاردار چھاتی میں دھن محسوس ہو اور دبی ہوئی محسوس ہو۔ کھانستے وقت چھاتی کو ہاتھوں
پکڑے جس سے تھوڑا سا آفاقہ ہو۔ سانس کی نالیوں سوزش کے ساتھ اور چھاتی میں لگاڑے کے ساتھ
گھنٹیا کے ہمراہ دمر یا اس سے اول بدل کر دمر۔ اگر یہ دوائی آرام دینے میں ناکام ہو حملے تو
میدروریم بطور عمل انگیز دوائی کے دی جاسکتی ہے۔

سمکسٹو نائیکرا۔ سانس تیز اور دقت سے آئے۔ اونچا خراہٹ والا۔ چھاتی میں دباؤ جیسے
وزن ہے ہو۔ ذہنی کونڈی اور دم گھٹنے کا ڈر ہو۔ بعض اوقات جہرے اور منہ پر سوزش سرخی رنگ
کے ہمراہ۔ عام گرمی۔ خسر پھر سے زیادہ اونچا نہ بول سکے۔ دم گھٹنے والی کھانسی۔ لیٹے ہوئے کی صورت
میں زیادہ ہو۔ بچوں میں۔ انبانیوں میں اور نابانیوں۔ بل میں کام کرنے والوں میں دمر۔ بچہ سانس

نہ لے سکتے کی وجہ سے جاگ پڑے، جسم پر پسینہ۔

آرم ٹر انفلیم۔ خاص طور پر پنکار کا ہی کے لئے موزوں ہے چھینکیں۔ شام کے وقت گلے میں درد اور سکڑن بہت زیادہ نزلہ و زکام کے ہمراہ۔

ماسکس۔ ہیٹربائی طبیعت والی عورتوں میں یا جن بچوں کو سردی لگ گئی ہو میں دم سانس کی نالی کے اوپر والے حصہ میں دور سے وار سکڑن دم گھٹنے کے دوروں کے ہمراہ اس احساس کے ساتھ جیسے کنگڑھک کے بخارات میں سانس لیا جا رہا ہو۔

کیو پریم میٹ۔ ماسکس جیسی علامات میں دی جاتے لیکن اس کے ناکام ہونے پر انٹنشن واریا تخی دم۔ دوروں کا خطرہ گلے کی سکڑن۔

لو ویلیا انفلیٹا۔ چھاتی کا تناؤ۔ سانس کی نالی میں سرسراہٹ کا احساس۔ جدوجہد سے سانس آئے۔ سانس لینے کے لئے منہ کھلا رکھنا پڑے۔ چھاتی کے دباؤ کی وجہ سے دباؤ کو ٹھلنے کے لئے گہرا سانس لینا پڑے۔ گہرا سانس لینے پر چھاتی کی ہڈی کے نیچے ہلکی سرسراہٹ۔ کھانسی اور بلغم کا اخراج نہیں ہوتا۔ ٹھنڈا اور تباکو کے دھوئیں سے زیادتی جس کی پر برداشت نہ ہو سکے۔

فاسفورس۔ رتھم کے دم کے لئے بہتر ہے۔ ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس۔ جھنپی معدہ میں گرمی ہوتی ہے تے شروع ہو جاتی ہے۔ شدید دباؤ۔ پیشاب کی کمی البیومن کے اخراج کی کمی۔ ایسڈ فاس۔ جب فاسفورس ناکام ہو جائے تو یہ استعمال کی جائے۔ پہلے ۳ x میں اور پھر ۲۰۰ x میں دی جائے۔

نیٹریم آرسینیکم۔ الرجی یا جلدی خارش کے ساتھ دم۔ کوئلے کے باریک ذرات بھیچڑوں کے اندر چلے جانے کی وجہ سے دم۔

انگلکس ایم۔ پتلے۔ بیک کی طرح کے پتلے اعصابی اور بے چین حضرات جو تشنگ میں مبتلا ہو جائیں۔ پٹھوؤں کا کانپنا۔ اعصاب کی جھنجھٹاہٹ۔ بے ڈول اور بھدے حضرات۔ ادھر ادھر گریں چیزیں ہاتھ سے گرا دیں اور توڑ دیں۔ شدید ٹھنڈ محسوس کریں۔ کھل جانے کا رجحان۔ چھاتی کا زکام رات کے بسنیوں کے ہمراہ۔ شدید کھانسی کے دورے جو چھینکے پر منتج ہوں۔ سانس آنا۔

دل کی دھڑکن۔ بازوں کے جھکے جن کے بعد شدید کمزوری اور تھکاوٹ صبح کے وقت لیکن شام کے وقت خشک کھانسی وہ خوش و خرم اور کام کے ناقابل ہوتے ہیں۔

تھو جا۔ جب ٹیکہ لگانے کے بعد دم ہو۔ چہرہ زرد۔ بیماروں کی طرح کا۔ موی اور جھکدار۔ کبھی کبھار منہ ظاہر ہوں۔ شام کے وقت خشک کھانسی ہو، بچوں کا دم، خشک کھانسی یا دھیمی کھانسی، پرانا نزلہ، گاڑی زردی، نائل سبز اخراج کے ساتھ۔ جب اچھی طرح منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ بطور عمل انگیز کے دی جائے۔

ہیپر سلفر۔ ٹھنڈی ہوا لگنے دم۔ مشرقی خشک ہوا کے چلنے سے دم میں زیادتی۔ نندار دم میں بہت زیادہ کمی ہو۔

کیلڈیم۔ دم۔ خارش دار فالوں سے اول بدل کر۔ سکٹافاس۔ خشک کھانسی شام کے وقت زیادتی ہو۔ لیٹ کر سو سکے۔ جتنا زیادہ کھانے کھانسی بڑھتی ہی جائے۔ سوئیں جن میں دودھ کم آئے۔

برومین۔ ملاخوں کا دم جب وہ ساحل پر جائیں، جنہی وہ سمندر پر چلے جائیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ گرد اور ہوا کے جھونکھوں سے زیادہ ہو جائے۔

سیلیشیا۔ یہ سائیکوٹک مریضوں اور سودی محسوس کرنے والے مریضوں کے لئے موزوں ہے۔ چھاتی کے پلنے کام پرانے مریضوں۔ دم کی وجہ سے ساں ساں یا خراہٹ۔ تھوڑا ہٹ کے ساتھ دم گھٹے۔ حرکت نہ کر سکے۔ زیادہ گرمی لگنے اور زیادہ کام کرنے کے ساتھ مزین مانس کی نالیوں کی سوزش اور جھیلاد۔ نندار دم۔ بلغم کی بھدی سی کھڑکھڑاہٹ۔ تمام چھاتی بلغم سے بھری ہوئی محسوس ہونے سے کہ وہ دم گھٹ کر جائے گا۔ سوزاک کب جانے سے واقع ہو۔ نیچوں میں ہوا بھراؤ جہاں لپک کم ہو گئی ہو اور ریشے آخری درجہ تک ڈھیلے ہو چکے ہوں نئے یا پورے چاند کے دوران زیادتی ہو۔

اگنیشیا۔ دم جذبات۔ احتیاطوں اور غموں کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہو۔ مینڈورینم۔ دم کے لئے ایک عمل انگیز کے طور پر دوائی ہے۔ جب دوسری اچھی طرح سے

منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں یا مکمل صحت نہ دے سکیں۔ دم گھٹنے والی کھانسی بخور
 بندک اس میں ہوانہ گزر سکے۔ صرف چہرہ کے بل لینے سے آفاقہ ہو۔ گہری خالی لینے سے زیادتی
 معدہ کے بل لینے سے آفاقہ۔ سانس مشکل سے آئے۔ بکھا جھگٹا چاہے۔ ٹھنڈک عکس کرے۔
 لیکن اوپر لے گئے کپڑوں کو دُور پھینکے۔ گرمی سے بھی زیادہ ہو۔ ہوائے خمدار جھونکوں، بجلی
 کے طوفانوں سوزج کی روشنی سے غروب آفتاب تک زیادتی۔ ہمیشہ ہی شام کے وقت زیادہ بخمدار
 یا ساحل بخمدار پافاقہ اور اندرون ملک زیادہ (برڈیم کے الٹ) دم گھٹنے کے ساتھ یا
 اس کے متبادل ہو۔

اکٹیاریس۔ دم کے شدید دورے جن کی زیادتی عیض کے دوران ہو یا بولتے وقت اور
 رات کے وقت۔ بلغم کا اخراج سناؤناور۔

ریومیکس۔ کھانسی کے شدید دورے جن کی درجہ حرارت کی تبدیلی پر گرم کمرے سے باہر
 کی ٹھنڈی ہوا پر جانے میں اور اس کے الٹ اور بولنے سے اور ہنسنے سے، ہنسی کی ہڈی کے نیچے درد
 کا احساس کھانسی چھاتی اور سر کو ہلکے رکھ دے، بلغم کم اور مشکل سے نکلتے۔

سنیگیا۔ بلغم کی بھدی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ دم، سخت اور تاردار جس کو آسانی سے
 نکالا نہ جاسکے، خشک گلے کے ساتھ۔ سانس اندر لے اور کھانے۔ ہوائی نالیوں کی خیزن سوزش۔
 سانس لینے کے اعضا کی ناکامی کی حالت کو آفاقہ دیتی ہے۔

ایسڈ سلیفیووک۔ دم چھوٹی خشک کھانسی کے ہمراہ، اکثر منہ تک معدہ سے مواد آئے یا
 تھے ہو۔ چھاتی کمزور اور ملین دار اور سوئیاں چھیننے والی تکلیف سے پُر۔ ڈرانے والا دباؤ اور
 بھاتی کی گھٹن جن کو ٹانگیں نیچے لٹکانے سے آفاقہ ہو۔

کاربووٹیج۔ دم جو معدہ میں گیس کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے ہو۔
 پلوٹھوس۔ گرد و غبار سانس کے ذریعہ اندر جانے سے دم جن کو پافلہ غارتا کرنے
 پر لفاقہ ہو۔

کالوٹھوس۔ بدھنی اور گیس کی وجہ سے دم۔ بخمدار کے کنارے زیادتی۔ گرگھ کے دم

میں ٹھنڈک محسوس کرے۔

سورائینیم۔ بازوؤں کے کھلے رکھ کر لیٹنے سے افاقہ ہو۔ بستر پر بازوؤں کو چھینکنے سے
سانس میں آسانی کے لئے۔ جب بازو جسم کے قریب لائے جائیں تو زیادتی ہو۔ سردی اور
ٹھنڈے موسم میں زیادتی۔ اخراج چپکے والا اور بدبودار۔ بڑھے لوگوں کا دمر۔
ٹائیسپرکیم۔ دھندلے موسم میں زیادتی۔ کافی مقدار میں اخراج بلغم اور پسینہ کی زیادتی
سے افاقہ ہو۔

ڈولکامارا۔ نمدار موسم میں دمر یا نمدار بگھون پر رہنے کی قحط سے دمر۔
کرومیکو کالی سلفیو ریکم۔ جرمین لوگ کہتے ہیں کہ دمر کے لئے مخصوص ہے جس میں شدید
دباؤ کا مرضی بلغم جو مشکل سے اکھاڑی جائے۔

سباڈیلا۔ کاہی دمر کے لئے بہت بہتر دوائی جو دباؤ پھینکوں اور پانی جیسے اخراج پر
ہائیڈروٹانک الیڈ۔ اعصابی دمر کا شدید حملہ میں شدید گھٹن کے ہمراہ۔
سینگونیریا سی۔ خاص طور پر خوشبو یا ت سے دمر زیادہ یا ان کی وجہ سے کھانسی سخت
خشک گلابیٹھا ہوا۔

سفلیئم۔ ہر گرمی کے موسم میں دمر عود کر آئے یا دمر کی بیماری ہو گرمی کے موسم میں لاتی ہو جائے
ایک ایم طاقت میں دیجئے۔

پلسٹیللا۔ بزدل یا ڈرپوک جلد نارض ہو جانے والے طبیعت جلد تبدیل ہو جانے والا
ہنسیں اور آسانی سے چھینیں۔ اندھیرے کا ڈر۔ موت کا ڈر۔ شکی۔ چربی سے سخت نفرت۔ پیلو کے
خواب۔ ۱۔ ایم طاقت میں صرف ایک خوراک دیجئے کچھ عرصہ کے لئے اور انتظار کیجئے۔

دل کی خرابی کی وجہ دمر

اکوناٹ این۔ بائی بلڈ خشک کھانسی۔ موت کے ڈر کے ہمراہ دمر۔
ناجا۔ مشکل سے سانس آئے۔ لیٹ نہ سکے۔ شدید پھیپھیں جن سے سانس لینے میں افاقہ ہو۔

نبض آہستہ یا دھیمی۔

سیبل سر۔ خرخراہٹ کے ساتھ، دل کی خرابی والا دمہ خرخراہٹ کے ہمراہ شدید کھانسی۔
سرور اور نمدار موسم میں زیادتی۔ گلا خشک۔ ۲ یا ۳ طاقت میں استعمال کرائیے۔

برٹیا کارب۔ ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ دمہ۔ غددوں کی سوزش کا رجحان۔ آنکھوں
کے آگے سیاہ دھبے۔ ڈھیٹوں میں بھراؤ کا احساس، کانوں میں بھنبھناہٹ کی آواز اور کم سنائی
دے۔ احساس جیسے کہ دھواں اینچ پیڑوں میں لے جایا گیا ہو۔ چھاتی میں درد۔

برٹیا میور۔ بوڑھے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں دمہ۔ ذہنی کمزوری اور حافظہ جاتا
رہے۔ دم گھٹنے والی کھانسی بغیر غارغ کرنے کی طاقت نہ ہو۔ ہر قسم کی موسمی تبدیلی سے زیادتی۔
وکم البم۔ گردوں کی تکلیف یا ہائی بلڈ پریشر اور غالباً پیشاب میں البیومن کی وجہ سے۔
یٹنے پر دم گھٹنے کا احساس نبض کمزور اور تدار۔ دل میں بھاری پن اور دباؤ کا احساس۔

کریٹیکس۔ دل کے فیل ہونے اور ہائی بلڈ پریشر والے، دمہ والے لوگ شدید
تنگی تنفس اور دل کھلا ہوا۔

آرم میور۔ اونچی آواز کی کھانسی زرد رنگ کم بلغم کے ہمراہ۔ دل کے اوپر تکلیف یا درد۔
سٹرکولیا۔ یہ کمزور دل والے خاص طور پر شریبوں میں دمہ کی دوائی ہے۔

امونیا کارب۔ کمزور دل۔ لاغر۔ دل کی دھڑکن اور چلنے پر مشکل سے سانس لے۔

ایپو سائٹم کین۔ دمہ جس میں پیشاب میں کھار آئے۔ گردوں میں تکلیف اور دل

کمزوری کے سوجن کے ساتھ۔ دل کے خانوں کی نااہلیت۔ سانس چھوٹا۔ خون کی نالیوں
کا کم دباؤ۔

کینکٹس گ۔ دم گھٹنے کے وقفہ دار دورے۔ غشی کے ہمراہ سچہ پڑھنے

پیسے اور نبض کا نہ ہونا۔ احساس چھاتی کا پھیلا حصہ مضبوطی سے اسی سے باندھا ہوا ہے۔

دباؤ اور دل کی دھڑکن۔ لیٹے میں مانع ہوا لیٹنا نہ جا بیٹھے۔ چھاتی میں خون کا اجتماع، احساس
جیسے کہ دل اور چھاتی ایک بانگ میں کچلے جا رہے ہیں۔ دورہ انجکے صبح ہوں کھلی ہوا میں نانا۔

کھانسی

اکونائٹ این - خشک کرپ دم گھٹنے والی - اونچی اور کھڑی کھانسی، دم گھٹنے والی سخت - بچنے والی اور سیٹی وار خشک ہواؤں اور ہوا کے جھونکوں سے -

سیلا ڈونا - جب گلے میں اجتماع خون کی وجہ سے خشک - بھونکنے والی کھانسی ہو - کھانے وقت چہرہ سرخ ہو جائے -

برائی اونیا - خشک کھانسی جب حاذز کام کا حملہ ہو - منہ، خشک - چھاتی کے پہلوؤں میں سویاں چمکنے جیسے درد -

کالی بائی - جب چھٹنے والی کھانسی جو رسی کی طرح کھینچی جاسکتی ہے - ڈھیلی کھانسی - ہائیوسائمس - خشک کھانسی جب لیٹے تو زیادہ ہو - بیٹھنے پر افادہ - کھانے پینے اور بولنے سے زیادہ ہو -

سائیکلیمین - رات کے وقت سوتے میں کھانسی بغیر جاگے خاص طور پر بچوں میں - کالی کارب - خشک کھانسی جب دورے دار - لیسڈار بلغم خارج ہو یا پیپ جو نگل لی جائے ۲ سے ۴ بجے کے دوران زیادتی -

کاربو ورج - درجہ معده میں گیس کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے ہو - پلسٹیللا - ڈھیلی کھانسی جب کہ گرم کمرے میں زیادہ ہو اور کھلی ہوا میں افادہ - فاسفورس - گرم کمرے سے ٹھنڈے کمرے میں جانے پر کھانسی، بنسنے پر اکھانے اور پینے اور بائیں طرف لیٹنے پر کھانسی زیادہ -

پسٹونجیا - خشک کھانسی سال ساں کی آواز کے ساتھ جیسا کہ لکڑی میں سے آہ کھینچا جا رہا ہو - مٹھائیوں سے ٹھنڈے مشروبات سے - تبا کو نوشی سے - نیچا سر کر کے لیٹنے سے زیادتی - پڑھنے پر بھی - گانے پر بولنے پر اور نکلنے پر بھی زیادتی - کھانے پر بہتر یا گرم مشروبات کر دینی ضرور اسٹ کی آواز جب سانس لے -

ہمیں سلفر۔ جب خشک ٹھنڈی ہوا لگنے سے کھانسی ہو۔ چلنے پر زیادتی جسم کو ننگا کرنے پر کھانسی۔ چھاتی کی کمزوری پریشان۔ بھرائی ہوئی خرخابٹ دار سانس۔

پٹرولیم۔ رات کے وقت کھانسی زیادہ جب دن کے وقت اسہال شروع ہو جائیں تو کھانسی میں اضافہ۔

سینکونیریاکین۔ خشک اور نندار کھانسی جس کے بعد سوزش ہو۔ سانس کی نالیوں کی کھانسی بخجور اور چھاتی کے اوپر کے حصہ میں خرخابٹ۔ رات کے وقت جگادے اس وقت تک نہ بند ہو جب تک بیٹھے نہ اور ہوا نہ خارج ہو۔

کیپیکیم۔ دور دراز حصوں میں درد کے ساتھ کھانسی۔ بدبودار سانس لوگوں کا کمرہ میں بیٹھنا مشکل کر دے۔ پھیپھڑوں سے گندی ہوا زور سے نکلے۔ $200 \times$ طاقت میں ۱۲ سے ۱۵ گھنٹے کے وقفے سے دیا جائے۔

میفائٹس۔ ہر صبح کھڑکھڑانے والی کھانسی۔ بولنے پر یا اونچی پڑھنے پڑکھانسی کھانسی کے ہر دور سے پریشاب یا پاخانہ خارج ہو جائے۔

اینا کارڈیم۔ کھانا کھانے کے بعد کھانسی۔ بولنے پر، سونگھنے اور ذائقہ کا جاتے رہنا۔ کھانسی کے ہر دورہ کے بعد مواد کا میوچرٹھنا اور تے کا آنا۔

نیٹرم میور۔ ماتھے میں درد کے ساتھ کھانسی اور بلا ارادہ پیشاب کا خارج ہو جانا۔ جگر کے تھام پر سوئیاں گڑنے جیسا درد کھانسی کے ہمراہ آنسوؤں کا بہنا۔

ایلیم سڈیا۔ کھانسی خجورہ میں سرسراہٹ کی وجہ سے ہو سرسراہٹ سے نجات پانے کے لیے متواتر کھنا گھارنے کا رجحان۔

امونیا کارب۔ انفلوئنزہ کے بعد کھانسی جب برائی ادویا اور دوسری ادویات ناکام ہو جائیں۔ گلے کے تھل جانے کی وجہ سے کھانسی بخون تھوکتا۔ گلے میں سرسراہٹ جیسے کہ گردوغبار سے ہو۔ کھانسی صبح ۳ بجے ہو۔

ڈرومیرا۔ کھانے کھانے کے دوران یا بعد میں کھانسی کے دورے۔

کامیسیکم۔ زیادہ گہری کھانسی نہ کھانس سکے کہ بلغم کو اکھاڑ دے یا بخور ہی سی اکھڑی ہوئی۔
بلغم حلق میں پھسل جائے نہ کھانسی کے دوران پیشاب خارج ہو جائے۔ کھانسی بول چال اور ٹھنڈے
پالے زیادہ ہو لیکن ٹھنڈے پانی کے گھونٹ لینے سے افاقہ۔

کوکولس۔ اونچا بولنے یا دانتوں میں بُرش کرنے پر کھانسی ادرتے۔

کیوسریم میٹ۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے کھانسی لیکن ٹھنڈا پانی پینے پر کھانسی
رک جائے۔ کھانسی گلے میں قفل کی آواز کے ساتھ جیسے کہ بوتل میں سے پانی باہر اڑا دیا جائے۔
سلیشیا۔ بہوش کرنے والی کھانسی خطرناک مواد تھوکن جو گولی دار زرد یا سبز اور پانی کی
تہہ میں میٹھ جائے اور بہت گندی ہو آئے۔

چیلیڈونیم۔ ہوائی نالیوں میں گرد وغبار کے احساس کی وجہ سے کھانسی۔
اکٹیا رسیمورا۔ خشک پھاڑنے والی کھانسی رات کے وقت اور ہر بار بولنے کی خواہش زیادتی۔
اکالیفا انڈیکا۔ شدید خشک کھانسی جس کے بعد غونی بلغم خارج ہو۔ کھانسی شدید
رات کے وقت۔

کوریلم رب۔ بچے اپنا سانس گتوا دیں یا بچوں کو سانس نہ آئے ان کے چہرے زرد
اور سیاہ ہو جائیں۔ سانس کھلنے نہ کھولیں جس کے بعد تپ ہو جائے۔ ہوا کے راستوں
میں برف جیسی ٹھنڈک۔ اعصابی اور باریک دہین کھانسی۔

شائم ایوڈائیٹ 3×3 { تمباکو نوشی کی کھانسی
سیفسگیر یا $30 \times$

سنیکا۔ جب کھانسی کا خاتمہ پھینکوں پر ہو۔

ٹیرنٹولا ایس۔ کھانسی جس کو تمباکو نوشی سے افاقہ ہو۔ رات کے وقت لینے پر خشک
کھانسی اور صبح کے وقت اٹھنے پر چھاتی میں پھاڑنے والے درد کے ساتھ کھانسی۔
ٹرائیولیم پی۔ کھانسی جس کے بعد بھکی لگے۔

نیفتھلیئم۔ دم گھٹنے والی کھانسی۔ سانس لینے کے ناقابل بعض اوقات شدید کہ پسینہ آئے۔

انٹیم ٹارٹ - جب بچہ ناراض ہو جائے، ادل بدل کر کھانے اور جمائیاں لے۔
 کروٹن ملگ - جب ایگزیمیا کے دبے کی وجہ سے کھانسی ہو۔ یہ دوائی کھانسی اور بھڑے
 پھنسی کے ادل بدل کر آنے کے لئے یعنی جب کھانسی ختم ہو جائے تو بھنسیاں ہوں اور حبیبیاں
 غائب ہو جائیں تو کھانسی ہو۔ دے والی کھانسی جو آدھی رات کو مریض کو گہری نیند سے جگا دے۔
 یوفورنیا - بعض اوقات خشک کھانسی لیکن عموماً ڈھیل ڈھالی، دن کے وقت زیادہ رات
 کو تکلیف نہ دے خون کے بہاؤ کے رک جانے پر کھانسی۔

لیکٹو کا - دورے دار کھانسی، دم گھٹنے کے احساس کے ہمراہ۔
 میو برکولیم بو - نوجوان لڑکیوں میں کھانسی حوض دب جانے کی وجہ سے۔
 سکولٹل خشک سخت کھانسی - پھینکوں کے ہمراہ۔ کھانتے وقت پشیاں خارج ہو جا
 کھانسی کے ساتھ تنگی تنفس کافی زیادہ ممکن، لیسڈار بلغم کا اخراج۔
 ریو میکس - کھانتے وقت پشیاں خارج ہو جائے خشک متواتر تنگ کرنے والی کھانسی
 ہوا کی تبدیلی سے زیادتی یا کمزوری کی تبدیلی سے زیادہ رگے کے گرمی کو چھونے یا دبانے سے زیادتی۔
 میٹنگم - لیٹنے سے کھانسی کو آفت اور بڑیوں کا احساس ہوتا۔
 انٹیم کروڈ - آگ کو دیکھنے سے کھانسی میں زیادتی۔

کو کس کی کھانسی - کھانسی کا گرمی لیسڈار بلغم کے ہمراہ۔ یہ گرمی کے آخری مہینوں میں
 شروع ہوتی ہے۔ اور ساری سردیوں میں رہتی ہے۔ یہ ٹھنڈے موسم میں آتی ہے لیکن حقیقتاً
 یہ ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی ہوا سے کم ہوتی ہے۔ یہ گرم کمرے اور گرم مشروبات سے زیادہ
 ہوتی ہے۔ گلے میں سرسراہٹ۔ دورے دار کھانسی۔ کالی کھانسی، شرابیوں کی کھانسی۔
 برومیم - گرمی میں کھانسی، یہ گرد و غبار والی چیزوں کے استعمال سے زیادہ ہوجاتی ہے۔
 بریٹاکارب - جھفر میں اور ہوا کی نالی میں ہیجان کی وجہ سے کھانسی جس کو پیٹ کے
 بل لیٹنے سے آفت ہو۔

انٹیم ٹارٹ - چھوٹی چھپک کے پیچھے کے طور پر کھانسی۔

آرم ٹرائل فلم - کھانسی چھاتی میں دکھنے کے احساس کے ساتھ پھیپھڑے دکھیں۔ سانس کی نالی اور سانس کی بڑی نالیوں میں جلن۔

امبرگریسیا - جب زیادہ لوگ ہوں تو کھانسی زیادہ ہو اور اعصابی مریضوں میں بھی - گانے سے زیادتی، کھانسی جس میں بعد میں معدہ سے ڈکار آئیں - دوسری ادویات ایسڈ سلفٹ - آرنیکا، سیلگونیڈ - اور دریسٹرم البم -

ایریلیا ریسومسا - تھوڑی سی نیند لینے کے بعد رات کے وقت کی کھانسی، کھانسی کے دورے کے دوران لیٹنے سے زیادتی، لیٹنے کے فوراً بعد بھی یا عام طوراً دھمی رات سے پہلے -

بسمتھ - کھانسی جب معدہ خالی ہو -

امونیا آرسینکم - خون آمیز بلغم کے ساتھ کھانسی بلغم بدبودار - پیپ دار - میٹھے ذائقہ والی سخت، زرد، دھندلی کھانسی رات کے وقت - چھوٹی بے قاعدہ کھانسی - دم گھٹنے والی -

دل کی خرابی کی وجہ سے کھانسی

ہائیڈروسائٹک السیڈ - یہ چوٹی کی دوائی ہے، سب سے پہلے یہ آزمائی جائیے -

ڈیجیٹلیس - کھانسی جس میں سانس مشکل سے آئے - نبض بے قاعدہ اور وقفہ دار - چہرہ مڑوں جیسا زرد -

سپونجیا - خشک بھوکنے والی کھانسی - گلے میں ڈاٹ لگنے کا احساس - حنجروں میں سرسبز -

ناجا - گلے سے سانس لینا دم گھٹنے کے ہمراہ - دل کی تکلیف کی وجہ سے پُر حیران کھانسی

لیس دار یا چکنے والا بلغمی مواد اور تھوڑا -

آرم میور - دل کی وجہ سے کھانسی -

اگزالک السیڈ - تھوڑی سی مشقت سے دل کی خرابی والی کھانسی - حنجروں میں رکاوٹ کا احساس -

کالی کھانسی

پرنوسین - یہ ایک نوسود ہے کالی کھانسی کی ابتداء میں دی جانی چاہیے - اکثر کیسوں میں اس کی

ایک خوراک کالی کھانسی کو درست کر سکتی ہے یا اس کے وقت کو کم کر سکتی ہے۔

ڈرومیرا۔ یہ کالی کھانسی کے لئے تقریباً مخصوص دوائی ہے۔ اس کی ۳۰ x طاقت دی جانی چاہیے۔ چار روز کے بعد دہرائی جائے۔ کچھ طبیب خیال کرتے ہیں کہ اس کی ۲ طاقت میں دو دو قطرے تین گھنٹے کے وقفے سے دینے چاہئیں۔ کھانسی کے دورے بار بار آئیں اور مریض کو سانس لینے کا موقع بھی نہ دیں۔ اس کے بعد جی متلائے اور تھے ہو۔ کھانسی بیٹھی ہوئی آواز کے ساتھ سانس لینے کی واضح مختلف سوراخوں مثلاً ناک۔ گلا اور حنجرے سے خون جاری ہو۔

بیلادونا۔ کالی کھانسی کے ابتداء میں خشک کھانسی نصف گھنٹہ یا اسی وقفے سے تین یا چار لہروں میں ایک وقت میں چہرہ سرخ ہو جائے۔ بعد میں ناک سے خون بہے۔

کالی کارب۔ جب ڈرومیرا ناکام ہو جائے تو یہ ایک مخصوص دوائی ہے۔ اس دوائی کا مخصوص نشان اوپر کے پوٹے اور برز کے درمیان تھیلے کی مانند سوزش۔

فاسفورس۔ بعد کی حالتوں میں جب خطرناک نتائج کی توقع ہو۔ گارمسی۔ زنگ کرنگ کی یا سرخ چمکدار جھاگ دار۔ بلغم۔ گلا بیٹھا ہوا۔ آواز جاتی رہے اور سر سر ہٹ۔

اپنیٹک۔ جب تھے کے ہمراہ شدید کھانسی ہو۔ یہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ کچھ کا چہرہ نیلا ہو جاتا ہے۔ چمکدار بلغم کا بہت زیادہ اخراج۔

میفاٹیس۔ سخت کالی کھانسی تشنجی دوروں کے ہمراہ جس کی زیادتی رات کے وقت اور لیٹے ہونے کی صورت میں ہو۔ دم گھٹنے کا احساس۔ بچہ سانس بہرہ نکال سکے۔ بعض اوقات بعد میں اینٹھن ہو۔ چھاتی کے اوپر کے حصہ میں بلغم کھر کھڑے (بعض اوقات یہ دوائی دینے سے تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے لیکن حقیقت میں بیماری کا دور گھٹ جاتا ہے) شدید کھانسی جیسے کہ ہر دورہ مریض کی زندگی ختم کر دے گا۔ زکام کی علامات نہ ہوں۔ بلغم کا اخراج بہت ہی معمولی یا بالکل ہی نہ ہو۔

کویرٹم رٹ۔ شدید کھانسی۔ بچے اپنا سانس نہ لے سکے۔ لہجے کے چہرے زرد اور سیاہ پڑ جائیں۔ سانس کے لیے تریس رتے بھی ہو سکتی ہے۔ سواکی نالیوں کی برف کی طرح کی ٹھنڈک۔

اعصابی اور پھوٹی بندوق کی طرح کی کھانسی۔ سانس لینے پر سواٹھنڈی معلوم ہو۔ کھانسی سے پہلے دم گھٹنا اس کی نمایاں نشانی ہے۔

کیو پریم میٹ۔ سانس کے ترک جانے یا دب جانے سے کھانسی چہرے کا نیلا پن اور قے ہو۔ انگلیوں کے ناخن بے رنگ نکھیں اور پروٹ جانیں بچہ کھاتا ہے حتیٰ کہ اس کا سانس اکھڑ جاتا ہے اور بیہوشی کی حالت میں لیٹ ہے۔ کھانسی جو ٹھنڈی ہوا سے پیدا ہوا اور ٹھنڈے پانی سے آتا ہو۔ کھانسی کا شدید دورہ جس کو ٹھنڈا پانی پینے سے آفاقہ ہو۔ مریض کو انیسٹن ہو سکتی ہے۔ انگوٹھے اور مٹھیوں کو بھینچ لے۔

ایلیم سپیا۔ بخوں میں قے۔ بد ہضمی۔ گیس اور بدبودار گیس کے اخراج کے ہمراہ کالی کھانسی۔ کوکس کی کھانسی۔ کالی کھانسی صبح کے وقت زیادتی جس کا خاتمہ رسیوں جیسی صاف بلغم کے اخراج جو منہ میں تاروں سے ٹپکتی ہوئی محسوس ہو۔ کال بائی بھی تاردار بلغم رکھتی ہے لیکن اس میں مواد زرد ہوتا ہے اور کوکس کی کھانسی کی طرح شفاف نہیں ہوتا۔

سنیگیا۔ شام کے قریب کھانسی میں اندھے کی سفیدی کی طرح کی سخت شفاف بلغم کا اخراج۔ مریض بچکل دینے والا ذرا چھاتی پر محسوس کرے۔ نیٹرم میور۔ جب کالی کھانسی میں آنسو بھی ہمراہ ہوں۔

نیفٹھالین۔ دم گھٹنے والی کھانسی۔ سانس لینے کے ناقابل۔ بعض اوقات اتنی شدید کہ پسینہ آجائے۔ کھانسی کے حملہ اچانک ہوں اور کافی دیر تک رہیں، گلے میں تنگی بہت نمایاں ہوتی ہے۔ (عورتوں میں کسی سبب کی وجہ سے کھانسی)

ٹیزٹولا کیونیز۔ کالی کھانسی کے لئے بہترین دوائی ہے جو مریض کو حصول میں یا چھوٹے چھوٹے بخوں میں بانٹ دے۔


عورتوں میں بغیر اختیار کے کھانسی۔

سینشوارنیں۔ حیض کے دب جانے کی وجہ سے کھانسی۔

یہ کیا۔ جب کھانسی پڑو میں سے اٹھتی ہوئی معلوم ہو۔ لیکن ذائقہ کی بلغم کا اخراج۔
 ملی فولیم۔ حیض کے دب جانے یا خون کے اخراج کے دب جانے سے کھانسی۔
 اکیٹا ریسوموسا۔ خشک تھکا دینے والی کھانسی جو رات کے وقت زیادہ ہو پراپٹوٹ تھکتی ہی
 حساس ہوں۔

امبرگریسیا۔ رحم کی کمزوری کی وجہ سے جب تھوڑے سے بھی جذبات کھانسی اور حیض کو بڑھاویں۔
 ایپس میل۔ بالغ ہونے پر بھونکنے والی کھانسی۔ دائیں طرف کی پچہ دانی کی حساسیت
 کی وجہ سے

واٹر نیم پولس۔ حمل کے دوران میں کھانسی جو استقاط حمل کا باعث بن سکتی ہو۔ یہ
 دوائی استقاط حمل کو روک دیتی ہے۔
 کالی بائیکرو میکم۔ حمل کے دوران میں کھانسی۔
 میڈورنیم۔ سوزاک کے ہمراہ یا سوزاک کی وجہ سے یا پرانے سوزاک کی وجہ سے۔



اٹھواں

باب

دل اور خون کی تالیوں

کی

بیمکاریاں

خون کی نالیوں کی پھیلاؤ

بریٹا کارب - کافی دیر تک رہنے والی شدید دل کی دھڑکن جو بائیں طرف لیتے سے ہو اور پھوٹے پھوٹے سانسوں کے ہمراہ - چھاتی میں بھراؤ خاص طور پر اوپر چڑھتے وقت - چھاتی میں سانس لیتے وقت سوسیاں چھٹنے کا احساس و تکلیف ہر میں تپکن و شدید کمزوری جیسے کہ دوران خون رگ گیا ہو - یہ مندرجہ ذیل ادویات پایہ تکمیل تک پہنچانے والی ہے تاکہ مکمل شفا ہو جائے۔

کاربو انیمیلس - سینے کی خون کی پھیلاؤ آواز جاتی رہے - تیز سوسیاں چھٹنے والی جیسی جلن دار درد چھاتی میں جو چلنے پر زیادہ ہو - ایک ایم طاقت میں دیکھئے۔
 لائیکو پوڈیم - خون کی نالیوں کی پھیلاؤ، گوشت کی کمی کے ہمراہ، ہونٹ دکھس یا درد کریں - گیس اور قبض کا رجحان۔

درد دل

امائیل نائٹریٹ - حاد حملوں میں جب دل کا فعل تیز اور ہنگامہ خیز ہو - سر کے گرد پی بندھی ہونے کا احساس دل کے گرد سکڑن - دبی ہوئی سانس - چہرہ پر خون - بازوؤں کی کمزوری اور کانپنا - پریشان اور تشویش۔

دل کا پھٹ پھٹانا - دل کی دھڑکن اور کمزوری

گلوناٹرن - جب سارے جسم پر تپکن محسوس ہو - تکلیف دل ہر طرف نکلتی ہوئی معلوم ہو - سانس مشکل سے لے دل کے پھٹکنے کے ساتھ -
 کرٹیکس - اچانک اور شدید درد چھاتی کے بائیں طرف دل سے نکلتی ہوئی اور بائیں بازو

ملاس اور موت سے ڈرے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً پانی کے ہمراہ مدرنیکچر کے پانچ قطرے
فی خوراک۔ دل کی تمام تکالیف کے چوٹی کی دوائی ہے۔

لیکسیس۔ غش کے ہمراہ اینٹھن دار دریں۔ دل کی دھڑکن اور معمولی سے پریشانی
سے بھی گھٹن، مموں کرے کہ دل ایک دھاگے سے لٹک رہا ہے اور ہر دھڑکن اسے پھاڑے
دل کے حصے میں سوئیاں چھبے جیسی دریں۔

ناجا۔ دل کے حصے سے گدی تک پھیلتی ہوئی درد۔ بائیں کندھے اور بازو میں پریشانی
اور موت کے ڈر کے ساتھ۔ دل کا پھر پھڑانا۔ اور دل کی دھڑکن۔ نبض سست اور بے قاعدہ۔
اکونائٹ۔ ایک گارآمد دل کی دوائی جب ذہنی پریشانی۔ موت کا خوف۔ دباؤ اور دل کی
دھڑکن۔ بائیں بازو کا سس ہونا۔ انگلیوں میں جھنجھناہٹ۔

آرسنیکم البم۔ دل کی تکلیف کے لئے اچھی دوائی ہے۔ شدید اور ناقابل برداشت
دل کی تپکن۔ خاص طور پر جب پیٹھ کے بل لیٹا ہو۔ ۱۲ بجے صبح کے بعد۔ دل کی چڑبیلی تیزی۔
دل کے پردوں میں پانی آجانا۔ بے چینی۔ استسقاء۔

سپائیکلیا۔ دل کی دھڑکن اور دل میں تیز سوئیاں چھبیں۔ نبض کمزور اور بے قاعدہ بھرپور
اچھلتی ہوئی حرکت سے زیادتی۔

مگنیشیا فاس۔ یہ دل کی درد کے حملوں کو کم کرتا ہے اور درد سے نجات دلاتا ہے۔
۶ x طاقت میں گرم پانی کے ہمراہ دیجئے۔

سمی می فیوگا۔ جب دل کا فعل اچانک رُک جائے تو شدید دردی مریض پر ہوش ہو جاتا
ہے، نبض کمزور اور باریک۔

شریانوں کی دیواروں کی سختی

بریٹامیور۔ جب خون کی بڑی نالیاں اور اوسط رگوں ہو تو چوٹی کی دوائی ہے رات
کو لیٹے پر شدید سردی۔

آزیکا مانٹ - دماغ کی شریانوں کی دیواروں کی سختی - بوڑھے لوگوں کے چکر - خون کے اخراج کا رجحان -

پلیم - بلڈ پریشر اور شریانوں کی دیواروں کی سختی - تارکی طرح باریک نبض - مزمن دم گڑھ - آرم میوور - دل کا حد سے زیادہ بڑھ جانا - پھیلتی اور سر میں اجتماع خون - دل کی شدید دھڑکن - سر کی شریانوں کے لئے خاص لگاؤ رکھتی ہے -

آرم میٹ - دل کی درد مزمن گٹھیا کے دہرے جو ایک بوڑھے دوسرے بوڑھے آدمی کے ساتھ - حرکت پر دل ہلتا ہوا معلوم ہوا اور دل کی دھڑکن ہولے ٹھہرنے پر مجبور کرے - اگر کوئی - شروع شروع میں جب شریانوں کی دیواریں سخت ہو جائیں جب دل کا رجحان اور دل کی سخت آواز ظاہر ہو - شریانوں کی دیواروں کی سختی اور تباہی اور نالیوں کی تسخیر سکڑن سختی کے ساتھ -

سٹرڈنٹیتھس - ٹھپے میں شریانوں کی دیواریں سخت ہو جائیں - چربی کا شریانوں میں چربی کا جم - مرمت نہ کر سکا - قسطوں کے اکٹھے ہونے کا رجحان -

ایڈرنیالین - شریانوں کا ہائیڈر پریشر - ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے کانوں میں گرج - آرسینک آئیوڈ - ہر قسم کی دل کی بیماریوں کے لئے خاص دوائی ہے - نبض دھیمی دل کی دھڑکن کے ساتھ - سانس پھولی ہوئی - بیڑھی نہ چڑھ سکے - منزل والوز کی خرابی منزل کی سکڑن درد دل کے ساتھ - ۳ x طاقت میں دن میں دو دفعہ کھانا کھانے کے نصف بعد دوسری ادویات کے ہمراہ یہ دوائی ہمیشہ دل کی تمام بیماریوں میں دوسری علامتی ادویات کے ہمراہ دی جانی چاہیے -

سپائیکیلیا - ایک اور بہت مشہور یا ضروری دوائی دل کی سوزش کے لئے جس میں دل کی اندرونی اور بیرونی جھلیاں متاثر ہو چکی ہوں - منزل والوز کی کئی شراب نوشی کے سے اس دوائی کی نمایاں علامت ہے - آنکھوں کے آگے شرارے ہوتی ہے - دل میں تکلیف یا درد سر چکرانا سر میں آوازیں آئیں - شدید اعصابیت - گلے میں رکاوٹ کا احساس - سونہ سکا -

ہائی بلڈ پریشر شریانوں کی جلد کی سختی بھی دیکھیے۔

لیکس۔ ہائی بلڈ پریشر کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ مریض صبح جاگنے پر زیادہ بری حالت محسوس کرتا ہے۔ نیند کے دوران زیادتی۔ بے چینی۔ فٹ پڑے نہیں ہیں سکتا۔ ان کو ڈھیلے کرنا پاتا ہے۔ سب سے پہلے اکثر کیسوں میں یہ دوائی چلی ہے۔ ایک ایم طاقت میں دیجئے۔

آرم میٹ۔ جب غصے کے دہنے یا ناراضگی کی وجہ بہت زیادہ حساس۔ سر میں گرج، ہچکچہ شدید سر درد۔ موت کا خوف۔ دل کی دھڑکن۔ نا اُمید ہی اور مایوسی۔

اکونائٹ۔ دل کی دھڑکن۔ بہت پریشانی۔ جسم کی گرمی۔ دل کے حصہ میں بھلا لگنے جیسے درد۔ جھنجھٹا ہٹ کے ساتھ بیہوشی۔ نبض بھر پور، مضبوط اور سخت۔

ایلیم ٹائیوا۔ ایلیم جیم یا موٹے تازے مریضوں کے لئے موزوں ہے جو بہت زیادہ خوراک کھائیں، خاص طور پر سبزی خوردہ ہو۔ خون کی نالیوں کو پھیلانے والی خصوصیات رکھتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر عام طور پر ۲۰ سے ۳۵ منٹ کے بعد ۲۰ سے ۴۰ قطرے مڈ نائٹ کے استعمال کرنے لگتے ہیں۔

سٹروفنٹیس۔ بوڑھے لوگوں میں دل کی تسکین جن کو گروے کی بیماریاں ہوں پچھان دل سخت شریانوں کے ساتھ پیشاب کافی مقدار میں۔ دل سکڑنے کو بڑھا دیتا ہے اور دل کی تیزی کو کم کرتا ہے۔

پلیسمم میٹ۔ جب قبض اور بُزدلی ہمراہ ہو۔

نیٹرم میور۔ مریض جو تک کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پشیمان ہوتے ہیں۔ ان کا بلڈ پریشر کم کر دیتی ہے۔ ۲۰۰ طاقت یا بڑی طاقت دیجئے۔

کاربوا نیملیس۔ خدی قسم کی سرکی کھوپڑی کا سر درد۔

جلیسیم۔ جب بڑی خبر کو جو سے اچانک صدمہ ہو جانے۔ ایک ایم طاقت میں دیجئے۔

الکینشیا۔ جب جذبات۔ ناکام محبت اور غم کے اثرات کی وجہ سے ۲۰ طاقتیں دیکھے۔
 گلوناہین۔ سستی۔ کام کرنے کو بالکل جی نہ چاہیے۔ ٹوکے جلنے پر جوش و میحان اور
 سرورد۔ سروردل کی طرف خون کا زیادہ ہوجانا۔ ٹپکن دار در دیں۔ بھر بھڑاتا ہوا دل۔
 قبض اور غارش والی بواسیر۔

بریشا میوٹیکیم۔ بوڑھے لوگوں میں شریانوں کی دیواروں کی سختی اور دماغ کی بیماریاں
 چکر اور کانوں میں آوازیں۔ بغض کا تناؤ، فالج کے ساتھ جسم بہت ہی ٹھنڈا۔ شریانوں کا ٹوٹنا ہو
 جانا۔ بوڑھے لوگوں میں ہوا کی نالیوں کی تکالیف اور دل کا بڑھ جانا۔
 ور میٹرم ورائیڈ۔ پرخون کثرت دم والے لڑاکے آدمی۔ کمزوری بغض سخت پرخون
 علامات کے ساتھ۔

بیلادونا۔ دل کی شدید دھڑکن۔ سر میں گونج دار آوازیں تکلیف دہ سانس کے
 ہمراہ۔ تھوڑی سی بھی سختی سے دل کی دھڑکن۔ تمام جسم میں ٹپکن۔ جلد پرخون اور گرم
 پریشانی یا ڈر۔ پیاس نہ ہو۔ بائیں جانب یا پیچھے کی طرف گرنے کا ساتھ چکر۔ چھوٹے سے
 شور سے، بے ہنگم آواز اور منچے لیٹنے سے زیادتی۔

اکسینکلم الیم۔ بے چینی کے ہمراہ، آنکھوں اور پاؤں کا سوج جانا۔ سانس لینے میں مشکل
 رات کے وقت لیٹے پر دم گھٹے۔ بیٹھیوں پر چڑھنے سے زیادتی۔
 تھوچا۔ مائی بلڈ پریش خاص طور پر کمزور شریانی دیواروں کے ہمراہ۔ ذاتی اور خاندانی
 تاریخ دریدوں میں خون کے تو تھڑے ظاہر کرے۔

ایڈرینالین۔ شریانوں کا بہت اونچا بلڈ پریش۔ کانوں میں گرج مائی بلڈ پریش کوچے۔
 لائیکو پوڈیم۔ زرد رنخ لوگوں میں جو یورک ایسڈ کی تکلیف میں مبتلا ہونے کا رجحان
 رکھتے ہوں جو جلد پر جگر کے رنگ کے دجے رکھتے ہوں۔ مٹائیوں کی زبردست خواہش۔ گھوٹی
 ہوئی گیس پیٹ میں جو ۴ اور ۸ بجے کے دوران زیادتی ہو یا صبح سویرے حرکت سے افاتہ۔

فیثرم میور۔ نمک کی زبردست خواہش۔ گرم موسم میں بے ہوش ہو جائے۔
چائنا آفیشیلس۔ چکر۔ بیہوشی۔ دل کا اچھلنا کودنا۔ جو بھی چیز کھائے گیس میں تبدیل
ہو جائے اور اد پر نیچے نہ ہو۔ کانوں میں دوازیں۔ رطوبت زندگی کا بہت زیادہ اخراج اور کمی۔
سیمیپا۔ آنکھوں کے نیچے زردی مائل گہرے حلقے۔ تمام جسم میں دھڑکن۔ کھٹی چیزوں کے
خواہش۔ شدید مشقت سے کمی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد شکم کا اوپر کا حصہ بالکل خالی
معلوم ہو۔ جگر کے حصے۔ زندگی اور اپنے محبوبوں سے لاپرواہ۔

کاربوو تاج۔ ناطاقتی۔ پیٹ کے اوپر والے حصہ میں گیس بھری ہو۔
ٹیوبیکولنیم۔ یہ ان لوگوں میں بطور عمل ایگزیردوانی کام کرتی ہے جو اپنی صحت کو کھو رہے ہوں
کلکیو فاس۔ یہ تھکے ہوئے جوانوں میں ظہر ہوتی ہے تیزی سے بڑھنے والے نوجوانوں میں۔
وکم ایلبم۔ نبض سُست اور کمزور۔ جوڑوں کا درد اور درد گتھیا۔ اعصابی درد اور لنگری
کا درد۔ ڈاٹ لگنے کا احساس۔ مستقل چکر۔ دل پر وزن اور دباؤ جیسے کہ بھینچا جا رہا ہو۔
لینے کے نااہل۔ سردیوں اور ٹھنڈے طوفانی موسم زیادتی تکلیف۔
جلیسیم۔ دل کی بے قاعدہ دھڑکن۔ دل کی دھڑکن۔ نبض بے قاعدہ۔ نرم کمزور دم
گھٹے۔ پھیپھڑوں کا فاج۔

شریانوں میں خون کے لوتھڑوں کا جم جانا

مرکیورس۔ دل کی کمزوری جیسے کہ سر رہا ہو۔ کلپتے ہوئے دل کے ساتھ جاگے اور
ہلچل جیسے کہ ڈرا ہوا ہو۔ دل کی چوٹی پر درد جو اوپر کی طرف بڑھے۔ دل کا دباؤ۔ ڈر کے ساتھ
دل کی دھڑکن۔ رات کے وقت یا تھوڑی سی محنت کے ساتھ زیادتی کھانسی کے ہمراہ اور
خونی بلغم کا اخراج کے ہمراہ

میدورنیم۔ سانس لینے میں دقت چھاتی میں دباؤ کی وجہ سے دل کا پھر پھر انا اور
تیکن دار درد درد۔ حادثہ تیز۔ مچی دل کی چوٹی پر تیز درد۔ حرکت پر زیادتی۔ دل میں جلن

جو بیٹھا اور بائیں بازو تک جائے۔

لائیکو لوٹو دیم۔ دل کی دھڑکن ٹھکے بستر میں بھی رات کے وقت بستر میں پریشان پہلو بدلتے پر۔ کھانا کھانے کے بعد زیادتی ہضم ہونے کے اور دوران زیادتی۔ دل کا عمل دبا ہوا اور غیر واضح۔ پیشاب میں البیومن کا اخراج۔ چھاتی میں اینٹھن اور گھٹن۔ مانس نہ لے سکے۔ چھوٹی پسلیوں کو مانس کی وجہ سے سوئی لگے جیسی تکلیف ہو۔

لیٹیم مگر نیم۔ احساس جیسے کہ دل مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو یا بانگ (لوہاروں کا ایک اور جس میں چیزوں کو مضبوطی سے کسایا پکڑا جاتا ہے)۔ میں جھینچا جا رہا ہو۔ جیسے کہ تمام خول دل کی طرف چلا گیا ہے۔ دہرا ہونیکا احساس پیدا ہو۔ سیدھا چلنے کے نااہل ہو، دل جیسے کہ زبردست پکڑ میں اور تب اچانک چھوڑ دیا جائے اول بدل کر گھٹن میں دل میں تکلیف تقریباً متواتر کھانا کھانے سے زیادتی خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ کھایا جائے۔ اکثر اوقات دل کی دھڑکن اور تشویش۔

آرنیکا۔ رات کے وقت ڈرے۔ اچانک موت کا ڈر۔ صدمہ۔ جسم کے اوپر دھکن دار گرہیں جسم پر۔ ناراضگی آرنیکا کی نمایاں علامت ہے جسم سرد اور سرگرم۔ آرنیکا دل کی ترانوں کی امراض کے لئے بہت مفید ہے۔ مریض علیحدہ چھوڑ دیا جانا پسند کرے۔ غلگن، جڑ پٹا۔ اداس۔ ڈرنے والا۔ آسانی سے ڈر جانے والا۔ ہضم کی چیزوں کا تصور کرے۔ رات کے وقت دہشت زدہ۔ اچانک موت کا ڈر اکثر آئے بے چین۔ سخت گھٹن زیادہ کام کرنے یا تھک جانے پر۔ آرنیکا متاثرہ حصول کو آرام دے دیگا اور علاج کر دے گا۔ سیکل کار۔ سیکل میں بازوؤں اور ٹانگوں کا سُن ہونا اور ٹھنڈے ہونا پایا جاتا ہے۔ دل میں درد اور چھاتی میں سوراخ کرنے والا درد۔ سینے میں دھکن۔

دل کی جھلی کی سوزش

اکونائٹ این۔ چھاتی میں سوئی گزرنے جیسی تکلیف۔ پریشانی۔ بے چینی اور بخار۔

پایچیلیا۔ دل کے حصّے سے تیز باہر کی طرف جانے والی تکلیف دل کی دھڑکن اور بے چینی کے ہمراہ۔
 لیکس۔ دل کے حصّے میں پھوڑے کی طرح کی دریں۔
 کالمیا لیٹی فولیا۔ جب جوڑوں کی دردوں کے ہمراہ جگہ بدلنے والی تکلیف۔
 گن پوڈر۔ خون گندہ ہونے کی صورت میں یا خون زیرِ پلا ہونے کی صورت میں ۳۔ ایکسٹ میں دیکھئے۔
 ناجا۔ والور کے متاثر ہونے کی صورت میں حاد حالت کے بعد

دل کی عام بیماریاں۔

ڈیجیٹالس۔ نبض بھر پور۔ بے قاعدہ۔ آغاز میں بہت سُست اور کمزور۔ ہر قریب پانچویں یا ساتویں سڑوک وقفہ وار یہ احساس کہ دل حرکت کرنا بند کر دے گا، اگر وہ چلی۔ استقسا یا جلودھر دل کی بیماریوں کی وجہ سے۔ بھاری سانس جو بیٹھے پر زیادہ ہوں۔ دل خون کی کمی کے ہمراہ ڈھیلہ ڈھالا۔ سُست تھکا ماندہ۔ بے ہوش۔ سخت تھکاوٹ اور شدید کمزوری۔ دہشت ناک خواب اور معرہ بیچنا۔ سونے سے ڈرنے کہ اس سے دم گھٹ جائے گا۔

سٹرونیٹس۔ کھلے دل کے لئے دل کی دھڑکن اور کمی خون کے لئے شراب۔ نمبا کو اور چائے نوشی کی وجہ سے دل کا اپنے افعال میں ناکام ہونا۔ تنگی تنفس پھیپھڑوں کی سوزش کے ہمراہ۔ یہ قے، کھانسی، پھیپھڑوں سے خون آنا اور استقسا یا جلودھر اگر دل کی تکلیف کی وجہ سے یا دل کی تکلیف ہمراہ ہو۔ دل کی اپنے افعال سرانجام دینے کی نااہلیت بغیر گھٹن کے۔

لاروسیر وکس۔ ڈیجیٹالس کے غلط استعمال کی وجہ سے دل کا فیل ہو جانا۔
 کالسنوسیا۔ دل کی بیماریاں۔ بیہوشی کے حملے۔ دباؤ۔ مشکل سے سانس لے، خونی بواہیر کے ہمراہ۔ جب خون بہنا رک جائے تو دل کی تکلیف ظاہر ہوں۔

ایپوسائٹیم۔ دل کی بیماریوں کی وجہ سے استقسا یا جلودھر۔
 لائیکولس درج۔ دل کی دھڑکن نبض سُست، اونچائی پر چڑھنا مشکل جسے کہیں دیکھیں
 پر چڑھنا وغیرہ۔

کیکس گرنیڈی۔ درد دل گھٹن اور دل کی عالمگیزی اور لاغری کے ساتھ، احساں جیسے کہ دل لوبہ کے کرے یا پھٹے میں تنگ سے تنگ ترکس جارہا ہے۔ دل کا سکڑاؤ اور گھٹن سر میں خون کا شدید دورہ۔ بازو، ٹانگوں میں ٹھنڈا کاشدہ احساس۔ بھاتی دل اور جسم میں خون کی غیر متوازن حرکت۔ دل کے کام کرنے کی نااہلیت گھٹن کے ہمراہ۔

لووسٹا۔ دل بہت بڑا عسوس ہو۔ بھاتی میں دباؤ کے ہمراہ کھانا کھانے کے بعد دل کی دھڑکن یا حیض کے دوران میں دل کی دھڑکن۔ ان تکالیف کے ہمراہ دماغ میں گہرا درد سر کے بڑا ہونے اور سوجھ ہوئے ہونے کا احساس۔

جیلیمیم۔ دل کے ٹپھوں کی کمزوری اس احساس کے ہمراہ کہ دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ نیند سے مزین ایسا کٹھن میٹھا ہے اس احساس کے ساتھ کہ دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ حرکت میں رہے درندہ دل رک جائے گا۔ بغض شاذ و نادر ازم، کمزور اور تقریباً نامعلوم۔ گرانڈولیا۔ دل اور پھیپھڑوں کی کمزوری۔ جب مرض سوجائے تو اس احساس کے ساتھ اٹھ کر سانس رک چکا ہے۔

میگنولیا۔ بھاتی کا دباؤ پھیپھڑوں کا پھیل نہ سکا۔ کھانا کھانے کے بعد بے چینی کا احساس۔ گھٹن کا احساس جب تیز چلے یا بائیں کوٹ لیٹے، تنگی تنفس۔ دل میں اینٹھن دار درد۔ درڈل۔ دل کے خلاف کی سوزش۔ بیہوشی کی رغبت۔ احساس جیسے کہ دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ دل میں درد خارش کے ہمراہ۔ گٹھیاوی درد دل۔

سکونا وائروسا۔ کانپنا۔ دل کی دھڑکن۔ احساس جیسے کہ دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ بعض اوقات بیہوشی کے احساس کے ساتھ۔

لیکسس۔ چلنے پر دل کی گھٹن۔ بینگنی رنگ کا چہرہ استقاء اور بڑھے ہوئے جگر کے ہمراہ۔ نیند اور نیند کے بعد زیادتی۔ سونے سے زیادتی مرض کی وجہ سے ڈرے۔ فاسفورس۔ دل کی چربی تنزی۔ دل پھیلا ہوا۔ بائیں جانب لیٹنے سے دل کے دھڑکن میں زیادتی۔

گر پٹیکس۔ دل کے فیل ہونے ہی والے عمل کے لئے بہترین دوائی ہے۔ بیہوشی اور حلتِ نزع یا قریب المرگ۔ دل کا غیر قدرتی طور پر بڑھ جانا۔ اور دل کی غون کی روکنے والی جھلیوں کی بیماریاں۔ دل کی دھڑکن اور دل کا جلدی جلدی عمل کرنا۔ دردِ دل۔

آرم میٹ۔ گنٹھیاوی دل کے لئے بہترین دوائی ہے۔ جب درد ایک عضو سے دوسرے عضو تک منتقل ہوا اور آخر کار دل میں ٹھہراؤ ہو جائے۔ یہ دل کی اندرونی جھلیوں پر اثر کرتی ہے، سن ہونے کے ہمراہ اور بائیں بازو میں جھنجھناہٹ والی درد۔ مزمن درم شاہرگ۔

آرسنک آئیوڈ۔ زہر کی وجہ سے دل کے غلاف کی سوزش اور دل کی استقسانی حالت عام سوزش اور آنکھوں اور پاؤں کی سوزش۔ دل بے قاعدہ دھڑکے اور نبض وقفے دار۔ سکولیریا۔ تباہ کنوشی سے دل کمزور۔

فیروزلس نانا۔ کمزور اور بغیر آواز کے دل۔ نبض کمزور اور وقفہ دار اور کمزور۔ جب اور کوئی تحریک پیدا کرنے والی دوائی کام نہ کرے تو دل کو فیل ہونے سے بچاتی ہے۔

سیرس لون۔ ذہنی کوفت والی اور اینٹھن دار، دل کی در دیں۔

لایکوپوڈیم۔ کم بلڈ پریشر اور کمزوری کے لئے کھانا کھانے لار یا منہ سے پانی بہے۔ گیس اور پیٹ بھول جائے یا تن جائے۔ کمزور دل، کمزور دورانِ خون۔ بستر میں بھی دل کی دھڑکن۔ کھانا کھانے کے بعد زیادتی۔

ناجا۔ منزل والو کی تنگی دل کی دھڑکن۔ دل کے درد کے ہمراہ۔ دل پر درد محسوس ہو۔ دل کی درد گدھی تک۔ بائیں کندھے بازو تک جائے اور موت کا ڈر۔ کم دباؤ۔

کرکس۔ قابو نہ پائی جانے والی ہنسی اس احساس کے ساتھ کہ کوئی چیز اچھل رہی یا اچھلتی ہوئی تکلیف، سوئی لگنے جیسی تکلیف اور صدمہ جیسے کچھاتی میں کچھ اچھل کود ہو۔ مرک وائیو۔ دل کی جھلیوں کی سوزش جو جوڑوں اور دل کے غلاف۔ سفید زبان۔

شدید پسینے کے ہمراہ جس میں رات کے وقت علامات کی زیادتی ہو۔

اگنیشیا۔ پریشانی کی وجہ سے دل کی شدید دھڑکن۔ ایک ایم طاقت میں دیجئے۔

تھائیرائیڈسٹیم - تھائیرائیڈ غدد کے بڑھنے کے ساتھ دل کی تکلیف اور دھڑکن جیت
 زلیٹ کے - اعصابی ہسٹریا اور مرگی کے دوروں کے ساتھ - گنٹھیاوی دل بھینچنے والی درد
 کے ساتھ نیچے زلیٹ کے - شدید قسم کا درد دل -

کاربوونک - بد بھمی کی وجہ سے دل کی تکلیف یا پیٹ کے اوپر والے حصہ میں ہوا کی
 وجہ سے دل کی تکلیف -

تھو جہا - ٹیکوں کی وجہ سے یا زیادہ ٹیکوں کی وجہ سے دل کی بیماریاں -

ایکس - تھوڑی سی حرکت پر دل کی دھڑکن یا کوتاہ دمی یا سانس کا نہ آنا - نرم اور دھڑکن
 نبض - بائیں بازو میں تکلیف اور بے حتی - چکر - ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے - گلے میں گھٹن کا
 احساس - اعصابی ، رات کے وقت یا صبح کے وقت یا صبح کے قریب ، علامات کی زیادتی -

اگر الکالائیڈ - دل کی دھڑکن - آواز کے نہ ہونے سے اول بدل کر آئے - کا پینے - انیمشن
 احساس نہ رہے - جسم اور بازوؤں ، انگلیوں اور ہونٹوں کا سن ہو جانا ، دل ، حرام مغز اور
 دماغ کی بیماری کی وجہ بازوؤں کا فالج - تمام جسم میں دھکن - تھکاوٹ - پھارنے والی - تیرکی
 طرح نکلنے والی - کاٹنے والی شدید در دیں - سانس مشکل سے لے -

ایڈونس ورنیلس - منزل اور اوٹلی میں خون کی واپسی - شاہرگ کی مزمن سوزش - دل
 کی دھڑکن - تنگی تنفس - چربی کی وجہ سے دل کی جھلیوں کی سوزش -
 ایڈرنیالین x ۲۰۰ - دل فیل ہونے کی صورت میں -

کالمیا - ایل با - جب گنٹھیا دل کی طرف جلتے تو یہ مفید ہوتی ہے - یا جب دل کی تکلیف
 گنٹھیا کے ہمراہ ہوں -

کالچیم - جب کالمیا ایل ناکام ہو جائے تو یہ آزمائی جانے -

کنوٹیریا - دل کی دھڑکن ، رحم کے حصہ میں دھکن کے ہمراہ - آخری علامت کے ہمراہ ڈاکٹر فرش
 نے دل کے استسقاء کا کامیاب علاج کیا - اس دوائی کی x ۲۰ طاقت کے ساتھ -

ریگٹس { دل کے والوز کی بیماریوں میں سُن ہونیکے ہمراہ اور بائیں بازو میں بھینچنا ہٹ کے ساتھ -
 ارم

مرکب ورس سائینٹس - دل کی پھٹی کے السر۔ دل کی خطرناک بیماریوں میں دل کے جلدی
فیل ہونے کی مفید دوائی ہے۔

لیٹم مگرینم - احساس جیسے کہ دل بڑا گیا ہو۔ بانک میں کس کر کھلا جا رہا ہو خون دل کی
طرف جائے دہرا ہونے کے ساتھ۔ دل میں تکلیف۔

آرنیکا مانٹ - دل کی شریانوں کی بیماریاں جسم ٹھنڈا اور سرگرم علیحدہ رہنا پسند کرے گا۔
بد مزاج۔ چڑچڑاہٹ۔ غلین۔ ڈپرکس۔ آسانی سے ڈر جائے۔ اچانک رات کے وقت موت کا ڈر۔
سیکل کار۔ دل کا درد۔ خون کا بہت زیادہ دباؤ سن ہونے کے ہمراہ۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے
مید ورنم۔ پھاتی پر دباؤ کی وجہ سے مشکل سے سانس ہونے کے ہمراہ۔ دل ادھر ادھر
پھرتا پھرتا تھوڑی سے ورزش سے بھی دل کی دھڑکن۔ دل میں تیز۔ جلد جلد اور تھیں
دریں۔ دل میں جلن۔

دل کا بڑھ جانا

کریڈیٹس۔ دل کے والوز کی نااہلیت کی وجہ سے دل کا بہت بڑھ جانا۔ تنگی تنفس اور
استعداد کے ہمراہ۔

کالیالیٹی فوئس۔ دل کے والوز کی بیماریاں دل کے بڑھنے کے ہمراہ جس کے بعد گھٹیا
کے حملہ کا ڈر ہو یا اس کے ساتھ گھٹیا ہو۔ دل کی دھڑکن اور دل میں تکلیف جو نیچے بیٹ
کے جائے۔

آرنیکا ایم - جب دل کا بڑھنا والوز کے صدمہ یا چوٹ کے ہمراہ ہو اور یہ زیادہ دیر تک
رستاکس { طاقت سے زیادہ کام کرنا جیسے کہ دوڑ لگانا یا کاروباری طور پر تھکے ہوئے
لوگوں میں شدید دباؤ کی وجہ سے بڑھ گیا ہو۔ تنگی تنفس۔ بیڑھیاں نہ چڑھ سکے۔ دھواں
برداشت نہ کر سکے۔ کم خون۔

لارڈوسیسس۔ منزل والوز کی نااہلیت کی وجہ سے دل کا بڑھ جانا۔ سانس لینے
کے لئے ہانپنے۔ ناہاتھی۔ چلنے پر یا چڑھنے پر بے دم ہو جائے۔

ابرس - دل کا بڑھ جانا اور کھلا ہو جانا۔ دل کا شدید اور تیز عمل، نرم نبض کے ہمراہ
 تھوڑی سی بھی حرکت یا کام کی زیادتی پر دل کی دھڑکن، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے، گلے کے
 بند ہونے کا احساس۔ دل کے عمل کے لئے محاسن۔ مڈر ٹیکہ کا ایک قطرہ فی خوراک دیجئے!
 کیکیٹس - شدید دل کی دھڑکن۔ کمر کے بل لیٹنے پر زیادتی۔ جوش دلانے پر، حرکت کرنے پر
 اچانک اٹھنے پر یا چلنے پر زیادہ۔ چہرہ سرخ چڑیا پر سر درد۔ شریانوں کی ٹپکن۔ نوجوانوں۔
 میں دل کا بڑھ جانا اس کی خاص نشانی ہے۔

اکونائٹ این - دل کا سادہ بڑھ جانا بغیر والوز کی بیماری کے۔ انگلیوں کا سُن ہو جانا اور
 جھنجھناہٹ (والوز کی تکلیف میں یہ بہت نقصان کر سکتی ہے)۔

آرم میٹ - والوز کی تکلیف میں سُن ہونے اور بائیں بازو میں جھنجھناہٹ کے ہمراہ۔ آرم
 میٹ چربی والا دل بغیر پھیلاؤٹ کے ہوتا ہے۔

نیرٹرم میور - بائی بلڈریشیر دل کے پھیل جانے کے ہمراہ چڑچڑے اور ہمدردی سے نفرت
 کرنے والے لوگوں میں جو شدید ضبط کرنے والے۔ اپنی پریشانیوں اور غموں کے متعلق کبھی
 بات نہ کریں۔ اس سلسلہ میں معمولی گہمزدی، انہیں ناراض کر دگی۔ خاموش غم۔ جلد زرد پائی پگھلی۔

درم شریان - شریانوں کی سوزش

کلکیر یا کارب - شریانوں کی سوزش

درم ورید

ہیما میلس - سادہ اور حاد درم وید حساسیت۔ وریدیں سخت گروہ دار اور تکلیف دہ
 پلسٹیل - جب بچہ کی پیدائش کے بعد۔ نیلے حصے۔ دکھن اور رنگ لگنے جیسی تکلیف
 ہپوزنیم - جب پیپ بن چکی ہو۔

دھڑکن

اکونائٹ نیپ۔ دل کی دھڑکن جو طاق ت در ہو۔ بائیں کندھے اور چھاتی میں درد۔ پریشانی
درد اور انگلیوں میں جھنجھناہٹ۔

نکس و امیکا۔ جب بڑھتی کی وجہ سے۔ کھانا کھانے کے بعد گیس۔

واپرا۔ دریدوں کا ورم۔ متاثرہ بازو کو نیچے لٹکانے سے زیادتی۔ بھڑاؤ۔ درد اور
دریدوں میں پھٹنے کا احساس۔ قبض۔ کھانا کھانے کے بعد زیادتی۔

الیومن۔ دائیں طرف لیٹنے سے دھڑکن جو اس دوائی کے لئے خاص اور نمایاں ہے۔

پلسٹیل۔ عورتوں میں بڑھتی سے یا سنہرے بالوں والے لوگوں میں۔ تیزابیت۔ پاخانہ
ڈھیلا۔ ڈھالا۔

کاربووٹیج۔ کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں بہت زیادہ گیس۔ ڈکاروں سے افاقہ۔

ماسکس۔ اعصابی دھڑکن۔ بیہوشی کے ہمراہ۔

مختائیرائیڈینم۔ دل کی دھڑکن اور بیہوشی دل کے نہایت تیز عمل کی وجہ سے۔

کریٹیکس۔ دل کی دھڑکن، دل فیل ہونے کے خطرہ کے ساتھ۔ دل کے حصہ میں درد

اور بائیں کندھے کے سحر میں درد۔ سانس بہت بھڑکا۔ تیزی کے ساتھ۔ نرم اور بے قاعدہ

نبض۔ انگلیوں اور پنجوں کا نیلا پن۔

ڈیجیٹلس۔ دل کی دھڑکن بے قاعدہ اور وقفہ دار نبض کے ہمراہ۔

آریٹمک ایلیئم۔ دل کی دھڑکن یا دل جب تمام جسم مل رہا ہو اور چھاتی جگہ سے اپنی دیواروں

کو بھڑکائیں۔ بیٹھے براگے جھکے یا پیچھے جھکے پر افاقہ۔

کوکا۔ سانس بھڑکا۔ دباؤ۔ تنگی نفس۔ شدید سنی جانے والی دھڑکن جو پہاڑی پر چڑھنے کی

وجہ سے ہو۔

کالمیلیٹ۔ دھڑکن یا دل میں درد نیچے کی طرف پیٹ میں آتی ہوئی۔ دل کا بڑھ جانا یا دالوز

کی تکالیف جس کے بعد گھٹھے کا دورہ یا اول بدل کر گھٹھے کا دورہ یا حملہ۔
 لاروسیر وکیس۔ دل کا بڑھ جانا، منزل والوز کی نااہلیت کی وجہ سے۔ سانس کے لئے ہانپنا۔
 ناطاتی چڑھنے پر یا چلنے پر۔ سانس نہ آئے۔
 لائیکولپس درج۔ دھڑکن سست نبض۔ اونچائی پر چڑھنا جاسکے، جیسے کہ میزبیلوں پر۔
 کینا بس انڈیکا۔ دل کی دھڑکن۔ نیند سے بیدار کر دے۔
 ابرس۔ دل کا بڑھ جانا اور پھیل جانا۔ دل کا شدید اور تیز عمل نرم نبض کے ہمراہ۔ تھوڑی
 سے حرکت یا کام سے دھڑکن۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے۔ گلے میں رکاوٹ کا احساس۔ دل کے
 عمل کیلئے محاسن۔ مدر کچر کا ایک قطرہ فی خوراک دیجئے۔
 اولینڈر۔ تیز نبض کے ساتھ دل کی دھڑکن۔ جی تھلائے ادرتے۔ تمام جسم میں درد۔
 لیکٹس۔ دل کی شدید دھڑکن جو بائیں جانب لیٹنے پر یا حیض کے شروع پر زیادہ ہو۔ دل
 کے گرد لوہے کے کڑے کا احساس۔ دم گھٹنے کے ساتھ اور ٹھنڈے سینے۔ دل کی جوتی پر درد
 جو بائیں بازو تک جائے۔ سرگرائی۔ سانس جھوٹا اور گیس کے ہمراہ۔ دھڑکن نبض کمزور تیز اور
 بے قاعدہ۔

ناجا۔ دل کے گرد وزن کا احساس، سوئی لگنے جیسی درد کے ساتھ جو گردن کی گتدی، بائیں
 کندھے اور بازو تک پریشان اور موت کے ڈر کے ساتھ۔ متعدی امراض کے بعد دل کی خرابی
 برومیم۔ دل کی دھڑکن جی تھلانے کے ہمراہ اور سر درد اور اعصابی براہینگی کے ساتھ۔
 کام سے، پڑھنے سے نفرت۔ گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لے۔ لاپرواہ۔ تھکا مانہ۔
 غمگین اور بے حوصلہ۔

آزیکا مانٹ۔ دوڑگانے والوں میں زیادہ طاقت کے استعمال کیوجہ دھڑکن۔ زیادہ
 رستاکس۔ وزن اٹھانے والوں میں۔ بائیں بازو اور کندھے کا ٹھن ہو جانا۔ دی گئی
 ترتیب سے ان ادویات کو آزمائیے۔

سٹانم۔ تھوڑی سی مشقت سے بھی دھڑکن اور پریشانی جیسے کہ گھریلو ایات دینے پر ہی۔

کلکیر یا آرسینکم - تھوڑے سے جذبات دل کی دھڑکن کا باعث نہیں۔

سٹرونیٹھنس - دل کے پھیل جانے اور خون کی کمی کی وجہ سے دھڑکن۔

آرچنٹم نائیریکم - دائیں جانب لیٹنے سے دھڑکن۔

آرچنٹم میٹ - پچھلی میں یا سارے جسم میں پیٹھ کے بل لیٹنے پر، ہلنے پر، پھر پھٹانے اور کاپنے کے احساس کے ساتھ۔ دھڑکن۔

اگنیشیا - بہت زیادہ متاثر ہونے والے آدمیوں اعصابی دھڑکن۔ رات کے وقت بستر میں زیادتی دھڑکن مریض کو جاگتا رکھتے۔

لیکسس - تھوڑی سی پھیل پر دھڑکن خاص طور پر زندگی کی تبدیلی پر۔

امبرگریا -
سٹیفگیٹریا - { گھانا سننے پر دل کی دھڑکن

انٹم مارٹ - پاخانہ کے دوران دل کی دھڑکن۔

سلفر
کونیم { پاخانہ کے بعد دل کی دھڑکن

ڈیجیٹلس
اوپیم { غم اور ڈر کے بعد دل کی دھڑکن۔

ڈیجیٹلس
سیدیا { جماعت کے بعد دل کی دھڑکن۔

امونیم کارب - تنگی تنفس کے ساتھ دھڑکن۔ لیکن بغیر کسی دل کی بیماری کے نہانے پر زیادتی۔

نیٹرم میور - جب بستر میں لیٹے یا کھانا کھانے کے بعد۔ کونین کے غلط استعمال کے بعد اور جب

دھڑکن سارے جسم کو ہلا کر رکھ دے۔ بائیں جانب لیٹنے پر زیادتی

اکٹیا ریس - پیٹ کے گڑھے میں ڈوبنے کا احساس کے ساتھ دھڑکن شدید بے چینی اور نیند۔

سپائنجیلیا - دل کے حصے میں شدید تیر لگنے جیسا کاٹنے والا درد منہ سے گدی بوکے ہمارے،

نبض کمزور اور بے قاعدہ - اعصابی درد جو بازوؤں تک جائے - گرم پانی کی زبردست خواہش - جو کہ آفاقہ دے -

بیلادوونا - تھوڑی سی مشقت سے دھڑکن پورے ٹپکن دار سر درز کے ہمراہ اسرخی چہرہ ، روشنی اور شور سے بہت حساس -

تھیا - دل کے پھر پھر اٹنے اور وقتی طور پر رک جانے کے ساتھ دھڑکن - میگنیشیا میور - ہڈیاں دالی عورتوں میں دل کی دھڑکن جس کو چلنے پھرنے سے آفاقہ ہو - فاسفورس - تباہ کنوشی کی وجہ سے دل کی دھڑکن جنسی کمزوری -

دریٹرم ورائیڈ - جب نبض ۴۰ یا اس سے نیچے گر جائے - بعض اوقات کلائی میں محسوس ہی نہ دے - مریض سرخ دھاری رکھتا ہو زبان کے درمیان میں - کمزور دل لوگوں کے لئے یہ استعمال نہیں کرنا چاہئے -

نبض

اولینڈر - نبض تیز تہ اور مچا ملانے کے ساتھ یہ نبض کی رفتار کو نیچے لے آتی ہے -

اکونائٹ این - نبض تیز - جلد اور اچھلتی ہوئی یا پھلانگتی ہوئی -

بیلادوونا - نبض اچھلتی ہوئی - چہرہ سرخ - پرخون مریض - ٹپکن دار نبض -

کارلو ورج - بے قاعدہ نبض ، ناک سے خون بہنے کے ساتھ -

میورٹیک ایسڈ - جب نبض ہر تیسرے شروک پر وقفہ دے -

دریٹرم ایلیم - نبض ۳۰ - ۴۰ پر آجائے ، لیکن دوبارہ فوراً اوپر آجائے اور پھر گر جائے -

نبض ٹھنڈے پینے کے ہمراہ غائب -

ڈیجیٹالیس - نبض بے قاعدہ اور بہت سست اور کمزور ہر تیری یا پانچویں اور ساتویں ضرب پر وقفہ ہو -

کیکس - نبض گھٹن کے ہمراہ غائب ہو - گھٹیا دی دل میں وقفے دار نبض -

ایموس - جھکے دار نبض - تھاپ ایک دوسرے میں ملتی ہوئی معلوم دے ، دہری نبض -

آرٹھنک سلف فلیوم - نبض تیز - بے قاعدہ - وقفہ دار - پھوٹی اور کمزور -
پھوٹی ہوئی رگ - فوطوں کی پھوٹی ہوئی رگیں -

پلسٹیللا - بطور حفظ ماقدم یا جب متاثرہ حصے نیلے ہوں - دکھن کے ساتھ اور ڈنگ لگے
 جیسی درد ہو - پھوٹی ہوئی رگوں کے لئے چوٹی کی دوائی ہے -

فارمیکا - جب کمزوری ساتھ ہو -

فلورک الیڈ - بہت ہی پرانے کیس - ضدی - خاص طور پر عورتوں میں جنھوں نے بہت بچے پیدا کئے
 ہوں - رگوں میں کانٹھیں اور پھوٹی ہوئی رگوں کے لئے پھوٹی رگوں میں پھوڑے خاص طور پر ٹانگوں پر -
 پائرو جینیم - پھوٹی رگوں کے پھوڑے - پھوڑوں والی ٹانگوں جن میں مواد بہت زیادہ رہے
 اور انتہائی شدید درد -

آرٹھنک ایلیم - آگ کی طرح جلیں، خاص طور پر رات کے وقت -

نکسوامیکا - حمل کے دوران امیرانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے -

ہیما میلس - ڈنگ لگے جیسے اور سوراخ کرنے والی درد (پھوٹی ہوئی رگوں پر ہیما میلس
 کا سلیوشن ہر حالت میں لگایا جانا چاہیے)

وائیپرا - متاثرہ حصہ کو ٹپکنے دینا جیسے کہ یہ بھراؤ کی وجہ سے پھٹ جائے گا - اس دوائی کی
 نمایاں علامت پھٹ جانے کا احساس -

بسیلا ڈونا { پُر خون لوگوں میں پھوٹی ہوئی رگیں جہاں خون سر کی طرف اُٹے -

گلوناٹن { دریدوں میں ٹپکن دار درد -

میگنٹک پولس آسٹ - ٹانگوں میں ٹپکن دار درد جب بچے لٹک رہی ہوں تو گرم پانی
 کے گرنے کا احساس - متاثرہ حصوں پر چلنے پر بیہوشی -

لیکسس - حمل کے دوران دریدوں کا درد -

مٹی فو لیم - پھوٹی ہوئی دریدوں میں بہت ہی مفید دوائی ہے خاص طور پر جب شعری مالیاں

اسفنج کی طرح اور برسی ہوئی ہوں۔ دریدیں آسانی سے ٹوٹ جائیں جب ان میں اجتماع خون ہو۔ زخموں سے آسانی سے اور زیادہ خون بہے۔ دریدوں کی سوزش پُر درد عمل کے دوران۔ بھول ہوئی ٹانگوں کی دریدیں بھوڑے ٹھنسی والیاں اور حاملہ عورتوں میں ان سے خون بہے۔ **سلفر**۔ دریدیں بھوڑوں والی۔ پٹ جائیں اور خون بہے۔ ٹانگوں اور ماتحتوں کی دریدوں کی سوزش۔ یہ دوائی بطور عمل انگریز کے استعمال کرنی چاہیے جب دوسری ادویات ناکام ہو جائیں یا نامکمل آرام دیں۔

خوراک

دل کی تمام بیماریوں میں گوشت، پختلی، پرندے اور ان سے بنی ہوئی چیزیں کھانڈ لیک، پیٹری، جام، مارلیڈ اور مٹھائیوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ نمک کی بھی کم سے کم مقدار استعمال کرنا چاہیے۔



نواں
باب ۹

نظامِ انتظام
کی بیماریاں !
پیٹ

پیٹ - زندہ

کر دیکھو۔ جیسے کہ کوئی زندہ چیز پیٹ میں یا بھاتی میں حرکت کر رہی ہے۔
اینا کارڈیم۔ یقین کرے کہ جب کوئی چیز پیٹ میں نہ جائے، جیسے کہ اس کے اندر
کوئی ہے، جو چیز وہ کھاتا یا پیتا ہے وہ بگل لیتا ہے۔ یہ تمام علامات بعض اوقات پارے کی ہریم
سے اگزیما کے اندر دب جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔
تھو جا۔ کوئی زندہ چیز کے پیٹ میں ہونے کا احساس۔ بچے کے ہاتھ کی حرکت کو محسوس کرے
یا اس کی انگلیوں میں کوئی جانور ہے۔

درم زائدہ

برائی ادینا۔ سوئی لگنے جیسی اور جلن دار درد جو تھوڑی سی حرکت سے زیادہ ہوں۔ دباؤ
اور درد والی طرف پیٹ سے افاقہ۔ پیٹ کے نچلے دائیں طرف دھکن، امراض خاموشی کے ساتھ
لیٹے ٹانگیں اوپر کھینچی ہوئی ہوں۔ پیٹ کے بچوں کو آرام دینے کے لئے بچھو یا پسند نہ کرے
اور ہر سانس سے درد میں زیادتی ہو۔ ٹھنڈے پانی کی زیادہ مقدار میں شدید پیاس۔ ۹ طاقت
میں ہر چار گھنٹے کے بعد دیکھو مچھی کہ درد ترک جائے۔

سلفر۔ بطور عمل انجین استعمال کی جانی چاہیے تاکہ مکمل شفاء ہو جائے
آئرس مینکس۔ درم زائدہ کا علاج شروع کرنے کے لئے پہلی دوائی ہے۔ وہ جہاں
کہ اندھی آنت اور چھوٹی آنت آگرتی ہیں شدید درد۔ دباؤ سے بہت زیادہ درد۔ موت جیسا
احساس معدہ کے گڑھے پر۔

بیلادونا۔ یہ آئرس مینکس جیسی علامات رکھتی ہے لیکن یہ اس وقت دی جائے جب پہلی دوا
ناکام ہو جائے۔ یہ اندھی آنت اور چھوٹی آنت کے ملنے والی جگہ پر شدید درد ہوا، ہلنے یا بچکا

سے زیادتی۔ معمولی سا چھوٹا جانا بھی بڑھت نہ ہو سکے۔ بستر کی چادر کا چھوڑا بھی تکلیف دہ ہو۔
تے بھی ہو۔ پُر نیند لیکن سونہ سکے۔ روشنی کے لئے بہت زیادہ حساس اور دوسری بیرونی احساسات
کے لئے۔ پیٹھ کے بل لیٹنے پر گھٹنوں کو کھینچ کر لیٹنے پر افاقہ۔ اعصابیت۔ ٹیکن دار سرد درد۔
ٹیک لگانے پر زیادتی۔ ڈھیلے کپڑے پہننے چاہیے۔

ڈائسکوریہ۔ جب تکلیف درد متواتر ہو اور مریض درد سے نجات نہ پا رہا ہو تو یہ دوائی
بہترین دوائی ہے۔ انٹرایاں گیس سے بھری ہوئی پیٹ میں درد ہو۔ دہرا کرنے والا درد جس کو
تیچے کی طرف ہونے سے افاقہ ہو۔ یہ گرم پانی میں دی جانی چاہیے۔

مرکیورس۔ جہاں بیرونی علامات حاد ہوں۔ انٹرایاں کی یا پچیش کی حالت موجود ہو۔ سخت سرش
چھوٹی آنت اور اندھنی آنت کے ملنے کی جگہ پر درد۔ انٹرایاں میں دھکن۔ پسینہ سے کوئی افاقہ
نہ ہو۔ اپنڈکس کے حصہ میں نرم گولہ معلوم ہو۔

کالوسٹھ۔ خاص طور پر جب شدید درد ہو رہا ہو جو کاٹنے والا ہو۔ دہرا کرنے والا یا ایٹھن ہو
منہ کا ذائقہ کڑوا۔ جلی کی طرح کا پاخانہ یا لیسہ دار پاخانہ۔ برہم ہونے یا غصہ آنے پر زیادہ
دباؤ یا گرمی سے زیادہ۔

لیکسس۔ ایک قیمتی دوائی سارے پیٹ میں دھکن اور سوئی پھٹنے جیسی تکلیف۔ سوزش
دالی جگہ پر۔ کولہوں نے پھلی طرف اور پھی طرف۔ مریض پیٹھ کے بل لیٹا ہے۔ گھٹنے کھینچنے
ہوؤں کے ساتھ گرمی محسوس کرتا ہے۔ سرد موسم میں بھی کپڑے بڑھت نہیں کر سکتا۔
لائیکو لوڈیم۔ جب حاد حملہ ختم ہو چکا ہو تو اونچی طاقت مثلاً... طاقت میں اچھی دوائی ہے۔
ہر پندرہ روز بعد یا ایک ماہ بعد دہرائی جائے تاکہ دوبارہ حملہ نہ ہو۔

آر سینک البم۔ جب عفونی حالت ہو یا جراثیمی حالت ہو تو یہ دوائی دیتے۔ سردی کی بہری۔
دق کی علامت۔ پچیش۔ بے چینی اور طاقت کا اچانک جواب دینا کی علامات ہوں۔

رسٹاکس۔ چھوٹی آنت اور اندھنی آنت کے ملنے والی جگہ پر شدید سوزش اور شدید درد جس
کی وجہ سے نہ رکنے والی دے چینی ہو۔ یہ جراثیمی یا زہریلی حالتوں کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔

انگلیشیا۔ اینڈکس میں شدید درد اور پریشانی کا ذکر خاص طور پر ذہنی علامت ہے گھٹنے
 ٹھوڑی گھٹنوں سے لگی ہوئی جسم گرم اور سخت۔ مریض حساس۔ چست اور اعصابی ہوتا
 ہے۔ وہ بیک وقت ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ انٹریوں میں درد اور
 سوزی بچنے جیسی تکلیف۔ اعصابی مریضوں میں اس دوائی سے علاج شروع کرنا چاہیے۔

فیرم فاس
 کالی میور
 میگنیشیا فاس } چھوٹی آنت اور اندھی آنت کے علاقہ کی سوزش
 کے لئے کارآمد ادویات ہیں۔

پیٹ کا استسقاء۔ جلودر

ایپس میل۔ جلودر پیاس کے بغیر۔ یہ بخاروں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، خاص طور
 پر دانے دار بخار۔ جلد زرد۔ موم جیسی اور شفاف پیشاب بہت کم۔ جلد خشک گری سے
 زیادتی اور ٹھنڈک سے انفا ۹ یا ۶ ملاقت میں دیکھئے!۔
 ایپوسائیم کین۔ ٹائیفائڈ کے بعد جلودر یا سرخ بخار یا جگر کی رکاوٹ کی وجہ سے۔
 جب عضوی مرض ہو تو یہ جلودر کے لئے مفید ہے۔ سردی سے زیادتی اور سرد مشروبات
 سے حساس۔ ٹھنڈے مشروبات سے پیٹ میں درد۔ ایپس کی طرح پیشاب کم اور جلد خشک
 شدید پیاس کے ساتھ لیکن پیشاب کم۔

آر سینکلم الیم۔ ہر قسم کے جلودر میں مفید خاص طور پر جب دل اور پھیپھڑوں میں خرابی ہو۔
 اور گردوں کے علاقہ کا جلودر ہو۔ چہرہ پر سوزش اور ٹپکوں کے گرد سوزش ہو موم جیسی
 شفاف جلد۔ پیاسا اور قے ہو وغیرہ جلودر میں خون آب کا باہر سنا بھی ایک علامت ہے۔
 لیکٹی فلو ریٹم۔ جلودر دل کی عضوی بیماری کی وجہ سے جگر کی مزمن تکالیف۔ پیشاب
 میں بہت زیادہ مقدار میں البیومن جس کے بعد دفعہ دار بخار ہو۔
 ڈیجیٹالس۔ دل کے جلودر میں مفید ہے۔ کمزور بے قاعدہ جیسے کہ خاموشی سے کھڑا ہو۔

گہرا سانس لینے کی خواہش کے ساتھ - پیشاب کم - گہرا اور البیومن والا - بعض سست خبیثوں کی تعمیل اور آکثر ناسل صوجا ہوا - ٹھنڈے پسینے -
میسورٹیک الیڈ - جگر کے کینسر کی وجہ سے جلور

ہیلی بورس - جلی کی طرح کے محیش کے ساتھ جلور - پیشاب گہرے رنگ کا اور مقدار کم
تھلا پی برسا - جلور میں مفید ہے - مدر نکچر کے - قطرے فی خوراک دیجئے -
یوریا - گردوں کے جلور میں مفید ہے - پیشاب میں البیومن - پیشاب میں کھارنے اور
شوگر - کم وزن مخصوص کا پیشاب -

یاسٹرس جھماکیڈا - جگر اور تلی کے بڑھنے کی جلور - اس کے متعلق کہا جاتا ہے -
کریر پراگین پیشاب ایک دن میں خارج کر دیتا ہے - آدھ اونس بڑے رگین جوشانہ
بنائے جو ایک دن میں استعمال کرائے یا مدر نکچر کے قطرے فی خوراک دیجئے -
ڈلکا مارا - پسینہ دب جانے کے بعد جلور یا پھنسیوں کے دب جانے سے یا ٹھنڈ لگنے
سے جلور -

ایسٹیک الیڈ - پیٹ کے جلور گیس کے ہمراہ - ڈکار کے ہمراہ یا منہ میں پانی آنا یا رلیس ہونا
اور محیش -

لیکسس - جلور - پیشاب گہرا اور البیومن ملا - جلد گہری یا نیلگوں سفید -
ٹیرینٹھنا - گردوں میں زیادہ خون کی وجہ سے جلور - گردوں کے علاقہ میں دھیمیا دھیمی درد
گہرا اور دھوئیں کے رنگ کا پیشاب -

کالچیکم - گہرے پیشاب کے ہمراہ جلور - خاص طور پر گنٹھیا دی پچیدگیاں اس دوا کی نظر
ہوتی ہیں - خوراک یا کھانے پکنے کی بو کو برداشت نہ کر سنا اس کی نمایاں علامات ہیں -
لائیکوٹوڈیم - جگر کی بیماریوں کی وجہ سے جلور، پخلا نصف پیٹ تنا ہوا - ٹانگوں پر چھوڑ
بڑھی ہوئی تلی کے ساتھ جلور - شام کے وقت بخار بغیر پائس کے بے پر سانس مشکل
سے آئے - پیشاب کم مقدار میں اور گہرے رنگ کا قبض دار پاخانہ دل کا فعل کمزور
لکھ: ۱۶۷ - عدہ -

پسٹیللا۔ بلوغت پر یاس پاس یا حیض کے ختم ہونے پر جلودر۔ خاص طور پر نرم طبیعت شریف اور آسانی سے مان جانے والی طبیعت والی عورتوں میں۔ کھلی ہوا پسند کریں خواہ بہت ٹھنڈی ہی کیوں نہ ہو۔

تیچے کی طرف کھینچاؤ

لیٹم میگنٹم۔ تمام اعضاء پیٹ کا تیچے کی طرف کھینچاؤ۔ معدہ سے تیچے کی طرف کھینچاؤ۔ مینگنم۔ انٹریوں کا تیچے کی طرف کھینچاؤ۔ ڈھیلا چھوڑنے پر تمام پیٹ ذری معلوم ہو تھکی ماندی۔ کمی خون والی عورتیں رحم اور امعاءے مستقیم کا خروص ہو۔

درد قولنج

نکسوامیکا۔ بد معی کی دہر سے درد قولنج کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ یہ ابتداء میں کم طاقت میں گرم پانی کے ہمراہ دی جانی چاہیے۔ درد پیٹ کے کسی بھی حصہ میں ہو۔ در دیں مسلسل یا اینٹھن دار اور کھانا کھانے پر زیادتی اور اس کے ہمراہ گیس ہو قبض ہو۔ اور جی تلاء، حمل کے دوران میں پیٹ میں اینٹھن۔ کالو شتھس۔ پیٹ درد شکم کی طرح پکڑا ہوا۔ اینٹھن دار۔ کھودنے والا خنجر لگنے والا۔ درد جیسے کہ انگلیوں سے پکڑا ہوا ہو۔ آگے کی طرف جھکا کر دہرا ہونے پر افاقہ یا پیٹ کی دیوار پر سخت دباؤ سے افاقہ۔ گرمیوں کی تکالیف اور بچپن بھی۔ درد قولنج گیس کی دہر سے غیر مضہم شدہ خوراک یا کچے پھلوں۔ ٹھنڈک سے یا شدید جذبات جیسے کہ غصہ کا دورہ یہ سوزش والے قولنج میں کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہوتا۔

وریرٹرم ایلیجم۔ پیٹ کی در دیں جن کو دہر ہونے سے افاقہ ہو۔ یا ٹھنڈے سے آرام لے درد قولنج جیسے کہ انٹریوں میں گانٹھ پڑ جائے۔ پیٹ میں اینٹھن۔ چہرے پر ٹھنڈے پسینے۔ یہ خاص طور پر مفید ہے جب انٹریاں ایک دوسرے سے گزرجائیں۔ پیٹ میں ٹھنڈک کا احساس۔

بودھ سٹا۔ دہرا ہونے اور کھانے کے بعد افاقہ محسوس کرے۔ پیشاب سرخ۔
 کروٹن ٹنگ۔ انترلوں میں درد پانی کی طرح کی پچپش جو پانی کے نل کی طرح خارج ہو۔
 تیمارداری اور کھانا کھانے سے زیادتی۔

ڈائسکوریا۔ ناف دے حصہ میں درد جو گتار اور مستقل ہو۔ پیچھے کی طرف بھٹکنے پر افاقہ
 اور جسم کو کھینچنے پر افاقہ۔ رطوبت کی وجہ سے گنٹھیا اور اعصابی درد قویج۔ خوراک منہ کو آئے
 کھٹے یا کڑے ڈکار۔

کیو پرم میٹ۔ سوزش والی درد قویج کے لئے مفید کے لئے دوائی ہے۔ پیٹ سخت
 درد قویج کے شدید دورے جیسے کہ پیٹ میں جاتو گھونپا جابا ہو۔ ٹھنڈے مشروبات
 سے زیادتی۔

کیو میلا۔ یہ ایسی درد قویج کے لئے مفید ہے جو اچانک آئے غائب ہو جائے غصہ
 کی وجہ سے درد قویج، گرمی سے زیادتی۔ سفیغیر یا ایک اور دوائی ہے جو غصہ کے بعد
 درد کے لئے موزوں ہوتی ہے یا پیٹ کے اپرین کے بعد گیس کو ڈکاروں سے فائدہ ہے۔
 اکونائٹ۔ جب پیٹ اور رحم میں اجتماع خون ہو۔ بھروپر اور تعداد میں زیادہ نفی ہو۔
 کوکولس انڈیکا۔ اعصابی درد قویج۔ رات کو زیادتی۔ گیسوں کے ہمراہ جس کے اخراج پر کوئی
 افاقہ نہ ہو۔ ٹھنڈے مشروبات کی زبردست خواہش خاص طور پر ٹھنڈی سیرکی۔ کڑوا یا دھاتی
 ذائقہ پیٹ میں ایٹھن۔

الیومن۔ سیسے میں کام کرنے والوں میں درد قویج کا رجحان جیسے کہ مینٹرز۔
 پلمسم۔ پیٹ میں درد میں جو ہر طرف کو نکلیں۔ پیٹ کی دیواریں کھینچی ہوئی۔ جیسے کہ پیٹ
 اور پیٹھ کے ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں۔ ٹانگوں میں ایٹھن۔ صدی قسم کی
 قبض لیکن گیس نہ ہو۔ پیٹ کی پتھر جیسی سختی۔ خصوصاً سیسے کے درد قویج کے لئے
 ناف کی درد کانٹے ٹنگ جائے۔ مریض پیچھے کی طرف بھٹکے۔

پلسٹیللا۔ ٹھنڈک سے درد قویج جو پیٹری اور مرغی خنداؤں کی وجہ سے ہو۔ پیٹ اوپن اپنی

گر گرڈا ہٹ اور آواز گیس والا درد قویخ ہسٹریا والی اور حاملہ عورتوں میں پیشاب کی کثرت
سوئی لگنے جیسی یا اینٹھن دار در دیں۔ جی تھلانے کے ہمراہ۔

کیڈیم سلف۔ معدہ میں جلندار اور کاٹنے والی در دیں شدید جی تھلانے کے ہمراہ اور تے۔

سیاہ تے۔ تھوڑی سی شے بھی ہونٹوں کو لگنے پر تکی کی تحریک ہو۔

کیو پریم آرسینکیم۔ پیٹ میں اعصابی در دیں جلندار۔ اینٹھن دار اور درد قویخ۔

زنکولس بلب۔ سوئی لگنے جیسے درد۔ پسلی کے نیچے پیٹ کے دائیں کوکھ کے نیچے کا درد۔

فیٹم کرب۔ معدہ میں درد جس کو کھانا کھانے سے افادہ ہو پریش کوہ بج صبح بستر میں
سے اٹھارے کر کچھ کھائے۔

سینا۔ درد قویخ خصوصاً بچوں میں جب بچہ کا پیٹ ہوا سے بھرا ہوا ہو۔ یہ کمزوری اور
انٹریوں کی دور کرتا ہے۔

میگنیشیا فاس۔ شدید دورے دار درد جو گرم اشیاء لگانے سے کم ہو۔ دائیں طرف درد
کی زیادتی جس کو دہرانے سے افادہ ہو۔ ڈکار اور ہوا کا اخراج کوئی فائدہ نہ دے۔ متواتر بجکی
ابکائی کے ہمراہ دن رات ٹانگوں میں اینٹھن۔ پتہ میں سوزش پتہ کی وجہ سے درد۔

چیلیٹونیم۔ شکم کے بالائی حصہ میں پریشانی اور دباؤ کے ہمراہ تیز درد۔ پیٹ میں کھنچاؤ ٹھنکی
کرے جیسے کہ ریموں سے بندھا ہوا ہو۔ درد دائیں کندھے کے جوڑ کی طرف پھیلے۔ ناف کے
حصے میں درد۔ دائیں طرف حرکت کرنے پر موسم کی تبدیلی پر اور صبح کے وقت زیادہ۔ رکاوٹی ریان۔
سوزش پتہ۔ پتہ کی پتھری۔ بالائی شکم میں درد انٹریوں میں تبخیر کی وجہ سے۔

چائناٹ۔ شکم کے بالائی حصہ میں درد، وزن اُپر ہونے کا احساس معمولی سی فکد کھانے
پر بھی۔ رطوبات کے اخراج کی وجہ سے شدید کمزوری۔ منہ کا ذائقہ کڑوا۔ خوراک کا ذائقہ نمکین
معلوم ہو۔ ٹھنڈے پانی کی پیاس اور بھوک کا احساس۔ پیٹ ہوا سے پُر۔ ڈیوڈنیم میں درد۔ بجکی۔
میلڈوٹا۔ پیٹ بہت ہی تنا ہوا۔ معمولی سا مشروب بھی خازج ہو جائے۔ معمولی سا چھوٹا
جانا بھی برداشت نہ ہو اور شدید درد کا باعث نہ بنے۔ انٹریوں میں رکاوٹ۔ پیچھے کی طرف
بھٹنے سے افادہ۔

ڈرلکا مارا۔ نان کے حصے میں درد یا پھنسیاں خاص طور پر سوراخ۔

پلائینٹیم۔ پینٹرز کا درد قویج۔ نان کا درد پیٹھ تک جائے۔ وہ چھٹا پلاتا ہے اور ہر مکان کو ش کرتا ہے کہ درد سے نجات مل سکے۔

کیسٹوریلیم۔ اعصابی قسم کا درد قویج جو خاص طور پر پھوٹی آنت میں ہوتا ہو۔ دردوں کو دبانے

سے افادہ ہو۔ اچانک طاقت کا ڈوبنا جیسے کہ زندگی کا بنیادی اصول ہی مر رہا ہو۔

سٹیفگیئر یا غصے کی وجہ سے درد قویج کے لئے مفید ہے۔

سٹائم۔ درد قویج شدید دباؤ سے آرام پذیر ہو۔ درد دیں آہستہ آہستہ شروع ہوں بتدریج

جوئی تک ٹرھیں اور تب بتدریج کم ہو جائیں۔

گرتیشی اوللا۔ پیٹ میں شدید کاٹنے والی دردیں گیس کی گگر ٹراہٹ پیٹ میں ٹھنڈک احساس کیاتھ

ایلیم سپیا۔ شدید کاٹنے والی درد پچلے بائیں حصہ پیٹ میں۔ پیناب میں جلن اور پیناب کی بہت

زیادہ خواہش بچوں میں درد قویج دہل ہونے کے ساتھ اور بدبو دار ہوا کے ساتھ۔

جربائنٹری۔ پیڑ میں شدید درد جس پر ٹھنڈا پانی گرانے کی زبردست خواہش ہو جس نفاقہ ہو۔

کارلوقج۔ معدہ کے اوپر والے حصہ میں گیس کے ہمارہ درد جو ڈکار آنے پر کم نہ ہو۔

الیووتا۔ پینٹرز کا درد قویج۔

لائیکو لوڈیم۔ کھانا کھانے کے بعد پیٹ کے بالائی حصہ میں درد یا دباؤ۔ کھٹے ذائقہ کے ساتھ

بہت زیادہ تناؤ خاص طور پر پیٹ کے پچلے حصہ میں۔ زبان بغیر پائیس کے خشک۔ شدید

بھوک۔ گوشت یا روٹی کھانے پر زیادتی۔ ۴ سے ۸ بجے شام کے دوران اور پلٹنے پر افادہ

ڈکار آنے اور گیس کو خارج کرنے پر افادہ۔

کافیا۔ حمل کے دوران بے خوابی کے ساتھ اینٹھن دار درد۔

مزمن پیچیش

سلفر۔ مزمن پیچیش کی چوٹی کی دوائی ہے۔ اس دوائی کے ساتھ علاج شروع کرنا چاہیے یہ

بہت زیادہ کیسوں کو درست کرتی ہے۔ بغیر کسی اور دوائی کی مدد کے ۲۰۰ طاقت استعمال کیجئے

میگنیشیا کارب - پیٹ - بہت زیادہ تناہو سہر پانی کی طرح کا پاخانہ انٹریوں سے پانی کے نل کی طرح خارج ہوتا ہے -

چائنا آف - جب ہمیش پھل کھانے یا شدید ٹھنڈا پانی پینے سے ہو - زرد پانی کی طرح کا پاخانہ گیس کے ہمراہ بغیر تکلیف کے اور کھانے کے بعد زیادتی -

لیکسس - ہمیش بدبودار ہمیش قبض سے آدل بدل کر - موسم بہار میں زیادتی -
سیلینیم - انٹریوں کی جھلی کی ٹی بی - سبب کھانے سے ، سگریٹ سے یا لمبوں کھانے سے ہمیش -
تھوجا - ہمیش یا امیائی ہمیش کے لئے شاندار دوائی - ۱ - ایم طاقت میں دیجئے -

پیٹ کا بڑھ جانا

لیکسس - نوجوان لڑکیوں میں پیٹ کا بڑھ جانا -

گیس - معدہ کے تحت گیس بھی دیکھئے -

چائنا آف - جب تمام پیٹ میں گیس ہو - گیس کی وجہ سے پیٹ کا تناؤ تقریباً پھٹنے کے قریب پھل - پھل اور شراب سے زیادتی -

کاربو رتج - جب پیٹ کے اوپر والے حصہ میں گیس - سانس لینے میں دباؤ ڈالے یا پھٹائی کے گرد تیز دریں - پاخانہ بے نامہ یا ٹھیکلا ڈھالا - خوراک کے گلے ٹھرنے کی وجہ سے پیٹ ڈھول کی طرح پھول جائے -

لائیکوٹوڈیم - جب پیٹ کے نچلے حصہ میں گیس ہو - شام ۴ سے ۸ بجے تک زیادتی - جو چیز بھی کھائے گیس میں تیل ہو جائے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ناراض ہو جائے اور تنگ ہو جائے - ایک لغتہ ہی سے گیس بھر جائے اور پیٹ تن جائے - گرم سے گیس کا اخراج -

ریغنیس - جب ہوانان کے گرد ہو ، جو خارج نہ ہو سکے اور پُر درد -

کاربالک سیڈ - پیٹ میں گیس کی وجہ سے تناؤ جس کی وجہ سے اکثر آہیں اور ڈکار آہیں -

نکس ماسکاٹا - گیس کی وجہ سے تناؤ جس کی جھٹک معدہ جہاں ہر چیز گیس میں تبدیل ہو جائے -

کیجیو میلا۔ گیس جس کو ڈکاروں سے افاقہ ہو۔

ایلو۔ گیس بدبودار۔ جلن دار۔ بہت زیادہ خارج ہو۔ کم پاخانہ بہت زیادہ ہوا خارج ہو۔ پیٹ میں اتنی گرگڑا ہٹ ہوتی ہے کہ کمرے میں موجود کوئی بھی سن سکتا ہے۔ اینٹھن پانٹنے سے پہلے اور بعد میں۔ سخت پاخانہ بغیر پتہ چلے باہر خارج ہو جائے۔ پیٹ میں اتنی ہوا کہ معلوم ہو کہ پیٹ پھٹ جائے گا۔

لیک کینٹم۔ رحم سے ہوا خارج ہو۔

سار سپر لیا۔ جب پیشاب کے ساتھ ہوا خارج ہو۔ پیشاب آواز کے ساتھ خارج ہو۔

اولینڈر۔ ہوا کے ساتھ پاخانہ خارج ہو جائے۔

کلکیر یا ایوڈ۔ خالی ڈکار۔ بدبودار۔ کڑوے۔ بے ہوشے۔ چھاتی اور بالائی شکم میں درد۔ دھکن کے بعد معدہ میں چپکنے والی درد۔ سکڑنے والی درد بالائی شکم میں جو سانس کو روک دے۔ بالائی شکم میں گیس کا اجتماع جو چھپونے پر حواس ہو یعنی درد کرے۔

فیل توری۔ پیٹ میں گرگڑا ہٹ اور بے ہنگم آوازیں بے بُود بے دائرہ ڈکار۔ کھانا کھانے کے بعد سونے کا رجحان۔

فیوکس ولس۔ اس دوائی سے گیس کم ہو جاتی ہے اور بالآخر غائب ہو جاتی ہے بدبو بکھر کے تین قطرے فی خوراک دیں۔

کیسٹوریم۔ پیٹ ہوا کی وجہ سے مھولا ہوا۔ چیدوں میں کچھاٹ۔ ناف کے گرد کاٹنے والا

درد جس کو دبانے سے افاقہ ہو۔ سبز لیسڈار پاخانہ جو جلن دار ہو۔ اعصابی قوت رنج ،

بچوں کے لئے گرمیوں میں سبز پاخانہ میں متبادل ہو جانا۔

ایلیم سپیا۔ بدہشی۔ تھ اور گیس بچوں میں۔ بدبودار گیس۔ درد کی وجہ سے دہرے ہو جائیں

کالی کھانسی۔

ہومکس۔ رات کے وقت ہوا خارج کرنے کے لئے جاگ جائے۔

آر جیم ٹائٹریک۔ ہوا اتنی کہ پیٹ پھٹنے کے قریب۔ ہوا کے خارج ہونے یا ڈکاروں کے خاص افاقہ نہ ہو۔

کاکولس۔ جب ہوا کی بندش ڈھول کی طرح پیٹ پھولا دے۔

لائیکوپرسیکم۔ پیٹ میں بہت زیادہ گیس خاص طور پر اسے ۱۱ بجے صبح پانی کی زیادہ مقدار والی پیاس کے ساتھ۔

لیکس۔ پیٹ گرم۔ حس۔ پرورد پھولا ہوا۔ گیس۔ دباؤ نہ برداشت کر سکے۔ کافی ہوا خارج ہوا۔ ڈکاروں سے افاتہ۔

پلسٹیللا۔ پیٹ سخت پھولا ہوا۔ درد قریح اکثر قے اور عیش کے ہمراہ۔ دباؤ جیسے کہ پتھر ہو جو شانہ تک بڑھے۔ چربی غذا۔ پیٹری اور پھلوں کے بُرے اثرات۔

نکس و امیکا۔ شراب۔ کافی اور میٹھے رہنے والی زندگی کے بُرے اثرات۔ گیس کا دباؤ اوپر کی طرف جو سانس کو روک دے۔ چھاتی میں دباؤ جیسے کہ معدہ میں پتھر ہوں۔ قبض، پاخانہ کی لاماصل خواص۔ یعنی پاخانہ کی خواہش کے باوجود کھل کر نہ آئے۔

ہرنیا۔

کلیریا کارب۔ ہرنیا کے لئے چوٹی کی دوائی ہے جس کے ساتھ علاج شروع کرنا چاہئے یہ اکثر مکیوں کو درست کر دے گی۔ ہرنیا جہاں پیٹ کی دیواریں تھلی ہوں اور ہرنیا کی ٹپٹی پہنچی جاسکے۔

لائیکوپوڈیم۔ دائیں جانب کا ہرنیا۔ آنتوں کے الجھنے کی وجہ سے ہرنیا۔ ہرنیہ روز کے بعد ایک ہزار طاقت کی ایک خوراک دیجئے۔ پیٹ کا گیس کی وجہ سے گرگڑا ہٹ اور تناؤ۔ نکس و امیکا۔ بائیں جانب کا ہرنیا۔ ہرنیہ روز بعد ایک ہزار طاقت کی ایک خوراک دیجئے۔

جب لائیکوپوڈیم ناکام ہو جائے تو یہ دائیں جانب کے ہرنیا کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔

کاکولس۔ جب لائیکوپوڈیم اور نکس و امیکا ناکام ہو جائیں تو ۲۰ طاقت میں دی جائے۔

آرم میٹ۔ بچوں میں چڑے کا ہرنیا جب درج بالا ادویات ناکام ہو جائیں۔

لیکس۔ آنتوں کے الجھاؤ کی وجہ سے ہرنیا اور آنتوں کا گلنا سٹرنا۔

پلمیم۔ آنتوں کے امعاء کی دگر سے ہر نیا خواہ ران کا۔ چڈے کا یا ناف کا ہر نیا ہو۔
سلیفنگیر یا۔ شانے کا ہر نیا۔

سلیشیا۔ چڈے کے غددوں کا پھول جانا اور سوزش۔ پھوٹنے پر دکھیں۔ پر درد چڈے کا ہر نیا۔
ایسکیلوس ہیپ۔ چڈے کا ہر نیا۔ داہنے چڈے کے حصہ میں کاٹنے والا درد۔

آنتوں میں رکاوٹ

بیسلا ڈونا۔ آنتوں کی رکاوٹ کے لئے اس دوائی سے علاج شروع کرنا چاہیے۔
اوپیم۔ پانخانہ کی پھوٹی آنتوں میں درد سے دار رکاوٹ۔ پیٹ سخت پھولا ہوا۔ ڈھول
کی طرح، درد قویٰ کے دوران پانخانہ کی حاجت اور سخت پانخانہ کا اخراج۔
پلمیم۔ آنتوں کی سخت پانخانہ سے پرانی ٹھنسی نمایاں طور پر محسوس کی جاسکتی ہے اور دیکھی جاسکتی ہے۔
کاسٹیکم۔ گیس کا رگ جانا سخت پانخانہ کے ساتھ۔
لیکس۔ پیٹ پھولا۔ حساس۔ پر درد کم کے گرد کوئی چیز برداشت نہ کر سکے۔

انسپیشن آف باولز

اکونائٹ این۔ پیچھے کے ساتھ اچانک درد۔ شدید بے چینی۔ پیٹ تنا ہوا۔ امعاء مستقیم
سے خون اور رطوبت سے۔ امعاء مستقیم۔ غبار سے کی طرح پھولا ہوا ہو۔ جلی کی طرح سوز
رطوبت امعاء مستقیم سے۔ ۲۰ طاقت میں دیکھئے ہر نیا درد منٹ کے بعد ایک ٹوکرا اپنی
طاقت میں بھی یعنی ایک ہزار طاقت میں کام کرتی ہے۔

پلمیم۔ درد قویٰ پانخانہ کی تے کے ہمراہ۔ ناف پر رسی کی طرح کا کھنچو۔ جیسے کہ پیٹ اندر کی
طرف کھینچا ہوا ہو۔ بعض اوقات یہ احساس کہ پیٹ اور کمر بہت ہی قریب ہو گئے ہیں۔
اوپیم۔ شدید درد قویٰ اور انٹینس۔

ورٹیر مایلم۔ درد ادھر ہوا جس کی طرف بھگے اور دبائے سے افادہ سخت اذیت یا سخت تکلیف۔

ناف

لائیکو لوڈیم - گیس کی وجہ سے ناف کا باہر نکلنا۔
 نمکس یا سٹیکٹا - ناف کے گرد بھوڑے پھنسیاں نوزائیدہ بچوں میں۔
 ابروٹیم - نوزائیدہ بچوں میں ناف سے خون کی طرح کی رطوبت رسنا۔
 کلگیر یا فاس - نوزائیدہ بچوں میں ناف سے خون کی طرح کی رطوبت رسنا۔
 ہائپوسائٹیس - نوزائیدہ بچوں میں ناف سے پیشاب کا اخراج کیا رسنا۔
 ڈائسکوریا - ناف سے درد شروع ہوا اور ہر طرف پھیلے۔
 ایومنا - ناف کا سکڑ جانا یا کھنچ جانا۔

رکاوٹ

نمکس و امیکا - قولون کا وہ حصہ جہاں سے اعلیٰ مستقیم شروع ہوتی ہے مین تکلیف کے ساتھ رکاوٹ تکلیف والی طرف لپٹنے سے لیکن دباؤ سے اتفاق۔ پاخانہ یا ہوا خارج کرنے کے نااہل یعنی دونوں خارج نہ کر سکے۔
 رشاکس - ٹھنڈی اشیاء کے علاوہ ہر شے سے کدے۔ زبان پر فرسرخ تین کونوں والا سر۔
 بے چینی - اکثر اپنی حالت کو بدلنا چاہے جس طرف لپٹے سُن ہو جائے اور درد ہو۔
 اوسیم - انٹروں کی رکاوٹ۔

لبلیہ

آئرس ور - لبلیہ کے حصہ میں جلندار بے چینی۔ میٹھے پانی کی تے کے ہمراہ گریس کی طرح کا تھوک۔ پانی کی طرح کے بچش جن میں غیر مضغ شدہ چربی ہو۔
 آئیوڈین - یہ تھوک کے غدودوں پر اثر کرتی ہے۔ پانی کی طرح کا زیادہ مقدار میں تھوک

پانی کی طرح کی کثرت سے شدید تھکے یا کھٹے مواد کی پیچش بھرت نرم پانی جیسے جھاگدار پانے
 جن میں جلی ہو۔ کھاتے پیتے ہونے کے باوجود کمزور ہوں
 فاسفورس۔ مختلف اعضاء خاص طور پر دل، جگر اور گردوں کی جزیلی تنزلی۔ غیر منقسم شدہ
 پاخانہ جس میں خوراک ساگودانہ کی طرح کے ذرات ہوں۔ تیل کی طرح نظر آنے والا پاخانہ۔ لبلبہ
 کی جزیلی تنزلی۔
 بیلا ڈونا۔ لبلبہ کا رکا خون ملی لبلبہ کی سوزش

سوزش غشائے مصلیٰ

معدہ کی جھلی پر پیٹونیم کی سوزش۔

اکونائٹ این۔ جب ٹھنڈ لگنے سے۔ بخار پیٹ میں پر پیٹونیم میں درد۔
 فیرم فاس۔ ٹھنڈ کی وجہ سے پر پیٹونیم میں درد کے لئے ایک اور دوائی ہے۔
 برائی اونیا۔ بخار تمام جسم پر جلن دار گرمی کے ساتھ شدید پیاس بہت زیادہ پانی پینے
 کی۔ پیٹ میں درد جو حرکت اور دباؤ سے زیادہ ہو۔
 بیلا ڈونا۔ پیٹ پھولا ہوا جو ڈرم کی طرح سخت اور پھونے پر حس۔ تھوڑی سی حرکت
 شور اور روشنی درد کو بڑھا دے۔ ابکائیاں ادرتے۔
 مرک مال۔ جب پیپ آنا شروع ہو جائے۔ پیٹ اس کے نکلنے سے پھولا ہوا ہو۔ مریض
 کو ٹھنڈے پینے آتے ہوں۔ پیچش ٹھنڈ اور بخار کے ساتھ۔
 لیکس۔ پیٹ کی جھلی پر پیٹونیم کا درد جب معمولی سا پھولا جانا بھی بڑھت نہ ہو سکے۔
 رٹاکس۔ پیٹ کی جھلی پر پیٹونیم کی سوزش ٹائیفائیڈ کے رجحان کے ساتھ۔ تیز
 بخار۔ خشک زبان۔ زبان کا سرا سرخ۔ پیٹ میں سوزش۔ کڑوا ذائقہ۔ دودھ کی خواہش۔
 درٹرم ایلم۔ جب مریض حالت نزع جیسی تصویر پیش کرے۔ شدید ٹھنڈک۔
 کمزوری۔ تھکے۔ اسہال۔ اور ہاتھ پاؤں میں اینٹھن۔

ٹی بی۔ تپدق

فاسفورس۔ میزنگ غدود یا ماسارقی غدودوں کی ٹی بی۔

ناسور۔

اور نکتہ گویم۔ معدہ کے زیریں حصہ اور اندھی آنت کا ناسور معدہ کے شدید تناؤ کے ساتھ ڈکاروں۔ بدبو دار گیس سخت تکلیف۔ کپڑے ڈھیلے کرنے پڑیں۔ معدہ اور بارہ انگشتی آنت کے ناسور۔

ایسٹیک الیڈ۔ معدہ کے ناسور۔ گرم کھٹے ڈکار۔ خون اور تمام کھائی ہوئی خوراک کی تہ۔ کاٹنے والی درد۔ معدہ کا تناؤ۔ معدہ اور پیٹ میں جلن۔ معدہ پر لیٹنے سے افادہ گیس اور جلور بچش خالص خون کے۔ کئی خون کمزور اور لاغر۔ بھوک کی کمی۔

آر جینٹم ٹائیٹریک۔ انٹریوں کا ناسور یا معدہ کا ناسور۔ خونی تہ کے ہمراہ۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد تکلیف۔

کالی بائیکرومیکم۔ انٹریوں کا ناسور مزمن بچش کے ہمراہ۔

مرک کلر۔ بڑی آنت کا ناسور۔ خون پاخانے کے ہمراہ۔

ٹیرینتھنا۔ انٹریوں کا ناسور اخراج خون کے ہمراہ۔

ٹائیٹریک الیڈ۔ ٹائیٹریڈ بنجار میں انٹریوں کا ناسور۔

فاسفورس { معدہ کا ناسور جلندار درد کے ہمراہ دی گئی ترتیب بھی دیکھئے۔
ایسٹیک الیڈ

یوفوریم۔ معدہ کے ناسور جلن دار درد کے ہمراہ دی گئی ترتیب اگر ناکام ہو جائے تو یہ دو امعدہ

کے ناسور جو کوٹوں کی آگ کی طرح جلیں۔ جلندار درد جب فاسفورس اور آر سینگ الیم ناکام ہو جائے

لائیکو پوڈیم۔ چند ہی قسموں سے پیٹ ابھر جائے۔ ۴ سے ۸ بجے شام زیادتی۔ ۱۔ ایم طاقت میں بچے

لیکس۔ معدہ کا ناسور جب مریض جاگنے پر بہت زیادہ تکلیف محسوس کرے کبھی قسم کی بدنہ برداشت

نہ کر سکے۔ ڈھیلے کپڑے پہننا چاہیے۔ سوزن کی گری برداشت نہ کر سکے۔

پلسٹیللا۔ ایسے مریض جو چربی ہضم نہ کر سکیں۔ کھلی ہوا میں افاقہ۔

تھوہا۔ زیادہ ٹیکے لگوانے والے حضرات میں معدہ کا ناسور۔

گرفیٹائٹس۔ یہ معدہ اور بارہ انگشتی آنت کے ناسور کے لئے بہت مفید ہے گرم

خوراک اور گرم مشروبات اور لٹنے سے افاقہ۔

نیٹرم فاس۔ معدہ کا ناسور۔ ایک مخصوص جگہ پر درد کھانا کھانے کے بعد زیادہ تیزابیت

اور تیزابی مواد نہ میں آئے۔

میٹڈورنیم۔ بارہ انگشتی آنت کا ناسور کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد درد۔ بہت زیادہ گیس

اور مندر کے کنارے پر ہمیشہ افاقہ۔ ایک۔ ایم فاقہ میں دیجئے۔

ایسکیلوس۔ اجتماع خون اور معدہ کا ناسور، تھے کے رجحان کے ہمارہ جو کھٹی ہوتی ہے بکٹے

ڈکار۔ متواتر بے چینی اور معدہ میں جلن۔

یوڈینیم ہائڈریٹ۔ پائیلورک اور معدہ کے ناسوروں کے لئے مفید۔ پسپی ہوتی کافی کی

طرح کے مواد کے ساتھ خون آمیز تھے۔ پاخانہ تارکول کی طرح کا سیاہ اور گہرا۔

دوسرا حصہ

معدہ

تیزابیت (گیس اور ڈکار دیکھئے) شدید بھوک۔ بڑھی ہوئی بھوک۔

سنا۔ بڑھی ہوئی بھوک جب بھوک بڑھنے کی وجہ پیٹ میں کرم ہوں۔ بچہ کھانے پر آسودگی ہوگا۔

لیکٹینیم۔ بہت بھوکا۔ انسان نہیں کھا سکتا کہ بھوک مٹ سکے۔

فلورک ایسڈ۔ بڑھی ہوئی بھوک اور متواتر بھوکا۔ ٹھنڈے پانی کی زبردست خواہش۔ پیٹ میں

کچھ بھی نہ ہونے کا احساس۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھاتا رہے لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ کیونکہ زیادہ

نہ برداشت کر سکے اور جلد ہی بھوکا ہو جائے۔

ایپس کین۔ کاٹنے والی بھوک۔ زیادہ کھانے کا رجحان۔

گریبی ادلا۔ کھانا کھانے کے بعد بھوک۔ خالی پن کا احساس۔

لیکس۔ برسی ہوئی بھوک معدہ میں درد کے ہمراہ۔

لائیکوپوڈیم۔ شدید بھوک لیکن کھانا شروع کرنے پر چند ایک لقوں سے سیر ہو جایا بھوک ہے۔
پیرولیم۔ پیچش کے ہمراہ برسی ہوئی بھوک۔

آیوڈین۔ شدید بھوک کے لئے بہترین ہے۔ بیہوشی محسوس کرے اگر تین یا چار گھنٹے کے بعد نہ کھائے۔ وہ دونوں کھانوں کے دوران کھاتا ہے لیکن پھر بھی بھوکا رہتا ہے۔
۲۲ طاقت میں دوائی دیتے۔

ایونفا سلیکیٹ { بھوک برسی ہوئی خوراک کی خواہش کے بغیر۔ کھانا کھانے کے بعد بھی
ایونفا فاس { بھوکا۔ شدید بھوک۔
ایروٹینم۔ درد میں اُبلتی ہوئی روٹی کی زبردست خواہش اپنی کٹنے والی بھوک مٹانے کے لئے۔ درد سے نفرت۔

رسٹاکس۔ کتوں جیسی بھوک کھانا کھانے کی خواہش کے بغیر۔
آرجنٹ میٹ۔ مکمل کھانا کھانے

انتھرم۔ غیر صحت مند یا بے قابو بھوک۔ بھوک کی وجہ سے رات کو جاگ جائے۔ ٹیپ ورم۔
ہائیدراسٹس۔ بھوک مگر خوراک سے مطمئن نہ ہو۔ اس دوائی کی یہ علامت نمایاں ہے۔
صحیح طور پر جذب نہ ہونا۔

سلفر۔ معمول کے وقت سے ایک گھنٹہ پہلے خوراک کے لئے بے کل ہو جانا، خاص طور پر گیارہ بجے صبح۔ اگر خوراک نہ ملے تو وہ کمزور ہو جائے اور جی تھکے۔ تھیلیوں، تلیوں اور سر کی جلن وغیرہ۔

نکس و امیکا۔ سیر شراب سے استعمال کے بعد۔ مزمن پیچش میں۔
ایسٹ فاس۔ کتوں جیسی بھوک کی وجہ سے رات کو جاگ جائے

گلکیر یا کارب { شدید بھوک جو کمی سے
 فیرم میٹ { اول بدل کر ہو۔ سوکھا
 آئیوڈم { مسان میں اچھا کھانا کھانے کے باوجود سوکھا جائے۔
 مرک کار۔ معدہ کے سرطان میں۔

کافیا۔ جلدی جلدی کھانا کھانے کے ساتھ۔

آرسینک ایلیم۔ کھانا کھانے اگرچہ وہ سمجھے کہ سڑی لگے گی۔

بائیوسائیکل۔ مرگی کے دورہ سے پہلے کتوں جیسی بھوک۔

لوپٹھوریم پرف۔ کونین کے بعد وقفہ دار بخار میں بھوک۔

زئیم میٹ۔ بازوؤں میں کمزوری کے احساس کے ساتھ۔

نیٹریم کارب۔ معدہ کے گڑھے میں صبح کے وقت کچھرنے ہونے کا احساس

ایلیم سٹائیوا۔ بہت زیادہ کھانے کی عادت۔ پیٹو۔

وریرٹرم ایلیم۔ حمل کے دوران۔ بہت زیادہ۔

اولیم جکیف۔ سوکھا مسان بچوں میں۔

اگنیشیا۔ عادی تمباکو نوشی سے۔

کینابلس انڈیکا۔ بھوک جو خوراک سے دور نہ ہو۔

مگنیشیا کارب۔ بچے جو درد دھپینے سے انکار کر دیں۔ درد میں مبتلا ہوں اگر درد نہیں۔

بھوک نہ رہے۔

نکس و امیکا۔ کڑوا ذائقہ۔ زبان پھپھلی حرکت زرد فرسے ڈھکی چھپی ہوئی۔ بڑی وجہ بدھنی ہوئی ہے۔

چائنا۔ بھوک کی کمی جو کھاتے وقت ہی لگ جائے۔

اگنیشیا۔ خوراک مشروبات اور تمباکو نوشی کی باکل خواہش نہ ہو۔ ان سے نفرت یا ان

کے بُرے ذائقے کے بغیر۔

فیرم فاس۔ بھوک کم یا بالکل نہ رہے۔ خوراک کی خواہش بالکل نہ رکھے۔ خوراک دودھ
گوشت وغیرہ سے نفرت۔ پیٹ پھولا ہوا۔ جگر اور تلی بڑھی ہوئی۔ بہت زیادہ گیس۔ جی
متلائے اور تھے۔

ہومر سس۔ بھوک کی کمی پہلے کی نا اہلیت کے احساس کے ساتھ۔ جب وہ صبح کے وقت
جلگے۔ گلے میں دھکن۔

لیک ویک ڈیفیل۔ بھوک کی کمی پانی کے بہت زیادہ مقدار میں پینے کی پیاس کے ہمراہ۔
ایس نائیگرہ۔ صبح کی وقت بھوک بالکل نہ ہو لیکن دوپہر اور رات کے وقت خوراک
کی شدید خواہش۔

جنتشیا لٹ۔ سادہ بھوک کی کمی یا حادثہ بیماری کے بعد۔ مرنیکور اور ۲x طاقت کھانا
کھانے سے نصف گھنٹہ پہلے دیں۔

پرنس ایس۔ چند لقمے کھانے سے احساس جیسے کہ بہت کھا لیا ہے۔ اس علامت
پر لائی کو پوڈیم بھی دی جاسکتی ہے۔

کلیر یا آر سینکم۔ خوراک کی خواہش کی کمی لیکن ٹھنڈے پانی کی پیاس۔

مرکیورس۔ بچے دودھ پینے سے انکار کر دیں۔

کینسر

اور تھوگلم۔ معدہ کے زیریں حصہ اور اندھی آنت کے کینسر۔ یہ دوائی مرنیکور میں ایک
قطرہ فی صبح پانی میں دیا جانا چاہیے۔ اس سے مریض سیاہ لیسڈار قیض کرنا شروع کر دے گا۔
بہت افادہ ہوگا۔ اگر پہلی خوراک کام نہ کرے تو دوسری خوراک ۳۸ گھنٹے کے بعد دی جائے۔
کارپووج۔ پیٹ کے اوپر والے حصہ میں جلن اور گیس۔

کنڈورانگو۔ معدہ کا کینسر۔ سخت گانٹھ دار۔ سوزش زیریں معدہ میں۔

آر سینکم الیم۔ جلن اور بے چینی کے ہمراہ۔ پانی کی تھوڑی تھوڑی مقدار کی پیاس کے ہمراہ۔
اور گرم بیٹیوں سے افادہ۔

چھلیٹو دیم۔ معدہ کا کینسر۔ ایک ایم یا سی ایم طاقت میں دیجئے۔
 فاسفورس۔ پسپ ہوئی کافی کی طرح کے مواد کی تہ کے ہمراہ خاص طور پر جب کینسر کھالت میں
 بدلنے والی ہو۔ بہت اونچی طاقت ایک ایم یا سی ایم طاقت میں دیجئے۔

ڈکار۔ (پیٹ میں درد یا معدہ اور گیس۔)

آرٹھرمائٹیک۔ اونچے۔ کثرت سے اور بغیر تکلیف کے ڈکار۔
 کاربو وریج۔ پیٹ تنا ہوا۔ ڈکار۔ کھائی ہوئی خوراک کے ذائقہ کے ڈکار بغیر۔ جلن دل کے ڈکار۔
 کاربو انیمیلیس۔ کاربو وریج کے بعد گیس۔ اینڈوگس تک آئے۔ دباؤ اور گھٹن کا باعث ہو۔
 کاربالک ایسڈ۔ ڈکار۔ اعصابی بد مضعی کے ہمراہ۔
 ایپس نائیگرا۔ بالائی شکم میں پردرد گرنے کا احساس جیسا کہ اپر کینسر اُبلتا ہوا انداز ہو۔
 نکس ماسکٹا۔ گیس اعصابی مریضوں میں۔
 سلفر۔ خوراک کے ذرات کے ہمراہ ڈکار جو بہت کھٹے ہوں۔

اوسیم۔ مولی کے ڈکار۔

سلیفورک ایسڈ۔ دل کی جلن کے ہمراہ ڈکار جو دانتوں کو کنارے پر سیٹ کر دیں۔
 انٹم کرڈو۔ جو چیز کھائی ہو اسی کی ڈکاریں۔ جی متلائے اور تہ کی خواہش۔ کرڈا ذائقہ۔
 بسمتھم۔ ہر کھانے کے بعد جی متلائے۔ جو نہی پانی معدہ میں پہنچتا ہے تہ کر دیا جاتا ہے
 گندی بدبو کا اٹھنا۔ پیٹ میں گرد گڑا ہٹ۔ پیٹ میں جلن۔ تہ اور پچش۔ معدہ کا کینسر۔
 اپیکاک۔ جی متلائے خالی ابکائیاں۔ سور کا گوشت کھانے کے بد اثرات۔ پیٹے ہوئے پانی
 اور غیر ہضم شدہ خوراک کی تہ پچش کے ساتھ تھیں۔ خون کی قہیں۔

مائڈر اسٹس۔ کھٹے مواد کی ڈکاریں۔ معدہ کا کینسر۔ سولے دودھ کے ہر چیز کی قہیں۔
 روٹی یا سبزیوں تیزابیت کا باعث نہیں۔ مزین گیس کا زکام۔
 فیرم ایوڈیم۔ خوراک اور پرک طرف دھکیلتی ہوئی معلوم دے۔
 کیو پیم میٹ۔ جب پانی پیے تو اس کی آواز سنائی دے۔

برائی ادویا۔ کڑوے ذائقے کے ساتھ ڈکار
 ہائیڈرو سائنک لیڈ۔ پانی ایسے پھیلے جیسے کہ خالی ڈرم میں پھیلے۔
 آرسینک البم۔ خراشدار اور کڑوی ڈکار۔
 سورٹینم۔ گلے میں اندھوں جیسے ڈکار۔
 ایتھوزا۔ خوراک کھانے کے ایک گھنٹہ بعد تے کی صورت میں الٹ دینا۔ تے بے جینی کو دہر کر دے
 بہت پریشانی اور درد۔

کیمو میللا۔ اگر علامتی ادویات ناکام ہو جائیں تو گرم پانی کے ہمراہ بطور مل ایگنیز کیو میلادی بلے۔
 لارویس اسس۔ کڑوے بادام کے ذائقے جیسے ڈکار۔ معدہ میں مواد لڑھکتا ہوا عکس ہوا

خوراک کا زہر

نکس و امیکا۔ خوراک کے زہر کے لئے چوٹی کی دوائی ہے تے معدہ میں درد پیش
 آونیک ایلم۔ آئس کریم یا زیادہ پکے ہوئے پھل کھانے کے بعد۔
 پیٹیشیا۔ پھوٹ کی زہر کی وجہ سے خوراک کا زہر
 کیویرم۔ علامات کے مطابق دوائی کا انتخاب کیجئے!
 کاربوونج۔ خراب شدہ اور لگا ہوا گوشت کھانے سے۔
 ہائیو سائنکس۔ خوراک کے زہر کے دوران بیٹھن۔
 نیٹرم میور۔ شہد کھانے کے بُرے اثرات۔
 پلیسٹیللا۔ چربی غذا کھانے کے بعد یا چاکلیٹ کھانے کے بعد
 آرجنٹم نائٹرکیم۔ حواس کا مکمل طور پر کھو دینا۔ یہوشی اور اینٹھن۔ سیاہ قہقہ

درد معدہ (ڈکار بھی دیکھئے)

نکس و امیکا۔ معدہ کے نظام کے درم برہم ہونے پر بہترین دوائی ہے۔ جھوک کی کمی۔ کھانا

کھانے کے بعد درد بطنی۔ اس دوائی کی نمایاں علامت ہے۔ بالائی شکم سے مختلف اطراف کو جاتی ہوئی دریں۔ درے وارثوں کے ہمارے۔ اعصابی درد معدہ تکلیف کھانے کے نصف گھنٹہ بعد ہو۔ جب شراب کی وجہ سے تکلیف ہو۔

کاربووکیج۔ سست اور نامکمل ہاضمہ۔ معدہ اور انٹسٹینوں میں وزن۔ دھیا اور معدہ میں کچھ نہ ہونے کا احساس۔ کھانے سے جس کو افادہ نہ ہو۔ لیکن چند لمحے کھانے کے بعد مجھ سے ہونے کا احساس۔ معدہ میں کچھ نہ ہونے کا احساس۔ معدہ میں بہت جلن۔ چھاتی اور پیٹ میں مٹیخن دار دریں جو مریض کو دہرا ہونے پر مجبور کر دیں۔ معدہ میں وزن۔ تیزابی ڈکاریں بکھٹی اور گندے بو والی۔ معدہ میں گیس یا پیٹ کے اوپر دالے حصہ میں گیس۔

آئرکس ور۔ زیادہ تیزابیت کے لئے بہترین دوائی ہے۔ کھٹے اور کڑے ڈکار جو دانتوں کو کھٹا کر دے۔

رومینیا۔ جب زیادہ تیزابیت کے لئے آئرس در نکام ہو جائے تو یہ آزمائی جائے۔ پٹیلیائی۔ سرد درد کے ہمارے صفرا کی زیادتی۔ مزین درد معدہ متواتر معدہ میں۔ متواتر کھائے جائے۔ گرمی اور جلن کا احساس۔ قبض اور شام کا بخار۔ جگر سو جا ہوا دبانے پر ڈکھے دھیمی اور مسلسل درد۔ جگر میں اجتماع خون۔ مزین درم جگر۔

چائٹا۔ جب تمام پیٹ میں گیس ہو اور تباؤ پڑے درد ہو۔ ڈکاروں سے وقتی افادہ ہو۔ کھٹے یا کڑے ڈکار یا بدبودار گیس۔ فعل ہاضمہ کا سست ہونا۔ رات کے کھانے کے بعد زیادتی۔ زرد بیچش اور رات کے وقت زیادتی اس دوائی کی نمایاں علامت ہے۔ بغیر بدبو یا سٹانڈ کے جلندار ڈکاریں۔ اس کو کاربووکیج سے تفریق کرتی ہے۔ اس دوائی کی ایک اور اہم علامت یہ ہے کہ خوراک معدہ میں کافی عرصہ تک بغیر ہونے کے پٹری رہتی ہے اور آخر کار غیر ہضم شدہ خوراک تے کر دی جاتی ہے۔

انٹم کرڈ۔ بیچش چپکنے والے کھٹے اور بدبودار۔ بچہ ہر دفعہ خوراک کھلانے پر تے کر دیتا ہے۔ زبان سفید گاڑھی فرسے ڈھانپی ہوئی۔ بچوں کے معدہ کی مزین خرابیاں۔ متواتر جی تھلائے۔

معدہ میں گولا۔ ہیٹ تا ہوا۔ پتھر ٹھکا ہوا۔

لائیکو پوڈیم۔ جب ہیٹ کے پچھلے حصہ میں گیس ہو تو یہ دوائی منہ پر ہوتی ہے۔ شدید جھوک لیکن چند نفعی کھانے پر عسوس ہو کر ہیٹ بھرا ہوا ہے اور کھانا ایک طرف کر دیتا ہے۔ پلیٹیلہ اور اناکلوڈیم کے بر خلاف تکلیف کھانے کے فوراً بعد ظاہر ہوتی ہے۔ جبکہ مذکورہ بالا دونوں ادویات میں آدھ گھنٹہ بعد۔ نمک اسکاٹا میں فوراً تکلیف ہوتی ہے اور کر کے ارد گرد دباؤ برداشت نہیں ہو سکتا ہمہ وقت جیسے کہ لیکس میں ہوتا ہے۔ اس دوائی کی ایک اور علامت مٹھائیوں کی زبردست خواہش ہوتی ہے۔ یہ موزوں ترین ہے۔ ناطقہ یا کمزوری کی حالت میں تیزابی قسم کی بد ہضمی میں کیونکہ یہ کھانا ذائقہ رکھتا ہے۔ کھٹے ڈکارا درتے جب کبھی بھی یہ ہوتا ہے یہ کھاتا ہوتا ہے۔ معدہ کے گڑھے پر پردہ سوزش۔ گیسوں کے ڈکارا فاقہ ذکر کریں۔ پیشاب میں سرخ ریت۔ فوزا ایڈو۔ بچوں میں قوی طرح کا درد۔

پلیٹیلہ۔ منہ خشک۔ صبح جاگنے پر منہ کا ذائقہ گندہ اور یہ احساس کر خوراک سینے بیڈیوں کے نیچے پڑی ہوئی ہے اس کی نمایاں علامات ہیں۔ زبان کھردری گاڑھی فرسے دھاپنی ہوئی۔ تیزابیت اور دل کی جلن۔ خوراک کا ذائقہ کڑوا۔ کھانا یا بدبودار۔ منہ میں رال اور کھلی ہوئی خوراک کے کھٹے ڈکار۔ پیاس نہ ہو مرن منہ کو ترک کرنے کی خواہش۔ بڑا ذائقہ پلیٹیلہ کی مخصوص علامت ہے۔ چربی غذاؤں سورکا گوشت بیٹری یا ملی جلی خوراک سے معدہ کے بگاڑ کے لئے خاص طور پر مفید ہے۔ مریض ٹھنڈ محسوس کرتا ہے لیکن گرمی سے زیادتی نکسو میکا کے برخلاف شام کے وقت زیادتی جبکہ پلیٹیلہ میں صبح کے وقت زیادتی ہوتی ہیں۔

دوری فوراً۔ معدہ اور دوسرے حصوں میں جلن۔

اینا کارڈیم۔ کھانا کھانے سے بہت افاتہ اس کی نمایاں علامت ہے۔ معدہ میں بیٹھے کی کیفیت کھانا کھانے کے دو گھنٹہ بعد اور معدہ میں دھیمہ درد جو رٹھ کی ہڈی تک جائے بے ذائقہ ڈکار بعض اوقات کھٹے ڈکار۔ کھانا کھانے کے بعد زیادتی۔

فاسفورس۔ خوراک کا الٹ کرنے میں آنا۔ ٹھنڈی چیزوں کی شدید خواہش جو یہ چیزیں معدہ

میں گرم ہوں تو قے کر دی جائیں۔ بغیر جی متلاسنے کے خون تھوکن اس دوائی میں عاک ہے۔
 معدہ میں کمزوری کا احساس جو سلفر اور سیسپیا کے برخلاف انٹروین تک بڑھتا ہے بعض اوقات
 کندھوں میں بھی جلن پائی جاتی ہے۔ نرسن بد ہضمی میں قے۔ یہ دوائی توڑ پھوڑ اور علیحدہ کرنے
 کے عمل کے ساتھ خاص تعلق رکھتی ہے اس لئے یہ کینسر کے لئے مخصوص دوائی ہے سخت
 جگہوں اور کینسر کی رطوبت سے نئے پیدائشہ زخموں وغیرہ کے لئے جلن دار۔ کاٹنے والی محدود
 جگہ کے اندر درد محسوس ہوتی ہے جسم کا جلدی کم ہو جانا۔ اور کئی خون۔

سٹانم۔ درد معدہ مریض کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ادھر ادھر چلے لیکن کمزوری اسے آرام
 کرنے پر مجبور کرے۔ زیادہ دبانے پر افاقہ ہوتا ہے۔

جنشیا سی کیو۔ معدہ میں دباؤ جیسے کروٹاں پاخانہ ہونے کا رجحان۔

اکونائٹ این۔ معدہ اور معدہ کے گڑھے میں دباؤ جیسے کہ سخت تھوڑو۔

ایسکولیس ہپ۔ معدہ میں شدید جلن دار۔ بے چینی۔ معدہ کے گڑھے میں جیسے پتھر کا ذرن
 ہو۔ ہوا کی خالی ڈکار۔

گریفائیٹس۔ درد معدہ جس کو کھانے سے افاقہ ہو۔ کھانا جلدی جلدی کھائے تاکہ پیٹ
 کے بالائی حصہ میں سے درد کو افاقہ ہو۔ خاص طور پر درد پہرے کھانے کے وقت اور رات کے کھانے پر
 آرمینک البم۔ معدہ کی خرابیوں کے لئے شاندار دوائی ہے۔ پریشان کن معدہ کا بگاڑ اور حادثہ
 پیٹ میں درد اور پچش درد جلن دار قسم کی ہوتی ہے جن کے ہمراہ تلی اور قے، معدہ حساس ہو اور
 دکھ۔ مریض کمزور معدہ میں ٹھنڈک پھیل یا آئس کریم کے ذریعے۔

آر جنٹم ٹائمریکم۔ بہت زیادہ گیس جس کو ڈکاروں سے افاقہ ہو۔ کاٹنے والی اور ناسوری درد
 پیٹ کے گڑھے میں جہاں سے درد ہر طرف کو ہائے۔ درد معدہ خاص طور پر اعصابی اور نرم نازک
 خواتین میں۔ یہ جذبات کی برائیگی ہوگی۔ نیند کی کمی یا بعض خرابیوں سے لاحق ہو سکتا ہے۔ معدہ
 میں گولے کا احساس۔ مواد کی تہ جو ماروں میں کھینچا جاسکتا ہے۔ مٹھائیوں کی زبردست خواہش
 جبکہ مٹھائیوں سے تکلیف میں زیادتی ہو۔ اور پچش ہو جائے۔ معدہ کا کینسر کھانا کھانے کے بعد

اور درد دبانے سے تکلیف زیادہ، خونی تے اور لیسہ رقتے کے ہمراہ، مزمن درد معدہ۔ نوزائیدہ بچوں میں درد قولنج۔

پیٹروسیلیئم - معدہ اور انٹسٹینوں کی تکلیف کے لئے۔

کالچیکم - معدہ میں برف کی طرح کی ٹھنڈک۔

ہیپو مینٹر - معدہ میں برف کی طرح کی ٹھنڈک یا ۲۰ تا ۳۰ طاقت میں دیجئے۔

گریشی اولہ - معدہ میں تیزابیت گنتھیا کے ہمراہ۔

نیٹرم سلف - عام صفراوی حالت جوئی کی وجہ سے یا نمی سے زیادتی ہو۔

نیٹرم کارب - دورو سے بچش۔ دل کی دھڑکن۔ معدہ کی درد کھانے پر کم ہو۔ صبح سویرے

بستر سے اٹھائے۔ کچھ کھانے کے لئے۔

نیٹرم فاس - گیس دہی جیسی تے کے ہمراہ۔ شدید تیزابیت۔ کھٹے پسینے۔ معدہ کی تیزابی حالت

متلی کے ہمراہ اور جلن دار مواد کی تے۔ کھٹے ڈکار۔ ہر کے جیسے کھٹے ڈکار۔ معدہ کا ناسور کھٹی

رطوبت منہ کو آئے۔

لیک ویک ڈیفیلو - معدہ کا درد اور انٹسٹینوں کی سوزش، مزمن سوزش بچش اور تے۔

فاسفورس - بد مزہی، جوئی خوراک اندر

فرم میٹ - نگلی جائے۔ یہ کھٹی ہو جائے وہ

آر سیکنگ البم - ڈکار لیتا ہے، حتیٰ کہ مواد خارج کر دیا جاتا ہے

ایسکولس ہیپ - دل کی جلن اور متواتر معدہ میں جلن۔ معدہ کا ناسور۔

انٹرم کروڈ - معدہ کی تکالیف ذہنی علامات کے ساتھ۔ موت کی خواہش۔ معدہ سے غذا کا ادر

اُبھرنے کھانے کے بعد تے اور متلی کے ہمراہ ۲۰ طاقت یا ایک ایم طاقت میں دیجئے۔

نکشتہس - معدہ میں جلن۔ متلی اور تے کے ہمراہ۔

کیڈیم سلف - انٹسٹینوں کی سوزش۔ معدہ میں جلن۔ پیٹ سو جا ہوا اور بھولا۔ بھالا لگنے جیسے

درد خنجر لگنے جیسے درد۔ پائیلورس میں درد۔ خون والے بچش خونی پیشاب کے ہمراہ۔

برائی اونیا۔ معدہ کی خرابیاں معدہ کے بخند۔ ٹھنڈ اور سردی کے ہمراہ۔ ٹھنڈک اور سردی کے ہمراہ پریشانی۔

کروٹیلےس ہو۔ حیران کن نایاب صغروی دوائی ہے۔ سیاہ مواد کی تہ بڑی مقدار میں سردی کے ہمراہ پیٹرولیم۔ حمل کے دوران درد معدہ جب بھی پیٹ خالی ہو متواتر کھانا کھانے سے انفاق۔ ایسٹریلیسک۔ معدہ کی تیزابیت۔ ویلیریانہ آف۔ اعصابی معدہ کا بگاڑ۔ سلفیورک الیڈ۔ جب معدہ میں نمک کے تیزاب کی زیادہ ہو۔ الیومن۔ درد معدہ ضدی قسم کے درد معدہ کے ہمراہ۔ متلی تہ اور مواد کا منہ کو آنا۔ ۱۔ ایم یا سی ایم طاقت میں دیکھو۔

دیکھئے معدہ کے ناسور۔ پیٹ کے سلسلہ۔

کیلجے کی جلن۔

اپریکاک۔ کیلجے کی جلن۔ متلی یا تہ کے ہمراہ بہت زیادہ گیس۔ یہ حمل کے دوران بھی مفید ہے۔ نکس و امیکا۔ کیلجے کی جلن گیس اور بہت زیادہ تیزابیت کے ہمراہ لیکن بغیر متلی یا تہ کے۔ زبان پر ملائی جیسی نر۔ عام طور پر معدہ خراب۔ جب اپریکاک ناکام ہو جائے تو یہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ اپریکاک سے ادل بدل کر دی جاسکتی ہے۔

کلکیہ یا کرب۔ معدہ میں جلن کا احساس۔ خراشدار ڈکار۔ بعض اوقات کھٹے دوسرے وقت کھاری ذائقہ میں معدہ پر دباؤ کا احساس خوراک اور مواد کی تہ کے ہمراہ۔ سٹیفیگیہ یا۔ تبا کو نوشی کی وجہ سے معدہ کی جلن۔

ایم الیم۔ گذہ کر دیا کھٹا ذائقہ۔ حلق اور گلے میں گرم جلن کا احساس۔ خراشدار مواد متلی ابکائی اور خون ملے ہوئے مواد و لیڈار مواد کی تہ۔ ہاتھ پاؤں کا کانپنا اور سردی کا احساس

معدہ میں درد کے ہمراہ اور دبائے والی پریشانی - بے قاعدہ اور بے ہنگم نبض -

ہچکی

نکسوا میکا - بذہنی کے ساتھ ہچکی - تے اور ہچش -

آگشتیا - جب ہچکی کی زیادتی کھانا کھانے - تبا کو نوشی اور بالائی پیٹ میں خالی پن کے احساس کے ساتھ تبا کو جانے سے تکلیف دہ ہچکی - خاموش غم سے بھی ہو سکتی ہے - صدمہ یا ناکامی کھانا کھانے یا پینے کے بعد ہچکی -

رٹنہیا - کھانا کھانے کے فوراً بعد شدید ہچکی خاص طور پر جب وہ کافی دیر تک بغیر کھانے کے ہو - حملوں سے پہلے یا پیٹ کے تناؤ کی شکایت ہو -

سنا - شدید ہچکی - جب رٹنہیا ناکام ہو جائے تو یہ دی جائے -

کوکولس انڈ - ڈایا فرام کے تشنج کے ساتھ ہچکی -

ہائیو سائیمس - پیٹ کے اپریشن کے بعد ہچکی -

ٹیو کریم - دورھ پلانے یا خوراک کھانے کے بعد ملا دینے والی ہچکی -

چائنا آف - کونین کے غلط استعمال سے ہچکی - ہچکی کی وجہ سے سردرد -

زنکولس بلب - شراب والے مشروبات کے بعد ہچکی - شرابیوں کی ہچکی بھی ہچکی شدید اینٹھن دار اور ڈکاروں کے ہمراہ -

نیرم میور - شدید ہچکی کے لئے خواہ عادی ہوں یا مہترن خاص طور پر کونین کے زیادہ استعمال کی وجہ سے -

سائیکلیمین - حمل کے دوران ہچکی صبح کے جی متلنے کے ساتھ یا اس کے بغیر کھانا کھانے کے بعد -

سٹرامونیم - گرم مشروبات کے بعد شدید ہچکی ، پانی جیسے تھوک کی موجودگی میں -
ورٹیرم ایلیم - گرم مشروبات کے ہچکی -

آرسنیک الیم۔ سرد مشروبات کے بعد بھکی۔

پلسٹیل۔ ٹھنڈے مشروبات یا تبا کو نوشی کے بعد۔

کاجو پیٹ۔ تھوڑے سے جذبات کی برا نگینگی پر بھکی آئے۔

ایسڈ سلف۔ زبان پر سوجن محسوس ہو حلق اور حلق کا سکڑنا۔

وریرٹم ورائیڈ۔ مستقل بھکی۔ تکلیف دہ خوراک کی نالی کے اوپر والے حصے میں دے۔

بھوک۔ بڑھی ہوئی بھوک یا کم بھوک دیکھئے۔ درد معدہ۔ تیزابیت۔

زیادہ) نمک کے تیزاب کی معدہ میں کمی۔

سٹرکینیم نائٹرکیم۔ کم تیزابیت کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ یہ معدہ کے مواد کو بڑھاتی ہے اور تیزابیت کو بڑھاتی ہے۔

کاربووٹک۔ کم تیزابیت یا تیزابیت نہ ہونے کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔
ہائیڈروسلک ایسڈ۔ مشروبات گئے اور معدہ میں گرگڑا ہٹ پیدا کریں۔ نمک کے تیزاب کی کمی۔ جب معدہ خالی ہو تو درد معدہ۔

تے۔ متلی۔ ناسور۔ تے۔ ناسور پیٹ کے باب

اپریکاک۔ یہ متلی اور تے کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ مزہ تر زیادہ تھوکت

خوراک صُغرا خون اور مواد کی تے۔ بھکی۔ صاف زبان۔ بیہوشی اور حالت نزع۔ معدہ میں خنجر لگنے جیسے درد متلی جس کو تے سے آفاقہ نہ ہو۔ حیض سے پہلے کلیجہ کی جلن اور تے۔
انٹم گروڈ۔ تے سفید فر زبان پر نمایاں علامات ہے، جو نہی مریض کچھ کھانا پیتا ہے۔ تے کر دیا ہے۔ شدید تے جو کسی طرح بھی نہ رکے۔

ایتھوزا۔ بچوں کی تے کے لئے بہترین دوائی ہے۔ بچہ کھانے پینے کے جلد بعد تے کرتا ہے۔ اس کے بعد شدید کمزوری جو اس کی نمایاں علامت ہے۔ بچہ کمزوری کی وجہ سے پیچھے کو

گرتا ہے۔ وہی کی پھیپوں کی طرح کی ہنرتے۔ تے کے فوراً بعد بھوک محسوس کرے۔
 نگسوا میکا۔ پیٹ کے بالائی حصہ میں وزن محسوس کرنا۔ سانس میں دقت کے ہمراہ متلی
 ابکائیوں کے ہمراہ۔ قوبنجی دریں۔ پانخانہ کی حاجت کے ہمراہ جو بہت کم خارج ہو۔ ٹھنڈک
 لانا۔ اور پریشانی۔

فاسفورس۔ صفت معدہ والے مزین تے کرنے والے مریضوں کے لئے بہت ہی مفید دوائی
 ہے۔ ٹھنڈے پانی کی بہت ہی پیاس جوتے سے افاقہ کرتی ہے لیکن جو پانی یہ پانی معدہ
 میں گرم ہوتا ہے تے کر دیا جاتا ہے۔ یہ خونی تے اور معدہ کے السر اور کینسر کے لئے مفید ہے۔
 آئرنس ور۔ بہت ہی کھٹے مواد کی قیس جو دانتوں کی کھٹاس کا باعث ہوں۔ یہ قیس گلے
 کو چھیل کر رکھیں۔ تاروں والا ٹھوک۔

کرڈنلیس ہو ریڈس۔ تے چیش۔ بے چینی کرنے والی متلی اور میٹاب تنگ کرنے والی درد
 کے ہمراہ۔ سیاہ صفراوی تے بڑی مقدار میں۔

کالچیکم۔ پکائی ہوئی خوراک سے متلی اور تے خاص طور پر چربی والا گوشت۔ انڈے
 اور مچھلی، ٹھوڑی سی حرکت سے بھی متلی پیدا کرے۔ دوسرے کمرے میں خوراک کی بو بھی
 یا باد چھی خانہ سے خوراک کی بو بھی مریض میں متلی پیدا کرے۔

لارڈ میریس۔ گرم شود کے قریب آنے پر متلی۔

یو جینیا جیموس۔ متلی جس کو بے کونوشی سے افاقہ ہو

سینگو میریا۔ معدہ میں جلن کے ہمراہ متلی تیز روشنی کی وجہ سے اینٹھن دار در دین۔

طر آمونیم۔ معدہ اور طق میں جلن اور تے۔ چیش۔ دل کمزور اور دل کی دوسری امراض کے ہمراہ
 سو جن، استسقاء، خاص طور پر پاؤں کی سو جن۔

نکشیٹھس۔ متلی اور تے معدہ میں جلن کے ہمراہ۔

کلکیر یا میور۔ ہندی قسم کی تے

ایسڈ کاربولک۔ شرابوں کی تے۔ عام قسم کی تے پیٹ پیٹ کے بالائی حصہ میں وزن کے ہلکے
 معدہ کی جلن۔

قوبکیم - تباکو کے غلط استعمال کی وجہ سے

لکریٹیا پیو - تھے اور متلی شدید قسم کی کھانا کھانے کے بعد حمل کے دوران

سائیکلین - صبح کے وقت اکثر تھے گیس - معدہ میں درد

مینیریم - تھے اور متلی کھانا کھانے کے بعد غائب ہو جائے یا رک جائے۔ میسراب
کی تھے (پانی کی نہیں) کڑوا - ذائقہ ہو۔

سیدیا - کھانا کھانے کے بعد متلی غائب ہو جائے۔ صبح کے وقت زیادہ حیض کے بعد کچھ
کی جلن اور تھے۔

کوکولس - دماغی قسم کی تھے۔ بجائے معدہ کی تھے کے۔ آدھ مہ کے درد سے تھے یا دماغی
پھوڑوں کی تھے، خوراک کا خیال یا دھڑکے سے خوراک کی بڑیا یا اورچی خانے کی بڑیا
مریض میں متلی پیدا کرے۔ اوجھا لولنے سے تھے اور کھانسی لاحق ہو جائے متلی جو سردی میں
محسوس کی جائے۔

روما - اعانے مستقیم میں متلی کا احساس۔

آر جٹم نائیٹ - معدہ کے پرانے ناسور کی وجہ سے خون کی تھے۔

ڈالسکوریہ - کانوں میں متلی محسوس ہو۔

آرینیم البم - حیض کے دوران میں تھے اور کچھ کی جلن۔

کریوزوٹم - تھے اور آبکیاں معدہ کی کمزوری کی وجہ سے جو غیر مضہ شدہ خوراک کو مترا کر دے۔

یانکال دے کھانا کھانے کے کئی گھنٹے بعد یا جب تھے پاخانہ کی بولیا کسی دوسری گندی بولیا

وجہ سے ہو۔ گھنٹہ یا دو گھنٹہ خوراک کھانے کے گھنٹہ بعد تھے متواتر متلی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد بلند

درد اگر نچلی طاقت ناکام ہو جائے تو ۲۰ طاقت دیجئے۔

ویسپا - تھے یا بہوشی گرم سٹو کے نزدیک یا گرم کمرے میں غصہ یا جذباتی برا بھنگی بھی درو لاسکتی

لوسیلیا انفلینا - تھے شدید پسینہ اور تھوک کے ہمراہ۔

تھیرڈرون - شور کی وجہ سے جی متلائے۔

ویلیریانہ - پتھر تے کر دے جو نہی یہ والدہ کے قصہ کے بعد دودھ پئے یعنی اگر والدہ کو قصہ آیا ہوا ہو۔
پتھر دودھ پی لے تو فوراً تے کر دے۔

کیمومیلہ - تے اور تکلیف دہ قتل اور آبکیائیں جو افیون اور مارین کے بعد لاحق ہوں۔
اگیشیا - ناقابل ہضم چیزوں سے تے میں افادہ جبکہ قابل ہضم چیزوں مثلاً دودھ ٹوٹے سے تے ہو۔
بچی گو بھی اکثر ہوا بیاز اور آلو تے بند کریں۔

کرڈن ٹنگ - تے اور شدید تلی، چکر جانے کے ہمراہ شراب نوشی کے بعد زیادتی۔
کیڈمیم سلف - معدہ جواب دے دے، باضمہ بالکل نہ ہو۔ ہر کھائی ہوئی چیز تے کر دی جائے۔
مرضی خاموشی سے لیٹنا چاہے اور آرام سے سوچنا چاہتا ہے۔ وہ تنگ کیا جانا یا بلایا جانا پسند نہیں کرتا۔
سیاہ تے۔ جلدار اور کاٹنے والی درد۔ معدہ میں شدید تلی اور تے۔ معمولی چیز جو ہوشوں کی نکال
جائے تو معدہ میں شدید تلی اور تے۔

لوریکس - متواتر تے۔ کھٹے مواد کی تے۔ گیس پٹ کا تناؤ پر کھانے بعد۔
ایسڈ سلفیورک - کھٹی تیزابی تے۔ ابھی طرح صفائی کے باوجود پتھر سے کھٹی ہوئے۔
نیزم میٹ - خوراک کھانے یا پینے کے بعد کی تے کے لئے بہترین دوائی ہے۔
پلمبیم - پانانہ کی تے۔ (پانانہ کے مواد کی تے)

کرڈنٹیلکس - سیاہ تیس
آرینیکا مانٹ - سیاہ روشنائی کی طرح تے۔ مزہ کڑوا اور عام دکھن۔ سیاہ لوتھرے دار خون

منہ کا پانی

مرک سال - منہ کا پانی اکثر نکلنے متلی کے ہمراہ۔
لیکسس - خراشدار پانی جو منہ کو دکھائے۔
لائیکوپوڈیم - حمل کے دوران میں منہ میں پانی آئے۔ اینٹھن کے بغیر یا اینٹھن کے ہمراہ جی
مثلاً منہ کے ہمراہ یا اس کے بغیر ہضمی میں۔

نکسوا میو کا۔ کیچڑ کی جلن کے بہرہ منہ میں پانی۔ قویخ کے ساتھ بدہضمی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد۔
 میگنیشیا میو۔ سردی کے بہرہ منہ میں پانی۔ درد ہضم نہ کرنا جو درد پیدا کرے۔ گندہ کار۔ معدہ خراب۔
 پلسٹیل۔ حیض کے دوران یا پہلے رات کے وقت منہ میں پانی۔
 پٹرولیم۔ صبح کے وقت جی متلانے کے بہرہ منہ میں پانی
 کاربو انیمیا۔ منہ میں نمکین۔ منہ سے باہر گرے۔
 کیو راس۔ رحم کے ناسور میں۔ منہ میں پانی کی زیادتی۔
 سیلشیا۔ ٹھنڈے لگنے کے ساتھ منہ میں پانی کی زیادتی۔
 سیڈیا۔ شراب پینے کے بعد منہ میں پانی کی زیادتی۔
 برائی اوینیا۔ منہ میں تیزابی پانی۔ بغیر ذائقہ کے ابکائیوں کے بہرہ۔
 چیلیڈونیم۔ منہ میں کڑے ذائقہ والا پانی۔

جگر اور تلی کی تکالیف تیسرا حصہ

جگر کی تکالیف

یہ جیلیڈونیم۔ جب جگر کا دایاں پہلو یا تو متاثر ہو چکا ہو۔ جب بعض دائیں کو میں تکلیف محسوس کرے اور
 چھوٹے پردہ محسوس کرے۔ یہ دوائی یرقان کے لئے ۲۶ طاقت دی جانے مفید ہے۔ جگر کے حصہ میں درد
 جو دائیں کندھے اور چھاتی اور معدہ تک بڑھے۔ یہ جگر کے مرضوں کے لئے مفید ہوتی ہے۔ یہ جگر سے تپا
 اور زیادہ صفرا خارج کراتی ہے۔ یہ جگر میں پتھری کو خارج کرتی ہے اور اس کے بننے کو روکتی ہے۔ درد تیز
 اور بھالا مارنے جیسی گرم مشروبات سے قے کرنے کا رجحان۔
 کارڈس میریا۔ یہ جگر کیلئے بہتر بہترین دوائی ہے۔ جب بایاں کو سوزش زدہ ہو یا متاثر ہو چکا ہو
 یہ مدر نکچ میں ۵ سے ۱۰ قطرے دی جانی چاہیے۔ یہ جگر کے کیسز میں، یرقان، دیسے سردی اور

اور تسلی میں درد کو دور کرتی ہے۔ پیشاب پتھری بڑی مائل زرد۔ جگر کے دھبے اس دوائی کی خاص علامت ہے۔
 مائیکسکایا سیریفیرا۔ یہ ایک بہت اہم دوائی ہے اگر کم استعمال کی جاتی ہے۔ سردی کے برقان میں کارآمد ہے
 دیاسا درد۔ صبح کے وقت زیادتی۔ آنکھیں میلی۔ گندی اور زرد رنگ اور زبان پر زرد فر۔ مریض کمزور
 اور بچوں میں دھن کی نکایت کرتا ہے۔ بازوؤں میں درد دھیمی نبض اور گہرا پیشاب۔ دائیں پسلیوں
 کے نیچے درد۔ جھوک نہ ہو سکے۔ کھٹاس کی خواہش۔ ناسودہ نیند یعنی نیند ٹھکاٹ دور نہ کر سکے۔
 نکسوسو امیکا۔ جگر کی خرابیوں جو کہ شراب والے مشروبات یا بہت ہی بھونی ہوئی خوراک۔ کوئین یا
 جلابوں کے استعمال کی وجہ سے۔ جگر کی خرابی۔ درد تو بڑھ بھی ہو سکتا ہے۔ امیرانہ غذا کے بعد تین
 باضمہ آسانی سے خراب ہو جائے۔ پیاس نہ ہو۔ غصے کے دورے کے بعد ریتان۔ وہ عموماً صبح کے
 وقت زود حس اور ناراض ہوتا ہے۔ نا اُمیدی اور جگر میں نامکمل صفرائانے کی وجہ سے یہ فان۔
 کالی آئیوڈ۔ آتشک کے تیسرے درجہ میں جگر کا بٹھ جانا۔

ریفینیس۔ جگر میں سوئی لگنے جیسی درد۔ ابکیاں اور قش جھوک کا نہ رہنا۔ تناہوا پیٹ۔
 ڈھول کی طرح کسا ہوا۔ سخت۔ نان کے گرد اکٹھا ہوا ہوا پیٹ۔

واپیرا۔ بڑھ ہوئے جگیش شدید درد۔ یرقان اور بخار کے ہمراہ۔ درد جگر سے کندھے تک
 اور نیچے کو ہلے تک غونی پاخانے۔

تھیرڈ رن۔ جگر کا پھوڑا۔ جگر کے حصہ میں شدید جلن دار درد۔ ابکیاں اور مفروہی تے۔
 لیکس۔ جلن دار اور حاد درد جگر میں جو معدہ تک جائے۔ جگر کی سوزش اور نرم ہو جانا۔
 جگر کا پھوڑا۔ پتے کی پتھری۔ پیٹ سخت اور تناہوا۔ دباؤ برداشت نہ کر سکے۔

لایسکو پوڈیم۔ جگر چھوٹے پر حاس ہوا اور اسمیں تناؤ کا احساس۔ درد دھیمے اور مسلسل
 تیز اور بھالا لگنے جیسے دردوں کی بجائے جیسے کہ چیلیدو نیم میں۔ تھوڑا سا کھانے پر بعد
 کا پُرجانا۔

سلفر۔ یہ ایک مل انجینر دوائی ہے اور اسے شفا کو مکمل کرنے کیلئے دینا چاہیے۔ یہ صفرائے بہاؤ
 کو بڑھاتی ہے۔ جگر میں شدید تسکلیف اور دھن ہوتی ہے۔

فاسفورس - جگر کی چربی کی تنزیل دیکھن اور یرقان کے ہمراہ - پاخانے صبورے مائل سفید ہوں -
یہ جگر کی خبیث بیماریوں میں مفید ہے -

پشلیا - جگر کے حصّہ درد اور وزن - بائیں جانب لیٹنے سے بہت زیادہ جو کھینچنے کا احساس پیدا کرے -
آرم آرسینکم - جگر کے حصّہ میں لاغری یا کمزوری - ہیٹ کے تناؤ کے ہمراہ یا اس کے بغیر - جگر کا سخت
ہو جانا - ہیٹ کی جلد کی خارش -

نیرم سلف جگر بہت بڑھا ہوا - گنٹھیاوی طبیعت - جگر کے علاقہ میں دیکھن - منہ میں بڑا ذائقہ -
ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے - ریڑھ کے آخری ہمرہ میں (کوئی) میں درد -
مرک سلف - جگر کا بڑھ جانا پتہ پر گوشت - بخار - جگر میں درد - پاخانے سیاہ قبض - بڑا ذائقہ -
جسم میں جلن کا احساس -

ٹارکسیکم - جگر کے علاقہ میں درد اور دیکھن اور صفراوی پھشش - نقشے دار زبان اور کڑوا ذائقہ -
منہ کا کھانا کھانے کے بعد سردی - بڑا سخت جگر تلی اور جگر کے علاقوں میں درد - انگلیوں کے نزل
پر ٹھنڈک کے ساتھ -

بیلشیا - چھوٹے بچوں کے جگر کے لیے بچہ کو پاخانہ نہ آئے اور اکثر ملائے - سر پر پینہ ۲۰۰ قطرات
یا ایک ہزار قطرات میں دیجئے -

چوننتھس - جگر کا بہت بڑھ جانا اور اس میں رکاوٹ قبض - مٹی کے رنگ کے پاخانے بنزین یرقان -
آرم سیکم البم - جگر کا بڑھ جانا اور اس میں درد، کونین کی وجہ بخار کے دب جانے کی وجہ سے کھانے کے
بعد ۲ دن میں ایک خوراک دیجئے -

آرسینکم سلف رمبرم - پتہ کی تھری قولنج بخار کے ہمراہ -
مرک آیوڈ - جگر بڑھ جانا پتہ پر گوشت کے بن جانے کیساتھ - رائی کے تیل کی طرح کا پیشاب - بہت درد
ایک دن میں ایک خوراک دیجئے -

فیرم آیوڈ - جگر اور تلی کا بخار کے بغیر بڑھ جانا -
فیرم آرسینکم - جگر اور تلی کا بخار کے ساتھ بڑھ جانا -

کلکیر یا آریسینکیم۔ بچوں میں جگر کی خرابیاں۔۔۔ ۲۰ یا اس سے زیادہ طاقت میں استعمال کیجئے۔
اویسجم۔ جگر سست قبض کے ساتھ!

چائنا آف۔ جگر کے علاقوں میں درد جسے کہ کھال کے نیچے ناسور سے ہو۔ پھوٹنے پر زیادتی، جلد زرد
آنکھ کے پردے میں بلیا ہٹ۔ پتے کی پتھری کی دہر سے درد۔ سو جا ہوا سخت جگر۔
پلوڈو فائیلیم۔ کمزور جگر یا نرسن جگر میں اتھار خون جب پچش کے پہلو ہو۔ جگر سو جا ہوا اور خناسن۔
برائی او نیا۔ جگر سو جا ہوا۔ جگر میں اجتماع خون اور سو جا ہوا۔ جگر کے علاقہ میں تکلیف یا درد
حرکت پر زیادتی۔ درد والی طرف لیٹنے سے افادہ۔

پتے کی سوزش۔ پتھری والے کیلے پتے کی پتھری دیکھئے
بغیر پتھری کے۔

چیلیڈونیم۔ دائیں کندھے میں درد متواتر صبح کے وقت صفراوی قے کے ساتھ ہی مٹتا ہے۔
بالائی پیٹ کے حصہ میں درد جس کو کھانا کھانے سے عارضی افادہ ہو۔ پیٹ تنا ہوا قبض سخت مٹی
کے مٹی رنگ کے رنگ پاخانوں کے ساتھ اور پچش اول بدل کر۔ معتد کی مارش۔ چشاب
گہز درد اور جھگ دار۔ کھانا کھانے۔ دباؤ اور گری اور صبح کے وقت زیادتی۔ کھلی ہوا اور مٹن
طرف لیٹنے سے افادہ ہو۔

کارڈس میور۔ جگر اور صفراوی نالی پر مخصوص عمل۔ بائیں طرف درد پسلیوں کے نیچے۔ الچی قسم
کادمہ۔ چکر پیچھے کی طرف گرے۔ قبض سخت گانٹھ دار یا خانہ بڑی مشکل سے خارج ہو یا پچش
شراب کی طرح کا چمکدار یا خانہ۔

پلوڈو فائیلیم۔ پیٹ کے بالائی حصہ میں درد۔ تنا ہوا پیٹ اور اس میں غلاؤ کا احساس۔
کھٹی خوراک یا تیزابی خوراک کی خواہش۔ پانی کی زیادہ مقدار میں زبردست خواہش کے پہلو پچش والے
درد، سبز پانی جیسے، بہت زیادہ گندے پانی کی جیٹ کی طرح خارج ہوں قبض سے بلیں جیسے
کہ چیلیڈونیم میں۔

بیچو متھس۔ جگر کی خرابیاں۔ پکریاز کی بیماریوں کے ساتھ سخت پیاس کے ہمراہ۔ بہت زیادہ گہرا پیشاب۔ صفراوی دھبوں اور گلوکوز کے ہمراہ۔ جگر کے علاقہ میں ذرن اور ریتان اور قہص کے ہمراہ لیٹنڈرا۔ میلبے کے بعد جگر کی تکالیف۔ جگر کا بڑھ جانا۔ دل کی دھڑکن درد کے ساتھ۔ نیچوالی کے ہمراہ چکر۔ آگے کی طرف ہتھوڑا لگے جیسی درد۔ بہت زیادہ جھپٹ جس میں گہرا خون ہو۔ خون کی بواسیر۔ مقعد باہر نکلے یا خروج مقعد۔

مائیٹریکا سسر لھرا۔ ریتان جس میں ذرن میں بہت کمی ہو۔ دما اور واضح کمزوری۔ کینٹیوں اور ماتھے میں درد سر۔ کروڑا ذائقہ شدید جی متلانے کے ہمراہ۔ مہاگنی کے رنگ جیسا گہرا پیشاب۔ صفراوی نمکیات کے لٹکنے کی وجہ سے جلدی خارش۔ ترش خوراک کی خواہش۔ کھانا کھانے کے متلی زیادہ ہو۔ چلنے سے افاقہ ہو۔

کولیسیٹرمین۔ مزمن سوزش پتہ۔ جگر میں اجتماع خون کے ساتھ کینسر سے پہلی حالت یا کینسر کی حالت میں جگر کے علاقہ میں جلن دار درد جو دائیں کندھے تک پھیلے۔ شدید کمزوری طاقت کی کمی۔ کئی خون کے ساتھ۔

پتے کی پتھری

چیلیڈونیم۔ پتے کی پتھریوں کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ اگر کافی عرصہ تک لی جائے یہ ان پتھریوں کو خارج کرتی ہے اور ان کی پیدائش کو روک دیتی ہے۔

کولیسیٹرمین۔ یہ پتے کی پتھری کے درد کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اجتماع خون اور اور پتے کے قتل کے دوہم برہم ہونے کی وجہ بخار کو ٹھیک کرتی ہے۔ (نوٹ)۔ روغن زیتون پتے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ یہ نصف پینٹ، روزانہ لیا جانا چاہئے۔ روغن زیتون پیچھے اور اس کے فوراً بعد لیمو کارس۔ تین چار منٹ بعد اور روغن زیتون پیچھے۔ اسی طرح دیکھئے حتیٰ اگر نصف پینٹ روغن زیتون اور رس لیموں آخر میں ختم ہو جائے۔ رس لیموں روغن زیتون کو مضام کرنے میں مدد دیتا ہے اور جی نہیں متلائے گا۔ یہ طریقہ استعمال کرنے سے ایک روز میں پتھری کو نکال دیگا۔

بعض اوقات یہ علاج دو تین دن بھی جاری رکھنا پڑتا ہے۔

بربرس و لگڑیوں۔ پتے کی پتھری کیوجہ سے درد۔

چیمو نٹھس ورجیکا۔ صفراوی درد تو لچے۔ پتے کی پتھری کا درد صفرا کو مائع میں تبدیل کر دیتا ہے۔

پتھری کو نسنے سے روکتا ہے، پہلے سے بنی ہوئی پتھری کو خارج کر دیتا ہے۔ طبرانی کی جگہوں میں جگر کی

رکاوٹ دور کرتا ہے۔ قبض، پانخانہ مٹی کے رنگ جیسا۔ زرد جلد۔ پیشاب تقریباً سیاہ۔

کارڈس میریانس۔ جگر ادبلی کا ٹھہر جانا، پتے کی سوزش۔ پتے کی پتھری کا درد۔ صفراوی بخار۔

پانخانہ سخت۔ شکل سے خارج ہو۔ کانٹھ دار۔ پچھش سے آدلی بدل کر آئے۔

گلکیریا کارب۔ پتے کی پتھری کا درد۔ پیٹ میں جڑی کا اجتماع۔ تھوڑے سے دباؤ کیلئے بھی حساس۔

جب تک لگا کر کھڑا ہو تو جگڑیں درد۔ چڈے اور مینزک خدوہ سوچے ہوئے اور پردرد

بائیڈراسٹس۔ پتے کی پتھری کا درد۔ ٹیچوں کی طاقت کمزور، نظام انہضام بگڑا ہوا، خدوی قبض۔ جگڑا ہوا۔

چائنا۔ جگر کے علاقہ میں درد نیسے کہ جلدی پھوڑے میں ہو، چھوٹے پر زیادہ ہو۔ آنکھ کی پتلی۔ اور

جلد زرد پتے کی پتھری کا درد۔ سوجا ہوا سخت جگر۔ پتے میں پتھریوں کو حل کر دیتا ہے۔ پتے کی پتھری کا

درد۔ یرقان۔ یہ جگڑیں اجتماع خون۔

مینگنم۔ یہ تندرست صفرا میں پتھریوں کو حل کر دیتا ہے۔ پتے کی پتھری کا درد۔ یرقان۔ یہ جگڑیں اجتماع

خون اور گوشت کے بننے کو روکتا ہے۔

نیرٹم سلف۔ پتے کی پتھری کا درد بدھیمی کے بعد لاحق ہو۔ پتے کے علاقے میں درد۔ پیشاب کرنے

کے بعد قطرہ قطرہ پیشاب۔ دائیں طرف کی درد جو چھاتی تک جائے۔

نیچول کا یرقان

بجیلیڈونیم۔ اس دوائی کے ساتھ علاج شروع کیجئے اور موزوں وقت میں خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا یہ پتے

کی حالت پر منحصر ہوتا ہے (پتے دی گئی ادویات دیکھئے۔

نیمس و امیکا۔ پانخانہ کسٹ اور آہستہ۔ نیم زرد رنگ اور چلائے۔

کانسونیا۔ نمایاں زردی۔ پاخانہ گہرا دار اور دہی کی طرح۔
مرکب سال۔ اگر یقان کے ہلکے، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے۔ تمام اخراجات اور پیشاب بہت ہی رنگدار
چیونٹھتھس۔ جب پیشاب صفرا سے پُرسندیدہ زرد پُین اور پھکدار۔

یرقان

سلفر۔ یرقان کا علاج ہمیشہ سلفر سے شروع کیجئے۔ یہ دوائی مکمل شفاء کے لئے بھی دی جانی چاہئے۔
اور اس دوا کی ۲۰۰ طاقت استعمال کیجئے۔

چیلیڈونیم۔ ایک دن کے بعد سلفر کے بعد یہ دوائی دی جانی چاہئے۔ یہ یرقان کے لئے مخصوص دوا
ہے۔ ۶ طاقت میں دیجئے۔ آنکھ کا پردہ زرد رنگ کا۔ ذائقہ کڑوا۔ زبان کا رنگ گہرا سرخ۔ دبلنے پر
جگہ دکھے۔ بھورا سرخ پیشاب۔ ہلکے مٹی کے رنگ کے پاخانے۔

مائیکریکاسیریفرا۔ ہننے والے یرقان کے لئے اہم دوائی ہے۔ صبح کے وقت دھیماسردرد۔ آنکھوں
کا رنگ گندہ غلیظ۔ زبان پر زردی۔ مریض کمزور اور پٹھوں کی کمزوری کی شکایت کرتا ہے۔ بازوؤں
میں درد نبض سُست اور گہرا پیشاب۔ دائیں طرف پسلیوں کے نیچے درد۔ بھوک نہ ہو۔ ترش چیزوں کی
خواہش۔ نیند سے تارگی نہ آئے یا نیند سے تھکاوٹ دور نہ ہو۔

ہائیڈراسٹس۔ سردی کا مرکب یرقان۔ تیز سوئی چھینے جیسی دردیں بہت زیادہ لیسڈا روا ہے
متلی اور قے۔ جگر کا گھٹ جانا۔ زبان سوچی ہوئی دانتوں کے نشان سفید یا زرد فر کے ساتھ۔
چیونٹھتھس۔ ہننے والا یرقان گڑبڑا ہٹ کے ساتھ۔ ہر گری میں پلٹ کر آنے والا یرقان۔ مٹی کے رنگ
کے پاخانے کے ہمراہ قبض۔

مرکب سال۔ یرقان کے لئے ایک نمایاں دوائی ہے۔ نبض تیز۔ آنکھ کے پردے کا زردی مائل رنگ
کی ہلکی تہہ زبان پر قبض۔ زرد اور خشک پاخانے۔ پاخانہ پتلا۔ گہرے زرد رنگ کا۔ پسینہ بہت زیادہ
جس سے افادہ ہو۔ افرازات بڑھے ہوئے خاص طور پر تھوک۔ زبان ڈھیلی ڈھالی۔ دھاتی ذائقہ
جگر کے علاقہ میں حساسیت جو کم سوچی ہوئی ہو۔ اور سخت ڈنگ لگنے جیسی اور سوئی چھینے جیسی درد۔
پلوڈوفائسلم۔ بھڑپ کا احساس۔ تیز اور کاٹنے والے درد جگر کے علاقہ میں۔ گارھے صفرا اور خون کی

بعض اوقات یہ علاج دو تین دن بھی ماری رکھنا پڑتا ہے۔

برسر رک و لگس ہیں۔ پتے کی پتھری کی وجہ سے درد۔

چینو منٹھس در جھیکا۔ صفادی درد قونچے پتے کی پتھری کا درد صفرا کو بائیں میں تبدیل کر دیتا ہے۔

پتھری کو نٹنے سے روکتا ہے، پہلے سے بنی ہوئی پتھری کو خارج کر دیتا ہے۔ میمرای کی جگہوں میں جگر کی

رکاوٹ دور کرتا ہے قبض، پانانہ مٹی کے رنگ جیسا۔ زرد جلد۔ پیشاب تقریباً سیاہ۔

کارڈس میمرایس۔ جگر اور تلی کا ٹھہر جانا، پتے کی سوزش۔ پتے کی پتھری کا درد۔ صفادی بخار۔

پانانہ سخت۔ مشکل سے خارج ہو۔ گانٹھ دار۔ پچھش سے آدل بدل کر آئے۔

کلکیر یا کارب۔ پتے کی پتھری کا درد۔ پیٹ میں جڑی کا اجتماع۔ تھوڑے سے دباؤ کیلئے جی مناسب۔

جب میک لگا کر کھڑا ہو تو جگر میں درد۔ چڈے اور میز نرک غدد دوسرے ہوئے اور پُر درد

ہائیڈراسٹس۔ پتے کی پتھری کا درد۔ ٹھچوں کی طاقت کمزور، نظام انہضام بگڑا ہوا، خدی قبض۔ جگر گھٹا ہوا۔

چاننا۔ جگر کے علاقے میں درد نیسے کے جلدی پھوڑے میں ہو، پھوڑے پر زیادہ ہو۔ آنکھ کی پتلی۔ اور

جلد زرد پتے کی پتھری کا درد۔ سوجا ہوا سخت جگر پتے میں پتھریوں کو حل کر دیتا ہے۔ پتے کی پتھری کا

درد۔ یرقان۔ یہ جگر میں اجتماع خون۔

مینگم۔ یہ تندرست صفرا میں پتھریوں کو حل کر دیتا ہے پتے کی پتھری کا درد۔ یرقان۔ یہ جگر میں اجتماع

خون اور گوشت کے بننے کو روکتا ہے۔

نیرم سلف۔ پتے کی پتھری کا درد بدبضی کے بعد لاحق ہو۔ پتے کے علاقے میں درد۔ پیشاب کرنے

کے بعد قطرہ قطرہ پیشاب۔ دائیں طرف کی درد جو چھاتی تک جائے۔

نیچول کا یرقان

چیلیڈونیم۔ اس دوائی کے ساتھ علاج شروع کیجئے اور موزوں وقت میں خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا یہ بچے

کی حالت پر منحصر ہوتا ہے (نیچے دی گئی ادویات دیکھئے۔

نمکس و امیکس۔ پانانہ سست اور آہستہ۔ نیم زرد رونا اور چلائے۔

کالنسونیا۔ نمایاں زردی۔ پاخانہ گہوارا اور دہی کی طرح۔
مرکب سال۔ اگر یقان کے ہمارے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے۔ تمام اخراجات اور پیشاب بہت ہی رنگدار
بیچونٹھس۔ جب پیشاب صفرا سے پُر شدہ زرد پُین اور چمکدار۔

یرقان

سلفر۔ یرقان کا علاج ہمیشہ سلفر سے شروع کیجئے۔ یہ دوائی مکمل شفاء کے لئے بھی دی جانی چاہیے۔
اور اس دوا کی ۲۰۰ طاقت استعمال کیجئے۔

چیلیڈونیم۔ ایک دن کے بعد سلفر کے بعد یہ دوائی دی جانی چاہیے۔ یہ یرقان کے لئے مخصوص دوا
ہے۔ ۶ طاقت میں دیجئے۔ آنکھ کا پردہ زرد رنگ کا۔ ذائقہ کڑوا۔ زبان کا رنگ گہرا سرخ۔ دہانے پر
جگہ دکھے۔ بھورا سرخ پیشاب۔ ہلکے مٹی کے رنگ کے پاخانے۔

مائیریکا سیریفرا۔ ہننے والے یرقان کے لئے اہم دوائی ہے۔ صبح کے وقت دھما سر درد۔ آنکھوں
کا رنگ گندہ غلیظ۔ زبان پر زردی۔ مریض کمزور اور پھول کی کمزوری کی شکایت کرتا ہے۔ بازوؤں
میں درد نبض سُست اور گہرا پیشاب۔ دائیں طرف پیسیوں کے نیچے درد۔ بھوک نہ ہو۔ ترش چیزوں کی
خواہش۔ نیند سے تازگی نہ آئے یا نیند سے تھکاوٹ دور نہ ہو۔

ہائیڈراسٹس۔ سردی کا مرکب یرقان۔ تیز سوئی چھینے جیسی دردیں بہت زیادہ لیسڈاوا ہے
متلی اور قے۔ جگر کا گھٹ جانا۔ زبان سوچی ہوئی دانتوں کے نشان سفید یا زرد فر کے ساتھ۔
بیچونٹھس۔ ہننے والا یرقان گڑبگڑا ہٹ کے ساتھ۔ ہر گرمی میں پلٹ کر آنے والا یرقان۔ مٹی کے رنگ
کے پاخانے کے ہمارے قبض۔

مرکب سال۔ یرقان کے لئے ایک نمایاں دوائی ہے۔ نبض تیز۔ آنکھ کے پردے کا زردی مائل رنگ
کی ہلکی تہہ زبان پر قبض۔ زرد اور خشک پاخانے۔ پاخانہ پیلا۔ گہرے زرد رنگ کا۔ پسینہ بہت زیادہ
جس سے افاتہ ہو۔ افزائت بڑھے ہوئے خاص طور پر تھوک۔ زبان دھیلی ڈھالی۔ دھاتی ذائقہ
جگر کے علاقہ میں حساسیت جو کہ سوچی ہوئی ہو۔ اور سخت ڈنگ لگنے جیسی اور سوئی چھینے جیسی درد۔
پلوڈو فاسلم۔ بھڑپن کا احساس۔ تیز اور کاٹنے والے درد جگر کے علاقہ میں گارھے صفرا اور خون کی

تھے۔ گلے ٹرے انڈوں جیسے ڈکار۔ قبض اور اسہال اول بدل کر۔
 ڈیجیٹلس۔ دل کے پٹھوں کی کمزوری۔ جگر کے بڑھنے اور سختی کی وجہ سے یرقان ہست و قف دار
 نبض۔ بہت ہی رنگدار کم مقدار میں پیشاب دل کی تکالیف کے ہمراہ یرقان کے لئے مفید دوائی ہے۔
 نکس و امیکا۔ بولاس اور قبض کے رجحان کے ساتھ یرقان۔ گنداپھمپوندی جیسا یا کراوا ذائقہ خوراک
 سے نفرت جگر کے علاقہ میں تبکین دار درد غشی کے دورے۔

ٹیلیائی۔ جگر میں اجتماع خون، معدہ میں جکڑن اور کپڑن نہیں جھنکی۔
 کیمو میلہ۔ غصے کے دورے کی وجہ سے یرقان یا کسی بھی غیر ضروری رائیغشگی کی وجہ سے یا جذبات
 کے درجہ برہم ہونے سے جگر میں اجتماع، بھوک کا نہ ہونا۔ مٹی گندہ اور چکنا ہٹ والا ذائقہ سیٹ
 میں چٹکیاں بھر پور مردہ والی جیسی دریں۔

مہلک یرقان

فاسفورس۔ مہلک مرض ابتداء میں۔ جگر کے بڑھا جانے اور اس کی سختی میں جگر کی مادہ کمزوری۔ جگر کے
 علاقہ کی بیماری۔ مہلک یرقان۔

لیکسس۔ کئی خون والے، اعصابی درد اور حس لوگوں کے لئے مفید ہوتی ہے۔ سونے کے بعد۔
 گرم مشروبات پینے کے بعد اور گرم کمرہ میں زیادتی ہوں۔ پیشاب بھالدار۔ گہرا تقریباً سیاہ۔ تمام جسم میں
 جلن اور خارش۔ تمام وریدوں کے راستوں پر نیلا پن۔

آرینک الیم۔ مہلک یرقان کی آخری سیس میں۔ بے چینی کے ساتھ سنجار اور پیاس تھوڑے تھوڑے
 وقفے پر تھوڑے تھوڑے پانی کی۔

تلی کی تکالیف

سینو تھس۔ تلی کے بڑھ جانے کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ یہ عام طور پر مددکنچ کے تھروں کی
 صورت میں استعمال کی جاتی ہے۔ تلی کے علاقہ میں گہرائی پر درد۔ گہری سوئی چھیننے والی نندار
 موسم میں زیادتی۔ سردی کے دورے اور بخار۔ یہ تلی ہوئی اور اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تلی۔

چائنا۔ تلی کے بڑھ جانے میں دوسری بڑی دوائی جب تلی میں اجتماع خون ہو۔ سوزش اور سوئی
جھنجھے درد تلی میں کھینچنے والے شدید بخار کی وجہ سے۔

ارانیڈ آئیڈیما۔ تلی کا بڑھ جانا۔ مزین میلبا کی وجہ سے کاہلی کُستی اور متواتر سردی لگنا مفید ہے۔
کیپسکیم۔ حساس۔ سوئی ہوئی اور بڑھی ہوئی تلی کے لئے بہتر ہے۔

سیکینم ایڈ۔ تلی کی حالت اور فعل کو درست کرنے کے لئے ابھی دوائی ہے۔

برائی اونیا۔ تلی کی سوزش اور اجتماع خون۔ سوئی جھنجھے جیسی اور بھانسنے والی در دیں جن کو حرکت پر
زیادتی ہو۔ آرام سے افاتہ ہو۔

لیکسس۔ تلی کی سوزش خون پہنے کا حجان کے ساتھ۔ کسے ہوئے کپڑے اور کسی سوئی پٹیاں
برداشت نہ کر سکے۔ تلی کے علاوہ میں شدید در دیں۔

امعائے مستقیم اور پاخانہ

پھوٹھا جھٹھ

ناسور

ایومنا۔ امعائے مستقیم میں ناگوری اکاؤ یعنی ناسور، پاخانہ۔ کے بعد در دعام طور پر بلض
قبض میں مبتلا ہوتے ہیں۔

رُوتا۔ امعائے مستقیم کا ناسور۔ پاخانہ کے گھنٹوں بعد تک درد جاری رہے۔

ایسڈ ناٹرک۔ جب ایومنا ناکام ہو جائے تو یہ دوائی استعمال کی جائے بہت مفید ہے۔

سکریہنم۔ یہ دوائی بطور عمل انجیز استعمال کی جائے جب مذکورہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں۔

ہیضہ

کیمغورا۔ مدر کلچر کا ایک قطرہ ایک خوراک میں بطور حفظ ماقدم اور ابتدائی درجہ میں علاج کیلئے

یہ ایک بہترین دوائی ہے۔ جبکہ تے اور اسہال شروع ہو چکے ہوں۔ ابتدائی حالت میں دل کا ڈوبنا۔

ٹھنڈک اور اچانک پسینہ جو کمزوری لاحق کر دے۔ مریض بہت ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اخراجات کم۔

چہرہ کی خشکی اور نیلاہٹ ہوتی ہے۔ قے کرنے یا اسہال خارج کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ گرمی سبب آفاقہ معده اور غوارک والی نالی میں جلن۔ پسینہ نہ ہو لیکن نہ ٹھنڈے والی پیاس۔

دریٹرم ایلیم۔ ہیضہ کی دوسری سیٹیج جب اسہال اور قے شروع ہو چکے ہوں۔ پاخانہ پہلے پیٹ میں درد۔ پاخانہ کے بعد شدید درد و کمزوری۔ ٹھنڈا پسینہ اور جسم کی سطح ٹھنڈی۔ اندرونی جلن کا احساس۔ دریٹرم کی نشاندہی کے لئے پیٹ میں ضرور درد ہونی چاہیے۔ نمایاں یا زیادہ اخراجات۔

کیو پریم پیٹ۔ انگلیوں اور پنجوں میں شدید شدید انہٹن کے دورے۔ جسم کی سطح پر ٹھنڈک جلد کی نیلاہٹ۔ منہ کی خشکی اور پیاس پیٹ کے بالائی حصہ میں شدید درد۔ قے کی لاشا حاصل کوشش یعنی قے کرنے کی کوشش کرے لیکن قے نہ کر سکے۔ قے اور اسہال دریٹرم جتنے ہی رکھتا ہے لیکن ٹھنڈا پسینہ نہیں ہوتا۔

ایتھونزا۔ سی۔ پنجوں کا ہیضہ جو ایک آتا ہے۔ بچہ بچہ دو دو ہوتا ہے قے کر دیتا ہے اور تب اس کو شدید کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ دو دو کا کچھ حصہ دہی کی صورت میں اور کچھ حصہ مائع کے ہمراہ تیزا۔ زردی مائل لیسار پاخانہ کے ساتھ۔

آر سینک الیم۔ پنجوں میں جب ایتھونزا نام کا مہلے تو ہیضہ کے لئے بہترین دوائی ہے۔ غیر مضبوط پاخانہ اور تیزی سے کمزوری ہو۔ بٹوں میں ہیضہ کے لئے دریٹرم کی مانند ہے۔ سوائے اس کے کہ اس میں بے چینی زیادہ اور پسینہ کم ہوتا ہے۔ تھوڑے تھوڑے پانی کے لئے پیاس وقفوں کے بعد۔ شدید قے اور اسہال بہت زیادہ بدبودار زرد یا بھوئے اسہال۔

کارلوو تچ۔ یہ مرض کے آخری سیٹیج کی دوائی ہے۔ جب مریض آرام سے لیٹ جائے بہت کمزوری۔ ٹھنڈا سانس، نبض کمزور تیز ہو اور دھماکے کی طرح باریک۔ قے اور اسہال نہ ہوں اور نہ ہی درد یا دورے ہوں۔ مرض جسم کو کھوڑ چکی ہوتی ہے لیکن کمزوری شدید تر ہوتی ہے۔ بہاد کی دوسرے مریض غیر مرزا تھی سیٹیج تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔

ہائیڈرو سائیک الیڈ۔ یہ دوائی حالت نزاع میں جب تمام اخراجات رک جائیں کارلوو تچ کے برعکس غشی کے دورے اور قہقہے دورے رکھتی ہے۔

الیٹریم۔ بچوں کا بیضہ۔ زیتون کے تیل کی طرح سبز پانی جیسے پاخانے جو زور سے نکلیں۔

لیکس۔ جلن کے ساتھ جو تھوڑی سی بھی سخت کے ساتھ پھرے جاری ہو جائیں۔

سیکلکار۔ آخری شیج کی دوائی ہے جب مریض ٹھنڈا رہا پسند کرتا ہے۔ مریض تقریباً بغیر مض کے اور ٹھنڈا لیکن ڈھانپنے جلنے سے نفرت کرتا ہے۔

جڑوفا۔ بیضہ تار دار تے۔ البیومن پلا مواد۔ شدید کمزوری، تے اور اسہال اور چا دلوں کی پیچ

جیسے پاخانے۔ ایٹھن اور ٹھنڈک۔ یہ بیضہ کی مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔

قبض

نکس و امیکا۔ دُبلے تے مریض انتہائی زرد رنگ جو آواز اور ہوا کے جھونکوں سے متاثر ہوں بہت زیادہ پاخانہ زیادہ جلاب لینے پر۔ پاخانے درد والے بہت دباؤ کے ساتھ۔ تمباکو۔ کافی۔ شراب کے زیادہ استعمال کی وجہ سے قبض۔ قبض غیر تسلی بخش حاجت کے ہمراہ۔ یہ سست عادات والے لوگوں میں ہوتی ہے۔ ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ طاقت میں دتہجے۔

برائی اونیا۔ پاخانہ خشک جیسے کر جلا ہوا پیاس کے ساتھ۔ قبض جس سے اپند کس کا درد ہو۔

گرم موسم میں قبض ہو پاخانہ بہت سخت اور آٹول کے بغیر۔

الیومنا۔ انٹرپوں کی خشکی اور ان کی حرکت در راگیر نہ ہونے وجہ سے جب بہت سا پاخانہ اکٹھا

نہ ہو جائے پاخانہ کی خواہش اور حاجت نہ ہو۔ بہت دباؤ کوڈ کی سیٹ پر جم کر بیٹھنا پیر کے پاخانہ

پاخانہ سخت۔ گرہ دارانرم۔ معتد سے چپک جائے۔ پاخانے کی تھوڑی سی یا بالکل خواہش نہ ہو۔

امعائے مستقیم کا مکمل جمود کہ نرم پاخانہ بھی بہت مشکل سے خارج ہو۔ پاخانہ سخت اور گرہ دار

بھیر کی میٹلینوں کی طرح۔ منہ خشک اور زبان زرد حس اس دوائی کی رہنمائی کرتی ہے۔ شدید فہشی

یابوی، بھوک کی کمی حمل کے دوران قبض۔

سپیا۔ عزیں جن میں پیڑ و پر شے کی طرف شدید دباؤ جو امعائے مستقیم تک بڑھے۔ پاخانہ کی ناکام

کوشش۔ زور لگائے مگر پاخانہ نہ آئے۔

ایتنا کارڈیم - جب امعاء مستقیم باریکیم میں پاشانہ کی لاماصل خواہش ہو۔ پاشانے کے امعاء مستقیم باریکیم پر دباؤ۔ ٹکس و امیکا میں دباؤ۔ پیٹ پر محسوس کیا جاتا ہے۔

اوپیم - انٹریوں کے کام نہ کرنے کی وجہ سے قبض۔ پاشانہ کی خواہش نہ ہو۔ جب پاشانہ آئے تو رینخت خشک سیاہ گولیوں کی طرح۔ انٹریوں کی خشکی اور ان کا کام نہ کرنا انہیں پایا جاتا ہے، منہ اور معدہ کی خشکی مریض کئی روز تک پاشانہ نہ کرنے پر بھی۔ تکلیف محسوس نہیں نہ کرنا۔ پاشانہ کی حاجت ہی نہ ہو۔

پلمیم - مزین قبض کیلئے سوئی کی دوائی ہے۔ یہ اوپیم کی قبض کی طرح ہے لیکن اس میں انٹریوں میں کچھ عمل ہوتا ہے۔ پاشانہ کی خواہش ہوتی ہے لیکن بہت دقت سے پاشانہ آتا ہے۔ بچوں کا عمل مست اور انٹریوں کے غدد کے افرازات کم ہو جاتے ہیں۔ پاشانہ سخت اور ڈھیلوں کی طرح جو تھوڑے دال سے لائیکوپلوڈیم - سخت قسم کی قبض۔ پاشانہ کی لاماصل خواہش۔ معدہ میں تیزابیت اور جلن کو دکھانے سے آفاقہ ہو۔

سلفر - قبض۔ پاشانہ سخت۔ گرو دار خشک جیسے کہ جلا ہوا ہو۔ بڑا تکلیف دہ۔ بچہ تکلیف کی وجہ سے پاشانہ جانے سے ڈرتے۔

گریشی ادلا - ناسور کی قبض۔ امعاء مستقیم باریکیم گھٹا ہوا۔

کاربو انیمیس - قبض۔ مریض محسوس کرے کہ پاشانہ خارج ہوگا۔ لیکن منہ ہوا خارج ہو۔

سیلینیم - قبض۔ پیٹ مشکل سے منہ بیکانی انداز ہی سے خالی کیا جاسکے۔ بہت ہی مشکل سے پاشانہ آئے اپنے بڑے سائز کی وجہ سے مقعد کو پھاڑ دیں۔ پاشانے میں بالوں کی طرح دھلگے۔

مفلینیم - ساروں کی خدہ کی قبض۔ امعاء مستقیم رسیوں سے بندھی ہو۔ جب انہیں کیا جائے تو پاشانہ نکلنے کے ساتھ دروازہ جیسا درد ہو۔

نیٹرم میور - جب پاشانہ سخت اور ٹراٹرا ہوا۔ امعاء مستقیم خشک پاشانہ مشکل سے خارج ہو۔ خون جاری ہو جائے ریکیم میں تناؤ اور دکھن پاشانے کے بعد۔

گریفٹائٹس - پاشانہ کی خواہش نہ ہو۔ قبض کے ساتھ۔ کئی دنوں تک پاشانہ کی حاجت یا خواہش نہ ہو۔ جب چہرہ پر بڑھی بڑی پھنسیاں ظاہر ہوں۔ بواسیر کے ساتھ اور جیسے جو مجلس دکھیں اور ان پر

ناقابل برداشت عداوت برداشت عداوت ہو۔ پانخانے کے مقصد میں درد گرفتاریوں کی عمومی ادا کی اور ان کے
 آسانی سے اس دوائی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پسندار باد سے ٹھہرے ہوئے پانخانے۔ یہ ان عورتوں کے
 لئے موزوں ہے جو پانخانے جانے کے لئے رستی کرتی ہیں۔ مریض بہت ہی حسی۔ اضمحلال اپنی توجہ
 کو مرکوز کر کے۔ صبح کے وقت اٹھنے میں دقت محسوس کرے۔

پلاٹینا۔ اس قسم کی قبض مسافروں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والے لوگوں میں زندگی کے
 معمول میں تبدیلی آنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پانخانے کی اکثر خواہش لیکن کم پانخانہ اور شکست سے
 کی زبردستی بعد جب کس دایکا ناکام ہو جائے۔

دریڑم ایلیئم۔ انٹریوں کی مکمل ناماقتی یا شدید ناماقتی یا کلوری۔ امعاء مستقیم میں بہت سا
 پانخانہ جمع ہو جائے۔ مریض کوشش در کوشش کر لے اور اکثر پسینے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن آخر
 کوشش چھوڑ دیتا ہے اور مصنوعی طریقہ سے پانخانہ خارج کیا جاتا ہے۔

سٹانم میٹ۔ آرام کے دنوں کے بعد قبض۔

پلوڈوفائلم۔ مزمن قبض امعاء مستقیم یا کیکم یا مقعد کے خروج کے برابر۔

لیکٹیک ڈیفلو۔ قبض جہاں امعاء مستقیم خارج زندہ معلوم ہو۔ پانخانہ کافی ندر لگنے کے باوجود
 اندر ہٹ جاتا ہے۔

میگنیشیا کارب۔ مریض نے ہونے اور بیمار بچے جو خوراک اور درد دھپنے سے انکار کر دیں کیونکہ
 یہ چیزیں لینے سے ان کے معدوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اسہال میں مبتلا ہوتے ہیں

پانخانے، سوکھا سان یا سوکھے کے مریض ہوتے ہیں۔

کاسٹیک۔ کھڑے ہو کر بہتر پانخانہ خارج کر کے۔

میدورنیم۔ پانخانہ خارج کرنے کے لئے پیچھے کی جانب جھکتا ہے۔

میگنیشیا میور۔ پانخانہ سے پہلے عقیقہ وہ خواہش۔ پانخانہ کے بعد مقعد میں ملن۔ انٹریوں کی کڑی
 اور شانہ کی کڑی۔ چشما صحت پنچہ کی طرف جھکنے اور پیٹ کے ٹھوں کو دبانے سے خارج ہو سکتا ہے
 بھلنے کے وقت نکالنے کے زمانہ میں قبض مگیس۔ بڑے بڑے جلاب۔ بے سخت گو دار پانخانہ لیکن کوئی
 تکلیف نہ دیں۔

ایسٹریا آر۔ خدّی قبض۔ ۱۲ سے ۱۵ دن کے پانخانہ ہوں۔
 ایون۔ کئی دن تک پانخانہ کی خواہش ہی نہ ہو۔ خدّی قبض جس کے ہمراہ منگی تھے ایکایاں۔
 ہائیڈرکسس قبض کے لئے ۹ طاقت میں ۲ قطرے فی خوراک دن میں ۲ بار۔
 امبرگر لیسیا۔ بڑھے لوگوں میں پرانی قبض۔ خاص طور پر جب ان کے قریب کوئی اور پتہ پانخانہ نہ ہو۔
 سینکولا۔ قبض۔ پانخانہ بڑا اور سخت جو خارج کرنا مشکل ہو۔ کافی دباؤ ڈالنے کے بعد پتہ پانخانہ
 باہر نکلتا ہے واپس جلا جاتا ہے جو میکانی طریقہ سے نکالا جاتا ہے۔ کئی ایچ لیسیا پانخانہ جس کو
 خارج کرنے کی زیادہ کوشش کی ضرورت نہ ہو۔
 سلیمشیا۔ سخت بدبودار پانخانہ۔ اکثر سخت اور شکل خارج ہوں۔ بہت بدبودار یا ج
 خارج ہو۔ پیٹ سخت اور سوجا ہوا۔
 ٹیرٹولا، سپانیولا۔ پرانی قبض، بے چینی کے ہمراہ مریض ایک کوٹ سے دوسری کوٹ بدلتا ہے
 یا لڑھکتا ہے، جو بے چینی کو افاقہ دینا ہے۔

اسہال

نکسوامیکا۔ یہ دوائی حاد قسم کے کیسوں میں جب ہلکے یا بلائیں زیادہ خوراک کھانے سے
 اسہال ہوں ۹x طاقت میں ۲ قطرے جانی چاہئے۔
 ایلو۔ جب مریض کو پانخانہ پر کنٹرول نہ ہو اسے الیرین کی طرف دیر کرنا چاہئے۔ پانخانہ پانی کے
 تل میں سے پانی کرنے کی طرح خارج ہوں۔ ناف کے گرد کاٹنے والے درد انیٹھن وار درد پیٹ میں
 کھانے اور پینے سے زیادہ ہوں۔ پیٹ کے ساتھ پانخانہ کی حاجت ہو۔
 ارگوٹین۔ جب اعصاب متعین یا یکٹیم میں احساس ختم ہو جائے۔ اور مریض کو تیرہ ہی نہ بل کے کہ
 کبھی صاف اور پاک نہ رہ سکے۔ ۲x طاقت میں دینے۔
 ہائیوسائیمس۔ پیٹ کرتے وقت بلا ارادہ پانخانہ خارج ہو جائے۔ اخراج ملا درد۔
 آرکیکم الیم۔ جہاں شدید، بے چینی، سخت اذیت اور ناقابل برداشت درد تھوڑے تھوڑے وقفوں

پر تھوڑی تھوڑی پانی کی شدت دیا پس۔ پاخانہ کی مقدار تھوڑی لاغری اور کمزوری اس کی نسبت سے بہت زیادہ۔ معویہ میں ٹھنڈک کی وجہ سے اسہال طیریا کی نوعیت کی ٹھنڈک یعنی رطوبت کا طیریا کی وجہ کا دنیا۔
 ورم طیریا۔ بہت زیادہ پاخانے۔ بے چینی۔ زیادہ مقدار میں پانی کی بہت زیادہ پیاس۔ پاخانہ کے بعد بہت زیادہ کمزوری۔ ٹھنڈے پسینے۔ ٹھنڈک اور عام جسم کی نیلاہٹ۔
 ایسٹیک الیڈ۔ دقت میں اسہال۔ اسہال پتلے خون آئینہ یا خون۔ بوایسر سے بہت زیادہ خون، غریب اسہال۔
 الیوننا۔ ایک دن چھوڑ کر اسہال۔

فلورک الیڈ۔ ایک دن چھوڑ کر شام کے وقت اسہال۔

برائی اونیہ۔
 اگنیثیا۔
 کالو شتھس۔
 شیفسگر یا۔
 کروٹن ٹیگلم۔ اس کی تین اہم نشانیاں۔

(۱) پاخانے نرم اور پانی کی طرح پتلے۔ (۲) اچانک گولی کی طرح خازج ہوں۔ (۳) کھانے پینے سے زیادہ۔ نرم پتلے پاخانے نرم سے باہر نکلیں۔ اس کے ساتھ تسلی اور قے۔ گرم پانی سے آفاتر ہو۔ ہر حرکت سے پاخانے آئیں۔

فائٹولا کا۔ دانت نکالنے کے زمانہ میں اسہال۔ مسوڑھوں اور دانتوں کو چبانے والی قابو میں نہ آنے والی خواہش۔

ٹیرٹولا ایج۔ جو خبی سردھویا جائے پاخانہ آجائے۔

پیٹرولیم۔ دن کے وقت اسہال رات کے وقت آفاتر جب کھانسی جاری ہو ہمیشہ قدرہ وقت پر اسہال۔
 آرچٹم نائٹریم۔ کھنڈ اور مافی کھانے سے اسہال۔ جذبات کی وجہ سے اسہال۔
 مرک ڈلس۔ بچوں میں سبز اسہال۔ آرچٹم نائٹریم اور اپیکاک بھی دیکھے۔
 نمکس مارکٹا۔ حمل کے دوران اسہال۔

اولینڈر۔ بلارادہ اسہال۔ معدی کی تکلیف۔ تھام انہضام درہم برہم اور خوراک مکمل طور پر غیر معیشتو خارج ہو جاتی ہے۔ ہوا کے ساتھ پانخانہ خارج ہوتا ہے۔

تھو جہا۔ صبح کے وقت اسہال، پیٹ میں گڑگڑاہٹ کے ساتھ جیسے کہ ہوا بند ترن میں جی بانی گلابا ہا۔
ٹرا میڈیم۔ اسہال کیلئے بہترین دوا کی ہے۔ جب کھانے پینے سے اسہال میں زیادتی ہو۔ پانخانہ سے پہلے۔ دوران میں اور بعد میں انٹیکشن دار درو۔ یہ عجیب بھی کھتی ہے۔

ڈبجی ٹلیس۔ یرقان کے دوران اسہال، سفید چاک کی طرح، راکھ کی طرح، پکچھ والے پانخانے۔
سینی کو لہا۔ جتنی دفعہ خوراک کھائے، اتنی بار پانخانہ آئے۔ کھانا کھانے کی میز سے فوراً پانخانہ کیلئے جانا پڑے۔ پانخانہ کو روکنے کے لئے ٹانگیں ایک دوسرے پر چڑھائے۔ مقعد کو بند کرنے والے ٹپے پر قابو نہ ہو۔ اکثر کھڑے دھڑتے ہوئے یارات کے وقت پانخانہ خارج کر دے۔

الٹو نیا کون۔ غیر معیشتو خوراک کے اسہال خوراک کھانے کے فوراً بعد کھانا مکمل کھانے سے پہلے ہی میز پر آٹھٹا پڑے۔ ہلکا سا بخار بھی آجانا۔

مرک کار۔ طاقت سے نکلنے والے اسہال۔

گوانیم۔ اسہال غیر معیشتو خوراک خارج ہو جائے۔ صبح کے وقت اسہال، کئی خون دلا۔
گرم مرلیض گنٹھادی بھی۔

آر جینٹ میٹ۔ زہنی کام کی زیادتی کی وجہ سے اسہال۔

چبار واکر س۔ اسہال اور عجیب۔ حاد یا مزمن، جب دوسری دوائیاں ناکام ہو جائیں۔

گرنفیلڈس۔ بہت زیادہ بدبودار پانخانے جو سلسلہ گھریں بدبودار پانخانے پھیل جائیں، مابن کے ٹکڑے جیسے۔
بنزداک الیڈر۔ بھورے مواد کے پانخانے غیر معیشتو چیزوں کے ساتھ ناقابل برداشت بدبودار ہوا۔
کونیم۔ ٹھنڈے پانخانے کے ہمراہ اسہال۔

ڈلکا مارا۔ پہاڑوں میں اسہال کے لئے مخصوص جب ٹھنڈے کی وجہ سے اسہال ہوں۔

سفلینیم۔ اسہال جن کو پہاڑوں پر جانے سے اتفاق ہو۔

سورائٹیم۔ گلے اندوں جیسی بودالے اسہال۔ بہت ہی بدبودار۔ گندے اندے جیسے ڈکار۔

سوزا غنیم - گلے انڈوں جیسی بڑے اہمال، بہت ہی بدبودار۔
 سیلشیا - دودھ پینے سے اہمال، ٹھنڈے ٹھنڈے لگنے اور پانی جیسے اہمال لیڈا رزبیا زرد۔
 آئرس اور - جب اہمال پانی جیسے ہوں اور مقعد کو جلائیں جیسے کڑا لگی ہو۔ منار و خورگ کی
 نالی میں جلن، بتلی کے ہلو۔

سپٹسمین - کیمپ کی زندگی میں یہ دوائی جادو کی طرح اثر کرتی ہے۔
 رپوڈ وینڈرون - ٹھنڈے مقدار موسم میں اہمال اور طوفان برق و باران میں دوبارہ ہوتا ہے۔
 آرنیکا - رات کے وقت بلا ارادہ پانا خانے۔
 کیغورا - مرض کے شروع میں حالت نزع۔

گریشی اولہ - موسم گرما کے اہمال - زرد - زرد سے نکلنے والے اور پانی جیسے معلوم ہو جیسے کٹانی
 کے نلی سے پانی خارج ہو۔ پانی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے پیٹ میں ٹھنڈک کا احساس، ہینز رنگ خدود
 کی سوچن۔

لیاٹرس پائیٹاٹا - مزمن اہمال، کیمپ کی زندگی۔
 مگنیشیا کارب - زرد اور بیاض بچے جو دودھ یا خوراک کھانے کے بعد اہمال میں مبتلا ہو جائیں۔
 وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیں کیونکہ اس سے ان کے معدے میں درد ہو جاتا ہے اور سبز پانے آتے ہیں
 سوکھاپن یا سوکڑا - پانا خانہ منہ جھاگدار جیسے کہ بوڑھے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے۔
 سلفر - صبح کے وقت اہمال عام طور پر جب مریض اٹھنے کے متعلق سوچتا ہے۔ آدمی رات اور صبح
 کے درمیان پانا خانے بدبودار اور پانا خانوں کی بدبو مریض کا بچھا کرتی ہے جیسے کہ وہ پانا خانے سے تھرا ہوا ہے۔
 بطور علی ایگر دوائی کے استعمال کر لی چاہیے۔

بوڈو وناٹیل - کیمپ کے اہمال، نامان پانی پینے سے۔ پانا خانہ بہت ہی بدبودار۔ صبح سویرے
 پانا خانہ پانی کی طرح لیڈا ریا چکے والا۔ زرد یا ناہضم ہونے والا۔ طاق سے خارج ہو۔ صدق
 پانا خانہ دن میں خارج ہو۔ پانا خانہ بلا درد۔ خاص طور پر بچوں میں خدای اہمال کے کیوں کیلئے۔
 ایسڈ فاس - اہمال پانی کی طرح پتلے اور بغیر تکلیف خارج ہوں۔ بعد میں مریض افادہ محسوس کرے۔

مقدار کا پھلنا اور بڑھنا اور پانچ بار ملا کر دیکھنا کافی دیکھنا اسہال کی دوا کرنی۔

بیم کا رب - درجہ پینے سے اسہال - اس کے ہمراہ دل کی دھڑکن بھی ہو۔

بیم کا رب - کوکاپینے یا چاکلیٹ کھانے سے اسہال -

سٹس کینا - مزمن اسہال غدد کی اور بیٹ کی سوجن کے ہمراہ بول کی یا بغیر بی کی کے رہوں۔

اوہیم - ڈرکی وجہ سے جب تواتر ڈر پیدا کرنے اور ذہن کے ساتھ ہی ہر ہو۔ خوشی میں اسہال

درمیرم الیم - ڈرکی وجہ سے جب سردی سے ہمراہ

اوسٹیم ٹائٹرم - جب جذبات کی برائیگی سے اسہال ہوں جب آہستہ سے کھیل گیا ہو بچوں میں

بزی اہل اسہال - جب والدہ نے بہت بڑی مقدار میں کھانا کھائی ہو۔

پلسٹیل - جب اسہال بنز، زرد، ایسدار حرارت کے وقت زیادہ ہوں۔ بغیر میں اسہال -

جٹوفا - اسہال اور تے - دل کی دھڑکن شدید ٹھنڈے جسم اور نپڑلیوں میں انٹھن کے

ہمراہ ایک ہی وقت میں تے اور اسہال - جیسے کرائشیائی ہضیہ میں ہوتے ہیں۔

یوفوریا کو رولٹا - تمام جسم پر ٹھنڈا پسینہ کے ساتھ اسہال اور تے - خاص ذہنی حالت مرض

مرجانا چاہتا ہے -

چائنا - تپ پانی جیسے بلا دریا خانے پیٹ میں گرگڑا ہٹ کے ساتھ کافی پیاس اور تمام

جسم پر پسینہ کھانا کھانے پر زیادتی خاص طور پر چل کھائے رات اور صبح سویر زیادتی ہوتی ہے۔

ریلوم - کٹھے پانچے اور تمام جسم سے کھٹاس کی بوا اس دوائی کی نمایاں علامات ہے۔ یہ بزرگبار

اور جوڑکی جھاگ کی طرح بنز پانچے ہوئے ہیں۔ مندرجہ بالا علامات کے ساتھ یہ دوائی بچوں

کے لئے خاص طور پر بوز دل ہے۔

کلگیر یا فاس - کٹھے اور غیر مضمر شدہ پانچے بچوں میں خاص طور پر جب بچہ دانت نکلانے

کے دور سے گزر کر رہتا ہے۔ آواز پیدا کرتے ہوئے اسہال پانچہ ناشتہ کے بعد اسہال - اسہال

جو ملات کے ساتھ خارج ہوا اور آواز پیدا کرے۔ یہ پانی کی طرح بنز اور غیر مضمر شدہ اسہال کہہ ہیں۔

لوریکس - پیشاب کرنے سے پہلے پانچہ ناشتہ کے بعد اسہال -

سٹر انشیا۔ رات کے وقت بڑی شدت سے اسہال۔ مریض شاید ہی لیٹیں چھو کہ کچھ بکارت ہو جائے۔
 فاسفورس۔ مزمن اسہال کے لئے، سبز مواد والے پاخانے جو صبح کے وقت زیادہ ہوں۔ اکثر غیر ہضم شدہ
 اور پلادر پاخانے چاولوں جیسے سفید باتوں جیسے ذرات رکھتے ہوں۔ پاخانے کے بعد معدہ کھلی رہی۔
 کیسٹورم۔ پتے جو گرمیوں میں سبز پاخانوں میں مبتلا ہوں۔ اعصابی قوی۔
 کالومنتھ۔ شدید درد قوی کے ساتھ اسہال۔ دباؤ سے اناتہ اور جذباتی برائیگی سے زیادتی
 صفراوی افزائت دور سے دار دروں کے ہلکے۔

فیرم میٹ۔ مریض کھانا ختم ہونے کا بھٹکل انتظار کر کے کہ پاخانے کی حالت ہو جائے۔ یہ تقریباً
 کھانے پینے کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں۔ پاخانے غیر ہضم شدہ خوراک اور اکثر رات کو۔ مزمن کیوں میں پلادر ہوتے۔
 گیمبوجیا۔ بوڑھے لوگوں کے اسہال۔ شدید عوارش اور پاخانے ایک ہی وقت میں بڑی طاقت
 کے ساتھ خارج ہوتے ہیں اور اس کے بعد کون آجاتا ہے۔

نیرم سلف۔ سبزیوں، پھلوں، پیٹریوں ٹھنڈے مشروبات اور غذا سے اسہال۔ یہ صبح کے اسہال
 جب مریض رات سے اٹھنے کے بعد تھوڑا سا چل پھرے۔ یہ سلف سے مختلف ہے۔ جہاں پاخانے کے
 خواہش صبح اٹھنے سے پہلے اٹھنے پر مجبور کر دے۔ پاخانہ کرتے وقت گڑگڑاہٹ اور بڑبڑکی آواز
 تب اچانک زیادہ آواز سے خارج ہو۔

الیٹریٹیم۔ زیتون جیسے سبز پاخانے۔ بہت زیادہ اور زرد سے خارج ہوں۔
 ابروٹینم۔ اسہال اچانک بند ہو جائیں جن کے بعد بواسیر اور حاد گنٹھیا۔ اسہال اور قبض اول
 بدل کر خاص طور پر بچوں کے اسہال کے لئے۔

کیمومیل۔ جب بچہ پاخانہ خارج کرتے وقت جاگ جائے تکلیف کی وجہ سے ہر وقت اٹھایا جاتا
 پسند کرے۔ سبز پاخانے۔ پانی کی طرح کے۔ پھیلین دار اکثر سے ہوئے اندڑوں کی طرح کے۔ کھٹی بو
 والے۔ دانت نکالنے کے دوران درد سے چلائے۔ کھانا کھانے پینے اور کھلونوں سے انکار کر دے۔
 میگنیشیا کارب۔ ہر تیسرے ہفتہ اسہال۔ پاخانے سبز۔ تھگادار۔ جو بڑی سبز تھگادار۔ درد
 بغیر ہضم ہوئے خارج ہو جائے۔ اسہال سے پہلے کھانے والا درد تمام بچے سے کھٹی بو لگے۔

ریوم۔ مشکل سے دانت نکالیں بچے بے چین۔ زرد رنخ۔ پڑ چڑا۔ زرد چہرہ اور تمام جسم سے
کھٹی بو کے بہارہ دھونے اور نہانے کے بعد بھی بچے کھٹی بو آئے۔ کھوٹری پر تنو تر بہت زیادہ پڑے آئے
فاسٹولا کا۔ دانت نکالنے کے دوران اسپہال جن میں مسوڑھوں اور دانتوں کو کاٹنے کی تدابیر
میں آنے والی خواہش ہو۔

ایسٹیک میڈ۔ شدید کمزوری کے ساتھ بچوں کے مزمن اسپہال۔

ایلیم سیدیا۔ بد ہضمی تھے اور گیس۔ بدبودار گیس خارج ہو۔

میڈورنٹسم۔ بچوں میں اسپہال بنی مائل زرد یا خاٹوں کے۔ شدید بدبودار۔ ملا دارہ اسپہال۔
پانی کی طرح کے لیسدار دہی کی طرح کے۔ گلے ٹڑے انڈوں جیسی بو۔ خون اور سیک بہت زیادہ خارج۔
گھٹی گھٹی۔ نان کے گڑھلے والی در دیں۔ بچہ چلائے اور کر رہے جس کے بعد پانے فاج
ہوں اور افاقہ ہو جائے لیکن کچھ دیر بعد بھر عود کر آئے یعنی مندرجہ تکلیف شروع ہو جائے۔

اکوئائیٹ نیپ۔ جب بچہ پانی پیے اسپہال میں چلائے اور بہت شکایت کرے ٹھیکوں
کو کاٹے اور بے خونی ہو۔

ایپس ایم۔ بچوں اور بہت چھوٹے بچوں میں خاص طور پر مفید ہے جس میں خاص قسم کا پانخانہ
خون ملا۔ مواد اور خوراک ملا جیسے کٹاڑ کی چٹنی۔

تیمپش

سلفر۔ یہ دوائی بطور عمل انگریز کے ۲۰۰ ملٹ میں استعمال کی جائے۔ حاد یا مزمن کیڑوں
میں اس کی ایک ہی خوراک مطلوبہ نتائج حاصل کرے گی۔ یہ تین یا چار روز بعد دہرائی جاسکتی
ہے اگر کھلی خوراک نہ کچھ اثر کیا ہو۔

مرک کار۔ تیمپش کیے چوٹی کی دوائی ہے۔ یہ پانخانے میں خونی علامات کے ساتھ بار بار پانخانے
کی تکلیف دہ حاجت رکھتی ہے۔ یہ شدید اور انتہائی تکلیف دہ بار بار پانخانے کی حاجت جو
شدید تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پانخانے کم لیسدار مواد کے گڑھے۔ خون زیادہ یا کم مقدار میں ہو سکتا ہے۔

یہ دوائی خونی بچیش میں بھی مفید ہوتی ہے۔ معقد میں جلن۔ پاخانے سے پہلے اور بعد میں تکلیف دہ کیفیت۔

مرکب سال۔ جب خون نہ ہو اور بچیش میں لیسدار مواد ہو یہ مرکب کار کے مقابلے میں ہلکی بچیش کے لئے موزوں ہوتی ہے۔

تھوجا۔ ایسائی بچیش کے لئے شاندار دوائی ہے جبکہ سلفر اور دوسری علائقی تمام ادویات ناکام ہو جائیں۔

کاربالک الیڈ۔ لیسدار مواد دوائی بچیش نمایاں کمزوری اور ٹھنڈے پسینے کے ہمراہ۔
چیار دامرگاس۔ مزمن یا حاد بچیش جب اسہال اور بچیش میں عام ادویات ناکام ہو جائیں۔
کالو سنقص۔ بچیش میں پاخانے سے پہلے تکلیف دہ حاجت۔ دہرا ہونے اور دباؤ سے تکلیف میں افتاد۔

ٹرا میڈیم۔ جب بچیش کھانے اور پینے سے زیادہ ہو۔ پاخانے سے پہلے اور دوران میں اینٹھن دار در دیں۔

کالچیکم۔ موسم خزاں کی بچیش کیلئے انتہائی مفید دوا ہے۔ سفید مواد کے اخراج کے ہمراہ شدید تکلیف۔ خونی بچیش، لیسدار مواد کے ساتھ ملا ہوا۔

سنا بیرس۔ بچیش جو ہر رات کے وقت زیادہ ہو۔ خونی مواد والا پاخانہ کافی طاقت لگانی پڑے۔ اسہال بننا ماننے کے ہمراہ جورات کو زیادہ ہوں۔ پاخانے کے دوران معقد باہر نکلتے۔
سٹریپٹو کین^{۲۰}۔ خونی بچیش جراثیمی قسم کی بہت زیادہ خون اور بخار کے ہمراہ خون میں زہر کی ملاوٹ کے ساتھ۔

شیفلو کو کین^{۲۰}۔ مزمن قسم کی بچیش۔ خون اور پیپ کے اخراج کے ہمراہ۔
سپینین۔ کیمپ کی زندگی میں جادو اثر برائے بچیش یہ کیمپ اسہال کو رفع کرتی ہے۔
ٹیٹھینا۔ آسٹریوں اور قولون کی سوزش۔ حسیں میں آسٹریوں سے خون ہے اور ان کا نامور۔

کروٹیلےس۔ زہریلی قسم کی پیمیش جس میں بہت زیادہ گہرا مواد۔ خون اور ملا اردہ پانخانے
 ہیں۔ شدید کمزوری اور غشی۔ پیشاب کی کم مقدار۔ گہرا سرخ۔ خون کے ہمراہ
 کیسکریلا۔ پانخانے گرو دار مواد سے لھڑے ہوئے۔ درد مین کے ہمراہ۔ وریڈوں کی بیماریوں۔
 کی وجہ سے اکثر درد رنگ کا خون اترتوں سے ہے۔ یہ بلایمیر کا خون نہیں ہوتا یا اترتوں سے۔
 لینڈرا۔ پانخانے سیاہ گہرے۔ گول تار جیسے بدبودار۔ غوطی لیسدار مواد۔ امعانے مستقیم سے کسی
 چیز کے گزرنے کا احساس۔

نکسوامیکا۔ پانخانے کی اکثر خواہش جو پھی اترتوں حرکت کریں۔ لاعامل پانخانے کی خواہش۔
 ایلواریس۔ جب پیٹ کے پچھلے حصہ میں پکڑنے والی تکلیف ہو یا پانخانے سے پہلے جس کے ساتھ
 خون اور لیسدار مواد آئے عام طور پر چیلی کی طرح لیسدار مواد بڑی مقدار میں خارج ہوتا ہے۔
 رہوڈنڈران۔ طوفان برق و باران سے پہلے یا دوران میں پیمیش یا ٹھنڈے مندار موسم میں۔

بدبھمی

نکسوامیکا۔ نہ ہضم ہونے والی خوراک سے اینٹھن اور دور سے دار درد۔ گیس۔ تے اور
 قبض۔ شراپیوں کی بدبھمی۔ خوراک ہضم ہو مبنے پرانفا۔ سلفر سے اول بدل کر اسہال اور تے
 کے لئے دیں۔

کاربووکیج۔ بہت زیادہ گیس۔ ہوا کے ڈکار۔ پھاتی میں کاٹنے والے درد تیزابیت اور ڈھیلا
 پانخانے۔

ایس کین۔ گوشت۔ اچار اور دوسری خراب خوراکوں کی شدید خواہش کرنا۔ جھوک اور پیٹ
 کے بلانی حصہ میں تھپی کا احساس۔

سٹانم۔ اعصابی بدبھمی میں جب تلی اور تے ہو خوراک کی بُرے۔

کامبلک ٹیڈ۔ شراپیوں میں شدید درد کے ساتھ اعصابی بدبھمی۔

روڈیسیا۔ تیزابیت کے ساتھ بدبھمی۔ معدہ میں درد کھٹی قیس۔

سلیسک الیڈ - گندے ڈکاروں کے ساتھ بدبھنی - بہت زیادہ گیس کا اجتماع - معدہ کی تیز ہیت، متلی منہ آنا اور متھوک -

امیگڈیلیس پریگیا - اسہال اور تھ

ایلیم سیٹاٹو - بوڑھے، بحیم و تخیم لوگوں میں بدبھنی، متھوری سی خوراک کی بڑھتی سے نظام کا سلیکم - اعصابی بدبھنی، پیچینی پیکر نروالی گیس - دل کا پھٹکن - زندگی سے مایوس -

کالی کارب - بدبھنی ایک عجیب علامت جیسے کر پیٹ کے اوپر والے حصہ میں کوٹرنڈوں کا احساس مریض سے جسم کا چھو جانا بھی برداشت نہیں ہوتا -

کروٹیلیس - زہریلی قسم کی پھپھش جس میں بہت زیادہ گہرا مواد - خون اور بلا ارادہ پاخانے -

میگنیشیا میو - بدبھنی، گیس، قبض، بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ میں -

لینڈرا - صفراوی تھ - یہ پاخانے - ماتھے میں دھیمی درد جیسے کہ اس کے گرد پٹی بندھی ہوئی ہو -

مرک سال - زرد، ڈھیلی ڈھالی زبان - بدبو دار سانس - ہلکے پاخانے کم حوصلگی -

کلیر یا کارب سبب ہلکم بھوک یعنی لامعدہ دھوک - سفید تر چرمی زبان - کلیجہ کی ملین - مزہ پانی -

دودھ موافق نہ آئے - بالائی پیٹ کی سوزش - کپڑے تنگ برداشت نہ ہوں - پیٹ تھسا ہوا اور سخت بدبو دار سفید پاخانے -

سینگو نریا - زبان پر زرد یا سفید تہہ - ناقابل ہضم اشیاء کی خواہش - مصالحہ دار خوراک کی

خواہش - بدبو دار ڈکار - متلی جس کو تھ سے افلا تھ نہ ہو - متھوک زیادہ - کڑوی قہیں سردی کے ہمراہ

جلندار باد یا معدہ میں خالی پن کا احساس - پیٹ کے بالائی حصہ میں دکھن -

پلسٹیل - جرمیلی غذا کھانے سے معدہ کے مواد کا درجہ ہوجانا - زبان بھر پر اور حصار متلی بہت

کھتے کے ہمراہ - کلیجہ کی ملین - درد نہ ہو - تھاکا احساس کپڑے ڈھیلے کرنا پڑتا - پاخانے ڈھیلے یا ہمارے

انٹم کوڑو - زبان دودھ کی طرح سفید - ہولکے ڈکار اور کھائی ہوئی خوراک کا گندہ ذائقہ -

لایکو پوٹیم - مزہ پانی - زبان پر سفید تہہ - گیس - انتڑیاں تھیں ہوئی کپڑے کا دباؤ برداشت نہ کر کے

قبض - تھمدار پیشاب - کھانا کھانے کے بعد شدید نہیںد -

اینا کارڈیم۔ کھانا کھانے کے بعد علامات غائب ہو جائیں اور دوبارہ ۲ گھنٹوں اور پھر تکالیف واپس آجائیں۔ (نکس وایک کے اُلٹ جس میں بعض خوراک ہضم ہونے پر اچھا ہو جاتا ہے)
ایس نائیکلر۔ بدہضمی ایس احساس کے ساتھ جیسے کہ بعض نے کوئی ناقابل ہضم شے نگلی ہو۔
جو معدہ کے اوپر والے سوراخ میں پھنس کی ہو۔ کم حوصلگی۔ مرقی حالت قبض اور بدہضمی۔ پیچھے پٹوں سے خون آنے کے ساتھ تباہ کیا جائے نوشی کی وجہ سے بدہضمی۔
نکس ماسکٹا۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد خراشدار مواد منہ کو چڑھے۔ کاٹنے والے درد۔

بدبودار پاخانے اسہال بھی دیکھئے

پلوڈو فائیلیم۔ گلے میں گوشت کی طرح کے پاخانے۔ بدبودار بیٹوں میں دہائی بیضہ کے اسہال گرم موسم میں زیادہ۔ کھٹے ہوا کے ساتھ بیٹوں میں گھگھیا ہٹ اور بہت پیاس۔
لیکس۔ مڑھ جیسا نیند۔ نیند کے دوران زیادتی۔
ایلیومنا۔ جیرے قبض کے ہمراہ اور بہت دباؤ کے ہمراہ بلغمی جھلی موٹی اور سوجی ہوئی۔
پلاٹینا۔ مقعد میں چیر جن میں ہر شام کیڑے ریگیں اور خارش ہو۔
تھوہا۔ بوا سیر۔ پاخانے کے دوران شدید درد چلتے وقت شدید ملین چھونے پر احساس ہو۔
بروئرس ولگیرس۔ اندرونی اندھا چوڑا جس میں سے گاڑھی زرد پپ نکلے مقعد ملین کا احساس۔
لیکس۔ جب چیروں پر تھوڑے گلے جیسی درد ہو۔

ناسور

نائیرٹک ایسٹ۔ اس مرض کی چوٹی کی دوائی ہے۔ یہ ہر ہفتہ ۲۰ طاقت میں دی جانی چاہئے بجلی انٹروں میں دکھن اور ملین۔ تینا ستر ماہ کافی مقدار میں ناسور میں سے ہے۔
سیلتیا۔ جب بدبودار بانی کی طرح کا ناسور میں سے اخراج ہو۔
بروئرس ولگیرس۔ ناسور میں درد جو مقعد میں ہو، صفراوی ملائم کے ساتھ اور تمام حصوں میں خارش بھی ہو۔

لیکس - ناسور میں درد جیسے کہ تھوڑے سے پیٹے گئے ہوں۔
ایسڈ فلور - آنسوؤں اور دانتوں سے اخراج کے ہمراہ۔
بسیلیم - آتشکی اور پارے کی تاریخ اگر بھی طرح منتخب شدہ ادویات فائدہ دیتی
تو بطور عمل انجینر دوائی کے استعمال کرتی جاسکتی ہے۔

کلکیر یا سلف - تکلیف دہ پھوڑا مقعد کے قریب۔ پیپ دار بھی لیڈر چھڑکا اخراج۔
کاسیکم - ناسور اور بواسیر، امعاء مستقیم دکھانے والے میں ملن ہو۔
ہائیڈراسٹس - مقعد میں ناسور اور بواسیر۔ مڈی قبض۔ امعاء مستقیم میں جلن اور کھن
بواسیر اور غشی کے دورے۔

سلف - مقعد کے اوپر کی طرف بھالانے جیسے درد خاص طور پر پاخانے کے بعد۔ اندھا ناسور بغیر
درد کے بڑی نابل زرد اخراج۔ بھوک نلگے گلے میں سرسٹ کے ساتھ۔ ناک کا زکام پیشاب میں
بورٹ۔ فاسفیٹ اور اگر الیٹ کا اخراج۔

کلکیر یا فاس - خاوری اشخاص میں چھاتی کی علامات سے ادل بدل کر اور ایسے لوگ جن
میں موسم کی تبدیلی پر جوڑوں میں درد ہو۔
کیلنڈر والا لوشن - ایک اونس پانی میں ایک ڈرام کاوشن بنا کر مقعد پر لگایا جائے۔

جریان خون

ہیما میلس - جب گہرے رنگ کا خون پاخانے کے ساتھ خارج ہو بغیر کسی تکلیف کے۔
فاسفورس - جب گیس کے اخراج کے ہمراہ خون خارج ہو۔

لیکس - جب حیض کے دوران خون خارج ہو۔
امونیا کاربا - پاخانے کے بعد خون خارج ہو۔

سینگونیریا - انٹریوں سے خون کا اخراج جو جوخوں کے لگانے بعد خارج ہو۔

فائبرک الیٹ - جب مقعد سے بغیر کسی عام دیر کے خون بہان کیلے ہوئی ادویات ہیں۔
میوٹیک الیٹ

کر دیکھیں۔ جب خون زیادہ ایسڈ اور آلودہ ہو کر نکلتے والے سوراخ سے زیادہ تاروں کی تعداد ہلکے۔
 ٹیڑھ بن جھٹکا۔ معقدے خون اور بوائے خون نہیں۔ پیشاب میں البیومن اور خون ہو۔ پیشاب شدید
 بدبو دار آنتوں کا ناسور۔

آنتوں کا ناسور

ایسٹیک ایسڈ۔ خونی پھٹنے یا خالص تیلے خون کا ہنا۔ بوائے کی وجہ سے بہت زیادہ خون ہے۔

بوائے

سلفر۔ جب جلن دار درد اور قبض پاخانہ کی لامحالہ حاجت ہو۔ خونی یا بغیر
 نمکس و امیکا {خون کی بوائے کے لئے چوٹی کی ادویات ہیں۔ گندھک ۱۰۰۰ طاقت برابہ ایک غوراک ۱۰۰
 کے لئے دو دن پہلے اور دو دن بعد کوئی دوائی نہیں دی جانی چاہیے۔ باقی دنوں میں نمکس و امیکا ۲۰
 دن میں تین مرتبہ دی جائے۔

ہیما میلنس۔ بلا تکلیف خون ہے جس سے بہت زیادہ کمزوری ہو خون کے بہاؤ کے مقابلہ میں
 خون گہرے رنگ کا۔ کئی خون سانس کا آنا۔ کمزوری اگرچہ بھوک اچھی ملے۔
 میوکونا۔ خونی بوائے کے لئے ایک غوراک ایک قطرہ مخصوص ہے۔ دن میں دو یا تین غوراکس دو تین دن
 میں بیماری کو قابو کر لے گی۔

فائیکس ریل۔ اگر میوکونا ناکام ہو جائے تو یہ ایک اور دوائی آدم کروے گی۔
 ایسٹیک ایسڈ۔ آنتوں سے شدید خون ہے خون کے رک جانے سے یا کسی طریق سے۔
 نائٹرک ایسڈ۔ جس بوائے میں خون بہنا بند ہو گیا ہو، لیکن درد بہت ہو تا ہو اور امعاء مستقیم
 نیچے لگ گیا ہو۔ اس میں سوئی بچھٹھ جیسی درد تیز ہوتی ہو۔

گلگیر یا کارب۔ تے باہر نکلتے ہوئے چلنے پر شدید تکلیف، بیٹھنے پر آفات پاخانہ کے وقت
 بہت درد ہو اور خون ہے۔

فاسفورس۔ ہر پاخانہ کے بعد بار بار دھار میں خون ہے۔

کالی کارب۔ بوایسر پُر درد۔ انگ کی طرح جلن اور بہت زیادہ خون ہے۔ اندر بہت زیادہ
تناؤ اور سوزش۔ مقعد کا مسور۔ ٹھنڈے پانی میں بیٹھنے سے ٹھنڈی چٹیاں لگانے سے وقتی
طور پر آفاقہ ہو جائے۔

ایلو۔ جب پانی کے تلی کی طرح خون ہے بوایسر کے موکے انگور کے گچھے کی طرح باہر نکلیں۔
ٹھنڈے پانی سے آفاقہ۔ پاخانے کے ساتھ ہوا خارج ہو۔ مقعد میں شدید خارش اور جلن اس لئے
متواتر مقعد میں انگلی ڈالے رکھے یعنی انگلی ڈالے خارش کرتا رہے۔ ملام گلنے سے جلن زیادہ ہو۔
میوڑیک الیڈ۔ بوایسر انگور کے گچھوں کی طرح جو بیگنی رنگ کے ہوں اور چھوٹے پر چلیں۔
بچوں میں بوایسر باہر نکلنے والی سرخی مائل نیلی۔

سیگلکونیو یا۔ انٹریوں سے مسلسل خون پانی کی طرح بہے۔
اگنیشیا۔ اندھی بوایسر، کھڑے یا بیٹھے ہونے پر درد کرے۔ درمیں چلنے پر آفاقہ ہو۔
امعائے مستقیم میں تیز دبانے والے درد۔

لیکس۔ جب بوایسر سوزش زدہ ہو، ہتھوڑے لگنے جیسے درد۔
الیومنا۔ شام کے وقت بوایسر میں تکلیف رات کے وقت آرام کرنے پر آفاقہ۔ خون کے
دھڑے مقعد میں سے نکلیں۔ پاخانہ گرہ دار بھڑکی میگنیوں جیسی مقعد میں کاٹنے والی تکلیف
جس کے بعد خون ہے۔

ایسکولس چپ۔ پُر درد اندھی یا باہر نکلنے والی بوایسر۔ بیگنی رنگ کی مسلسل درد کے ہوا
بہت دکھیں۔ جلن اور خارش امعائے مستقیم میں چیتوں اور نکلنے والوں کے گھسے ہونے کا احساس
شاذ و نادر خون ہے۔ سخت خشک پاخانے جو مشکل سے خارج ہوں اور اس کے بعد امعائے مستقیم کے
باہر نکلنے کا احساس۔ کمزور کولہوں میں درد۔ خون بہنے سے درد کو آفاقہ ہو۔

ایپیس۔ تیز ڈنگ لگنے جیسی درد جس کو ٹھنڈی چیزیں لگانے سے آفاقہ ہو۔
آرمینک الیم۔ جلندار درد اور بے چینی جس کو گرم چیزیں لگانے سے آفاقہ ہو۔
کاسٹیکیم۔ ناقابل برداشت درد والی بوایسر جس کو چلنے سے زیادتی ہو۔

ڈال سکویا۔ بوایسرا انگوڑ کے گھجوں جیسی نظر آئے جس سے درد جگر نکل جائے۔

پنی اونیا۔ ناسور کے ساتھ بوایسر۔ مقعد اور اس کے ارد گرد کے چھ بیلگنی رنگ کے اٹھکڑوں یا ہتھوں سے پھرے ہوئے ہوں۔ مقعد کے اندر ناسور بہت درد والے تمام بلغمی جھلی ناسور اور چنروں سے بھری ہوئی۔ کاٹنے والے درد مقعد میں غارش جو کھرنے پر مجبور کرے۔

پوڈوفائیٹلم۔ زچگی کے بعد بوایسر اور بوایسر اور مقعد کا خروچ۔ جگر میں احماس خون اور قبض۔ لینڈرا۔ بیرونی بوایسر امعائے مستقیم کے باہر نکلے کے ساتھ۔ خونی بوایسر۔

رشاکس۔ اندھی بوایسر ہر بار پاخانے پر باہر نکلے مگر درد اور امعائے مستقیم میں بوجھ یا تھ۔ کیکٹس جی۔ خونی بوایسر۔ دریدوں کے سروں کے موٹے ہرنے کی وجہ سے گھر میں جائیں۔ جن میں سے کافی مقدار میں خون نکلے۔

کالسنونیا۔ مکر درد اور ہندی قبض کے ساتھ بوایسر۔ امعائے مستقیم باہر نکلے۔ خونی بوایسر یا اور باہر نکلے قبض اور اسہال ادل بدل کر ہو سکتے ہیں۔

سیلیگ۔ مقعد میں زبردست غارش کے ساتھ بوایسر گھٹنوں کی پٹیلیوں میں دھکن اور درد۔

امونیا کارب۔ پاخانے کے بعد بوایسری مے باہر نکلیں بہت زیادہ دیر تک رہنے والی درد چل نہ کے۔ بغیر پاخانے کے بھی بوایسری مے باہر نکلیں۔ جلن اور غارش مقعد میں جو ہونے نہ دے۔ حیض کے وقت بوایسر بہت ہی زیادہ ہو۔

کیپیسیک۔ بوایسری مے۔ جلن دار۔ موبجے ہوئے۔ غارش والے مقعد میں تپکن دار دھکن۔

خون بہے یا بغیر خون بہنے کے۔ رطوبت کے اخراج کے حملو۔ موٹے لوگوں میں جو آسانی سے تھک جاتے ہوں۔

کاربوونج۔ باہر کو نکلے ہوئے نیلے مے۔ پیپ بھی ہے۔ بدبودار، موبجے ہوئے امعائے مستقیم میں سے رطوبت رے گیس۔ سر میں اجتماع خون پر تکلیف زندگی کی وجہ سے ناک سے خون بہے۔

مرک سال۔ اسہال اور ہیچش کے ساتھ۔

جیلیسیم۔ فالج سے۔

ٹائپرکیم - غولی بلا سیر - درد اور دھکن کے ساتھ - امعائے مستقیم یا ریگٹیم کی سوزش

اگیشیا - مکڑنے والی درد، گولی لگنے کی طرح کے درد اور دیگر درد -
کیپسیکیم - انتہائی کی سوزش - جلن اور شدید درد -
نافسورس - بھلا گئے جیسی گولی لگنے جیسی دریں متعدد میں جلن کے براہ -

ایلو - { عارضہ کیوں میں ترتیب سے استعمال کرائی جائیں -
پوڈوفائیلیم -

کالچیکم - نیم ماد کیسوں میں بہت زیادہ طبیعت کے ہمراہ -
ٹائپرک الیڈ - مزین کیسوں میں جب تنگ ہونے کا احساس -

بدبودار - امعائے مستقیم میں درد یا ریگٹیم میں درد
(دیکھئے بدبودار پاخانہ)

روٹا - پاخانے کے بعد درد - یہ کئی گھنٹے بعد تک جاری رہے ۹ طاقت میں دنگے -
ڑنہیا - چیزوں کی وجہ سے پاخانے کے بعد جلن دار دریں جو کئی گھنٹے جاری رہیں -
ٹاکس - پیشاب کرتے وقت متعدد میں درد ہو -

میوڈرٹیک الیڈ { امعائے مستقیم میں جلن دار درد -
ٹائپرک الیڈ {

ایلو ایس { اسہال کے دوران درد اور گیس کے بعد درد -
سلفر {

کیپسیکیم - پیچش کے دوران درد -

کاشیکم - امعائے مستقیم میں درد چلنے کے دوران -
اگیشیا - تیز دریں جو امعائے مستقیم میں اوپر کو جائیں -

گوڑ۔ بوا سیر (دیکھئے بوا سیر)

میو کریم۔ امعاء مستقیم میں گوڑ۔
امعاء مستقیم کا بائزرنگنا یا مثل جانا۔
 دیکھئے امعاء مستقیم کی سوزش۔

ایلو اس۔ اسہال کے ساتھ خون ہے اور امعاء مستقیم کی سوزش۔
 یوڈو فاسکیم۔ ہر پاخانے کے بعد یا اچانک حرکت پر اسہال کے چھینکیں خاص طور پر صبح کے وقت۔
 گیمبو جیا۔ بنزایزرد اسہال کے ساتھ جلن دار دردی یا سخت لاکافی پاخانہ اور پاخانے کی شدید خارش۔
 میوڑ سیک الیڈ۔ پیشاب کرتے وقت امعاء مستقیم کا خرورج اور بوا سیری مسوں کے ساتھ۔
 روٹا۔ زچگی میں یا زچگی کے بعد یا پاخانے کی معمولی کوشش کے ساتھ۔
 بیلا ڈوفا۔ امعاء مستقیم کے نکلنے کی چوٹی کی دوائی ہے۔ پیٹ میں زبردست تناؤ۔ اور
 امعاء مستقیم کے نکلنے کے ساتھ اسہال۔

الغیشیا۔ امعاء مستقیم کا نمایاں طور پر خارج ہونا۔
 ایسکولس ہپ۔ پاخانے کے بعد خرورج مقعد بہت سے بڑے بڑے مٹے امعاء مستقیم کو
 بند کردیں۔ جلن دار بوا سیر۔ چاقو پٹنے جیسے درد۔

سپازم

کالی بائیکرو میکم۔ امعاء مستقیم کا تشنج۔ پیشاب والے راستے میں درد جماعت یا مباشرت کے بعد۔
 نمکس مارکٹا۔ منہ کی خشکی کی وجہ سے نرم پاخانہ خارج کرنے میں بھی مشکل پیش آئے۔
 بردت نیند آئے۔ آسانی سے بیہوش ہو جائے۔

چائنا۔ بوا سیری رحبان والے مریضوں میں نرم پاخانہ خارج کرنے میں بھی مشکل پیش آئے۔
 دیرنگ رنے۔ درد اور کم درد۔ پیٹ تنا ہوا اور گیس۔ کافی دکانہ گیس خارج ہو لیکن افادہ نہ ہو۔

سار سپر ملا۔ پاخانے کے ساتھ خون بہے۔ پیشاب کی زیادہ حاجت۔ یادرشت کی کمی۔
پیشاب گاڑھا۔ بادلوں کی طرح کا البینین والا۔

سلیشیا۔ دباؤ والا۔ خواہش زیادہ صحت و طوبت خارج ہو یا سخت پاخانے شکل سے
خارج ہوں۔

امعائے مستقیم کا بند ہو جانا۔ یا گھٹن

تھیوینا مینم۔ امعائے مستقیم میں گھٹن یا بند ہو جانا۔

ٹائپرک ایسڈ۔ کینسر کی وجہ سے یا سادہ گھٹن۔

ٹائڈر اسٹس۔ کینسر کی وجہ سے گھٹن ۹x طاقت میں دیکھے۔

روٹنا۔ جب ٹائڈر اسٹس ناکام ہو جائے تو یہ دوائی دی جائے۔

پاخانے پر دباؤ۔ پاخانے کی بار بار حاجت

مرک کار۔ نہ ختم ہونے والی حاجت بہت ہی پریشان کرنے والی۔

ایلوئیس۔ پاخانے کا دباؤ قابو نہ کی جانے والی پاخانے کی خواہش۔

بیلڈوٹنا۔ پاخانے کی خواہش لیکن پاخانہ نہ آئے یا بہت تھوڑا آئے۔

اگنیشیا۔ اگر پاخانہ کچھ بہت دباؤ ہو لیکن پاخانہ نہ آئے۔ امعائے مستقیم باہر نکل آئے۔

ٹکس و امیکا۔ اکثر خواہش لیکن پاخانہ نہ آئے۔

پلوڈو فاسیلم۔ دباؤ ڈالنے پر آسانی سے مقعد کا خروج۔

سلفر۔ امعائے مستقیم پر متواتر بوجھ۔ پاخانے پتلے۔ ریم یا پیپ والے غوطے یا قبض دار۔

پاخانے سے پہلے یا بعد میں دباؤ ڈالیں۔

کرم۔ چھوٹے۔ کدو دانے

سہنا۔ یہ دھاگے جیسے گول یا کدو دانے نکالنے کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ جب مریض ہلت

پہلے ۹ طاقت میں دی جائے۔ مریض بے چین متواتر تاک کوئے۔ بھوک بالکل نہ ہو یا بہت زیادہ ہو۔ کمزوری کی وجہ سے تشنگ یا اینٹھن کو دور کرتی ہے۔ اس سلسلہ میں ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ طاقت میں دی جائے۔
 ابرو ٹیم۔ ٹیپ درم شدہ بھوک کے ہمراہ رات کو جگا دیں۔ یعنی رات کو بھوک کی زیادتی کی وجہ سے مریض بھوک مائے
 چینیو پوڈیم۔ { خاص طور پر بک درم کے لئے موزوں ہے۔
 تھائیمل۔

کوسو۔ ٹیپ درم نکالنے کے لئے شاندار دوائی ہے۔
 فائیکس ماس۔ ٹیپ درم نکالنے کے لئے شاندار دوائی ہے خاص طور پر قبض کے ہمراہ۔
 انتھرم۔ ٹیپ درم شدید بھوک کے ہمراہ رات کو جگا دیں یعنی رات کو بھوک کی زیادتی کو کچھ مریض مانگ جائے۔
 مستوفین۔ جب سبنا ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جائے۔ سنا اور مستوفین اکثر کیکو ٹھیک کرتے ہیں۔
 ۲۲ طاقت میں ہر دو گھنٹے کے بعد دن میں ۶ دفعہ دی جانی چاہیے۔

کیلیڈیم۔ جب سیون پر درم چلیں پھر اس اور بھوٹی پختوں کے فرج میں
 ٹوکریم۔ پھوٹے بے اور گول کرم جب اعلیٰ مستقیم میں ہیجان ہو۔ ڈر کچا یا طاقت میں بیجے۔
 سٹاپس نائیکرا۔ بن درم کے لئے ایک اچھی ادوائی ہے جب ٹوکریم ناکام ہو جائے تو یہ دوائی
 استعمال کرائی جائے۔

سپائیجیلیا۔ بھینٹکا پن۔ پھرے کی زردی کے ساتھ جھمکے۔ آنکھوں کے نیلے حلقے۔ جی تھلانے
 کے ساتھ غشی۔ درد تو نفع نمانے کے قریب کمزوری کی وجہ سے۔ دوا مال پر مدد کچھ مڑ گھمانے سے اکثر
 کمزوری کی وجہ سے اینٹھن کو دور کر دے گا۔

سٹام۔ یہ دوائی کمزوری کو بہوش کر دیتی ہے جن کو جلاب دینے سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔
 زرد دھنسا ہوا چہرہ اور آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔ سست طبیعت۔ عام طور پر بے حس بدبودار اسٹائن
 اور معمولی بخار۔ مریض معدہ کے بل پر ٹیٹا پسند کرے۔
 کلگیر یا کرب۔ خازری موٹے۔ زرد بھنی مزاج۔ سرگرم اور رات کو پسینے آئیں اسے پتوں کیلئے مفید ہے۔
 ٹیلیوریم۔ یہ تھریڈ درم کو خارج کر دیتی ہے۔

کیوہرپم اکسی ٹیم ٹائیگرم - ہرسم کے کرموں کے لئے شاندار دوائی ہے۔ تھوڑی خوراکوں میں دی جائے۔ ۹x طاقت میں نکس وایکا ۲۰x کے ساتھ ادل بدل کردن میں چار بار یا پنج مرتبہ چار یا چھ ہفتہ تک دی جائے۔

نیٹرم فاس - انٹریوں کے لیے۔ گول یا قطر بڑا درم ناک کھجلائے پر اور گنٹھیا کے رعبان کیساتھ۔ ٹیٹینتھنا - معقد میں جلن اور کیڑوں کے چلنے کا احساس جیسے کہ درم باہر آگئے ہوں اور یہ گول اور ٹیپ درم خارج کر دیتی ہے۔

سلفر - ٹیپ درموں کے لئے جھوٹی کی دوائی ہے۔ یہ کافی لمبے عرصہ تک دینی چاہیے۔ سکرینہم - جب سنا اور ٹوکیم درم نکالنے میں ناکام ہو جائے تو یہ مدد دیتی ہے۔



دسواں

باب

پیشاب کے نظام

کی بیماریاں

پیشاب ، مشانہ

گرؤے

پیشاب میں جراثیم

’مقوجا۔ پیشاب میں جراثیم کے لئے مخصوص ہے۔ ہر منقہ ایک ایم طاقت میں دیتے ہیں جب انافر شروع ہو جائے تو دفعہ ایک ماہ میں ایک خوراک تک بھجھا دیا جائے۔
فارمیکا۔ پیشاب کے لئے بہت موزوں دوائی ہے۔ رات کو بہت زیادہ گدلا اور گندری بوندالا پیشاب آئے۔

بیسلیس۔ کولائی x ۳۰۔ جراثیم کے نمایاں کیوں میں مفید ہے۔
میتھلین بلیو۔ بخار کے کیوں میں۔ کان کے ٹھول کی سوزش میں۔ نڈان اور پیشاب میں پیپ۔ گردوں کی سوزش۔ سبز رنگ کا پیشاب۔

اکیٹیا۔

گردوں کی سوزش

اکوناٹ این۔ جب ٹھنڈی زمین پر بیٹھنے یا لیٹنے کے اچانک دب جانے سے یا ٹھنڈ لگ جانے سے بے چینی۔ پیاس، سردی اور پیشاب کا اچانک دب جانے سے۔
ایپس ایم۔ گردوں کی سوزش کے حادثہ کیس، بغیر پیاس کے۔ اس میں چہرے اور ہاتھ پاؤں پر سوزش اور استسقاء۔ سر کے بازوؤں اور گردوں میں درد پیشاب اکثر لیکن کم مقدار میں۔ پیشاب میں البیون۔ گھٹن کا احساس اور مشکل سے سانس لے، بھولا ہوا سانس۔ دباؤ ڈالنے پر گرٹھ پڑے تمام علامات گرمی سے بڑھیں۔ اور ٹھنڈک سے کم ہوں۔ جھوٹی طاقت میں دینے سے بہترین کام کرتی ہے۔
میلی بوریس۔ گردوں کی سوزش کی وجہ سے استسقاء۔ پیشاب کم اور گہرا۔ پیشاب میں زہر سے بہوشی کے ساتھ تپلیاں پھیلی ہوئیں اور دشمنی کے لئے بے حس۔ انیٹھن۔ جسم سے پیشاب کی سخت بو۔
دماغ سے اخراج نمایاں علامات ہیں۔

آرمینیکم الیم۔ گردوں کی سوزش کی وجہ سے استسقاء۔ پیشاب کم اور گہرا پیشاب میں زہر۔ گردوں کی سوزش کی تمام حالتوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ جب پانی جیسے اسہال۔ زرد جلد موم جیسی ظاہر حالت۔ پیشاب میں کثیر مقدار میں بھلیاں اور البیومن آئے۔ حقوڑے حقوڑے دھبے پر حقوڑے حقوڑے ٹھنڈے پانی کی پیاس۔ گرمی کی خواہش۔ بے چینی۔ چہرہ کی سوجن۔ سخت اذیت۔ موت کا ڈر انہیں۔ کیفنا بس ٹھانیوا۔ پیشاب کی نالی پیپ اور مواد سے بندش۔ پیشاب گدلا۔ سرخی مائل قطرہ قطرہ پیشاب آئے۔ پیشاب کی نالی میں سوئی لگنے جیسی درد اور ملین۔

کالی کلور۔ گردوں کی شدید سوزش۔ کم مقدار میں گہرا البیومن ملا پیشاب جس میں بھلیاں ہوں۔ کلکیر یا سلف۔ کمی خون جس میں لاغری اور ناخوشی بڑھے۔ پیشاب میں پیپ، پیشاب کے دوران جلن۔ پیپ کا کافی تناؤ۔ نزلا دی سردرد۔

مرک کار۔ بڑے سفید گڑھے میں منظر ہوتی ہے۔ پیشاب مقدار کم اور سرخ البیومن اور بھلیوں کے ساتھ۔ محل کے دوران سوزش گروہ۔ پیپ والی سوزش گروہ محل کے پانچویں سے ساتویں ماہ میں پاؤں پر سوزش۔

پیکرک الیڈ۔ پیشاب میں خون کو لال رنگ دیتے والے مادے کی موجودگی پیشاب میں انڈیکین دانے اور روغنی اجزاء آتے ہیں۔ گردوں کی سوزش شدید کمزوری کے ہمراہ۔ گہرا۔ غنی۔ کم مقدار میں پیشاب۔ رات کو پیشاب زیادہ آئے۔

فاسفورس۔ پیشاب میں خون کو لال رنگ دینے والے مادے کی موجودگی پیشاب گدلا بھجورا۔ سرخ تلچھٹ اور خون کے ساتھ۔

کینتھرس۔ پیشاب میں زہر کا تو جم جس کے ساتھ تکلیف کا احساس ہو۔ پیشاب کا کم ہوجانا بے چینی کے ہمراہ، چہرہ سرخ۔ آنکھوں سے شعلے نکلتے ہوں۔ پیشاب خارج کرنے کی خواہش لیکن پیشاب نہیں ہوتا بلکہ غالی ہوتا ہے۔ شاذ میں نہیں ہوتا۔ سرخ بخار یا خاق کئے استسقاء، پیشاب کا اعلیٰ تکلیف ہو، صرف چند قطرے ایک وقت میں آئیں۔ پیشاب بہت گرم اور غنی۔ ڈیجیٹلیس۔ گردوں میں دانے اور تنزیلی دل کی دھڑکن کے ساتھ۔ سست نبض۔

شیر بخنکنا۔ گردوں میں اجتماعِ خون کے ابتدائی دور میں خونی پیشاب ہو۔ یورٹیر اور اس کے پیچھے کی طرف تکلیف جائے۔

پلمبم۔ گردوں کی دانے اور تنزیلِ دل۔ گنٹھیاوی گردے۔ زرد۔ پھولا ہوا۔ وزنی دکھاوا۔ قبض۔ البیومن۔ گردے سکڑے ہوئے۔

بنسرواک الیڈ۔ گردوں کی دریں جو تیز اور شدید ہوں جو کمر سے نکلیں اور چھاتی تک جائیں۔ پیشاب گہرا اور شدید۔ امونیا کی بو والا۔ بو بہت ہی خبیثے والی۔ گردوں کی سوزش گنٹھیا نمایاں علامات ہیں۔

مرکوریس سائینڈ۔ پہلے اور دوسرے درجہ کے لئے شاندار دروائی ہے۔ پیشاب کم مقدار میں۔ گہرا۔ البیومن والا۔ گردوں کی نالیوں میں درد۔

ایوسائٹم۔ استسقاء حالت، پیشاب کم اور پیاس۔ ایپس میں پیاس نہیں ہوتی جس کے ساتھ اس دروائی کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے چھل کے دوران سوزش گردہ میں بے ہوشی اور ٹمٹھن ہوتی۔ ویسکییریا۔ درد گردہ۔ گردہ میں اعصابی درد۔ پیشاب قطرہ قطرہ آئے۔ پیشاب کی نالی میں جلن اور شاذ میں ہیجان۔ ایک رات میں تقریباً تین دفعہ پیشاب کی حاجت ہو۔ سوزاک اینٹوں جیسی تلچھٹ، پیشاب میں، تکلیف دہ پیشاب، پیشاب میں پیپ۔ البیومن اور خونی پیشاب استسقاء میں۔

کالچیکم۔ پیشاب میں البیومن جو سیاہ ہو جائے۔ پیشاب کم استسقاء سوجن کے ساتھ گردوں کی سوزش حادثہ کی۔

سولیدرگو۔ تھوڑا سا چھوٹے سے بھی گردوں میں درد جو گردوں سے پیٹ شانہ اور نیچے شانہ اور نیچے ٹانگوں تک جائے۔ پیشاب سُرخ، بھورا، کم، گاڑھا۔ بمشکل آئے۔ البیومن والا۔ مواد۔ فاسفیٹ والا پیشاب۔ ۲ یا ۹ طاقت میں دیتے۔

لائیکو پوڈیم۔ جب پیشاب کے سُرخ ذرات رت آئے، گردوں کی سوزش اور استسقاء کے ساتھ۔

ایسڈ نائٹرک - جب گردوں کی تکالیف کے ساتھ کان سے زردی مائل سفید رطوبت ہے
پیشاب سے گھوڑے کے پیشاب جیسی بو آئے۔
آر سینک بروم - جب شوگر کے ہمراہ البیون خارج ہو۔ جب لمبیم ناکام ہو جائے تو یہ دی جائے۔

پیشاب کے راستے میں پتھری۔ سنگریزے و پتھری

برمیسرسلکیرس - گردوں کے درد کیلئے چوٹی کی دوائی ہے۔ خاص طور پر جب درد بائیں
طرف ہو، گردے سے پیشاب والی نالی تک بڑھے۔ پیشاب کی خواہش کے ساتھ۔ دائیں طرف
کی بھی ایسی ہی علامات کو ٹھیک کرتی ہے۔

اومیم کلین - سخت اور بل کھلانے والی یا بیچ و تاب کھلانے والی تکلیف جس کی وجہ سے
مریض بلبلائے اور تڑپے۔ سرخ پیشاب اینٹوں جیسی تلچھٹ کے ساتھ یا سفید تلچھٹ پیشاب
گدلا۔ سُرخ اور غوثی۔

لائیکو پوڈیم - مزمن کیسوں میں جب مادہ تکلیف کرکے بیٹھ میں ہوا خاص طور پر بائیں
جانب پیشاب میں سُرخ ریت کے ہمراہ۔ یہ ۳ طاقت میں صبح و شام دو خوراکیں ۲ ماہ تک بخائیں۔
چائنا سلف - جب اینٹوں جیسی تلچھٹ یا ہلکی زرد تلچھٹ پیشاب میں ہو۔

سارمپرلا - سفید تلچھٹ کے لئے پیشاب کرنے کے فوراً بعد کبھی مٹی جیسا گولا ہو جائے
پیشاب کے آخر کار میں بہت تکلیف ہو۔ پیشاب کم لیسدا اور جھلیوں والا مثانہ میں اینٹیں۔
پیریرا بریوا - جب اور تمام ادویات ناکام ہو جائیں اسکی مدد کچھ کے پانچ قطرے فی
کے تین بار دن میں دیئے جائیں۔

کلکیریا کرب - گردوں کا درد جب پتھری اور کیسڈ کی وجہ سے بن رہی ہو۔
آرٹیکا یورینس - گردے میں پتھری، پیشاب گاڑھا۔ یہ گردے سے پتھری اور کنکر یا سنگ
مثانہ کو دور کرتی ہے۔

نیرم فاس - پتھری بننے سے روکتی ہے۔ چونے کے اگزیلیٹ کو حل کر کے معلول باقی ہے۔

اور جگر کو سخت نہیں کرنے دیتی۔ ۹x طاقت میں دن چار بار دیکھئے۔

پیشاب بھٹنا۔ گردوں کے علاقہ میں شدید کھینچنے والے درد۔ پیشاب میں شدید جلن اور اور کٹھنے والے درد۔ پیشاب کی نالی میں جلن۔ پیشاب میں خون اور البیومن اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ گردے کی پتھری بننے سے روکتی ہے۔ اور اس کو کھٹلا دیتی ہے یا مل کر دیتی ہے۔ یہ ایک۔ ایم طاقت میں دی جانی چاہیے۔ پیشاب سرخ۔ بھورا۔ سیاہ یا دھوئیں کے رنگ میں۔ سیلا ڈونا۔ گردوں کے علاقہ میں گولی لگنے جیسے درد۔ پیشاب کی نالی کے ساتھ جس میں سے پتھری جاری ہو۔

ڈائسکوریہ۔ سخت اذیت۔ خشک اور ایلٹھن دار دردیں۔ گردے کی پتھری کے اخراج کے ساتھ پیشاب کی نالیوں کی گھٹن۔ ایلٹھن ناف کے قریب۔ درد جس کو دبانے سے افادہ ہو۔

کینتھرس۔ گردوں مثانہ اور پیشاب والی نالی کی سوزش۔ تیز بھڑنے والی اور پھٹنے والی درد۔ گردے میں پیشاب مشکل میں خارج ہو۔ قطرہ قطرہ پیشاب خارج ہو۔ بائینڈیجیا آرلورز۔ پتھری کو توڑنے والی دوائی۔ خونی پیشاب قطرہ قطرہ پیشاب میں سفید سفوف مابطور پھٹ ہو۔

ملی فولیم۔ مثانہ میں پتھری، پیشاب نہ آئے یا رک جائے۔ خونی پیشاب۔ کاسٹیکم۔ شدید تکلیف جو گردے سے خضیموں تک جائے۔ سوتے وقت درد کا حملہ ہو۔ پیشاب قطرہ قطرہ ہو۔

ورم مثانہ۔ (دیکھیے پیشاب)

اکونائٹ نیپ۔ حاد کیسوں میں سخت بخار۔ جلد خشک۔ پیاس۔ ڈر۔ بے چینی۔ مثانہ میں متواتر جلن دار۔ تکلیف۔ پیشاب تکلیف سے آئے اور مشکل۔ بچے جیخیں اور آکٹ ناسل کو مضبوطی سے پکڑیں۔

اپیس ایم۔ مردوں کے مقابلہ میں عورتوں کے کیس زیادہ ٹھیک کئے ہیں۔ پیشاب کم گدلا اور غونی۔

کینتھرس۔ شانہ میں ناقابل برداشت درد۔ تشنجی درد۔ پیشاب کی نالی اور سیون کے ساتھ ساتھ جو خضیوں تک جائے جو ادھر کو کھینچے جائیں۔ سر ذکر، حنفیہ یا سپاری میں جلن۔ پیشاب دالا مورخ سرخ۔ پیشاب بمثل آئے۔ قطرہ قطرہ آئے۔ پیشاب سے پہلے، دوران میں اور بعد میں شدید جلن اور دباؤ۔ پیشاب کم اور غونی۔ تکلیف دہ خیزش۔ بے چینی بخار کے ہمراہ پیاس لیکن پانی کا دیکھنا یا پینا ہر قسم کی تکلیف کو بڑھاتی ہے۔ حاد اور متعدی کیسوں کے لئے زود اثر ہے۔

ڈلکا مارا۔ سردی لگنے کی وجہ سے شانہ کا نزلہ زکام ٹھنڈے موسم میں۔ پیشاب کرنے کی مستقل حاجت پیٹ میں گہری محسوس ہو، شانہ اور پیشاب کی نالی کا نیچے کی طرف ناپسندیدہ دباؤ کا احساس پیشاب بلا ارادہ خارج ہو جائے۔ پیشاب کم۔ بدبودار گدلا تیل ناخس میں سخت جلی کی طرح بیفد یا سرخ مواد جو خون کے ساتھ ملا ہوا ہو پیشاب دودھیا۔ بدبودار یا مواد اور پیپ ملا۔ سرخی نائل جلندار۔ قطرہ قطرہ خارج ہو لیڈار تلچھٹ۔ بہت سے بوڑھے لوگوں نے جن میں شدید سوزش شانہ ہو لیکن پروٹھیٹ غدود بڑھے ہوئے نہ ہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔

ٹیرینتھنا۔ بہت ہی غونی قسم کا پیشاب جس کا گڑھی لیڈار، گارھی کچر جیسی تلچھٹ۔ ایکویسٹیم۔ بہت ہی رنگدار اور کم پیشاب جو درد کے ساتھ بار بار خارج ہو مواد دھی تلچھٹ پر۔

بربریس ونگرس۔ گارھے مواد کے ساتھ پیشاب چمکدار سرخ گوشت جیسی تلچھٹ۔ کوہویا۔ مزمن سوزش شانہ خاص طور پر عورتوں میں استسقاء میں پیشاب کا بند ہو جانا۔ پیشاب کرنے کی لا حاصل متواتر کوشش۔

اپنی جگہ سے ہلے ہوئے گردے۔

کلکیر یا ایوڈائیڈ - سب پہلے آزمائی جائے۔

سیسیا - اگر کلکیر یا ایوڈائیڈ ناکام ہو جائے تو یہ دی جائے۔
گردے کی پیلوں میں رکاوٹ کیوجہ پیشاب کا جمع ہو جانا۔

پلیم } پلیم چوٹی کی دوئی ہے۔ اگر یہ ناکام ہو جائے
آرینکم } تو آرینکم الیم دی جائے۔

ورم گردہ

دیکھئے سوزش گردہ - پیشاب میں نقصان دہ مادہ کارہ جانا جو کہ عام طور پر گردے خارج کر دیتے ہیں جبکہ وجہ سے پیشاب کم - اینٹھن اور بیہوش ہو سکتے ہیں دسوزش گردہ سیلا ڈونا - پُر خون اور تندرست مریضوں میں جب گردہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے پیشاب گہرا اور گدلا ہوتا ہے - پٹھوں کا شدید اینٹھن کے ساتھ پھپھڑانا - ہیلی بورس - بیہوشی کے ساتھ یوریمیا - پتلیاں کھلی ہوئی اور روشنی سے متاثر نہ ہوں - اینٹھن یا تشنج جسم سے پیشاب کی شدید سہو۔

کینتھرس - یوریمیا کا تو ہم مسلسل ایذا یا تکلیف کے احساس کے ساتھ پیشاب کا رک جانا بے چینی کے ساتھ - چہرہ متما یا ہوا - آنکھوں سے شعلے نکلیں - پیشاب کی زبردست خواہش لیکن کچھ بھی خارج نہ ہونے میں پیشاب نہ ہو۔

کیوریم آرینکم - حاد قسم کا یوریمیا، اہمال، بچوں کا ہیضہ اور بد ہضمی کے پہلو - مریض شوگر میں مبتلا ہو سکتا ہے - پیشاب اچانک کم - گہرا سُرخ اور لہسن جیسی بو والا آتا ہے - آرٹیکا یوریمیس - پیشاب کی رکاوٹ کے ساتھ یوریمیا جس میں جسم سے پیشاب کی شدید بو آئے گرم پانی میں مدھنچر کے پانچ قطروں کی خوراکیں دیتے تھے۔

پیمجم۔ ناف پر کھنچاؤ کے احساس کے ساتھ یوریک میہوشی۔ پیشاب دبا ہوا۔ مشانہ
 میں پیشاب نہ ہو۔ پھر مردوں جیسا زرد۔ سانس آہستہ لے ایک اہم طاقت میں ایک ہی
 خوراک دیتے۔

ٹیر پینٹھنا۔ انٹھن اور جڑے کا فالج کے ساتھ یعنی دانٹوں کا بند ہو جانا۔ جو ہر
 پندرہ منٹ بعد ہو سکتی ہے شدید انٹھن اور پیٹ کی خطرناک اگڑن کے ساتھ۔

پیشاب کرنا۔

جلن

کینتھرس۔ ایسا دگی کے بعد پیشاب میں جلن اور قطرہ قطرہ آئے، پیشاب کے بعد جلن۔
 سٹیف سگیر یا۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن۔ پیشاب کرتے ہوئے جلن کھٹے
 نیٹرم کارب۔ پیشاب کے بعد جلن۔

مرک سال۔ پیشاب کے شروع میں جلن دن رات ہر گھنٹہ پیشاب آئے۔
 بیلادونا۔ مشانہ میں شدید میجان پیشاب کرنے کی متواتر خواہش۔ پیشاب کی تمام نالی
 کے ساتھ جلن، شور سے متاثر ہو۔

سلفر۔ پیشاب میں جلن اور بلا ارادہ پیشاب ہو جائے۔

ٹیر پینٹھنا۔ پیشاب کی کمی کے ساتھ جلن۔ پیشاب کرتے وقت جلن۔ پیشاب کم اور غونی۔

پلسٹیللا۔ پیشاب سے پہلے جلن۔

کلیٹیس۔ جب پیشاب کا آخری قطرہ بہت، میجان اور جلن پیدا کرے۔

خواہش

لیلمنگ۔ پیشاب کی متواتر خواہش لیکن مقدس کم۔ اگر پیشاب نہ کیا جائے تو چھاتی
 میں خون کے اجتماع کا احساس۔

ایکوزیٹم۔ متواتر پیشاب کرے۔ شانہ میں دردیسے کہ بہت بھرا ہوا ہو۔ پیشاب کرنے سے افاقہ نہ ہو۔ پیشاب کم کافی چپ ہو۔ بوڑھے لوگوں میں شانہ کے بھان کے لئے حیران کن دوائی ہے۔ لگا تا رنگ کرنے والی پیشاب کی خواہش جس کے بعد کم یا معمول افاقہ نہ ہو۔ مزین بھان شانہ کے لئے شاندار دوائی ہے۔ پیشاب کرنے کی شدید خواہش لیکن پیشاب کی تھوڑی سی مقدار خارج ہو۔

سلفر۔ چلتے پانی کو دیکھ کر پیشاب کرنے کی نہ رکنے والی خواہش۔ ا۔ ایم قناتیں دیجئے۔ پیٹرولینیم۔ پیشاب کی زبردست خواہش اگر جلدی خارج نہ کیا جا تو خود بخود نکل جائے۔ آرنیٹم میٹ۔ پاخانے اور پیشاب کی زبردست خواہش۔ کونیم۔ رحم میں درد کے ساتھ پیشاب کی متواتر خواہش۔ نیٹرم میور۔ پیشاب کی زبردست خواہش کم اخراج کے ہمراہ۔ تھوچا۔ پیشاب کی اکثر اور شدید خواہش۔ دھار کمزور۔ احساس کہ پیشاب کی نالی میں ایک قطرہ رہ گیا ہے پیشاب کرنے کے بعد مندرجہ بالا علامات کے ساتھ جکڑ بھی ہوں۔ لائیسین۔ چلتے پانی کو دیکھ کر پیشاب کی خواہش۔ کینتھرس۔ اگر لائیسین ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جائے۔ اینتھسم۔ پیشاب کی متواتر خواہش۔ پیشاب گہرا زرد۔ گھوڑے کے پیشاب جیسی تیز بو۔ سیٹیسگیریا۔ نوجوان شادی شدہ عورتوں میں پیشاب کی لگاتار خواہش۔ ارتیج کو۔ ہر آدھ گھنٹہ بعد دن رات پیشاب کرنے کی خواہش۔ پیشاب کے دوران اور بعد میں جلن۔

پیشاب تکلیف سے آئے۔

کینتھرس۔ جلن یا گرمی پیشاب تکلیف سے خارج ہو۔ قطرہ قطرہ خارج ہو۔ کوپیویا۔ لگاتار لا حاصل پیشاب کی خواہش پیشاب کی نالی میں گھٹن قطرہ قطرہ

خارج ہو۔ عورتوں کے لئے مخصوص دوائی ہے۔ شلنے کی مزین سوزش۔

اگنیشیا۔ ہسٹرکل کیسوں میں پیشاب کا دباؤ جانا۔

ایس میلفییکا۔ پیشاب کرتے وقت جلن اور دھن پیشاب کی زیادہ خواہش۔ مرن چند

قطرے پیشاب کم مقدار میں اور زنجین۔

کلیٹس۔ جب پیشاب کا بہاؤ پیشاب والی نالی کے اچانک تشنج کی وجہ سے رک پیشاب

کبھی کم کبھی زیادہ۔ پیشاب کا لیس دار مواد لیکن پیٹ نہ ہو۔ سوزش کا آغاز ہو۔

کونیم۔ پیشاب اچانک رک جائے کچھ وقت کے لئے جاری نہ ہو۔

کیفر۔ حاد کیسوں میں زہر یا ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے پیشاب تکلیف سے آئے بھولی

طاقت میں دیجئے۔

ٹیرینتھنا۔ پیشاب تکلیف سے آئے کمزور ہو۔

میگنیشیا میور۔ پیشاب مرن پیٹ کے پھجوں کو دبانے سے آئے۔

سارپیرلا۔ پیشاب کے بعد شدید تکلیف۔ پیشاب مرن کھڑے ہونے پر کرکے۔ ٹھنڈے

پرم قہر قہر ہو۔ ہر نذرہ دن بعد ایک ایم طاقت کی ایک غوراک دیجئے۔

کیناٹس انڈیکا۔ جلن۔ گرمی پیشاب سے پہلے۔ دوران میں اور بعد میں پیشاب کا دباؤ

اور خواہش لیکن پیشاب کا قطرہ بھی نہ آئے۔

چمافیلہ امبیلیکا۔ پیشاب گرم اور جلن دار بعض اوقات بڑی دھار میں زور سے نکلے۔

بعض اوقات دھاگے جیسی دھار اور خاتمے کے قریب قطرہ قطرہ آئے۔

پروٹس پائنوسا۔ پیشاب کرنے کے لئے آلت نائل کو دباؤ پڑے۔ سرزد کر تک پیشاب نکلتا

ہوا محسوس ہو اور واپس ہو جائے اور پیشاب کی نالی میں تکلیف ہو۔

ہیمپسلفر۔ پیشاب رکا ہوا۔ پیشاب خارج کرنے سے پہلے انتظار کرنا پڑے اور تباہ ہوتے

خارج ہو۔ محسوس کرے کہ ہمیشہ کچھ پیشاب شانہ میں رہ جاتا ہے۔

نیرم میور۔ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں پیشاب نہ کر کے عام گزرگاہ میں پیشاب نہ کر کے۔

میوٹر سکیم الیڈیکم۔ انٹرویو کو ہائے بغیر پیشاب نہ کر سکے۔

نکس و امیکا۔ پیشاب کا تشنجی اٹکاؤ۔ پیشاب کرتے وقت دباؤ ڈالنا پڑے۔ پیشاب کی بار بار حاجت اور خواہش۔ شانہ بھرا ہوا اور پیشاب قطرہ قطرہ آئے لیکن جب وہ دباؤ رلے یہ قطرہ قطرہ بھی ٹرک جائے۔

امبر گرہیا۔ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں پیشاب نہ کر سکے۔ خونی پیشاب سرخ پلٹھ کے ہمراہ۔ ایوفا سلیکیٹ۔ شانہ کی نالی کمزوری۔ پیشاب کی لا حاصل کوشش۔ پیشاب کی نالی سے لیسر بار بار اور پیپ کا اخراج۔ پیشاب کے دوران جلن۔ پیشاب کر چکنے کے بعد شانہ میں تلی کا احساس نہ ہو۔

مرک سلف۔ پیشاب خارج کرنے میں تکلیف جو باریک دھار ہوتی۔ بعض اوقات دو حصوں میں۔ جلن دار بعض اوقات شانہ خارج کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ بعض اوقات آخر میں خون کے چند قطرے خارج ہوتے ہیں۔

پرسیرا۔ صنف گھٹنوں کے بل ہونے پر پیشاب خارج ہونے لگی سے یا دو ہفتے بعد پتہ چاروں یعنی ہاتھوں اور پاؤں پر ٹپک لگائے۔

بورکیس۔ پیشاب پہلے پھر چلائے (بلغی پھلی کی سوزش) گرم پیشاب آگ کی طرح جلے۔ ایوفا۔ اعلیٰ ستقیم اور شانہ کے فالج کی وجہ سے پانخانہ اور پیشاب آہستہ آہستہ آئے۔ پیشاب سے کافی دیر پہلے پیٹھنا پڑے۔ پیشاب خارج نہ کر سکے، تب کمزور دھار۔ جلدی سے پیشاب خارج نہ کر سکے۔ بعض اوقات پیشاب نہ کر جاتا ہے۔ یہ قطرہ قطرہ آتا ہے۔ جب پانخانہ پر دباؤ ڈالے تو پیشاب نہ ہو یا بغیر دباؤ کے پیشاب نہ کر سکے۔

بستر پر پیشاب کر دینا۔ بلا ارادہ پیشاب کرنا

کاسٹیکم۔ رات کے پہلے حصہ میں لاشوری طور پر بستر پر پیشاب کر دینا۔ جب ناک بہے۔ رات کے وقت جب ٹھنڈ ہو۔ کھانسنے کے دوران، ہنسنے وقت یا پھینکنے وقت۔ ٹھنڈ سے زیادتی ہو۔

شانے کے پھوں کا فالج جو پیشاب خارج کرنے پر اثر انداز ہوں جس کے نتیجے کے طور پر پیشاب رک جائے۔ پیشاب کے سوراخ کے پھوں کا فالج جس کی وجہ سے بلا ارادہ پیشاب پیشاب کی دھار کا احساس ہی نہ ہو۔

جلیسمیم - سرد در والے مریضوں میں رات کو بستر پر پیشاب کر دینا۔ جب کاسٹیکم ناکام ہو جائے تو یہ دوائی آرام دیتی ہے۔

پلسٹیل - پیشاب رات کے پچھلے حصہ میں کر دیں خاص طور پر گرم مریضوں میں جب کھانے تو بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جائے۔ شریف اطمین - تبدیل ہونے والا ارادہ۔ کھلی ہوا میں جانے کی بڑی خواہش۔ چربی کو پسند نہ کرے۔ چڑچڑی طبیعت بے رنج۔ چچک کے بعد بستر پر پیشاب کرنے کی عادت۔

سیسیا - زرد رو بیمار لڑکیوں میں بلا ارادہ پیشاب کا خارج ہو جانا۔ رات کے پہلے حصہ میں پیشاب کے لئے مخصوص ہے۔ بچہ جو نہی سوتا ہے وہ پیشاب خارج کر دیتا ہے۔ یا سونے کے دو گھنٹے کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔

رٹاکس - جب سکون سے مریض بیٹھا ہو تو پیشاب خارج کر دے۔ جب چلے تو پیشاب روکنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔

برائی اونیا - جب چلے تو پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہو جائے۔ جب چلے تو پیشاب روکنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ یہ چلتے وقت ہے لیکن سکون سے بیٹھنے پر باقادر ہو۔

مائوسائیمس - چلتے پانی کی آواز سن کر بلا ارادہ پیشاب خارج ہو مائیفائیڈ کے بعد اینٹھن کے دوران بلا ارادہ پیشاب خارج ہو۔

بمنزواک ایسٹ - نیند کے دوران بلا ارادہ پیشاب خارج ہو رات میں کئی دفعہ پیشاب صاف نہ کیا جاسکے۔ یہ گارھے پیشاب کی طرح بُودے۔ کثافت اضافی کم ہو۔

الیومنا - شانے کے فالج کی وجہ سے پیشاب قطرہ قطرہ ہے۔ یہ رک جاتا ہے اور پھر قطرہ قطرہ بہہ جاتا ہے۔

کریوزوٹم - نیند کے پہلے حصہ میں جب نیند کی شدت کی وجہ سے بچہ کو جگایا جاسکے

بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جائے۔ مریض خواب میں دیکھے کہ وہ ابھی طرح سے موزوں جگہ پر پیشاب کر رہا ہے۔

ایکونڈٹم۔ بستر پر رات کے پیشاب اور پیشاب نہ آنے کے لئے دوائی ہے جب بستر پر پیشاب بغیر کسی قابل فہم وجہ کے نہ ہو سوئے عادت کے۔

انتقہرم۔ چلتے وقت یا سوتے وقت بلا ارادہ پیشاب خارج ہو۔

آرسینکیم الیم۔ بلا ارادہ پیشاب حمل کے دوران میں یا زچگی کے بعد۔

اکونائٹ این۔ پیاس اور ڈر کے پہلے بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جائے

کلکیریا سلف۔ رات کے وقت بستر میں پیشاب خارج کر دے۔ ٹھنڈ میں اناتہ محسوس کرے

سلفر۔ زرد۔ دبلے پتلے بچے بڑھے ہوئے پیٹ والے جو صینی اور مسالہ دار غذا کو بہت

پسند کریں۔ دھوئے جانے سے نفرت کریں۔ پیشاب خارج کرنے کی متواتر خواہش۔ چند قطرے

بلا ارادہ خارج کرنے کی خواہش۔ چند ایک قطرے پانی کے نل کو دیکھ کر باوجود کٹرول کے خارج

ہو جائیں۔ پیشاب کی ناقابل کٹرول خواہش۔

سورائیم۔ ایک عمل انگیز کے طور پر درائی جب دوسری ابھی طرح سے منتخب کی ہوئی افعیا

ناکام ہو جائیں۔ اگر میا کے دب جانے یا پھوڑے ٹھنسیوں یا شدید حاد، بیماری کے بعد۔

مریض ٹھنڈ محسوس کر لے اور دھونے سے ڈرتا ہے۔ پورے چاند کے دوران بستر پر پیشاب کرے

میتھورینم۔ رات کے وقت بستر پر پیشاب۔ زیادہ مقدار میں بہت ہی تیز بول والا۔ پیشاب

یا کم ہو یا بہت ہی رنگدار یا کافی زرد پیشاب چھبے والی بو کے ساتھ۔ حیض کے دوران تیزی

پیشاب قطرہ قطرہ آئے۔ شاذ کا سفید دہ تھج۔ پیشاب کے اختتام پر شدید درد۔

لائیکو پوریم۔ نیند کے دوران بلا ارادہ پیشاب۔ رات کے وقت بہت زیادہ پیشاب آئے

لیکن دن کے وقت ٹھیک ہو۔ کھانڈ اور گرم چیزوں کی خواہش۔

سنا۔ کربوں کی علامات کے ساتھ کافی پیشاب اور بلا ارادہ خارج ہو۔

سائیکوٹم۔ بد مزاج بچے جو اندھیرے سے ڈریں یا اکیلے رہنے سے ڈریں۔ عام طور پر اپن۔

چہرے کے پھولوں کا پھیرنا۔ پلوں کا چھکنا۔ تیل والی جلد۔ ٹی بی سے پہلے کے آثار۔
آلات تناسل کے گرد معمولی سوزش خاص طور پر عورتوں میں ہو۔

فیرم میٹ۔ حرکت کرتے وقت یا کھیل کے دوران میں بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جائے جب
قطرہ قطرہ بہے تو کپڑوں کو تر رکھے۔ حالت سکون میں پیشاب بند ہو جائے۔

لیکٹینیم۔ رات کے وقت کے بستر پر پیشاب کر دینا۔ خواب میں برفض پیشاب کرے جو اسے جگا دے۔
کلیریا کرب۔ دن کے وقت لگاؤ پیشاب خارج کرنے کی حاجت رات کو بستر پر پیشاب کرے
جلدی پسینہ آئے۔ جو اسے جگا دے۔ بھوک نہ ہونے کے برابر۔ بعض طرح کے پانی پینے کی وجہ سے پانی پینے۔
ایسڈ فاس۔ پیشاب کا بلا ارادہ اخراج خاص طور پر کھانسنے پر یا حرکت کرنے پر۔

سکوٹا اور دوسا۔ جب اٹھنے کی کوشش کرے تو جگڑائیں۔ آنکھوں کے آگے چیزیں گوتی نظر آئیں
دوبارہ لیٹ جانا پڑے۔ آنکھیں اندر دھنسی ہوئی آنکھ کی پتلیاں سکڑی ہوئی مٹانے کا فایز اس
لئے بلا ارادہ پیشاب خارج ہو۔

میگنیٹس پولس ٹریٹس۔ بطور عمل انگریز روائی کے کام آئے پہلے قطرہ قطرہ پیشاب ہر
نصف گھنٹہ بعد چند قطرے بلا ارادہ خارج ہو جائیں۔ بعد میں پیٹ کے دبانے سے زیادہ
پیشاب خارج ہو۔ رات کے وقت بلا ارادہ پیشاب جس کا جاگنے پر پستہ چلے۔

پیشاب زیادہ آئے

آر جینٹم نائٹرکیم۔ پیشاب زیادہ بار اور زیادہ مقدار میں آئے۔
نکس و امیکا۔ بدھضی کی وجہ سے پیشاب زیادہ بار آئے ۲۰ طاقت میں دیکھے۔
ولیسکیریا۔ رات میں میں تقریباً ۲۰ دفعہ پیشاب آئے درگزرہ اور دم شانہ، پیشاب
قطرہ قطرہ یہ پیشاب آئے، استقامت۔ تکلیف دہ پیشاب۔ پیپ۔ البیون اور پیشاب۔
میں خون کو ٹھیک کرتی ہے۔

مائیکل۔ بڑھا ہوا پیشاب گرم تکلیف دہ اور ڈنگ لگنے جیسا۔ درد پیشاب کی نالی میں۔
 پلسٹیدا۔ زیادہ پیشاب۔ جذبات میں تھوڑی سی براگتختگی سے قطرہ قطرہ پیشاب۔
 ہر وقت اس کا خیال رکھے یا پیشاب خارج ہو جائے۔
 کاسٹیکم۔ رات کو پیشاب کی بہت زیادہ حاجت لیکن پیشاب خارج کرنے میں کافی دیر لگے۔
 اگنیشیا۔ کافی پینے کے بعد زیادہ پیشاب آئے ہٹو یا میں۔
 سیبل سیرولیا۔ رات کے وقت پیشاب کرنے کی لگاتار خواہش۔ درم شانہ مشکل سے پیشاب
 آئے۔ سستی سبب پروائی۔ لا تعلق۔ ہمدردی کو پسند نہ کرے۔ پروسیٹ غدد کی تکلیف
 مدرنگو پراپچی طاقتوں میں دیکھے۔

میوڑیک الیڈ۔ دن رات بہت کثرت سے پیشاب جب ہوا خارج کرے تو پیشاب خارج کرے
 لیڈم پال۔ پیشاب بکثرت کبھی کم مقدار میں کبھی زیادہ پیشاب بہنے کے دوران دھار رگ
 جائے۔ خارش سرخی اور پیپ کا اخراج۔

مرک سال۔ مشروبات پینے مقابلے میں زیادہ پیشاب آئے اکثر اور کثرت سے پیشاب آئے۔
 ایومنا۔ پیشاب کثرت سے جو کافی دباؤ سے خارج ہو۔ اسے پاخانہ پروڈوڈا لائیڈ۔
 پیشاب خارج کرتے وقت۔ پیشاب کی نالی سے مکمل ہلکی پپی جوبلن کے ساتھ خارج ہو۔
 ایرنچیم۔ دن رات میں ہر نصف گھنٹہ بعد کثرت پیشاب جلن دار پیشاب۔ پیشاب کرتے وقت
 جلن اور بعض اوقات پیشاب کے بعد جلن۔ متواتر تکلیف۔ پیشاب قطرہ قطرہ آئے۔
 چیلیڈونیم۔ بہت ہی زیادہ اور کثرت سے سفید اور جھاگ دار پیشاب آئے۔

خون میں پیشاب

ٹیرنیتھنا۔ پیشاب میں خون کے لئے جھولی کی دوئی ہے۔ پس پھٹی کافی کی طرح
 پچھٹ۔ جلن دار اور پیشاب کا تکلیف کے ساتھ قطرہ قطرہ آنا۔ بنفشہ جیسی بو آئے اور بکثرت ہو۔
 فاسفورس۔ پیشاب میں خون خاص طور پر اور گرم گردہ۔ گردوں اور جگر پیشاب گدلا سرخ لچھے دکھاتے۔

چائنا سلف - پیشاب میں خون بغیر تکلیف یا پریشانی کے -
 ہیمامیلنس - پیشاب میں خون گردوں میں دھبے درد کے ساتھ -
 آرنیکا - میکانیکی زخم کی وجہ سے پیشاب میں خون -
 تھلاپی - بی - گہرا خون اور گاڑھا پیشاب -
 اومیم کین - خونی پیشاب سُرخ تلچھٹ کے ساتھ -
 پیسٹیللا - گہرے رنگ کا خونی پیشاب سوزاک کے دب جانے سے -
 نیرم فاس - رات کے وقت کثرت پیشاب - پسینے کے دوران رات کو نیند کے دوران
 بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جائے - پیشاب کی خواہ کرنے کیلئے انتظار کرنا پڑے -
 سیٹیفیگیریا - اکثر دور کثرت سے پیشاب کی حاجت تازہ شادی شدہ اعضاء میں عورتوں
 میں جو بہت ہی تکلیف دہ ہو -
 الفلفا کیو - اکثر اور کثرت سے پیشاب جس کے دوران ذرن اور گوشت میں کمی واقع ہو
 جھوک کم اور کمزوری -

پیشاب کا دب جانا

آرنیکا - زخموں یا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے پیشاب کا دب جانا -
 اکونائٹ این - ٹھنڈے موسم میں پیشاب کا دب جانا خاص طور پر بچپن میں جو
 تکلیف کی وجہ سے چلاؤں -
 اومیم - بچوں میں جب ڈر یا دایہ کے یعنی دودھ پلانے والی عورت کے جذبات
 کی زیادتی کی وجہ سے پیشاب یا مثانہ بھرا ہوا - پیشاب والے سوراخ کے سکرٹھنے یا فنڈس کے
 فالج کی وجہ سے -
 کینتھرکس - دبے ہوئے سوزاک میں پیشاب تکلیف سے خارج ہو - جلن کے ساتھ
 قطرہ قطرہ خارج ہوتا ہے -

ایسٹریلیا۔ کھلی ہوا لگنے سے پیشاب کا دب جانا یا بخار کے بعد۔ مریض اونگھتا ہے۔ غشی سی محسوس کرتا ہے یا بیہوشی سی محسوس کرتا ہے۔ نمایاں سوجن کے ساتھ۔ بچوں کو درد دھڑکنے کے دوران میں پیشاب کا دب جانا یا رکاوٹ۔ ۹ طاقت یا ۸۱ ملائم دیکھئے۔ مائوسٹیمس۔ پیشاب کی رکاوٹ۔ تنازعہ ہوا۔ مشکل سے پیشاب آئے۔ دباؤ دے دیا جائے۔ پیشاب نہ نکلتا۔ پیشاب بوند بوند آئے۔ شامہ کی اینٹھن۔ کم مقدار میں چمکدار رنگ یا غشی پیشاب از خود نکل جائے۔

لارویہ اسس۔ بخودی فالج کی وجہ سے پیشاب کا کرک جانا۔ دھار کر زور۔ پیشاب۔ از خود نکل جائے۔

آرٹیکلیم البم۔ ایس ایم والی علامات لیکن آرٹیکلیم البم کا مریض بہت ہی بے چین ہوتا ہے۔ وہ اونگھتا ہے اور نہ ہی بے ہوش ہوتا ہے۔ پیٹر وکیلیم۔ بچوں میں اوپر نیچے اچھلے کودنے سے پیشاب کا کرک جانا، درد اور جھنجھٹ چلانے کے ہمراہ۔ پیچہ پیشاب خارج کرنے کے قابل نہ ہو۔ کینائیس انڈیکس۔ پیشاب سے پہلے دوران میں اور بعد میں جلن اور پیشاب میں گرمی دباؤ لیکن ایک قطرہ بھی خارج نہ کر سکے۔

روٹا۔ رات کے وقت پیشاب غیر ارادی طور پر نکلے رہنا یا دن کے وقت کثرت پیشاب جس سے پیشاب کرنا دو بھر ہو جائے معلوم ہو کر شامہ کا فالج ہو اور جب پیشاب کرنے جائے تو نہ آئے۔ پلیٹیم میٹ۔ ایک عورت میں دو روز تک پیشاب نہ آیا جو بیہوش تھی کینٹھ سے معلوم ہو کر شامہ میں پیشاب نہیں ہے۔ علاج کیا گیا۔ مریضہ داعی علامات مرض سے کئی روز پہلے ظاہر کرتی تھی سورج میں سستی اور بجھنے میں سستی۔

ورٹیم البم۔ ہیضہ میں پیشاب کا کرک جانا۔ ویلی بوریس۔ خون میں زہر پھیل جانا اس کے ساتھ پیشاب کا کرک جانا۔ ٹیلیوں کے پھیل جانے کے ساتھ مکمل طور پر بیہوشی، روشنی سے متاثر نہ ہو۔ خون میں زہر کی وجہ سے اینٹھن سے پیشاب کی بو آئے

از خود یا بلا ارادہ پیشاب خارج ہو

تکلیف دہ

اکونائٹ اٹلن - اہمک سردی کی وجہ سے شانہ میں جلن دار درد - تیرھاٹنے والی درد گرم جلن دار گرم - سرخ پیشاب جس میں خون ہو - پیشاب کرتے وقت دباؤ ہو -
 کینتھم - چند ایک خونی پیشاب کے قطروں کا اخراج اور بعض درد سے دہرا ہو جائے
 اور جتنے چلائے اور کمر میں اذیت کی وجہ سے دانس کرے یا اچھلے کوڑے -
 پروفنس پائٹوسا - پیشاب سرزکرمک گزرتا ہوا محسوس ہوا رتبہ واپس آجائے اور پیشاب
 خارج کرتے وقت کافی دیر تک دباؤ ڈالے -

پیٹروسلینیم - تکلیف کانپنے پر مجبور کر دے اور اذیت کی وجہ سے دانس کرے یا اچھلے کوڑے -
 ایپس ایم - پروٹیٹ غدود کی وجہ سے دانس کرے یا اچھلے کوڑے -
 ایسڈ ٹائیٹرک - گوشت خور چھوڑا - پیشاب دلے آلات پر جو درد کرتا ہے - پیشاب کرتے
 وقت اور جماعت کے دوران آسانی سے نکلے -
 نکس ماسکاتا - مکمل کھانا کھانے کے بعد پیشاب کرتے وقت تکلیف -
 کینابلس انڈیکا - پیشاب سے پہلے اور پیشاب کے دوران تکلیف
 کینابلس ٹائیٹا - پیشاب سے پہلے اور پیشاب کے دوران میں تکلیف - یہ گوشت
 خور چھوڑے کی وجہ سے ہو سکتی (پیشاب کی نالی کے رستے کے پھلے ہوٹ براگاؤ) جیسے آسانی
 سے خون بہے -

سارسپرلا - بچہ پیشاب سے پہلے چلائے پیشاب تکلیف دہ ہو -

کثرت پیشاب

نکس وامیکا - جب بدھنمی کی وجہ سے رات کے وقت کئی دفعہ پیشاب آئے - ۲۰ ملائیں خوراک مٹجے -

- یورنیم نائٹریکیم - ضعفِ معدہ کی وجہ سے کثرتِ پیشاب -
 ایسڈ فاس - جو پیش گھٹنے میں متناہانی پئے اس سے زیادہ پیشاب آئے -
 چائٹا - برائٹٹس میں کرموں کی وجہ سے کثرتِ پیشاب -
 فائٹو لاکا - حیض کے دوران میں کثرتِ پیشاب -
 آگنیشیا - گلے کی خشکی کے ساتھ کثرتِ پیشاب -
 سٹروم - اعصابی سردرد کی وجہ سے کثرتِ پیشاب -
 ایکویریم - صاف اور ہلکا پیشاب کثرت میں خارج کرے -
 ولیکیرا - جب یورنیم نائٹریکیم ناکام ہو جائے -
 سینٹی کولا - زرد اور بے رنگ کثرتِ پیشاب - کثافت اضافی ۱۰۰۰۰ تھکاؤٹ محسوس کرے اور
 سخت تھکا ہوا - منہ کا ذائقہ بُرا اور بھوک نہ ہو - پانی کی زیادہ مقدار کے لئے شدید پیاس -
 میو ریکس - دن رات پیشاب کرنے کی زیادہ خواہش - پیشاب کا رنگ بے رنگ ہو -
 آریٹیم نائٹریکیم - زیادہ پیاس یا اس کے بغیر کثرتِ پیشاب -
 میڈورینم - جب دوسری ادویات ناکام ہو جائے تو یہ کثرتِ پیشاب کو ٹھیک کریتی ہے -

پیشاب کی نالی کی تنگی

سیلیشیا - اعضائے تناسل میں زخم کی وجہ سے نالی کی تنگی اور پیپ وقفہ وقفہ سے خارج ہو -
 گریفائٹس - پیشاب کے بہاؤ کا اچانک رگ جانا - نسوری رنگ کا مواد لمبے دھاگوں کی شکل میں -
 اوپیم - تھنجی تنگی نامکمل تخمیر شدہ شراب پینے کی وجہ سے اور شرابیوں میں بھی -
 سٹروم - جیسے کہ نالی کی تنگی کی وجہ سے پیشاب خارج نہ کیا جاسکے - پیشاب کا رنگ جلدنا -
 البیومن والا پیشاب -
 ایپس میل - حملِ محدودان میں البیومن کے لئے چوٹی کی دوائی ہے - سرخ بخار میں کھال تلنے
 کے دوران میں -

یو پیٹوریم پرف - استسقاء کے ساتھ پیشاب میں البیومن
ہیلی بوریس - پیشاب کم مقدار میں البیومن کے ساتھ تمام حجم کی استسقاءی سوچن -
گلوٹامائن - گردوں کی نالیوں کی سوزش سرور کے ہمراہ جو دھوپ میں پلنے کی وجہ سے ہو -
بازوؤں اور ہاتھوں کا سن ہو جانا - شدید بخنساہٹ سے تبدیل ہو - البیومن والے پیشاب کی
کثرت رات کے وقت اکثر پیشاب کیلئے اٹھنا پڑے -

کالی کلوریٹم - دم گردہ - پیشاب میں خون اور البیومن بھیلیاں کثرت پیشاب -
چمپائیلا - البیومن پیشاب میں خون کافی عرصہ کے سوزاک کی وجہ سے - پیشاب کم گہرا
بدبودار - گاڑھا نمایاں تلچھٹ - مواد -

فیرم آکسائیڈ - شربتوں میں استسقاء کے ساتھ البیومن، پیشاب میں دو دھیا تلچھٹ
اور میٹھی بو آئے -

مرکب سال - کم پیشاب کے ساتھ البیومن اور بیا سی زہو - ٹھنڈے مشروبات کی خواہش ہو -
لیکن اس سے متاثر ہو - چہرہ سوجا ہوا عیارے کی طرح دکھائی دے -
ایٹرونینم - نصف گلاس پانی میں ۲ گرین ۹ طافت کی دوائی حل کیجئے اور ہر گھنٹہ بعد
ایک چمچہ دیجئے یہ استسقاء جس میں پیشاب میں البیومن ہو ٹھیک کر دیتی ہے -
کاپیکیم - پیشاب میں البیومن جو روشنائی کی طرح سیاہ ہو جائے -

ایسٹرفاس - ٹائیٹرائڈ کے دوران میں یا بعد میں پیشاب میں البیومن -
ٹیرینیتھنا - لال بخار کے بعد پیشاب میں خون، البیومن اور چند بھیلیاں ہوں پیشاب
بنفصد کی بو والا، گہرا، بادلوں کی طرح اور دھوئیں جیسا -

میڈروٹیم - پیشاب میں البیومن - شیشے کی طرح کی بھیلیاں یا بلورنا بھیلیاں جب ماضی
موم کی طرح - پاؤں اور گھٹنوں کی سوچن اور تیلیوں کی مکھن -

مرکب کار - حمل کے ابتدائی دور میں البیومن -
فاسفورس - حمل کے آخر میں اور مکمل حمل کے دوران میں -

لیکٹی فلو۔ ٹائیفاؤڈ کے دوران میں یا بعد میں پیشاب میں البیومن۔
 بڑے ہونے البیومن وقفہ دار پیشاب کے بعد۔

کھار والا پیشاب۔

پیشابیا۔ ٹائفس میں۔
 کیتھرس۔ شانے کے زکام میں
 نیڈرم میور۔ سُرخ ہجھٹ۔

سیاہ

کالچیکم۔ لال بخار کے بعد روشنائی کی طرح سیاہ استقامت میں اور دم گڑھ میں (گردوں کی سوزش)
 لیکس۔ پیشاب تقریباً گہرا سرخ سوچن کے ہمراہ لال بخار کے بعد۔
 ٹیرینتھنا۔ جگر کی تکالیف میں پسّی ہوئی کافی ہجھٹ کے ساتھ۔
 ایسڈ کاربالک۔ پیشاب گہرا۔ سیاہ یا سیاہی مائل زیتون کی طرح سبز یا گھاس کی طرح ہنر
 دیکھے۔ پیشاب میں خون۔ پیشاب میں جربی۔

بھورا

ہائیمیریکم۔ سر میں زخم کی وجہ سے (شراب) کی طرح کا پیشاب۔
 آرسینکیم۔ گہرائی سے (شراب) کی طرح کا ٹائفس میں۔
 سپیا۔ گہری آمیزش والا۔
 لیٹڈرا۔ جگر کی خرابیوں کی وجہ سے۔
 بنزداک ایڈ۔ شانے کے زکام۔ پیشاب بہت ہی رنگ دار۔ بدبودار۔ گھوڑے
 کے پیشاب کی طرح ہو۔ جلاور کا رنگ۔
 ہیلی بورس۔ پسّی ہوئی کافی کی طرح۔
 ایپس میل۔ جلور میں (پیٹ کھولنے میں) پسّی ہوئی کافی کی طرح۔

پیشاب میں جھلیاں

کینتھرس - سلنڈر یا نالی کی طرح کی جھلیاں -
 فاسفورس - چرسیلی یا مومی جھلیاں -
 مرکب - چرسیلی دانے دار کافی مقدار میں جھلیاں - اس کی سطح پر لعابدار جھلی کے ٹکڑے
 اور چرسیلی تنزلی کا لت میں -
 ٹیسٹینتھنا - نالی دار سکڑی ہوئی یا جھٹی ہوئی جھلیاں (ایسوزن والی) -

پیشاب ٹھنڈا

ٹائٹلک الیڈ - جب پیشاب چھوٹے ٹھنڈے محسوس ہو - جب خارج ہو رہا ہو تو اسے
 ٹھنڈے محسوس ہو -

پیشاب میں چربی

مرکب - پیشاب میں چربی بکھری گولیاں ہوں -

سبزی مائل پیشاب

کاربالک الیڈ - پیشاب بزرگوں میں جیسا ازخود خارج ہو جائے یا بلا ارادہ خارج ہو جائے -
 مقعد سے مواد خارج ہو - گھاس کی طرح کے سبز پیشاب کے ساتھ -
 چیلیڈونیم - جب خرابیوں کی وجہ سے جگر ہو -

پیشاب میں انڈیکین

انڈول - پیشاب میں انڈیکین موجود ہو -

پیشاب دودھیا -

آئیوڈیم - دودھیا پیشاب یا خراشدار - گدلا یا زردی مائل سبز اور جسم کو گھلانے والا۔
 کلیمنگ - صبح کے وقت پیشاب دودھیا - صاف اور سفید - اہلے ہوئے تیل کی طرح
 ماسٹ - کثرت سے پیشاب آئے - تلچھٹ سفید یا سرخ -

ایسڈ فاس - جیسے کہ چاک ہلا کر ملا یا گیا ہو - چاک اور پانی ملا یا مکھن والے دودھ کی طرح -
 فاسفورس - پھٹے ہوئے دودھ کی طرح، اینٹوں کی طرح سُرخ رنگ کی تلچھٹ اور بھرتی -
 کالونستھ - ٹھنڈا کرنے پر دودھ کی طرح - ذیابیطس میں -
 سپونجیا - بھرا مائل -

ایپس میل - دماغ کے پروں میں ماد پانی آ جانے یا پتھوں کے دماغ میں پانی آ جانے کا
 آرم میٹ - دودھ کے مکھن کی طرح -
 اگر کیس - شام کے وقت دودھیا پیشاب -

پیشاب میں مواد

مرکازر - پیشاب میں صاف گئے ہوئے ہوں، بعد میں گاڑھا اور یادوں جیسا بھلی کی طرح
 کے ٹرے پیشاب کے -

پیریرا - گاڑھا لیس دار پیشاب -

چمافیل - رسیوں کی طرح گھاڑا پیشاب نمایاں تلچھٹ کم پیشاب - تلچھٹ میں مواد اور پتھر -

ایسڈ نرواک - پیشاب میں فاسفیٹ بطور تلچھٹ ہوں - شانہ کا نزلہ - پروٹینٹ غدد -

کاٹھ جانا - پیشاب کے تحت بُور دیکھئے -

لو - تیل جیسی بو

ایسڈ پلغرم - گریس جیسا جالا یا بھیتاں -
 لائیکو پوڈیم -

کو کا۔ - پھپھڑوں کی رِق میں تیل کی تہہ۔
 گلگیر یا گلوب۔ - بچوں میں تیل کی طرح کا پیشاب۔
 سبیل۔ - پیشاب میں تیل دار چھلتاں۔

بچوں کے اگزلیٹ

اگز الٹ لیسڈ۔ - پیشاب میں اگزلیٹ کے لئے جوٹی کی دوائی ہے
 کاسٹیکم۔ - البیومن کے ہمراہ پیشاب میں اگزلیٹ موجود ہوں۔
 ٹیرینٹھن۔ - اگزلیٹ کثرت ہے۔

پیشاب میں فاسفیٹ

رفیس۔ - پیشاب میں فاسفیٹس کی کمی یا کثرت۔
 ایسڈ فاس۔ - امونیم اور میگنیشیم کا فاسفیٹ کثرت سے ہو۔
 میگنیشیا فاس۔ - پیشاب میں مٹی جیسا فاسفیٹ۔ ٹائٹانیئم کے بعد پیشاب میں چوب آئے۔
 ایسڈ ٹائٹرک۔ - پیشاب خونی یا البیومن والا۔ فاسفیٹ والا پیشاب۔ خارج ہوتے وقت
 ٹھنڈا۔ گھوڑے کے پیشاب جیسی بو والا

پیشاب سرخ رنگ کا پیشاب

لوورسٹا۔ - جب سرخ رنگ کا پیشاب ہو۔

پیشاب۔ کم مقدار۔

ہیلی بروس۔ - پیشاب کم البیومن والا۔ تمام حجم پر مستحقاً سوچن والا بخار کے بعد۔
 ایپس ایم۔ - پیٹ کی سوچن میں۔

کروکس میٹ۔ - دماغ کی خرابیوں میں (دماغ متاثر ہو چکا ہو۔)
 اکونائٹ (این۔ - دسر میں پیشاب سیاہ۔ گھینٹے میں

آر جنٹلمن ٹریکیم - رحم کا خدو ج میں -

ڈیجیٹل ٹیس - دل کے استقامت میں -

کیلیب ٹیم - شام کے وقت - بانٹھن میں -

مرکال - کمزور دھار میں -

لیکس - لال بخار کے بعد استقامت میں -

پیشیا - ٹائفس میں -

گلگیر یا آریکیم - کم جلندار پیشاب البیومن اور تھیلیاں ہوں - مٹی کی نالیوں میں دباؤ کے بعد اور پانی پینے کے بعد -

پیشاب میں تلچھٹ

سیدیا - اینٹوں جیسی گرد - دماغی تکالیف میں - سُرخ سفوف - زرد چپکنے والی تلچھٹ - سفید چپکنے والی جھلی -

لائیکو پوڈیم - پیشاب میں سُرخ رت جیسی تلچھٹ گردوں میں درد کے ہمراہ یا اس کے بغیر -

میفاٹیس - اینٹوں جیسی تلچھٹ دمر میں -

کاسٹیکم - اینٹوں جیسی تلچھٹ براکٹائیس میں -

ایسکیوس ہپ - اینٹوں جیسی تلچھٹ، گہرے بیورے رنگ کی -

ایپس میل - پیسی ہوئی کافی کی طرح اینٹوں جیسی تلچھٹ -

سارپیرلایا - پیشاب میں سفید رت آئے -

سیلینیم - سفید مٹی جیسی تلچھٹ - چاندی کی طرح سفید تلچھٹ -

بروہیس و لیکریس - گہری سُرخ یا مہاگنی کے رنگ جیسی گرد جلی کی طرح تیرتی ہوئی

ٹوکڑیاں - گردوں میں درد جو پیشاب کی نالی اور شانہ تک جائے -

نیٹرم میور - گاڑھا سُرخ ہیکڑ والا پیشاب، تلچھٹ کے ساتھ اور گندی بو گندہ

جہو - کمزوری اور ماتھے کا درد -

کو بیویا۔ تلچھٹ زیادہ مقدار میں۔ بردھنکائی اور شانہ کا نزلہ۔
 فاسفورس۔ بدبودار پیشاب سرخ اور بھوری تلچھٹ۔ اعصابی قسم کے لوگ جو طفلان۔
 بادبلاں یا آوازوں سے متاثر ہوں۔ آسانی سے ڈر جائیں یا ذہل جائیں مثلاً صیبا چکر رنگ۔
 کینتھرس۔ گردوں میں دکھن، کاٹنے والی تحلیف جو پیشاب والی نالی اور شانہ
 تک بڑھے۔ پیشاب کم مقدار میں۔ گہرا رنگ پرانے کارے کی طرح کی تلچھٹ یا اینٹوں جیسی سرخ تلچھٹ۔
 لیڈم بال۔ پیشاب میں سرخ ریت۔ پیشاب والی نالی میں جلن پیشاب کرنے کے بعد۔
پیشاب کی بو۔

سیسیا۔ بدبودار اور کھٹی بدبو کمرے میں برداشت نہ ہو سکے۔
 ٹائٹرک الیڈ۔ گھوڑے کے پیشاب جیسی بو تیز بو۔ گرمی سے زیادتی۔
 ایکسس۔ گیس میں اور اعصابی بخار میں امونیا جیسی بو۔
 کوکا۔ دبے ہوئے سوزاک میں امونیا جیسی بو۔
 البسنٹم۔ گھوڑے کے پیشاب جیسی شدید بدبو۔ زرد رنگ پیشاب کرنے کی تواتر نزلہ۔
 ہیکس۔ بغیر دوسری علامات کے امونیا جیسی بو۔
 کاجو بیٹم۔ بلی کے پیشاب جیسی بو۔ گیس کا قوی بخ۔
 پیشیا۔ پیشاب میں گلے مٹے اندوں جیسی بو۔ ٹائیفائیڈ بخار میں گندی بو۔
 بنرواک الیڈ۔ بہت ہی گاڑھا پیشاب گھوڑے کے پیشاب جیسی بو۔ بدبودار گندی بو۔ بہت گہرا پیشاب۔
 بریٹامیور۔ خدود کے سونچنے میں۔ بدبودار پیشاب۔
 بوریکس۔ گرم پیشاب۔ چھٹنے والی بو کے ساتھ۔
 اوسیم۔ بنفشہ جیسی بو والا پیشاب۔
 انڈیکو۔ تھوڑا وقت ٹھہرنے کے بعد شدید گندی بدبو۔
 فیرم ایوڈیکم۔ پیشاب کی میٹھی بو۔

پیشاب کی کثافت اضافی

- یوریم یا میٹرکیم - کثافت اضافی بہت زیادتی ۱۰۳۰ سے ۱۰۳۴ کے درمیان -

ٹیسٹ بچھنا - کثافت اضافی ۱۰۱۸ جہی آنے والی بیماری میں -

پلیمیم - کثافت اضافی کم ۱۰۰۲ جب ۱۰۱۶ اور ۱۰۱۷ ہو -

بریک کلوٹس - ۱۰۰۳ - ۱۰۰۸ - ۱۰۲۰ جب ۱۰۱۶ اور ۱۰۲۴، ۱۰۲۴ اور ۱۰۳۴ کثافت اضافی کیلئے -

آرٹیکا ایم - ادھی کثافت اضافی کے لئے -

سینی کولا - کثافت اضافی ۱۰۰۰ زیادہ پیشاب آئے -

یورکائیڈ کے مرکبات میں پیشاب میں آئیں -

تھلاکسی بی - پیشاب میں یورائیڈ کی موجودگی کی وجہ سے بیماریاں -

نیرٹم سلف - پیشاب میں یورکائیڈ گیس اور گنٹھیاوی تکالیف کے ساتھ -

سیپیا - یورائیڈ کیٹ جگر کی خرابیوں کی وجہ سے پروٹینٹ خدود کی سوزش کی وجہ سے -

پلسٹیللا - امونیا کے یورٹس جن میں ضائع شدہ مواد ہو -

بنزواکائیڈ - یورکائیڈ بہت ہی زیادہ رنگ کے ساتھ اور بہت ہی بدبودار گنٹھیاوی

علامات کے ساتھ - گردوں کی ناکردگی -



گیارھواں

باب

آلاتِ تناسل کی بیماریاں

عام بیماریاں

سوزاک

سوزاک -

پلسٹیل - یہ دونوں دوائیاں ایک دوسرے اول بدل کر پھنڈے کے بعد اکوئارٹین - دی جانی چاہئے۔ مرض کے ابتدائی دور یعنی سوزش کی حالت میں،
 x ۹ طاقت میں دیتے۔ پلسٹیل بڑی طاقت میں اس وقت دی جائے جب مرضی نرم طبیعت
 بغیر پیاس - بغیر تکلیف کے پیشاب خارج کرے۔ زیادہ مقدار میں گاڑھا زرد مواد خضیوں
 کے سوزش کے ہمارہ یہ سب علامات ملی ہوئی چائیں کوئی ایک بھی غائب نہ ہو یعنی خندہ بالا
 علامات مکمل اور یقینی طور پر ہوں۔

کیو بی ا - جب سوزش والی حالت گزر جائے۔ پیشاب والی نالی میں پیشاب کرتے وقت جلن
 ہو۔ گاڑھا زرد اور پیپ کی طرح کا گہرا سرخ مواد خارج ہوتا ہے۔ یہ گاڑھا اور سوزاکی ہو سکتا ہے۔
 دوسرے اور آخری درجہ کے سوزاک کے لئے۔

سیلشیا - مزمن سوزاک کے لئے مخصوص دوائی ہے۔ پیپ یا پیپ کی طرح پیشاب
 کی نالی سے اخراج، معمولی قسم کے جھپٹے شامل ہوں۔ غولی اخراج جو پیپ دار ہو۔
 پیشاب کی نالی سے گاڑھی بدبو دار پیپ کا اخراج۔ یہ دوائی تقریباً تمام قسم کے سوزاکوں میں
 اعتماد کے ساتھ دی جاسکتی ہے۔ x ۱۰۰۰ طاقت میں استعمال کرائئے۔

کو بی ا - مزمن سوزاک میں کارآمد ہے۔ خزانہ کے ٹپٹ اور پیشاب والی نالی میں پیشاب
 کرتے وقت اور بعد میں کاٹنے والی، جلن دار تکلیف۔ پیشاب میں سے نقشہ جیسی خوشبو آئے۔
 قصوجا - مزمن سوزاک میں جب اخراج تپلا اور سبز پیشاب کرتے وقت جلن دار تکلیف ہو۔
 ٹیلو کو پیٹ - سوزاک نہایت شدید زرد اور سفید مواد کے اخراج کے ہمارہ پیشاب کی نالی
 میں ریگے۔ نمی کی نالیوں اور خضیوں میں جھپکے اور کھنچاؤ۔

پیٹروسیلیئم۔ پیشاب کی نالی میں شدید سوزش اور خارش۔ پیشاب کی نالی میں کوئی چیز کھرچنے کے لئے ڈالنا چاہیے۔

میتھورینم۔ دسبہ ہوئے سوزاک کے لئے جسمانی ساخت کے لحاظ دوائی ہے۔ پیشاب زیادہ رنگین۔ تیزبو والا۔ گہری گرےس جیسی تہہ سے ڈھانپا ہوا۔ شدید زرد۔ آہستہ آہستہ آئہ تناسل کی جڑ میں کاٹھے والا درد۔

سیلیا۔ حاد سوزاک کب جانے کے بعد سوزاک اور سوزاک کی مسوں کے لئے کارآمد ہے۔ آرتھرائٹس کے سرے پر گروٹر یعنی سرزاک کو مکمل طور پر گھیرے ہوئے ہو۔ پیشاب والی نالی میں بھالا لگنے اور گولی لگنے جیسے درد۔ پیشاب بہت بدبودار۔

کینتھکس۔ سوزاک کے دب جانے سے جب یہ شانہ کو متاثر کر دے۔ پیشاب رک جائے۔ پانی پینے سے جلن دار۔ جھجھے والی درد۔ خفیف کی تکلیف دہ سوزش۔ خارش ڈالنے والے لیکوڈیا۔ کے ہمراہ بچہ دانیوں کی سوزش۔

سناہیرس۔ پرانی سوزاک، پھیپہ آئنگ کے ہمراہ۔ کیپسکیم۔ پیپ دار، خونی، بدبودار اخراج۔ دبی ہوئی آئنگ و سوزاک۔ آلات تناسل کی ٹھنڈک اور سکڑن، بانجھ پن۔

الیومن۔ پیشاب کی نالی میں پھوڑے اور سختی، زرد رنگ کے اخراج۔ مزمن سوزاک میں رحم یا فسنزج پر پھنسیوں والے دھبے سے ہوں۔

تیرم سلف۔ ایسے مریض جن میں پھوڑے اور پانی پڑا ہوا ہو یا سب سے ہوں کو دی جانی جائیے۔ زردی نائل سبز اخراج کے ہمراہ مزمن سوزاک۔ سرزاک اور خفیف کی تکلیف کی سوزش۔ آلات تناسل۔ سرزاک اور آرتھرائٹس کی خارش اسے ملنے پر مجبور کرے۔ ملنے پر جلن۔ یہ دوا بہت ہی تکلیف کو دور کرتی ہے۔ غدودوں کی سوزش۔ خون کا پانی کی طرح پتلا ہو جانا۔ خون کا لوتھڑوں میں تبدیل ہو جانا۔ جلدی دانوں۔ پھوڑے پھنسی۔ ہاتھ پاؤں میں پھید کرنے کی تکلیف۔

پھنسی۔ آبلے۔ چھیلیاں کھیں۔ تپلا پانی سا خارج ہو۔ بسہری۔ آنکھ کے گھاؤ۔ ناخن بد شکل
یہ تمام علامات آنکھ یا سوزاک کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔

آر سینکیم سلف فلیو۔ شدید تکلیف کے ساتھ سوزاک۔ کافی زیادہ اخراج زرد جلندار
پیشاب کی تمام نالی کے ارد گرد جلن اور بے چینی۔

سلفر۔ بطور عمل ایگزیردوائی کے کام آتی ہے۔ ایسے مریض جو جلدی نزلہ زکام میں مبتلا
ہو جاتے ہیں یا اچھی طرح سے علاج نہ ہو سکنے کی وجہ سے خراب ہو جائے۔ متاثرہ حصوں
میں بہت زیادہ ہیجان۔ کھن اور جلن پائی جاتی ہے۔

کیٹا بلنس سٹائوا۔ پیشاب والی نالی میں جلن اور کھن پیشاب والے سوراخ سے نیکر
شانہ تک۔ پیشاب دلی نالی سوچی ہوئی ہو۔ اور دکھے۔ پیشاب کے دوران سوئی لگنے جیسی
پچھن۔ جلن وار درد پیشاب کے خاتمے پر زیادہ تکلیف۔ پیشاب کرنے کی تقریباً متواتر
خواہش۔ پیشاب سفیدی مائل اور گدلا۔

ملی فولیم۔ آلت تناسل اور خضیوں کی سوزش خونی اور لیسر پانی کے اخراج کے ساتھ۔
ایسڈ فلووریزا سوزاک۔ پیشاب کی نالی کی سکڑن۔ سوزا کی مادہ رات کو ت خارج ہو۔ جوں
پر زرد دھبہ ڈالے۔ پیشاب خارج کر کے بہت زیادہ خواہش پیشاب والی نالی میں جلن کے ہمراہ
آر سینکیم سلف فلیو۔ پرانے سوزاک اور سوزاک کے افزائش۔ پیشاب کرنے کی بہت زیادہ خواہش کے
ساتھ پیشاب والی نالی میں جلن۔ پیشاب خارج کرنے کے بعد چند ایک قطرہ خارج کرنے کی خواہش۔

کریوزوٹم۔ سوزاک اور پیشاب والی نالی کی سوزش۔ خاص طور پر جھرتوں میں۔ خلعت ہونے والا
خونی اور بہت ہی بدبو دار خراشدار اور خارش پیدا کرنے والا اور ب فرج پر خارش اور درد۔

کیمفر۔ پیشاب کا بوند بوند آنا جس کو پیشاب خارج کرنے سے افادہ ہو۔ شدید تشنگی اور پیشاب
کرنے کی لامحالہ کوشش۔ جبکہ شانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہو۔

مگسٹروس۔ پیشاب کا بوند بوند آنا۔ سوزاک۔ پیشاب خارج کرنے سے افادہ ہو۔ پیشاب
نرم دھار سے آئے اور کٹنے والی درد ہو۔ لب فرج سرخ اور سوجھے ہوئے۔ اندام نہانی یا فرج کی

سوزش۔ جو سوجی ہوئی ہو۔ سسرخ اور گرم۔ بنری مائل انحرافات۔ رات کے پینے۔ ہڈیوں میں دردیں جو پینے کے دوران زیادہ ہوں۔

زیرِ ناف بال یا پیسٹروکے بال۔

نائٹریک ایسڈ۔
سیلینیسم { زیرِ ناف بال گر جائیں۔

سلفر۔ بدبودار پسینہ کی وجہ سے زیرِ ناف بال تباہ ہو جائیں۔

آتشک

مرکب سال۔ یہ دوائی آتشک کی ہر شے کے لئے غیر موزوں اور خود حاصل کردہ آتشک کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ حاد کیسوں میں چھوٹی طاقت میں اور مزمن کیسوں میں بہت اونچی طاقتوں میں دی جانی چاہئے۔ آتشک کے زخم سسرخ جو اندرونی طرف پھیلیں۔ نمدی مائل۔ بدبودار اخراج کے ساتھ خون بہنے کا رجحان ہو۔ زبان پر نگلے یا پھیچھڑوں پر آتشکی چھوڑے۔ آتشکی گنٹھیا۔ آرم میٹ۔ دوسری شے کی آتشک کیلئے یہاں پارہ کا غلط استعمال کیا گیا ہو کے لئے موزوں ہے۔ چکلی دار چھوڑے میں سوراخ کرنے والی تکلیف۔ آتشک سے ناک کی ہڈیاں متاثر ہوئی ہوئی ہوں۔ دماغ میں گہرے شندیدہ تکلیف دینے والا سرد درد۔ تالو کا گھنا سڑنا اور دوسری چپٹی ہڈیوں کا گھنا سڑنا۔ عام پرانے نزلہ کے ہمارے۔

سنابیرس۔ آتشک جس میں سوزا کی پچیدگیاں شامل ہوں۔ زخم سخت اور اُبھرے ہوئے پیشاب والے راستے سے پھینکے۔

مرکب ڈلس۔ عورتوں کی آتشک میں مفید ہے جس میں آفات خاسل میں اور ایک ارد گرد گہرے ہوں۔ ایسڈ نائٹریک۔ یہ آتشکی چھوڑوں کے لئے مفید ہے جو گہرائی کا نسبت ارد گرد زیادہ پھیلے ہوئے ہوں۔ ڈنگ لگنے جیسی درد جیسے کہ بہت سی لکڑی کی نوکدار چفتیاں ہر وقت چھب رہی ہوں۔ سون

پہننے کا رجحان - دانے بکثرت ہوں - بے قاعدہ کنارے گومڑوں جیسی درد جیسے کہ بہت سی لکڑی کی پھتیلیں دھڑ رہی ہوں - گوبھی کے پھول جیسا اکاؤ - آتشکی بچے کی رات کی تکالیف جب اور تکالیف کے لئے دی گئی ادویات ناکام ہو جائیں - بچوں کا اور فرح کے لبوں کی آتشک - انجیر جیسے سے معتد کے ارد گرد چھاتی پر تانے کے رنگ کے پھوڑے چھیاں -

مرک کار - آتشکی پھوڑے - منہ - مسوڑھوں اور گلے میں بہت ہی زیادہ پھوڑوں کے ساتھ - بدبودار منہ - بہت زیادہ تھوک - ٹانسز یا گلے کے فغدو بڑھے ہوئے - زبان سبز اور پھوڑوں پر آتشکی پھوڑے -

کیلو ٹروئیس - دوسری بیچ پر آتشک جب ناسوں کے سرے موٹے ہو جائیں - مدر نکچے پانچ قطر سے فی خورد اک دیں -

ٹسٹلنجیا اسل - دوسری بیچ کی آتشک ہڈیوں میں تکلیف کے ساتھ گنٹھیا - ماتھے پر - پنڈلی کی ہڈی پر گانٹھیں - آتشکی کھانسی -

ٹائیگیل - گرم پیشاب زیادہ مقدار میں پیشاب کی نالی میں جلن اور ڈنگ لگنے جیسے درد - کالی آئیوڈ - گہرے آتشکی گھاؤ اور سبزہ کی جھن، پھوڑوں اور زبان پر آتشکی پھوڑے - آتشکی گنٹھیا خاص طور پر انگلیوں اور پنجوں کا - ماتھے کی انگلیوں کی ہڈیوں کا آہستہ آہستہ رخصا - بغیر تکلیف یا تکلیف کے ساتھ جلد پھیلنے والا زکام - تنھوں اور ہنڑوں پر پھالے ڈائے تکین دار اور جلن ناک کی ہڈیوں اور پیشانی کی ہڈیوں میں - کترنے والی - ہڈیوں میں سوراخ کرنے والی دردیں کھوٹری اور کمر گومڑ دار پھوڑے -

فلوکر الیڈ - منہ گلے اور ناک کے آتشکی پھوڑے جب اغراضات کا ڈھسے - خراشاں رہوں - مریض چڑچڑا اور زرد رنج - ہڈیوں کا گلنا سڑنا خاص طور پر ناک کی ہڈی اور پنڈلی کی ہڈیوں کا - کمر لیورٹ - آتشکی حادثات کو سیاہ کر دے اور گلا دے - منہ اور گلا دکھے پھوڑے ہوں اور پھٹے ہوئے ہوں -

کالی بائیکرومیکم - آتشکی زکام جو منہ ناک اور گلے کی بلغی جھیلیوں کو متاثر کریں - منہ اور ناک

میں سوراخ دار بھوڑے، بدبودار اور تباہ کن پرانا نزلہ کاڑھے زرد رطوبت ناک سے بہیں۔
 تھوہا۔ ٹی بی والی آنکھ۔ جلد پر گوڑے۔ بھوڑے۔ پیرے۔ مواد نکلے جو خراشدار ہو،
 اور خارش پیدا کرے۔

بیڈیا لگا۔ آنکھ کی پچے غلہ د سخت اور سو بجے ہوئے۔
 سفلینیم۔ یہ ایک نو سوڈ ہے۔ علاج کے شروع میں دی جانی چاہئے۔ یا بطور عمل انگیز کے
 جب اچھی طرح منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہوں۔
 لیکسس۔ یہ آنکھ کی پرانا ناکام اور پارے کے غلط استعمال کے بعد آواز کے آواز
 کے جاتے رہنے کو ٹھیک کر دیتا ہے۔

مردوں کی بیماریاں

دوسرا حصہ

کادہ تنوئیہ میں تولیدی جراثیم کی غیر موجودگی

غیر صحت مند حالت

ڈیمانہ۔ ضعف اعصاب کی وجہ سے پانچ پن میں تولیدی جراثیم کی غیر موجودگی۔ پروٹیکٹ و غلہ
 کا مزین اخراج۔

چینیم۔ جنسی خواہش کے دب جانے یا کم ہو جانے کی وجہ سے تولیدی جراثیم کی غیر موجودگی
 شکر کینیم۔ جب تولیدی جراثیم کی غیر موجودگی، شدید جنسی خواہشات کے ساتھ ماضیوں
 کی سوزش کے ساتھ۔

کونیم۔ تولیدی جراثیم کی غیر موجودگی یا پانچ پن کے ساتھ نامکمل ایسا دگی یا ایسا دگی کے
 بغیر جماعت میں طاقت کی کمی۔ عورت کی موجودگی ہی سے انزال ہو جائے یعنی عمل جماعت شروع
 کرنے سے پہلے ہی انزال ہو یا سرعت انزال ہو۔

ایٹوڈم۔ ان لوگوں کیلئے جن میں شدید یا متواتر ایسا دگی ہو۔ بطوری جنسی خواہش۔
کے ہمراہ۔ خُصیت چھوٹے ہو جائیں اور تکلیف دہ ہوں۔

کینسر سرجری کے تحت کینسر بھی دیکھیے

کونیم۔ آرتھرائٹس کا کینسر۔

پوونجیا۔ خُصیوں کا کینسر۔

جماعت یا مباشرت

گرفیٹیس۔ بانجھ پن کے ساتھ جماعت سے نفرت جماعت کے دوران میں اچانک
طاقت کھو بیٹھے۔ جماعت کے بعد ٹانگوں کی ٹھنڈک۔ جماعت کے بعد پسینہ۔

اگر لیس ایم۔ جماعت کے پسینہ۔

سیلینیم۔ جماعت کے بعد بد مزاج اور کمزوری محسوس کرے۔

کلکیر یا کارب۔ جماعت کے بعد گھٹنے جواب دے جائیں۔ جماعت کے بعد غیر مطمئن

اور ناراض۔ کمزوری لاحق ہو جائے۔

سٹیفسیگیر یا۔ جنسی براہ روی کے بُرے اثرات۔ دماغ ہر وقت جنسی خیالات پر ہی

مُرکز رہے۔ جماعت کے دوران اور بعد میں تنگی تنفس۔ جماعت کے بعد پیشاب کی خواہش۔

نیٹریم کارب۔ جماعت کے بعد پسینہ کی شدید وجہ جماعت کے بعد بہت پسینہ آئے۔

ٹائیٹینیم۔ جنسی کمزوری، مادہ منویہ کا بہت اخراج و انزال یا سرعت انزال۔

سیپیا۔ جماعت سے تکلیف۔ خاص طور پر چکر۔

میکس۔ جماعت کے بعد تھکے۔

کینتھر۔ پیشاب کی نالی میں جماعت کے بعد تکلیف۔

ڈنفے۔ جماعت کے بعد کے دانت درد۔

سٹرکٹیفکاس - مجامعت کے وقت ایسا دگی نہ ہو جیسا کہ وہ سے یا اس خیال سے کہ وہ نامزد ہے جبکہ ایسا ہرگز نہ ہو۔ ۲۲ طاقت میں استعمال کیجئے۔

ایسٹڈفاس - آؤتاسل اچانک ڈھیلا پڑ جائے اور مادہ منویہ خارج نہ ہو۔ مجامعت کے بعد خواہش جماع بہت بڑھ جائے و اختلام۔

سلفر - مکمل ایسا دگی سے پہلے ہی مادہ منویہ خارج ہو جائے۔

برٹیا کارب - جماع کے دوران سو جائے۔

لائیسین - مادہ منویہ بہت دیر سے خارج ہو۔ یا خارج ہی نہ ہو۔

لائیکوٹوڈیم - جماع سے نفرت آؤتاسل بھیا یا ہوا۔ جماع کے سو جائے۔ جماع کے دوران اچانک قوت و طاقت کھو بیٹھے یا مجامعت کی طاقت ہی نہ رہے۔

امبرگریسا - مجامعت کرتے وقت دمر۔

کالی کارب - جماع کے بعد نظر کمزور ہو جائے یا کمزور کرے۔

بیوفو - جماع کے دوران تشنج۔

سیبل سیرولاما - جماع کے بعد پیشاب کی تکلیف۔

مرک کار - جماع کے بعد معائے مستقیم میں درد کے دورے۔

کریوزوٹ - جماع کے بعد آؤتاسل میں جلن۔ جماع کے دوران میں۔ رحم کی طوہوں کے آؤتاسل پر لگنے سے جلن پیدا ہو۔

سٹرکٹیفکاس - جنسی ہیجان۔ ہاتھ متواتر آلات تناسل پر رہیں۔

مٹی فولیم - جماع کے دوران مادہ منویہ کا اخراج نہ ہو۔

نامردی - خواہش جماع کم ہو۔

نیوفو - ایسا دگی با سکل نہ ہو اور جماع کی خواہش با سکل نہ ہو۔ پانڈا یا پینڈب کے دوران از خود مادہ منویہ خارج ہو جائے۔

سیبل سیر ولینا۔ نامردی۔ آلات تناسل ٹھنڈے۔ خُصیے سکڑے۔ آلات تناسل سکڑا ہوا
ٹھنڈا اور پیشاب کی تکالیف۔

اوسمودیم۔ خواہش جماع کم سرگز میں ٹھنڈک کا احساس۔ رات کو احتلام۔ جلدی سے
مادہ منویہ خارج ہو جائے۔ نامکمل ایسا دگی کم لطف آئے۔

ڈامیانہ۔ نامردی کے لئے شاندار دوائی ہے۔ مدرنکچر کے پانچ سے دس قطر دن دقتہ دہجائے۔
ٹائٹینیم۔ جنسی کمزوری مادہ منویہ بہت جلد خارج ہو جائے یا سرعت انزال بار دہجے۔

کیلیڈیم۔ جلق یا تھد رسی کی وجہ سے نامردی۔ آلات تناسل ڈھیلا شدہ جنسی خواہشات
کے ساتھ نیم خرابی کی حالت میں ایسا دگی جب مکمل طور پر جاگ جائے تو ایسا دگی ختم ہو جائے۔

بورسے عیاشوں میں نامردی جو زوجہ کام کرنے کے نااہل ہوں ایسا دگی ختم ہو جائے۔ بورسے
اور پرانے پاپیوں کیلئے۔ ایسا دگی کے نہ ہونے کی وجہ سے، جنسی بے اعتدالیوں۔ تبا کو نوشی

یا تبا کو جانے کی وجہ سے دماغی اور جنسی طور پر شدید کمزور۔
لائکولودیم۔ بورسے میں نامردی۔ نیم نامرد۔ ہر ماہ ایم طاقت میں استعمال کیجئے!

سٹیفٹگیٹا
فامفورس { بے اعتدالیوں کی وجہ سے نامردی۔

ہاسکس
کیوریم میٹ { ذیابیطس کے ہمراہ نامردی۔

نیرٹرمیور۔ بنگلیکے ہونے کے دوران مادہ منویہ کام اخراج۔
یوہیمیم۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے نامردی کے لئے شاندار دوائی ہے۔

گرفیٹلیس۔ پوشیدہ گناہ کے بعد اور جنسی بے اعتدالیوں کے بعد نامردی۔

آزیکا
ایئریم { گرنے سے یا ضرب یا ٹکڑے لگنے سے نامردی۔

مسٹر کفریم فاس - مجامعت کے وقت ایسا دنگی نہ ہو جیسا کہ دوسرے یا اس خیال سے کہ وہ نامزد ہے جبکہ
 ایسا ہرگز نہ ہو۔ ۲۲ طاقت میں استعمال کیجئے۔
 ایسڈ فاس - آرنٹنل اچانک ڈھیلا پڑ جائے اور مادہ منوریہ خارج نہ ہو۔ مجامعت کے بعد
 خواہش جماعت بہت بڑھ جائے و اختلام۔
 سلفر - مکمل ایسا دنگی سے پہلے ہی مادہ منوریہ خارج ہو جائے۔
 بریٹاکارب - جماعت کے دوران سو جائے۔
 لائٹسین - مادہ منوریہ بہت دیر سے خارج ہو۔ یا خارج ہی نہ ہو۔
 لائیکو لوٹیم - جماعت سے نفرت آرنٹنل ٹھہرایا ہوا۔ جماعت کے سو جائے۔ جماعت کے دوران
 اچانک قوت و طاقت کھو بیٹھے یا مجامعت کی طاقت ہی نہ رہے۔
 امبرگریسا - مجامعت کرتے وقت دمر۔
 کالی کارب - جماعت کے بعد نظر کمزور ہو جائے یا کمزور کرے۔
 بیوفو - جماعت کے دوران تبخ۔
 سیبل سیرولاما - جماعت کے بعد پیشاب کی تکلیف۔
 مرک کار - جماعت کے بعد لمعائے مستقیم میں درد کے دورے۔
 کریوزوٹ - جماعت کے بعد آرنٹنل میں جلن۔ جماعت کے دوران میں۔ رحم کی ٹوہنوں کے
 آرنٹنل پر گلنے سے جلن پیدا ہو۔
 سٹر امونیم - جنسی ہیجان۔ ہاتھ متواتر آلات تناسل پر رہیں۔
 ملی فولیم - جماعت کے دوران مادہ منوریہ کا اخراج نہ ہو۔
 نامردی - خواہش جماعت کم ہو۔

نیوفو - ایسا دنگی بالکل نہ ہو اور جماعت کی خواہش بالکل نہ ہو۔ پانخانہ یا پیشاب کے دوران
 از خود مادہ منوریہ خارج ہو جائے۔

سیبل سیرولیا۔ نامردی۔ آلات تناسل ٹھنڈے۔ خبیثے سکڑے۔ آلت تناسل سکڑا ہوا
ٹھنڈا اور بچا بک تکلیف۔

اوسمودیم۔ خواہش جماع کم سرزکرمیں ٹھنڈک کا احساس۔ رات کو احتلام۔ جلدی سے
مادہ منویہ خارج ہو جائے۔ نامکمل ایسا دگی کم لطف آئے۔

ڈامیانہ۔ نامردی کے لئے شاندار دوائی ہے۔ مدر نکچر کے پانچ سے دس قطرہ دن و رات دجائے۔
ٹائٹینیم۔ جنسی کمزوری مادہ منویہ بہت جلد خارج ہو جائے یا سرعت انزال بار دجائے۔

کیلیڈیم۔ جلق یا تھوری کی وجہ سے نامردی۔ آلت تناسل ڈھیلا شدہ جنسی خواہشات
کے ساتھ نیم غرابی کی حالت میں ایسا دگی جب مکمل طور پر جاگ جائے تو ایسا دگی ختم ہو جائے۔

بوڑھے عیاشوں میں نامردی جو زوجہ کام کرنے کے نااہل ہوں ایسا دگی ختم ہو جائے۔ بوڑھے
اور پرانے بچیوں کیلئے۔ ایسا دگی کے نہ ہونے کی وجہ سے، جنسی بے اعتدالیوں۔ تبا کو نوشی

یا تبا کو جانے کی وجہ سے دماغی اور جنسی طور پر شدید کمزور۔

لائیکو لوڈیم۔ بوڑھے میں نامردی۔ نیم نامرد۔ ہر ماہ ایک طاقت میں استعمال کیجئے!

سٹیفٹگیٹا
فاسفورس { بے اعتدالیوں کی وجہ سے نامردی۔

ہاکس
کیوریم میٹ { ذیابیطس کے ہمراہ نامردی۔

نیٹرم میور۔ بنگلیگر ہونے کے دوران مادہ منویہ کام اخراج۔

یوہیمیم۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے نامردی کے لئے شاندار دوائی ہے۔

گرفیٹلیس۔ پوشیدہ گناہ کے بعد اور جنسی بے اعتدالیوں کے بعد نامردی۔

آرنیکا
ہائیپریم { گرنے سے یا ضرب یا ٹکڑ لگنے سے نامردی۔

مرکبوس کالی آیوڈیم { آنک کی وجہ سے نامردی۔ خواہش جماع بڑھی ہوئی

ایسٹ فلورک۔ گھٹیا قسم کے آدمی جب ایک آدمی ایک عورت سے مطمئن نہ ہو۔ ایک بیوی سے دوسری بیوی تبدیل کرے۔ گلی کی ٹکڑ ٹکڑ سے ہو کر معصوم عورتوں سے نظر بازی کرے۔ پرانے پاپیوں کے لئے بہترین دوائی ہے جو اپنی بیوی سے مطمئن نہ ہوں اپنے بچوں اور بیکار دوستوں سے نفرت کرے۔

فاسفورس۔ ایسا دگیاں بہت زیادہ ہوں اور ناقابلِ کنٹرول جنسی خیالات۔ نوجوانوں میں ایسا دگیاں جبکہ وہ جذبات کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں جب داغی اور اعصابی، خرابیاں ہوں۔

ٹیرنٹولا ایچ۔ شدید جنسی براہِ گھٹنگی۔

سٹیفس گیریا۔ نوجوانوں میں ناشائستہ جنسی بھوک۔

پیکرک ایسٹ۔ داغی اور اعصابی خرابیوں کی وجہ سے شدید بے تحاشا ایسا دگیاں آلت تناسل، اتنا تھوڑا کہ تقریباً پھٹنے کے قریب ہو۔

اورینگینیم۔ ایسا دگیوں کی شدید لہریں اور حلق یا ہتھکڑی کی عادت ۳۳ طاہیں دیکھئے۔

انتھرم۔ { خطرناک قسم کی جنسی بھوک جس کی تسکین کی ہر کوشش اسے تیز تر کر دے۔
کینٹھرس { حتیٰ کہ خود لذتی اختیار کرے اور پاگل ہو جائے۔ شدید ایسا دگیاں۔ دی گئی ترتیب میں استعمال کیجئے!۔

کیلیدیم۔ شدید جنسی خواہش نامردی کے ساتھ آلت تناسل ڈھیلا ڈھالا۔ صبح کے وقت نیم خوابی میں ایسا دگیاں جب جاگ جائے تو ایسا گایاں ختم۔ بغیر خواہش کے خود بخود ایسا دگیاں زبردست اور تسکلیف دہ ہوں۔

نکس و امیکا۔ شراب نوشی کی زیادتی کی وجہ سے جنسی بھوک۔
 کو نیم۔ تھوڑی سی ایسا دگی سے مادہ منویہ خانج ہو جائے۔ پروٹینٹ خدو کا سخت
 ہو جانا۔ دبی خواہش جنسی کے بڑے اثرات۔
 ماکسس۔ جنسی خواہش بڑی ہوئی۔
 پلاٹینا۔ لڑکوں سے بفعلی کی زبردست خواہش اور مقعد کی طرح جماع یا بااثر کی خواہش۔

ایسا دگیاں۔ خواہش جماع۔ جماع بھی دیکھئے۔

کو نیم۔ ایسا دگیاں نہ ہوں۔ نیم ایسا دگی یا بااثر ہی نہ ہو۔
 ڈال سکورا۔ دن اور رات۔
 نیٹرم میور۔ اکثر ایسا دگیاں اور انزال۔
 پلاٹینم۔ رات کے وقت شدید ایسا دگیاں۔
 کینتھر۔ شدید تکلیف دہ ایسا دگیاں۔
 کیمفر۔ خوابوں میں شدید ایسا دگیاں۔
 فاسفورس۔ ایسا دگیاں نہ ہوں یا کمزور ہوں۔
 کینا بس انڈیکا۔ حسب معمول ایسا دگیاں اور تکلیف دہ بڑھی ہوئی خواہشات۔
 ایسڈ پیرک۔ شدید ایسا دگیاں جو نیند کو خراب کر دیں یا شدید ایسا دگیوں کی وجہ سے نیند نہ آئے۔
 مردوں اور عورتوں میں جنسی نظام کی ضرورت سے زیادہ بڑھ چکنی گرم مغز یا داغ کے قاتر ہونے پر
 اومیم۔ صبح سویرے اٹھنے پر شدید ایسا دگیاں۔
 آئرکامانٹ۔ چلنے کے بعد ایسا دگیاں۔
 مسر ذکر۔ آہ تناسل کا نرم مسر۔ مسر ذکر کے پرک سوزش بھی دیکھئے۔

آرینکم البم۔ مسر ذکر کا چھنلا بچیرے۔ پیشاب کرتے وقت مسر ذکر میں جلن۔

مرک کار۔ سرزکر کی مزن سوزش۔ چو پیل بد بو دار افرازات۔ سرزکر حساس ہو۔ دکھن ہو۔
 مرکورس۔ گوشت خود بھوڑے سرزکر پر۔
 نائیرنگ ایسڈ۔ سرزکر کے گردنی۔
 کوپوا۔ سوزاک کے بعد سرزکر میں درد۔
 رشاکس۔ سرزکر کے پردہ کی سوزش کی وجہ سے پردہ کا پیچھے ہٹ جانا اور سرزکر میں تکلیف۔
 سٹار سیر بلا۔ سرزکر میں پھاڑنے والی تکلیف۔
 آرم میورنیٹ۔ سرزکر پر گہرے ناسور (گوشت خود بھوڑے)۔
 ایسڈ فاس۔ سرزکر پر مٹے ہندی قسم کا آگڑ۔
 کالی میور۔ آتشک کے زخم کے بعد سرزکر پر پتے۔
 سلفر۔ زخم مرع کی کافی جیسے مٹے۔ اسفنج کی طرح آسانی سے خون بہے۔ سرزکر بڑن کی طرح ٹھنڈا۔
 تھوجا۔ سوزاک کے بعد مٹے بھوڑے۔ نوکلر۔ ایسڈ اور اس کا اخراج۔

آرم سلف۔ سرزکر پر گوڑا پتے نامردی یا نامردی کے بغیر۔ سرزکر پر سوزش۔
نخعیوں کی پھیلی میں پانی بھجنا۔ نامردی۔ جلیق یا ہتھوری
 نخعیوں کی سوزش۔ خواہش کم ہو جائے دیکھے۔

پلاٹینم۔ بلوغت سے پہلے خلق اور اس کے اثرات۔
 کوئیم۔ جلیق کے بُرے اثرات اور جنسی بے اعتدالیوں کے بُرے اثرات۔
 انگس کاٹس۔ خلق اور جنسی بے اعتدالیوں کے بعد عضو مخصوص کی کمزوری۔ اس خوبصورت
 نوجوان بیوی بھی ایسا دنگی دہر بن سکے۔

کیلیڈیم۔ خلق کی حادث ہٹانے کیلئے اور اس کے اثرات کو دور کیلئے اچھی دوائی ہے عضو
 مخصوص اور سرزکر ٹھپلا ہو جائے۔ عضو مخصوص ڈھیلا ڈھالا۔
 یوفو۔ خلق کیلئے علیحدگی کی خواہش۔ ذہنی حالت کمزور۔ غصے میں گھر کے اندر دوڑتا پھرے اور ہمیں ہو۔
 اور گینیم ایم۔ جلیق کی شدید خواہش جو روکی نہ جا سکے جنسی خواہش اسے پاگل بنا دے۔

اسٹیل لگو۔ جلن کی دہائی نہ جلنے والی خواہش۔ اعلانِ رنگین خواب۔
 سیٹھ فیکیر یا۔ بچوں میں جلن کی حادث اور اس کے بُرے اثرات۔
لڑکوں میں دودھ۔

مرک مال۔ لڑکوں کی چھاتیوں میں دودھ۔
 غلبہ شہوت۔ خواتین میں خواہشِ جماع انتہائی عروج پر ہونا۔
 کینتھرس۔ اگر آلاتِ تناسل میں ہیجان کی وجہ سے ہو۔
 ٹمکس و امیکا۔ شراب نوشی کی بے اعتدالیوں سے وجہ سے۔
 فاسفورس {
 یکریک ایسڈ {
 داغی یا اعلیٰ خرابیوں کی وجہ سے۔

آلہ تناسل۔ (احساس کہ آلہ تناسل نہ ہو)
 کوکین { احساس کہ آلہ تناسل نہیں ہے
 کوکا {

جلن کریانوفٹ۔ آلہ تناسل میں جماعت کے دوران جلن اور پھر دوسرے دن سوزش ہونے۔
 میگنٹیا میور۔ صبح کے وقت ایستائیوں کے ساتھ جلن۔
 پیریرا۔ بوز بوز پیشاب کے ساتھ جلن وقفے وقفے کے ساتھ ہو۔
آلہ تناسل ٹھنڈا۔

اگنس کاسٹس { آلہ تناسل ٹھنڈا
 لائیکوپوڈیم {

چھنیاں۔ گریٹیس۔ وادیسی چھنیاں آلہ تناسل پر۔

کروٹنِ حکیم۔ چھلے دار چھنیاں آلہ تناسل پر۔ وادیسی چھنیاں آلہ تناسل پر۔
 آرنیکا مانٹ۔ زخموں کے بعد جلن۔ چھلے دار چھنیاں۔ جامنی رنگ کی چھنیاں آلہ تناسل پر۔

کائینیکم - آرتھناسل کی غارش -

آرتھناسل کی پٹے کھنا - کھینچنا -

سٹرپٹومیم - ہر وقت آلاتِ تناسل پر ہاتھ رکھے رہے -

بیوفو - ہر وقت آلاتِ تناسل پر ہاتھ انہیں کھینچ رہے -

آلاتِ تناسل میں درد -

اگیشیا - کھانتے وقت درد ہو -

ڈیجیٹلس - مادہ منورہ کے اخراج پر درد -

پیٹروسیلینیم - پشایب کی نالی کی بیماریوں میں جڑ میں درد خاص طور پر سوزاک میں -

کیسکیم - رات کے وقت پر درد ایسا دگیاں -

نکس و امیکام - صبح کے وقت پر درد ایسا دگیاں

کالی کارب - کافی زیادہ انزال یا مادہ منورہ کے اخراج پر درد -

نائیٹرک ایسڈ - رات کے وقت تشنجی درد

کھینچنا -

مرک سال

بچہ متواتر آرتھناسل کو کھینچتا ہے

دی گئی ترتیب میں دوائیاں استعمال کرائیں -

کینتھرس

آرتھناسل سکڑا ہوا

اگیشیا - جھوٹا ہوا -

بیوفو - آرتھناسل کا سکڑ جانا -

بچھوٹا -

ایسکوبوڈیم - جلق یا تھری کے بعد آرتھناسل جھوٹا ہوا -

اگنس کاسٹس - آرتھناسل ٹھنڈا اور جھوٹا ہوا -

اگیشیا - آرتھناسل جھوٹا اور سکڑا ہوا -

ناٹریک الیڈ۔ آلتناسل کی ساری جلد کا گلتا سڑنا، عضو مخصوص کو مکمل طور پر نگار دے۔
لیکسس۔ آلتناسل کی اندرونی جلد کا خراب ہونا۔ اور ملین زیادہ ہو۔

انزال

آلتناسل کے گھونگھٹ۔ سرخباد۔
ایپس ایم۔ ختنہ کے بعد سرخباد۔

آلتناسل کی سوزش

مکریورس۔ آلتناسل کا گھونگھٹ سوجا ہوا، پانی سے بھرا ہوتا ہوا، سر ذکر کے ہمراہ کے لئے سوزی
کی دوائی ہے۔ باریک سرخ چٹنیاں۔ چیرے اور کل چٹا ملین کے ہمراہ۔ کاٹنے والا درد۔ عارض اور درد۔
کلکیر یا کارب۔ زرد پیپ کے ہمراہ سوزش سے سرخ نہیں ہوتے بلکہ مفید ہوتے ہیں۔ سر ذکر میں
کاٹنے والی تکلیف اور ملین آلتناسل کا گھونگھٹ سرخ اور سوجا ہوا۔

کورٹلم۔ دکھن جیسے کرسٹیاں جھوٹی جاری ہوں۔

ایپس ایلم۔ پیپ کو روکنے کیلئے یا پیپ بنانے کے لئے بہترین دوائی ہے۔

ناٹریک الیڈ۔ اندرونی سطح کی سوزش اور اس کے کناروں کی سوزش پیپ نکلنے والے ناسور جو چٹے
ہوں۔ ڈنگ لگنے والے اور مچاٹنے والے درد۔ شام کے وقت زیادتی ہو اور تمام رات نیند خراب کریں۔
اکونائٹ این۔ گھونگھٹ اور سر ذکر میں ریگنے اور ڈنگ لگنے والے درد۔ گھونگھٹ سوجا ہوا اور سوزش
زرد۔ سر ذکر میں کاٹنے والے درد۔

ایپس ایم۔ آلتناسل کی سوزش اور استقامت ڈنگ لگنے اور ملین دار دریں۔

آرٹیکا ایم۔ زخم کی وجہ سے سوزشی کیفیت۔ پٹنے کے بعد میتا دیگیں۔

کروٹن ٹیکسٹیم۔ گھونٹ یا لکڑی کی اندرونی سطح کی سوزش سر ذکر میں پیشاب کرتے وقت ملین۔ سر ذکر اور
خفیوں پر سخت خارش جس سے دل گھبرا جائے۔

کونیم۔ گھونگھٹ کی سوزش ڈمگ لگنے جیسی اور کاٹنے والی درد۔ پیشاب کرتے وقت آرتھرائس میں
پھاڑنے والی درد۔

رٹا کس۔ سر ذکر۔ آرتھرائس اور گھونگھٹ کی سُرخی اور سوزش پیشاب کی نالی میں پیشاب
کرنے کے بعد جلن اور کاٹنے والا درد۔

سنا بیرس۔ گھونگھٹ کی سوزش شدید غارش کے ساتھ۔

خارش

سنا بیرس۔ غارش کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔

اگنیشا۔ اندرونی سطح پر غارش۔

کونیم۔ گھونگھٹ پر غارش ہر حرکت پر پروٹھیٹ غدد کے اس کا اخراج۔

رٹا کس۔ یہاں شانہ غارش جو رات کو زیادہ ہو۔

بیوفورنیم۔ [" " " " "]

وائیولاٹر۔ سوزش کے ساتھ غارش۔

سار سپر بلا۔ گھونگھٹ پر ناقابل برداشت غارگی اخراج کے ہمراہ۔ سر ذکر سرخ اور سوجا ہوا۔

گھونگھٹ کے پردہ کی تنگی

مرکبوریس۔ گھونگھٹ کے پردہ کی تنگی کے لئے بہترین دوائی ہے۔

سلفر۔ پنچوں میں بدبودار پیپ کے اخراج کے ہمراہ

ہیمپرسلفر۔ پیپ کا تکلفا پنکین دار درد۔

سنا بیرس۔ پیپ کی طرح کا اخراج۔ بدبودار پیپ (دوسری پیپ کی آتشک) گھونگھٹ سوجا ہوا۔

ٹائٹلک الیڈ۔ گھونگھٹ کی تنگی سوزش کے ہمراہ۔ آتشک۔ گھونگھٹ کی تنگی کیلئے چوٹی کی دوائی ہے۔

ایسٹک الیڈ۔ گھونگھٹ مٹا۔ چاہو ایکٹرانہ جاسکے اور شدید غارش ہو۔

مرکبوریس۔ آتشک کی وجہ سے ہو۔

جیکازنڈا۔ گھونگھٹ کی سوزش تکلیف دہ اور سوجی ہوئی۔

اکونائٹ این۔
ایپس ایم۔
بیلادونا۔

سوزش

گرفیٹس۔ پانی کے جبرے ہوئے بڑے پھالے کی سوزش بغیر تکلیف کے۔
رٹاکس۔ گہری سوزش تکلیف آور جلن کے ہمراہ۔
کیلیڈیم۔ کناروں کے ساتھ ساتھ سوزش۔
میک سال۔ جلد بزدلک کنچنی نہ جاسکے۔ ایک کرنے پر نمایاں زردی مائل پیپ کا اخراج۔
خیزس۔ پروٹھیٹ غدود۔ ناسور

کروٹیس ایچ۔ پروٹھیٹ میں کینسرے خون آئے۔

اخراج مواد

کوئم۔ ہیزش یا ایسا لگی پراخراج مواد ہو گھونگھٹ پر غاثر کے ساتھ۔

نکسوامیکا۔
سپیا۔
سیلینیم۔

کالی بائیکرومیک۔ پروٹھیٹ غدود کی مزمن سوزش میں پاخانے کے دوران مواد خارج ہو۔

سلیشیا۔ پاخانہ کے لئے زور لگاتے وقت مواد خارج ہو۔

نایٹرک ایسڈ۔ پاخانہ کے بعد مواد خارج ہو۔

تھوجا۔ جب مواد بزی مائل خارج ہو۔

سٹیفگیریا۔ جنسی اعضاء کے بعد پروٹھیٹ رس کا اخراج۔

روپيٹ غودکا برطرحہ جانا۔

اکونائٹ { ابتدائی سوزش کے لئے منور دوائیاں ہیں۔
بیلادونا " " "

سپنو نجیا۔ جب پیشاب کی دھار چھوٹی ہو کر کے لئے مزدور ہے۔ دھار جھاگ دار۔

خصیصوں کی سوزش اور منی کی نالیوں کی سوزش۔

برٹیا کارب - بڑھاپے میں یرو سٹیٹ غدود کا بڑھ جانا ۔

آئرینیکا مانٹ - زرخوں کی صورت میں جب بطور ذریعہ زخم کی دھڑ سے ہو۔ احساس جیسے کہ
خوش دار اور کوٹا پٹیا گیا۔ تیرکی طرح کے درد اور جھنجھٹا ہٹ سن ہونے کے برابر۔
تھو جوا۔ عادی سوزش جیسے کہ سوزاک سے ہو۔

تھو جا۔ عاد سوزش جیسے کہ سوزاک سے ہو۔

اوسمیں۔ پشایاب میں خون آئے پروسٹیٹ غدود کے ٹوٹنے کی وجہ سے یا پروسٹیٹ کی بوائیر۔

کوئیم۔ پردیٹ غدد کے بڑھ جانے کیلئے چربی کی دوائی ہے۔

سیدیل سر۔ فرزند یا مادر بھوڑی پٹیاب کے اخراج میں میں تکلیف ہو یا جلن ہو۔

کینا بس انڈیکا۔ معقد کے حصہ میں بیٹھے وقت کو لے کا احساس ہو۔

فاسفورس - پروٹیٹ عدد کا مزن بڑھ - پروٹیٹ رس بہنے کے ہمراہ -

سولیدگیو - مزن بھوتری پر ۲۲ طاقت میں دیجے۔

سیفگیر یا۔ پشاب کی اکثر خواہش کم مقدار میں باریک دھاریا قطرہ قطرہ پشاب

کے دوران اور بعد میں جلن پشیا ب کے بعد پشیا ب کی خواہش ہو جیسے کہ شام خالی نہ ہوا ہو۔

پھر میرا۔ پرنسٹن فڈز کے برصغیر کے ساتھ پیشاب میں رکاوٹ ہو۔

آسٹوڈیم - خازری اور ٹی بی کے مریض لوگوں میں پروٹیسٹ غدود کی سوزش -

مرک آئیوود۔ جن کیسوں میں پروڈیٹ فددروں میں بیب ڈیگٹی ہو۔

ڈیجی ٹیلیس - دل کی تکلیف کے ساتھ پروٹیسٹ غدود کا بڑھ جانا۔ پیشاب کا رگ جانا۔
یا قطرہ قطرہ آنا پروٹیسٹ غدود کے بڑھنے کے ساتھ۔ پیشاب کے دب جانے سے استقاء،
جسریان اور اختلام۔

شدید جنسی خواہش - مادہ منویہ کا اخراج

(دیکھئے مضمون کی سوزش۔ مضمون کا گوشت بھدا پھوڑا۔ عورتوں میں خواہش جماع کا
غیر معمولی غلبہ۔ خواہش بڑھی ہوئی۔ انزال۔ جریان منی۔)
ایسٹرفاس - مادہ منویہ کا اخراج شدید کمزوری محسوس ہونا لگیں کمزور ہو جائیں۔ بڑھ
میں جلن۔ آلت ناسل ڈھیلا اور خستہ پیلے۔ آلت ناسل میں ایستادگی کی طاقت نہ ہو۔ ایستادگی
غیر تسلی بخش۔ جماعت کے دوران جلد ہی انزال ہو جائے۔ آلت ناسل کا اچانک ڈھیلا پڑ جانا۔
انزال نہ ہو۔ غلبہ شہوت کے ساتھ یا اس کے بغیر مادہ منویہ کا اخراج۔
سیلینیم - مادہ منویہ کا اخراج کے لئے پھوٹی کی دوائی ہے۔ یہ تقریباً ۹۵ فیصد کمیوں
کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ انزال جلد ہو جذبہ شہوت دیر تک رہے۔

کالی بروم } یہ دونوں دوائیاں زیادہ اخراج منی کے لئے موزوں ہیں جب دل کے
ڈیجی ٹیلیس } دھکن ساتھ ہوا اخراج ہو تو ڈیجی ٹیلیس موزوں ہے۔
پلرک ایسٹ - شدید ایستادگیاں یا خیرش اور بہت زیادہ خواہش جماع۔
سیلینیا - پاخانہ کے وقت مادہ منویہ کا اخراج جھکے پاخانہ بڑا ہوا خارج کرنا مشکل ہو۔
کاسٹیکم - جب خونی مادہ منویہ خارج ہو
سلفر - مکمل ایستادگی سے پہلے مادہ منویہ خارج ہو جائے۔
گرنفائیٹس - مادہ منویہ خارج نہ ہو۔
کلکیر یا کارب - مادہ منویہ کا اخراج آہستہ آہستہ مہلن اور ڈنگ لگنے جیسے درد۔ انزال آکر ہو۔
سیپیا - نامکمل ایستادگی کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج۔
کاربووٹرچ - انزال بہت جلد اور سر میں گرج محسوس ہو۔

لافی سین۔ مادہ منویہ کا اخراج نہ ہو یا دیر سے ہو۔

فارمیکا۔ مادہ منویہ کا اخراج کم نامکمل ایستادگی کے ہمراہ۔

کونیم۔ معمولی سے جذبات کی براہِ گنجشگی کے پرادہ منویہ خارج ہو جائے عورتوں کی موجودگی میں آسانی سے ایستادگی ہو جائے اور مادہ منویہ خارج ہو جائے۔

چائنا۔ مادہ منویہ کے اخراج کی وجہ سے کمزوری کے لئے۔

جلیسیسیم۔ بغیر خواب کے از خود مادہ منویہ کے اخراج کے ساتھ رات کے وقت بغیر غلبہ شہوت کے خاص طور پر صبح کے وقت کمزور کرے۔

ویسچی ٹلیس۔ گہری نیند میں مادہ منویہ کا اخراج ہو بغیر جاگنے کے۔

شائٹم۔ شدید کمزوری کے ساتھ مادہ منویہ کا اخراج۔ آسانی سے غلبہ شہوت ہو۔ بازو کھلنے پر ہی غلبہ شہوت ہو جائے۔

پہرسیکا۔ پانخانہ کے دوران مادہ منویہ کا اخراج بغیر ایستادگی کے زیریں لہن میں خالی پن کا احساس اور آلات تناسل میں درد۔

ایسٹیک الیڈ۔ کمزور کرنے والے مادہ منویہ کے اخراج۔ پانخانہ کے وقت مادہ منویہ کا اخراج ہو۔ اکونائٹ کیم۔ شہوانی خوابوں کے بغیر مادہ منویہ کا اخراج۔

کالی بروم۔ مادہ منویہ کا اخراج جلیقین طبیعت۔ گند خیالات۔ کمزور۔ لکھڑائی چال اور شدید کمزوری یہ غلبہ شہوت کے ساتھ یا اس کے بغیر ہو سکتا ہے۔

زنکم میٹ۔ آلات تناسل کا غلط بہت زیادہ استعمال افسردگی اور نامیدی کے ساتھ زرد دھنسا ہوا چہرہ، آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔

کیتھرس۔ شدید ایستادگی کے ساتھ انزال۔

کیلیڈ ٹیم۔ جنسی بے اعتدالیوں کے بُرے اثرات کے بعد مادہ منویہ کا انزال بغیر کسی جنسی خواہش کے یا جذبات کی براہِ گنجشگی کے انزال۔ رات کو خوابوں کے بغیر یا غیر جنسی خوابوں کی بغیر اور جلق اور اس کے مابعد اثرات۔ آلہ تناسل اور سر ذکر پیلہ۔

اگنس کاٹس - پرانے پاپیوں میں جہلان - جنسی اعضا ٹھنڈا اور جنسی اعضا کی ٹھوک نہ ہو

اور مریض افسردہ ہو -

لائیکو لورڈیم - مکمل نامردی میں مادہ منویہ کا اخراج جبکہ ایستادگی بالکل ہی نہ ہوں یا غیر مکمل آلات تناسل ٹھنڈے اور سکڑے ہوئے -

ٹائٹنیم -

سٹیف گیسر یا - حلق کی وجہ سے شدید کمزوری جس کی وجہ سے مادہ منویہ کا اخراج - آنکھوں کے گرد گہرے حلقے - بے نور ہنجرہ - نمایاں چڑچڑاہٹ اور شرمیل پن -

ڈائسکوریہ - ناطاقتی سے مادہ منویہ کا اخراج - عضو مخصوص اتنا ڈھیلہ ڈھالا کہ ایک راستہ میں دو دو تین بار انزال ہو - خواب میں جس کے بعد کمزوری ہو - خاص طور گھٹنوں کی کمزوری - اوجھم - زیادہ مقدار میں منویہ مادہ کا اخراج اور دیر تک جاری رہے -

اسٹیل اگو - جسم میں خواب میں ایستادگی اور شاندار خواب - ٹیڑھ ٹولا - اچھ - مادہ منویہ غنی جلن اور گرمی کے ہمراہ -

ایسینجیم اگو - مادہ منویہ کا اخراج بغیر ایستادگی کے لئے چوٹی کی دوائی ہے ۲۰ قطبیں دیجئے - فیم برڈیم - قلت خون یا اینیما کے ساتھ -

جنسی - ٹھنڈے - دیکھیے مجامعت - -
لاغری -

آرم میٹ - لڑکوں میں بزرگی کے ساتھ اور خضیوں کی لاغری اور ان کاٹس ہو جانا - کیپسک - نامردی میں خضیوں کی متیلی ٹھنڈی اور خضیوں کی لاغری -

آئیورڈیم - خضیوں کا گھٹنے گھٹنے کم ہو جانا - خوابوں میں مادہ منویہ کا اخراج - نامردی - کارلورائیمیلس - غدد سخت سوجھے ہوئے - جلن کے ساتھ درد ہو - بھالا گئے جیسے درد اور کاٹنے والے درد -

کونیم - خفے پتھر کی طرح سخت جلن اور کاٹنے والی دریں -

ایپس ایم۔ دوسرے حصوں میں استقاء کے ساتھ ڈنگ لگنے والے درروں کے ساتھ خضبول کی خضبل کا استقاء خارش اور سُرخی کے ساتھ۔

کالی آئیوڈ۔ خضبول کی ماکم زوری۔ دایاں خضیر غائب ہو جائے۔

ایوینا سیٹ۔ جنسی شائل میں زیادہ پڑنے کی وجہ سے مادہ منور کا اخراج نامذری کیا تھا۔

آزیکا مانٹ۔ چوڑا دوسرے زخم خارش کے ساتھ درد۔ جامنی سرخ سوزش۔

رموڈوڈنڈرون۔ پھوٹنے پر حساس۔ مندر موسم میں زیادتی حرکت سے افاقہ۔

کلکیریا کارب۔ ۴۔
سلیشیا۔ ۱۔ جب مندر ج بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو دی گئی ترتیب میں دیکھئے۔
سلفر۔ ۱۔

خضبول کا کینسر۔ ناسور

آرینک البم۔ جب درد کیوجہ سے مریض بے چین ہو۔ تھوڑے تھوڑے وقفے پر تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس۔ ۱۔ ایم طاقت دن میں ۲ بار دیکھئے۔ حتیٰ کہ افادہ شروع ہو جائے تب وقفہ کو بڑھا دیا جائے۔

کونیم۔ کینسر کیے شاندار دوائی ہے، یہ آرینک البم کی ہی طرح دی جانی چاہیے۔
سکزمینیم۔ یہ ایک نوٹوڈ ہے۔ ۲۰ یا ایک ایم طاقت میں تلخ لکھیز دی جانی چاہیے۔ اس دن کوئی دوسری دوائی نہ دی جائے۔

خضبول کا اعصابی درد

الکیشیا۔ جب جنسی غلط کاریوں کی وجہ سے درد ہو۔

ایما میلس۔ گرمی اور حصوں کے شدید کھن کے ہمراہ دریا شدہ حساسیت۔

آرم میٹ۔ جب سخت اور ٹھوس سٹوں کے اکاؤ کے ساتھ کے اعصابی درد ہو۔

کالوسنتھ۔ جب سبب معلوم نہ ہو۔

میگنیشیا فاس۔ " " " "

خصیوں کی سوزش - خصیوں کی ٹی بی خصیوں میں پانی بھرنا دیکھئے۔

برائی اوپیا۔ جب پیدائشی طور پر خصیوں میں پانی بھرا ہوا ہوتا۔

ایرونیئم۔ بچوں میں خصیوں میں پانی بھرنا جب ٹیوٹون ناکام ہو جائے۔

آرم سلفٹ۔ بچوں میں خصیوں میں پانی بڑھانا۔ خصیوں کا سخت ہونا۔ سوزاک کا سوج جانا۔

آرتھرائٹس کے ناسور۔ خصیوں کا سوج جانا۔ خاص طور پر دائیں طرف کے خبیثے۔

مرکیورس۔ جب سوزاک کا اچھی طرح علاج نہ کیا گیا ہو۔ سوزاک دب گیا ہو لیکن دبنے سے پہلے بعض

گٹھی بنز پھپ خارج کر رہا ہو۔ دائیں خبیثے کی سوزش شدید درد کے ہمراہ جو میٹ تک جائے اور پھلی

ٹانگوں تک خبیثے کی پھیلی سُرخ اور چکدار۔

پلسٹیللا۔ اگر مرکوریس ناکام ہو جانے تو یہ دی جلتے، خصیوں میں جلن اور درد سوزش

کے ساتھ یا سوزش کے بغیر جم سے گہرے رنگ کے خون کے اخراج کے ساتھ سکڑن۔ انکھوں

کی سوزش کا رجحان۔ گنٹھیا۔ دریں ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی جلدی جائیں۔ دائیں یا

بائیں خبیثے کی سوزش۔ ٹھنڈک۔ بھوک نہ رہے اور پیاس نہ ہو۔ اس دوائی کے استعمال کے

بعد زردی نائل بنز پھپ کا اخراج۔ خصیوں میں پانی پڑنے کے لئے جو ٹی کی دوائی ہے۔

آرم میٹ۔ خصیوں میں گوشت کی سوزش خصیوں کا گوشت بھرا مچھوڑا۔ مزین قسم کا۔

ایوڈم۔ خبیثے سخت اور سوجے ہوئے۔ آلات تناسل پر بدبودار پسینہ۔

ایپس میل۔ خصیوں اور پروسٹیت غدود کی درد والی سوزش۔

تھو جوا۔ خصیوں کی سوزش بار بار سوزاک اور سوتوں یا گوٹروں کی وجہ سے۔

کلیٹیس۔ خصیوں کی سوزش کے لئے ایک اور دوائی جو سوزاک کے دب جانے پر پلسٹیللا

کے ناکام ہو جانے پر دیکھئے۔ دونوں ادویات میں گرم ٹیوں سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔

آزیکا مانٹ۔ جب خضیوں کی سوزش زخم کی وجہ سے ہو اور دکھن ہو۔
 کو نیم۔ خضیے بڑھے ہوئے اور بہت سخت خاص طور پر زخموں کے نیچے کے طور پر۔
 رہوڈرڈن۔ خضیوں کی سوزش اس احساس کے ساتھ خضیے کو خضیے کچلے گئے ہوں
 خضیوں میں کھینچنے والی تکلیف جو نالوں تک اور پٹ تک بڑھے خاص طور دائیں طرف پھوٹنے
 پر حس اور دکھن ہو خضیوں میں پانی پڑ جانا۔ نمدار موسم میں زیادتی اور حرکت پرانہ۔
 پنونجیا۔ سوزاک کے دب جانے کی وجہ سے خضیوں کی سوزش آہستہ آہستہ سختی میں اضافہ ہو۔
 اولیم انمیل۔ خضیوں کا اعصابی درد اور منی کی نالیوں کا اعصابی درد۔
 اگر الک الیڈ۔ منی کی نالیوں کا اعصابی درد۔

خضیوں کا نیچے نہ اترنا

آرم میوزنٹرنیم۔ خضیے چڑھے ہوئے لڑکوں کا لڑکیوں جیسا ظاہری رویہ۔ طبیعت اور
 جمانی ساخت ایک فیصد سلوشن آرٹھوڈیکو ریڈی ایک اونس پانی میں ملا کر دیں۔ دن میں صبح و شام
 درد دفعہ دیجئے اس کا ہومیو پیتھک نام۔ آرم میوزنٹرنیم۔ نیڑونٹیم۔ ایک طاقت میں دی جانی چاہیے۔

خضیوں کی ٹی۔ بی

پنونجیا۔ حامی مزین خضیوں کی ٹی بی والی سوزش۔ خضیے ہمارے سوچے ہوئے کاوٹل کے ساتھ
 زیادہ چکن دار درد، درد جو مادہ منویہ کی نالیوں تک جائے۔
 آرم میٹ۔ خضیوں کی مزین سوزش یا ٹی بی والی۔ اعصابی درد، شدید درد کے ساتھ خضیے
 سوچے ہوئے، خاص طور پر رات کو۔ خضیے مائل بہ تنزلی۔ خضیوں میں پانی کا بھر جانا۔ کم حوصلہ
 بے جان سا۔ یادداشت کی کمی۔ حرام مغزیں اعصابی درد۔
 کلکیریا کارب۔ خنازیری مریضوں میں کچلنے والا دبانے والا۔ اور خراشدار درد
 مرک بن آئیوڈ۔ خضیوں کی آنکس سوزش منی کی نالیوں کی دکھن کے ساتھ۔

سیلشیا۔ خضیوں کی تھیلی کی شدید سوزش۔ پانی پڑ جانا۔ خضیوں کی تھیلی پر غارش اور
 نندار خضیوں میں ریگنے والی در دیں۔ خضیوں کا پھوڑا یا اجتماع پیپ اور ہرنیا۔
 سلفر۔ خبیثہ ڈھیلے اور خبیثے ملک جائیں۔ خضیوں کی تھیلی پر نمی۔ منی کی نالیوں پر باد اور کھچاؤ۔

فوطوں کی رگوں کا پھول کر کاٹھن بن جانا

ہیما میلس۔ فوطوں کی رگوں کو پھولنے کیلئے چوٹی کی دوائی ہے۔ خبیثے سوجھے ہوئے اور
 منی کی نالیوں میں کھینچنے والے درد اور اعصاب بہت ڈھیلے اور پسینہ ہو۔ تیر کی طرح نکلنے والا درد
 خضیوں کی تھیلی سے پیٹ تک۔

لیکسس۔ جب شریانیں نیلگوں رنگ اختیار کر جائیں۔ دماغی افسردگی کے ہمراہ۔
 پلسٹیللا۔ شریانیں نیلی نظر آئیں تسکین دہ کھچاؤ کے ساتھ منی کی نالیوں کو کھجکھجی ہوں ہو۔
 اور درد کرے۔

امونیا میور۔ بائیں طرف مادہ منویہ کی نالی میں سونے جیسے جیسا اور تکیں دار درد۔ علامات
 کھانسی کے ہمراہ ہوں۔

آرنیکا مانٹ۔ مادہ منویہ کی نالی درد سے سوجھ ہوئی پیٹ میں سونے جیسے جیسا درد۔ زخم کی تکلیف۔
 بیلاڈونا۔ پھاڑنے والی درد جو اوپر کو جائے شام کو اور بستر میں رادتی ہو۔

چائنا آف۔ مادہ منویہ کی نالی اور خضیوں کی تکلیف دہ سوزش۔ بائیں خضیہ میں اور سوز کر کے
 بائیں طرف درد۔ در دیں اکٹھی ہوں یا جمع ہوں۔

کلیٹیس۔ دائیں مادہ منویہ کی نالی حواس خبیثے کھینچے ہوئے۔ خضیوں میں درد۔ مادہ منویہ
 میں کھینچنے والا درد۔

کالی کارب۔ خضیوں کی اور مادہ منویہ کی نالی کی سوزش۔ خضیوں کی تھیلی، خواہش دار،
 بائیں خضیہ اور آلت تناسل میں کھچاؤ دار درد۔ کانٹے ملے درد، اس دوائی کی نمایاں خصوصیت ہے۔

سینف گیر یا۔ بارہ منویہ کی نالی میں تیر لگنے جیسے اور کھینچنے والے درد غصہ، غم۔ افسردگی، احمک
گناہ۔ رطوبات زندگی کی کمی۔ جلق یا اشت زنی۔ جنسی بے اعتدالی۔ متاثرہ جگہ کو چھونے سے تمباکو
فوشی سے۔ پارے کے غلط استعمال سے زیادتی ہوتی ہے۔

سلفر۔ خضیوں میں اور مادہ منویہ کی نالی میں دباؤ۔ وہ ڈھیلے ہو کر نچے ٹک جائیں اور خضیوں
کی فیملی مندرا ہو اور شدید رکھن ہو۔

دیکھئے گکٹی

تیسرے حصہ



کینسر۔ موقوفی حیض۔

سلفر۔ تھکاوٹ۔ وزن میں کمی۔ جلد کھردری اور گندی نظر آئے۔ اس کے نزدیک ہرجیز گندی
اور ناقابل بیان ناصاف یہ دوائی بطور عمل انگیز کے استعمال کی جاتی ہے، جب بھی طرح سے منتخب
ہوئی ادویات مکمل طور پر کام دینے میں ناکام ہو جائیں۔

کیمفر۔ گرم کرے میں گرمی اور پسینہ کے پھیلنے۔ بازو اور پیٹ بہت ٹھنڈے جب ڈھانپ
دی جائے تو پسینہ میں شراب اور جب ننگی کر دی جائے تو سردی محسوس کرے۔

پلسٹیللا۔ ہیجان والی طبیعت جو تبدیل ہوتی ہو، بند اور گرم کرے میں گرم پسینہ آئے۔
روئے بغیر اپنی ملازمت نہ بتائے۔

اکٹیارسیموسا۔ شدید سرد درجے کے کھوٹری پھٹ رہی ہو۔ کمر اور گردن کے پٹھے دکھیں گھٹیا
یا گھٹیا دوی رحمان۔

لیکس۔ موقوفی حیض کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ شدید سرد درجہ جو کرے شروع ہو کر
سرکے لگے حصے تک آئے۔ چھوٹے پر بہت ہی حاس۔ پریشان کرنے والی دل کی دھڑکن اور جسم
کی ٹپکن دار گرمیے رنگ کا خون جیسے مریض بہت ہی باتونی ہو۔ جلن کا احساس جیسے کہ جلتے ہوئے کوئلے
جسم پر رکھے ہوں۔ خون دھو کرے۔ غمزہ اور بڑبڑا غشی کے دورے اور بلا میر۔

گلوناٹن۔ آندھنی ہوئی ٹپکن اور سرد ہتھوڑے لگیں۔ گرم کرے اور سورج کی گرمی میں

زیادتی۔ بستر پر نہ پڑ سکے۔ پہاڑی پر چڑھتے وقت دل کی دھواکن۔

کلکیر یا کارب۔ زرد۔ ڈھیلے۔ دھالے اور ٹھنڈے راضیوں کے لئے جو کلام کی وجہ سے تھک چکے ہوں۔ سلف کی طرح یہ دوائی بطور عمل انجین استعمال کی جانے والی ہے۔
نکس و امیکا۔ حاس لڑاکی اور چڑھڑی عورتوں میں بہت زیادہ خون ہے۔ وہ جلدی سے ناراض ہو جاتیں۔ یہ دوائی اس وقت استعمال کرنی چاہیے۔ جب مندرجہ ذیل تمام علامات کے ہمراہ نظام انہ نظام کا بگاڑ بھی ہو۔

سیپیا۔ خروج رحم کے ساتھ خون ہے نیچے دبا دینے والی دردیں۔ مریض جسمانی طور پر پلٹا پلٹا اور آسانی سے حوصلہ چھوڑنے والا۔ ٹھنڈی چٹیلی۔ کینہ پروردہ محبت سے نفرت کرنے والی۔ ہمکڑی کو پند نہ کرے۔ قبض کے ساتھ لیکوریا۔ اچانک گرمی کے دورے سے پسینہ کے ساتھ۔ کمزوری اور غش کھانے کا رجحان۔

سیلگونیریا۔ لیکوریا۔ خراشدار۔ بدبودار حیض کے بعد جاری رہے۔

پلاٹینا۔ بچہ دانی میں درد بہت زیادہ خون بہنے کے ساتھ۔

سبارنا۔ چمکدار خون ہے بہت زیادہ درد کے ساتھ پیڑوں سے نکلتی ہوئی زبان کے اگلے سرے تک جاتی ہوئی درد۔

کروکس۔ ہٹریائی عورتوں میں گہرے لوتھڑوں والا خون ہے پیٹ کے پچھلے حصہ میں دباؤ احساس دینے کو تجھ کو جنم دے رہی ہو۔

میسلیئم۔ بانیس طرف کے چہرہ کا درد جرات کو زیادہ ہو۔

میڈورینم۔ چہرہ کا درد ڈیکوں کے گلنے کی وجہ سے لیکوریا کے دینے سے صبح کے وقت چھوٹی ٹہریوں میں تیزابیت کے ساتھ درد زبان پر میل کی تہہ منہ کا ذائقہ گندا اور بدبودار سانس مٹانے کے جانے والی گندی زبان۔ کمزوری۔ پیلاہن۔ ٹھنڈا۔ ٹھنڈے منہ اور موسم میں زیادتی۔

بیلیس پر۔ موقوفی حیض کے دوران رگین بھولی ہوئی۔

فریکنیس ایم۔ موقوفی حیض پر دائمی امراض کیلئے مفید ہے۔ رحم کی کمزوری کے ساتھ۔

ٹریلیم - شدید کمزوری کے ساتھ خون کا اخراج -

کیمفر - گرم کمرے میں گرمی اور پسینے کے ٹھکڑے بازو پیٹ بہت ٹھنڈے - جب تنگی ہو تو سردی

محسوس ہو جب کپڑا اور لے لے تو پسینہ آئے -

اوو فوٹنم - موقوفی حیض پر مہاسے اور دیگر ملبی خرابیاں -

مباشرت - مجامعت

مباشرت کے دوران اور بعد میں تکالیف

سیلیا - مباشرت سے نفرت کے لئے اور اندام نہانی کی خشکی کے لئے چوٹی کی دوائی ہے
سب سے پہلے یہ آزمائی جائے قبض کے ساتھ لیکوریا -

نیٹرم میور - مباشرت سے نفرت کی خون والی عورتوں جن کے منہ اور جلد پر خشکی ہو کیلئے
موزوں ہے - اندام نہانی کی خشکی تکلیف دہ مجامعت -

ہائیدراسٹس - مباشرت کا خیال ہی نہ کر سکے - یعنی خیال ہی تکلیف دہ ہو یا تکلیف
کی وجہ سے مباشرت کی رغبت ہی نہ ہو - لیکوریا جو انڈے کی سفیدی کی طرح کا ہو کے وقت
تکلیف زیادہ ہو -

امبر اگر لسیا - مجامعت کے دوران دھڑکنا شروع ہو جائے -

کریوٹروٹ - اندام نہانی میں مجامعت کے دوران اور بعد میں جلن اور تیز درد اور خراش -
مجامعت کے بعد خون ہے -

سیٹفسیگیا - مجامعت کے خاتمے کے قریب تنگی تنفس ہو، رحم کا کینسر نئی شادی شدہ
عورتوں میں مباشرت تکلیف دہ ہو -

گریفائیٹس - مجامعت سے نفرت - برہمنی ہوئی سخت بچہ دانی - رحم اور بچہ دانی میں دھکن ہو -
کیکٹس - مباشرت کے دوران اندام نہانی کا سکڑنا -

برومیم - مباشرت کے دوران جذبات کی کمی

پلسٹیللا۔ جماعت کے دوران پھوٹنے پر حاسس ہو یا دکھن ہو۔

فیرم میٹ۔ جماعت کے دوران دکھن اور کاٹنے والے درد۔

پلاٹینا۔ جماعت کے دوران اندام نہانی میں شدید دکھن۔

فاسفورس۔ جماعت کے دوران میں لطف نہ آئے۔

لائیکو لوڈیم۔ جماعت کے دوران اور بعد میں اندام نہانی میں یا فرج میں شدید جلن۔

فرج کی خدی خشکی۔ چڑے میں نیچے کی طرف دباؤ جیسے کھینچ کر شروع ہونے والا ہو۔

سیدران۔ عورتیں مباشرت کے ہکلائیں۔

امبرگریسیا۔ مباشرت کرنے پر درد شروع ہو جائے۔

مباشرت سے لطف نہ آئے

بروسیرس ولگیس۔ مباشرت کے دوران لطف بالکل نہ آئے جیسے آپس میں حکمت پائیں۔

کاشیکم۔ جنسی خواہش بہت ہی کمزور ہو لطف نہ آئے۔

سیسیا۔ مباشرت سے نفرت کے ساتھ لطف نہ آئے۔

غلبہ شہوت

سٹانم۔ آسانی سے غلبہ شہوت ہو، جیسے کراؤں پہلانے سے ناقابل برداشت غلبہ شہوت ہو جائے۔

بروسیرس ولگیس۔ شہوت دیر سے آئے یا لطف نہ آئے۔

بروڈیم۔ لطف نہ آئے۔

اوہیم۔ انزال کے وقت متوقع لطف نہ آئے۔

مباشرت تکلیف دہ

فیرم میٹ۔ جماعت تکلیف دہ بعد میں خون آئے۔ رحم میں دکھن اور کاٹنے والی درد۔

کریوزوٹ۔ جماعت کے دوران اور بعد میں تکلیف ہو۔

آرجنٹم نائٹرکیم۔ مجامعت کے دوران تکلیف ہو۔
 نیٹریم میور۔ مباشرت کے دوران تکلیف، رحم کی خشکی کیساتھ احساسِ کُندامِ نہانی کی دیواڑوں
 کے ساتھ چپتی دہی ہوئی ہے۔
 لائیسین۔ تکلیفِ مباشرت سے نفرت، بچے کی پیدائش سے شروع ہو۔
 سیسیا۔ لیکوریا کے ساتھ مباشرت کے دوران شدید تکلیف۔
 ہائیڈرائٹس۔ تکلیف ہو جنسی خواہشات متواتر ہوں خاص طور پر جب عورت کے کُندامِ
 نہانی سے اندول کی بخیری جیسا مواد خارج ہو۔
 مرکالر۔ فرج کو چھونے سے یا دبانے سے سلسلِ درد۔
 بربریس و لگرس۔ اخراجِ تکلیف دہ ہو یا زیادہ دیر سے ہو۔

بچہ کی پیدائش یا جنابہ

پہلے، دوران اور بعد کی تکلیف۔
 اکیٹارسموسا۔ یہ دوائی تین یا چار ماہ بچہ کی پیدائش سے پہلے دی جائے تاکہ محفوظ اور
 بغیر تکلیف کے بچہ کی پیدائش ہو جائے۔ اگر پیدائش سے چند دن پہلے بھی دی جائے تو بھی محفوظ
 اور بغیر تکلیف کے پیدائش ہو سکتی ہے۔ یہ زندہ بچوں کی پیدائش کی ضمانت ہے اگر پیدائش سے
 چھ ماہ یا سات ماہ پہلے دن میں ۳ دفعہ متواتر دی جائے۔ یہ جھوٹی دردوں کو بھی روکتی ہے۔
 پیسٹیللا۔ جھوٹی دردوں کو روکنے کے لئے اور محفوظ پیدائش کے لئے مناسب وقت
 پر ایک ہزار اوقات کی خوراک ہر پندرہ منٹ کے بعد دیں۔ تیسری خوراک کے بعد محفوظ پیدائش ہو
 جائے گی اور آئندہ خوراک ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگرچہ دو یا تین دن ہی کیوں نہ لگ جائیں۔
 یہ بچہ دانی یا رحم میں بچہ کی پوزیشن کو بھی درست کر دے گی اگر غلط ہو جائے۔ اگر جھلی کے
 پھٹنے سے قبل دے دی جائے۔ نفاس کم مقدار میں۔
 و سکلم البم۔ آئول کا اخراج ہو جائے۔

بیلڈوٹنا۔ آئول رک جائے، کافی زیادہ گرم خون ہے۔
 کینتھرس۔ آئول رک جائے اور تکلیف دہ پیشاب ہو۔
 سبائنا۔ کمزوری کی وجہ سے آئول رک جائے۔
 اکوانٹ این۔ جب نفاس دب جائے، نفاس (۵ مواد جو بچہ کی پیدائش کے بعد رحم سے بہتا ہے)۔
 ٹائٹلک الیڈ۔ خواش دار نفاس۔
 ٹریلیم۔ خونی نفاس۔
 بیلڈوٹنا۔ نفاس گرم اور کم مقدار میں۔
 کریوزوٹ۔ نفاس غراشدار اور وقفہ دار۔
 آرم میوزٹریم۔ یہ آنکھ میں بتلاہ ماؤں کو دیکھا ناگاہی بچے اس مرض سے محفوظ ہو جائیں۔
 آرٹیکمانٹ۔ بچہ کی پیدائش کے بعد کی دردوں کے لئے بہترین دوائی ہے
 کالوقائیلیم۔ درد زہ کم وقفہ کے لئے۔ بے قاعدہ بچہ کی پیدائش کے شروع میں تشنجی بھوٹی دروزہ۔
 جلد پیدائش کے بعد خون ہے۔ لچک لکمی کی وجہ سے۔ کافی دیر تک درد زہ کی وجہ سے بعد کی
 تکلیف۔ تشنجی پیٹ کے نچلے حصہ سے چڑنے تک بڑھیں۔ پسٹیلہ کی مدد کار دوائی ہے۔
 جبکہ رحم میں بچہ خلط حالت میں ہو۔ دن میں ۳۰ طاقت کی ایک دوا تین ہفتے پیدائش سے
 پہلے پیدائش کو آسان بنا دیتی ہے اور بھوٹی دردوں کو روکتی ہے۔
 چائنا۔ بچہ کی پیدائش کے بعد بہت زیادہ خون بہنے پر ایک ہزار طاقت کی ایک غوراکس مرہینہ
 کی طاقت کو بحال کر دیتی ہے۔
 سٹرامونیم۔ شدید غلبہ شہوت زہنگی کے دوران۔
 نیچوٹرین۔ سست درد زہ کے لئے رحم کا جمود۔ درد زہ کی دوسری سطح میں جبکہ فرزج کا
 منہ کھلا ہوا ہو۔
 روٹا۔ بچہ کی پیدائش کے بعد امعاء مستقیم یا ریٹم کا اخراج۔
 ٹکسوا میکا۔ زہنگی کے دوران بچہ کی جھکائی پینے اور نیند کو روک دے۔

کیوپریم میٹ - پچہ جننے کے دوران مرلیضہ اچانک اندھی ہو جائے۔ درد دس جاٹیں۔
 اور انگلیوں اور پنجوں میں انیٹھن اور تشنج شروع ہو جائے۔
 پلاٹینا - زچگی کے دوران شدید غلہ نہوت۔
 کالی کارب - خون کی نالیوں کی کمزور حالت کی وجہ سے پچہ جننے کے ایک ہفتہ بعد بہنا شروع ہو جائے۔
 کاسٹیکم - پچہ جننے کے بعد مٹیاب بند ہو جائے۔
 وائرنم اپلو - درزہ کی جھوٹی دریں جو ایک عورت کو ہفتوں تکلیف میں مبتلا رکھے ہیں
 بعد کی تکلیف ہر کے لئے ہر درد کے بعد ایک خوراک دیں۔

بڑھی ہوئی جنسی خواہش
 دیکھئے زیادہ خواہش۔

جنسی خواہش

ماسکس - بغیر کسی ظاہری وجہ کے بڑھی ہوئی جنسی خواہش۔
 پلاٹینا - نوجوان لڑکیوں میں ناقابل کنٹرول جنسی خواہش وقت سے پہلے جنسی اعضاء اور
 خواہش کا بڑھ جانا۔ یہ خواہش زچگی والی عورتوں میں شدید ہوتی ہے۔
 ایسٹریاس رب - بڑھی ہوئی جنسی خواہش جس کی جماعت کے بعد بھی تسکین نہ ہو۔ رحم
 میں تپکن - باہر آنے کا احساس، مسج کے وقت شدید خواہش جماع۔
 مائیوسائیمس - شدید جنسی بھوک۔ بے حیائی سے اپنے آپ کو ننگی کرے غشی باتوں کی لگن ہو۔
 کالی فاس - کنواری لڑکیوں میں جنسی براہینگشگی ہر حیض کے بعد جنسی خواہش بڑھی ہوئی ہو۔
 لیلیئم ٹنگ - پچہ دانی تکلیف کے ہمراہ نہ بکنے والی جنسی بھوک پیاس۔ اندام نہانی میں بھرپور
 خارش ہواؤ کے احساس کے ساتھ۔ شدید جنسی خواہش اسے دبانے کے لئے اپنے آپ کو معرکے
 اور گینگیم۔ جب عورتوں میں شدید جنسی خواہشات کے ساتھ وہ جلتی پھر پور ہو جائے کیلئے
 موزوں ہے۔

لیکے یک فلوک - جب پچائی کو ماتھ چھو جائیں تو آسانی سے جذبات اٹھائیں۔
 نیٹرم کارب - گلے ملنے یا ہم آغوش ہونے کے بعد عورت مادہ منویہ کو تالو میں نہ رکھ سکے۔

فاسفورس۔ بیوہ عورتوں میں شدید خواہش جماع۔ مجبوری کے تحت کیوجہ سے شدید جنسی خواہش۔
 ٹیڑھٹولا ایچ۔ سٹریٹ میں شدید جنسی خواہش چلانے کی خواہش کے ساتھ۔ رحم میں درد سکڑاؤ
 بند ہونے کے احساس کے ساتھ سختی۔

میوہ کیس۔ جنسی اعضاء کے ساتھ معمولی سا چھو جانا بھی شدید جنسی جذبات کو برا بھلا کرتا ہے۔

جنسی خواہش میں کمی

دبائی ہوئی جنسی خواہش

کونیم۔ بچہ دانیوں اور رحم کی سختی اور بڑھ جانا۔ خردج رحم سرکس کی سختی اور ناسور کے ساتھ
 شدید لیکوریا۔ یہ سب جنسی خواہشات کے دبانے سے ہوتا ہے۔
 اونیٹوڈیم ویر۔ جنسی خواہش مکمل طور پر تباہ ہو یعنی بالکل ہی نہ ہو۔ رحم کی دوسری طرف ہونے کے
 ساتھ یا ان کے بغیر جیسے کہ بچے کی طرف دباؤ۔ ایٹھن۔ رحم میں مکھن۔ چھاتیوں ٹوچی ہوئی ہوگی
 ہوں اور اجتماع خون ہو۔ سی ایم طاقت میں دیکھے۔

رحم اور بچہ دانیوں کی سوزش

نکس و امیکا۔ بچہ دانی کی حاد سوزش۔ پیریٹونیم کی سوزش کے ساتھ یا اس کے بغیر جب
 بخار زیادہ تیز نہ ہو یا جب بخار کم ہو گیا ہو۔ پیٹ کے پچلے حصہ میں درد۔ چھوٹی کمر میں درد۔ رحم
 کے سوراخ کی سوزش پیٹ میں بوجھ اور جلن ہو۔

سیدیا۔ بچہ دانی کی حاد سوزش میں۔ اندام نہانی کی تکلیف دہ سختی۔ بچے کی طرف دباؤ
 جیسے کہ ہر چیز رحم کے راستے خارج ہو گیا۔ رحم کا گر جانا۔

گرفیٹیس۔ رحم کی حاد سوزش بچہ دانی کی سوزش کے ساتھ یا بغیر لیکن جلدی بیاڑوں۔
 پلاٹینا۔ رحم کی حاد سوزش اور بچہ دانی کی حاد سوزش زچگی کے بعد جنسی خواہش بڑھی
 ہوئی اور رحم کی خارش۔

کو نیم۔ رحم کی مزمن سوزش پھر دانیوں کی یا پھیپھوں کی سوزش کے پہلو یا اس کے بغیر پیٹ بنا ہوا۔
 رحم میں چکیاں ہی بھر ہوں اور سکڑن۔ پیچھے کی طرف پروردگارِ خونی یا دودھیا لیکوریا سے بچکی۔
 برائی اونیٹا۔ پیٹ ابھرا ہوا اور بھلا لگنے جیسے درد سے دکھے قبض۔ بخار۔ ٹھنڈے پانی کی
 پیاس کے ساتھ۔

کیمومیل۔ حاد سوزش رحم جو شدید محدودی غصے کا درد و حیض کے دوران یا زچگی کے بعد ہوا کی وجہ
 سے پیٹ پھولا ہوا اور دکھے۔

کالوشٹکس۔ جب دے ہوئے حیض یا نفاس کے دب جانے کے بعد کیمومیل ناکام ہو جائے۔
 کریوزوٹ۔ پختہ دانی کی مزمن سوزش۔ فرج اور رحم بھلی کے جھبکوں جیسے پیچھے والے
 درد۔ لیکوریا جو لنن پر پھوڑا داغ ڈالے۔

بیلادونا۔ غصے کے بعد سوزش، خاص طور پر بچگی کے بعد۔ آلات تناسل پر پروردگارِ خونی
 چہرے کی سُرخی کے ساتھ کھورنے والا درد۔

چائنا۔ خون کی کمی کے بعد یا بہت زیادہ مباشرت کے بعد۔
 آر سینک البم۔ بچہ کی پیدائش کے دوران۔
 رشتاکس۔ بچے کی پیدائش کے بعد یا یفائیدگی علامات کے ساتھ۔
 پلاسٹیل۔ پاؤں ٹھنڈے ہو جانے کے بعد حیض کے دب جانے پر۔ دودھ کی کمی
 ٹھنڈک اور پیاس نہ سونچنے کی بجائے اور پیٹ کے نچلے حصہ میں سکڑن۔
 ایپس۔ بچپن میں پختہ دانی کی سوزش۔

اکونائٹ۔ حیض کے دب جانے یا ڈر کی وجہ سے سوزش۔ علاج کے شروع میں دیکھائے۔
 لیکس۔ صبح کے وقت تکلیف یا سونے کے بعد تکلیف۔

آلات تناسل کی خارش۔ سلفر۔ خشک خارش جو بہت شدید ہو اور بیض خارش

کرتا ہے۔ حتیٰ اگر خارش زرد حصوں میں خون ہے۔

کالتسونیا۔ اندام نہانی کی خارش خاص طور پر حمل کے دوران۔
 ٹینٹو لاپٹج۔ خارش جس کے ساتھ اندام نہانی سے ہوا خارج ہو۔ جنسی جذبات اور بڑیا
 چلانے کی خواہش کے ساتھ۔ اندام نہانی میں درد۔ سکڑن۔ سختی بند ہونے کے احساس کیساتھ۔
 اٹریکالیورنٹس۔ فرج کی خارش جلن کے ساتھ فرج کے ہونٹوں کی سوزش اور موٹاپا۔ اگزیریا
 کیلیڈیم۔ فرج اور اندام نہانی کی خارش کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ یہ خارش بعض اوقات
 انٹرلوک کے کمروں کی وجہ سے لاحق ہو سکتی ہے جو فرج میں آجاتے ہیں اور جلن کا باعث بنتے
 ہیں اور جنسی جذبات کی شدت فرج پر خارش جو حمل کے دوران جلتی پر محسوس کرے۔
 امبرگر لیبیا۔ فرج کے بیرونی حصہ کی دھکن اور سوزش۔ حیض کے وقفے کے دوران
 خون ہے۔ نیگلوں لیکوریا۔
 ہیلونیاس۔ فرج اور اندام نہانی کی خارش۔ شدید خارش کہ گوشت اکھڑ سکتے
 کوچی چاہے۔ جلد سُرخ اور سُجی ہوئی ہو جو پتلی دہی جیسی جھلتی سے ڈھانپی ہوئی ہو۔
 ارم میوزنیرٹو۔ اندام نہانی کی اگلی جلد پر ناسور۔ اندام نہانی کے گوٹر۔
 سیسیا۔ لیکوریا کے ہمراہ اندام نہانی کی خارش۔
 برومیم۔ ذہنی خرابیوں کے ساتھ اندام نہانی کی خارش۔
 کریوزوٹ۔ فرج میں گہری مزیدار خارش اندام نہانی کے لبوں کی سوزش اور جلن
 کے ساتھ۔ ہر وقت ملنا پڑے زرد، خراشدار لیکوریا۔
 یلیم گلگ۔ شہوت انگیز خارش متعلقہ حصوں کے بھراؤ کے ساتھ۔
 لورکیس۔ حمل کے دوران خارش۔
 مرکوریس۔ خارش جو پیشاب لگنے سے زیادہ جو دھوا پڑے لیکوریا جو خراشدار اور
 رات کے وقت زیادہ ہو۔
 اروفورنیم۔ خارش کے لئے جو خارش کچھ عرصہ کے لئے حیض کے بعد ہو۔

لیکوریا

سیمیڈیا - قبض کے ساتھ تپلا لیکوریا - خراشدار - کھا جانے والا - زرد - پانی کی طرح یا سرخی مائل سبز لیکوریا - فرج میں گرمی اور خارش - حیض سے پہلے لیکوریا، بیرونی اعضا متاثر کی دُکھن کے ساتھ - چھوٹی بچہوں میں لیکوریا -

مرکیورس - خراشدار لیکوریا - جلن، خارش دُکھن کے ساتھ - ہمیشہ رات کو زیادتی - خارش جو پیشاب لگنے سے زیادہ ہو جو دھونا پڑے -

یوریکس - دہی کی طرح کا لیکوریا - انڈے کی طرح سفیدی والا لیکوریا - احساسِ کُرگرم پانی نیچے کی طرف بہہ رہا ہے - خراشدار لیکوریا -

کلکیریا کارب - تپلا دودھیا لیکوریا -

کیوبیسیا - شدید - زرد - سبزی مائل خراشدار اور بدبودار لیکوریا - چھوٹی بچہوں میں لیکوریا - ہائیدراسٹس - چکنے والا گارٹھا رحم یا فرج بے دھاگوں جیسا ایک قسم کی خارش کرنے والا - آرٹینکام ایوڈ - جب اخراج جلن پیدا کرنے والا ہو اور خراشدار - شدید جلن پیدا کریں - ایسٹرنائٹک - خراشدار پھلکے دار پرت دُوریں - فرج کے ہونٹوں کے بچہ دانی کے حصّہ میں جلن دار اور پھاڑنے والے درد ہوں

بروبیرس وگلیس - لیکوریا پیشاب کی تکلیف کے ساتھ -

ملی فولیم - بچوں میں لیکوریا -

پلسٹیللا - پانی جیسا خراشدار اور جلندار لیکوریا - دودھیا، گارٹھا اور سفید لیکوریا -

لائیکو پوڈیم - کبھی کم اور کبھی زیادہ، دودھیا یا پورے چاند پر اعصابی، لیکوریا سے

پہلے پیٹ کے نچلے حصّہ میں درد قوی -

فاسفورس - حیض کی بجائے لیکوریا - حیض سے پہلے انڈے کی سفیدی جیسا لیکوریا -

رونے کی رغبت اور پیشاب کی اکثر خواہش یا زیادتی - مسوڑھے سوجے ہوئے -

اوسموڈیم۔ لیکوریا ہلکا زردا بدبودار، خراشدار اور کثرت سے نیچے ٹانگوں تک ہے۔
 اسیکولوس ہرپ۔ لیکوریا ہلکا زرد گاڑھا اور چپکنے والا بجلی کر کے لنگڑے پن کے ساتھ جو چلنے پر جواب دے دے۔

تھو جا۔ حیض کے دوران یا حیض کے عوض جب ٹیکہ لگایا جائے یا لگایا گیا ہو ٹیکے کی بٹری ہو یا جب کئی دفعہ ٹیکہ لگایا جا چکا ہو۔

سینی کو لا۔ مچھلی کے پھٹکے جیسی شدید بو والا لیکوریا۔
 چائنا۔ حیض سے پہلے لیکوریا۔ بدبودار غولی لیکوریا۔ چڑے اور معتد کثیر تکلیف دہ بو۔
 میورنگس۔ لیکوریا جب ہے تو مریضہ با حوصلہ ہو لیکن رکنے پر اس کے عکس یعنی اچھی طبیعت نہ رہے۔ مزاج بگڑ جائے۔

کاربو انیمیلس۔ لیکوریا جو لنس کے کپڑے پر زرد نشان ڈال دے۔
 سفلیٹینیم۔ لیکوریا کی زیادتی جس سے رومال بھیگ جائے اور ایلوئیں تک بھیگ جائے۔
 الیومن۔ لیکوریا کی کثرت، رحم کے ناسور اور سختی کے ساتھ کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ مریض زرد و دھوتا ہے۔

زندہ بچے کی پیدائش۔ پستان۔ چھاتیاں

پھوڑا۔ (حمل کے نیچے دیکھئے)

ہیمپر سلفر۔ سوزش جس میں پیپ بنا شروع ہو چکی ہو یا شروع ہونے کے قریب ہو۔ یہ پیپ بننے کو روکتی ہے۔ چھاتیوں کی سوزش شدید گرمی کے ساتھ اور تکین ہو۔
 سیلا ڈونا۔ سوزش کے اعتبار سے ابتدائی دور میں جب جھتے مرنے اور سخت ہوں۔
 فائٹولا کا۔ ٹیکوں کی طرح کی سختی جب پیپ ناگزیر ہو۔ چھاتیوں میں سخت ٹیکوں کے لئے جو بچے کے سر کے مارنے پر زخم یا دودھ کے اکٹھا ہونے پر ہوں، اکیلے شاندار دوائی ہے۔
 برائی ادنیا۔ ابتدائی سیلج میں چھاتیوں کی سختی جب دودھ کے اکٹھا ہونا یا دھوات

سے ہو یہ دو سو ملاقات میں دی جانی پائیے ہر چھ گھنٹے بعد تین یا چار غور کریں ٹھیک کریں گی۔
 سلیشیا۔ ایک حصہ یا دوسرا حصہ پھوٹے سے پھر دہرے کے ساتھ ایک ہی شستر کے
 عام پھوٹے سے اخراج ہو یا کئی سوراخ ہوں۔ ہر پھوٹے کے لیے علیحدہ پیپ دلزالی میں پ
 کی طرح کا اخراج نکلتا محسوس ہو۔

لیکسس۔ جب متاثرہ حصے نیلا یا بیگنی رنگ کا اظہار کریں۔ بعض رات کو ٹھنڈک اور
 دن میں گرمی کے دورے محسوس کرے۔

چھاتیوں کا گھٹنا۔

اوسمودیم۔ چھوٹی ہو جائیں یا عام جسامت سے بھی چھوٹی ہو جائیں یہ ایک اگلائی کی علامت ہے۔
 چمافیلہ۔ چھاتیوں کے گھٹنے یا بہت زیادہ بڑھ جانے کیلئے نشاندار دو آتی ہے۔
 سیبل سر۔ جھکے کے دیر سے آنے کی وجہ سے چھاتیاں سوکھ جائیں یا رحم کی دوسری بیماریوں
 کی وجہ سے۔

نکس مارسکاٹا۔ چھاتیاں چھٹی ہو جائیں جو پہلے ٹھیک ٹھاک گول تھیں۔ چھاتیاں بہت
 چھوٹی اور بغیر درد دھکے پل اندر دھکنے ہوئے۔
 کرپوزوٹ۔ چھاتیوں کا گھٹنے گھٹنے پھوٹے ہونا۔ پرورد ڈھیلے سے بن جائیں۔
 کوئیم۔ چھاتیوں کا چھوٹا ہونا۔ نرم پلپی تھیلے کی طرح کی جلد رہ جائے۔ یہ بڑھ بھی
 سکتی ہیں اور سخت ہوں۔

ڈلکا مارا۔ جب لیکوریا اور حیض کی کمی کے ہمارہ ہو۔
 آئیوڈیم۔ چھاتیوں کا گھٹ جانا جب کہ دوسرے غدود بڑھ جائیں۔

خون بہنا۔

لائیکوپوڈیم۔ چھاتیوں میں خون پچھ اتنی مقدار میں پی لے
 کہ جب قے کرے تو خون کی ہی ہو۔ پستانوں سے خون اور پانی کا اخراج جلدی سے خون بہے۔

ہیما میلنس - شدید دُکھن کے ساتھ خون ہے۔
 سپیا - خون ہے پیپ کا بھی امکان ہو۔

کینسر - پستانوں کا حجم بڑھ جانا۔

(دیکھئے رسولیاں)

فاسٹولا کا - پستان بڑھ جائیں۔ بھرے ہوئے کہ دودھ اُبل پڑے گا۔
 فریگریا ویسکا - یہ پستانوں کے حجم کو کم کرتا ہے اور دودھ کو سکھا دیتا ہے۔
 کونیم - عام بڑھوتری یا حصّے کی بڑھوتری۔
 چماقیلا - یہ دوائی پستانوں کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا دونوں کو ٹھیک کرتی ہے۔

سوزش

برائی اونیٹا - دودھ کے جم جانے یا کسی اور وجہ سے پستانوں کی سوزش۔
 بیلاڈونا - جب حصّے سرخ اور گرم ہوں۔
 مرکورس - جب بیلاڈونا اور برائی اونیٹا ناکام ہو جائیں۔
 بلیس پر - جوڑ یا مکا لگنے کے بعد جب سوزش اور سختی قائم رہے۔
 کونیم - سوزش کی سختی کی سیج - حصّے مضبوط سخت اور پُر درد ہو جائیں۔ بائیں پستان
 میں سوئیاں سی چھیں سوزش اور سختی کے ساتھ۔
 فاسٹولا کا - جب پستان زیادہ تکلیف کے ساتھ پتھر کی طرح سخت ہوں۔ پستانوں میں
 سندس اور پیپ کا پڑ جانا۔ پستانوں میں دُکھن اور ڈھیلے۔

دودھ

گلکیر یا کارب - دودھ بڑھانے کے لئے۔
 لیک ویک ڈیفیلو - دودھ کم کرنے کے لئے

چیونٹھس - دودھ کو روکنے کے لئے۔

سیبل سر - دودھ کی پیدائش بڑھانے کے لئے۔

لیکٹورا ٹمڈوسا - دودھ بڑھانے کے لئے۔

رستنس - دودھ پلانے والی عورتوں میں دودھ بڑھانا اور کنواریوں میں بھی۔

سکٹافاس - کم دودھ یہ دودھ کی مقدار کو بڑھا دیتی ہے جبکہ دودھ دب گیا ہو ہیشہ

دودھ کی کمی کا زار دے۔

لو رکیس - دودھ بہت گاڑھا اس کا ذائقہ بُرا۔ یہ بات والد کو بچہ کو دودھ پلانے سے

روکتی ہے (یہ دوائی حمل کے دوران دی جانی چاہیے تاکہ پیدائش کے بعد دودھ موزوں اور

ذائقہ دار ہو جائے۔ بچہ بُرے ذائقہ کی وجہ سے چھاتیوں کو منہ میں لینا پسند نہ کرے۔

آرٹیکا یورنیس - چھاتیوں کی سوزش کے ساتھ دودھ کم اترے۔ جو عورتیں دودھ چھڑانا

چاہیں۔ ان کا دودھ سکھا دیتا ہے۔

پلسٹیللا - دودھ کو روکنے کے لئے ان ماؤں میں جو اپنے بچوں کا دودھ چھڑانا چاہیں۔

یہ دودھ چھڑانے کے فوراً بعد دی جانی چاہیے اگر یہ درد سے افاقہ زدے یا آسانی پیدا نہ کرنے

تو کلکیراکا رب دی جانی چاہیے۔ یہ دودھ کو دبانے اور سوجی ہوئی چھاتیوں اور درد کو روکنے

کے لئے مفید ہے۔

ایسا ٹومیڈا - دودھ بڑھانے کے لئے اس قسم بھی کرنے کے لئے۔ پستان دودھ

سے تھمے ہوئے حمل کے بغیر بھی۔

لیسی تھین - دودھ بڑھانے والی شاندار دوائی ہے۔ یہ دودھ زیادہ تقویت

دینے والا اور مقدار میں زیادہ ہو۔

مرکوریس - حیض کی بجائے پستانوں میں دودھ۔ لٹکوں میں بھی چھاتیوں میں دودھ

ہو سکتا ہے کے لئے مفید ہے۔ غیر شادی شدہ۔

لڑکیوں کی چھاتیوں میں دودھ

کلکیر یا فاس - بچہ دودھ پینے سے انکار کر دے کیونکہ دودھ نمکین ذائقہ کا ہو۔
 فائٹولا کا - چھاتیوں کی سوزش جب دودھ تار وار ہوا اور نیل سے بچے ٹکے جما ہوا دودھ۔
 دودھ کم - گارھا غیر صحت اور جلد خشک ہو۔ پانی کی طرح کا خونی اخراج جو برسوں جاری رہے بچے کو
 دودھ چھڑانے کے بعد اس دوائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔

نیوفو - جب دودھ خونی ہو۔

آرم ہلف - پستانوں کی سوزش کے ساتھ دودھ دب جائے یا بالکل نہ رہے۔

لیک کینیم - دودھ کو مکھانے کے لئے جب وہ بہت کثرت سے ہو۔

سیکل کار - بچہ کی پیدائش کے بعد دودھ دب جائے یا ظاہر ہی نہ ہو یعنی نہ آترے۔

اگنس کاسٹس - دودھ کی کمی ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو جب اس ذہنی کیفیت کے بغیر بچی
 پر دودھ ظاہر نہ ہو۔

کیمو میل - جب غصے کے ذریعے کی وجہ سے دودھ دب جائے۔

الفلقا - دودھ پلانے والی عورتوں میں دودھ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ ۵ سے ۱۰ قطرے

مدر نکچر دن میں چار بار دی جائے۔

سرپستان - بھٹنی - نیل -

فائٹولا کا - بھٹیاں دکھیں اور پستانوں میں پھوڑے کا رجحان - بھٹیاں اندر کو دھنس
 جائیں بچوں کو دودھ پلاتے وقت شدید درد - بھٹیاں بھٹی ہوئی یا چمڑی ہوئی بھٹیاں
 حساس دکھیں اور حیرے آئے ہوئے - دودھ پلانے پر زیادتی ہو۔

سارپیر لای - بھٹیاں سڑی ہوئیں درد والے حیض کے ہمراہ - اسہال - قے اور غشی کے
 ذریعے بھٹیاں پھوٹی مچھائی ہوئی اور غیر خوش پذیر ہوں - یعنی جذبات برا بیگمختہ نہ ہوں۔

کیسٹراکوی۔ بھٹیاں دکھیں۔ چری ہوئی اور بھی ہوئی۔ شدید حس پھو جانا داشت
نکر کیس۔

بائیڈرالس۔ دودھ پلانے والی عورتوں میں پستانوں پر خارش۔ بھٹیاں اندر کو مڑی ہوئی
گرنفائیٹس۔ کھا جانے والے چھالے یا پھوڑے یا ناسور جن سے چکنے والا مادہ خارج
وقت آتا رہا۔ لیکن دوبارہ ہو جائے۔ بھٹیاں دودھ پلانے سے چر جائیں یا پھٹ جائیں۔
کاسٹیک۔ بھٹیاں جن کے گرد داد ہو۔

کاروئیمیلکس۔ بھٹیاں پر گرم سخت اور مرغیوں کے اندے کے برابر ہوں۔
کروٹن ٹنگیم۔ بھٹیوں سے درد کم جاتے، بچوں کو دودھ پلاتے وقت بھٹیاں
کا درد کی وجہ سے کھینچا دے کر رہی سے کھینچا جا رہا ہو۔

سیلٹیا۔ سارے جسم اور بھٹیاں میں دودھ پلاتے وقت درد۔

فلنڈیریم۔ دوران دودھ پلانے کے ناقابل برداشت ہو۔

بورکیس۔ جب دودھ پلانے تو مخالف بھٹیاں میں درد ہو۔

رہنیا۔ بھٹیاں دودھ پلانے سے پھٹ جائیں اور چر جائیں۔

جلق

اورینگیم۔ جلق میں موثر ہے اور شدید بھی ہوئی ہنسے خواہش یکور یا ہسٹریا
غش خیالات اور خواب۔

کیلیڈیم۔ اندام نہانی اور رحم کی خارش جس سے ملن کا رجحان ہو۔ رات کے وقت رحم
میں تشنجی دریں۔

دیکھئے۔ موقوفی حیض ۱۔

موقوفی حیض۔ حیض رک جائے

پلسٹیللا۔ جب کسی ظاہری وجہ کے بغیر طوخت پر حیض نہ آئیں۔ جب بعض مزا یا دھوک

مرض بتانے وقت رو پڑے۔ کھلی ہو میں اپنے آپ کو اچھا محسوس کرے۔ پاؤں کو گیلیا کرنے سے حیض دب جائیں۔

فیرم میٹ۔ جب حیض کا دب جانا یا حیض میں تاخیر کمزوری یا کمی خون کی وجہ سے ہو سکتی کاہلی اور دل کی دھڑکن ہمراہ ہو۔

سائیکلایمن۔ گیلیا ہونے کی وجہ سے حیض کا دب جانا۔ جب پلسٹیلوالی علامات موجود ہوں لیکن مریض کھلی ہو میں تکلیف محسوس کرے۔ سر چکرائے اور سر درد محسوس کرے۔

اکونائٹ امین۔ جب ٹھنڈے لگنے سے حیض دب جائیں۔ اگر افاقہ نہ کرے تو پلسٹیلو بجائے۔ سلفر۔ جب مذکورہ بالا تمام ادویات ناکام ہو جائیں۔ خاص طور پر جب معدہ کے گڑھے خالی پن کا احساس ہو، سر دھکنے کے ساتھ۔

سینیشو آرنیس۔ حیض کے دب جانے سے کھانسی، ہڑبڑا۔ عرشہ۔ بنزیرقان۔ گلاب ٹھنڈا۔ اور تنگی تنفس جیسی بیماریاں لاحق ہو جائیں۔

ٹرنسیرا۔ خواتین میں افسردگی۔ نوجوان لڑکیوں میں باقاعدہ حیض جاری کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مدر ٹیکچر کے ۱۰ یا ۱۵ قطرے دن میں دو بار کھانا کھانے کے نصف گھنٹہ کے بعد۔ ڈمیانہ۔ مندرجہ بالا دلی علامات رکھتی ہے۔

سٹرمونیم۔ حیض یا نفاس کے دب جانے کے بعد کی تکالیف کے لئے۔

سیبل سر۔ رحم کی بیماریوں کی وجہ سے حیض دیر سے آئیں اور پھتیاں ٹکڑ جائیں۔ لیک ویک ڈیفلو۔ ٹھنڈا پانی پینے یا اتھ ٹھنڈے پانی میں ڈالنے سے حیض دب جائے۔ رحم کے حصے میں شدید درد۔ سر درد شدید۔

نکس ماسکاتا۔ ذہنی برا بھلائی سے یا بھیگنے سے، غنودگی کے ساتھ غشی اور اتھ پاؤں ٹھنڈے۔ فرج سے برا خارج ہونے کے ساتھ حیض دب جائیں۔

لوپلی اوئم۔ جب حیض بہنے کا وقفہ ہو تو ناک سے خون بہے۔ کاسٹرک بھاتی ہے۔ جب حیض بہنے لگے۔ زرد دیکوریا کے ساتھ کمر میں درد ہو۔

میگنیشیا مسور۔ حیض سیاہ رنگ کے۔

مرکبورس۔ پستان درد کریں۔ جیسے کہ ہر حیض پر ان پر ناسور یا پھوڑے نکلیں گے۔ حیض کی بجائے چھاتیوں میں دودھ یا حیض کے وقت چھاتیوں میں دودھ۔

ایپس میل۔ اعصابی۔ ہسٹیریائی۔ شرمیلی اور بے وقوف مریض خواتین کی بلوغت پر حیض کی بجائے یہ قدرتی بعد اپن نہیں بلکہ پٹھوں کی ایک دوسرے سے مطابق نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیسٹورم۔ حیض نہ آنے پر درد اچھارے کے ساتھ۔ رحم کی گزوری کی وجہ سے حیض کا خون قطرہ قطرہ آئے۔ اعضائی درد۔ پیٹن کے ہلہ۔ ٹھنڈے پسینہ جذبات کی براہ کھنگلی کی وجہ سے اچانک گزوری۔ پاؤں ٹھنڈے۔ ناف کے قریب کترن سی۔ پیٹ ہوا کی وجہ سے تھلا ہوا۔ جڈے میں کھنچاؤ۔ حیض کے دوران پاخانے کا رجحان۔

کوکولس انڈ۔ حیض دے ہوئے تم اور پریشانی کی وجہ سے چکڑوں کے ساتھ۔ سر درد اور تسلی۔ سیسیا۔ حیض نہ آئے۔ شدید ہسٹیریائی سر درد کے ہلہ لیکوریا اور دانت درد۔ نرم مزاج۔ جھو پر زردی نابل دھتے۔ کانپے اور گرمی محسوس کرے کیے بعد دیگرے۔ نازک سی عورتوں میں بلوغت پر حیض ٹرک جلتے۔

لائیکو پوڈیم۔ ڈر کیوجہ سے حیض ٹرک جائیں۔ سر درد۔ کھٹی تھیں۔ پاؤں کی سوزش۔ غشی کے دورے اور لیکوریا۔ جب وہ ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ سال کی ہو جائے بغیر حیض کے چھاتیاں نہ بڑھیں اور بچہ دانیال اپنا معمولی کام نہ کریں۔ اندام نہانی سے ہوا کا اخراج ہو۔

ڈولکامارا۔ ٹھنڈی وجہ سے یا ٹھنڈی جگہوں پر رہنے سے حیض کا رب جانا۔ چھاتیوں میں اجتماع خون اور سخت۔ ہاتھوں پر مٹے۔ ہر حیض پر جلد پر پھوڑے ظاہر ہوں۔ کالی کارب۔ ابتدائی یا ثانوی طور پر حیض کی بندش۔ تنگی تنفس۔ دل کی دھڑکن۔ پیٹ میں تشنگی۔

رضایروں اور مسوڑھوں کی سوزش۔ لیکوریا۔

پیمو متھس۔ یرقان کی وجہ سے حیض نہ آئے۔

نوٹ۔ کہی خون یا ٹی بی جی بیماریوں کی وجہ سے اگر حیض ٹرک جائے تو مہربانی کر کے پہلے ان کا علاج مناسب ادویات سے کیجئے۔

دیر سے یا درد کے ساتھ حیض آئے۔

اکیڑا سیموسا۔ حیض کے دوران یا بعد میں درد۔ حیض بے قاعدہ، بہت جلد یا بہت دیر سے۔ جتنا زیادہ حیض ہے اتنی ہی زیادہ تکلیف ہو۔ مریضہ اعضا یا بے چین اور افسردہ ہوتی ہے۔ حیض کے دوران خروح رحم ہو۔ گنٹھیا۔ حیض نہ آئے۔ اندام نہانی میں اور بچہ میں مکن۔ ننگراپن محسوس ہو۔ تمام جسم پر جھکے نمایاں علامات ہیں۔

ایسٹریٹریک۔ حیض درد والے جن میں پیشاب کی متواتر خواہش ہو۔

ایسٹریٹریک۔ قبض۔ حیض کثرت سے اور قبل از وقت۔ دردزہ جیسی تکلیف یا حیض نہ آئے رطوبات کی کمی وجہ سے کمزوری۔ بانجھ پن۔ اسقاط کارحان۔ خروح رحم۔

واٹرئم اوپولس۔ حیض سے پہلے شدید درد جو آگے کی طرف دہرا ہونے پر کم ہو جیسی حیض شروع ہو۔ درد غائب ہو جائے۔ پیٹ کے نچلے حصہ میں درد قوچی جو ناقابل برداشت ہو۔ دریں اچانک شدت کے ساتھ آئیں۔ مڈنچو کے تین قطرے یا ۹ طاقت میں دیجئے۔

یکمو میل۔ کثرت حیض کے نتیجے کے طور پر شدید قوچی درد اور پُر درد حیض۔ اطراف میں درد نہ جیسی دریں اسہال کے ہمراہ۔

کریڈز روٹ۔ حیض بہت جلد۔ کثرت سے گہرے رنگ اور حجم سے خون کے ساتھ کافی دیر تک رہیں۔ حیض صرف لیٹے پر ہوں۔ میٹھنے یا لیٹے یا چلنے پر رک جائیں۔ جب شدید درد قوچی۔ اخراجات صاف اور پانی جیسا تپلا خون۔ ناف پر درد۔ جس کے بعد سفیدی مائل لکیر یا ہو۔ حیض کے دوران تھ اور سینے کی جلن۔

لیکس۔ حیض کے ہمراہ بولیر۔ دیر سے کم مقدار میں اور بہت کم مدت تک آئیں۔ ناک سے خون بہے۔ غنی یا خانے۔ قبض۔ لیکوریا۔ اور دانت درد۔

لایسکولوڈیم۔ حیض بہت کم مقدار میں اور بہت دیر سے یا بہت جلد اور کثرت سے ہر چھ یا آٹھ دن بعد ظاہر ہوں۔ معمولی ڈرک وجہ سے حیض دب جائیں۔ پیٹ میں گیس۔

پلسٹیل - ڈرپک لڑکیوں میں پُر درد حیض جو نرم مزاج کی وجہ سے جلد بڑھتی ہو جائیں۔ وہ علامات بتاتے وقت ہی رو پڑیں۔ چربیلا جسم ٹھنڈا رکھ لی ہو اگر پسند کریں۔ سوئی حیض شروع ہوں اور دہند ہو جائیں۔

لیپس الیس - حیض میں اتنی تکلیف کروے یہ ہوش ہو جائے کے قریب ہو۔ سوئی حیض بہنا شروع ہو تکلیف ترک جائے۔ پہلے دن گہرے، لوتھڑے اور سیاہ خون کے ڈھیلے سے ہوں۔ کندھے کے جوڑوں میں درد۔ سر میں درد۔ گھسے باہر مانا چاہے۔
سبائنا - حیض کے دوران - شدید پریشان کن درد جو تنے کی طرف دباؤ ڈالے۔ درد زہ جیسے درد۔ رحم اور بچہ دانیوں کی سوزش۔

کارلوائس - رحم کے بڑھ جانے اور سختی کے ساتھ پُر درد حیض۔ کمر میں شدید درد جو کوطے تک جائے اور قیض۔

کیویریم میٹ - تشنج اور ادھام کے ساتھ شدید درد۔

بیوفو - حیض سے پہلے یا دوران حیض پُر درد اور رحم میں جلن کے ساتھ درد۔

کالوفائیل - پیٹ میں شدید تشنجی درد۔

کالوسٹکس - حیض سے پہلے حیض کا درد قوی ہو جلدی شروع ہو جائے۔ خون سیاہ اکثر لوتھڑوں میں خراشدار لیکوریا۔ حیض کے درد قوی کو آگے کی طرف دہل جانے سے اور سخت دباؤ سے انافق۔ درد رحم یا بچہ دانیوں میں ہو۔ مریض اعصابی ہو۔

سارپیریل - حیض اسہال کے ساتھ پُر درد۔ تھوڑے اور بہوشی حیض کے وقت بھینٹاں مگر میٹریس۔

لوپیلیا الفلیٹا - پُر درد حیض جو بے قاعدہ ہوں۔ تمام پیٹ میں درد خاص طور پر بچہ

دانیوں اور ٹانگوں میں شدید درد ہو۔ تمام جسم میں شدید درد متواتر غش کھائے جب حیض کو

دیر ہو جائے تو تھوڑے اور تلی ہو حیض سے پہلے اور بعد میں تھوڑے اور مزید شدید تھکی ہوئی اور

بھار محسوس کرے۔ حیض کی بے قاعدگی کے ساتھ اسہال۔

گن پاؤڈر - پُر درد اور کم حیض کے لئے شاندار دوائی ہے حیض کا بہنا بند ہو جاتا ہے شروع

ہو جائے۔ ۲۲ طاقت میں دیجئے۔

کیسٹوریم۔ حیض کا درد قریح پیلاین اور ٹھنڈے پسینے۔

کالی کارب۔ حیض یا تو دیر سے آئیں اور بہت کم مقدار میں یا پھر جلدی جلدی اور کثرت سے کافی عرصہ تک رہیں۔

سیسیا۔ ناکافی یا مست یا قبل از وقت کثرت سے حیض انہیٹن دار دردوں کے ساتھ ڈبلے پتلے اور کمزور انسانوں میں پہلے حیض میں دیر جہاں لیکوریا ہو۔ حیض کے عرصہ چھاتیوں میں غلن باعث نقصان ہو۔ پڑوں میں تنچے کی طرح بھاری پن کا احساس۔ زرد رزخ طبیعت بھوک لکھی کے ساتھ حیض کے بعد قے اور کھینچ کی جلن۔

گر لیاٹیس۔ بہت ہی دیر سے حیض آئے۔ بہت ہی کم حیض آئیں یا حیض شاذ و نادر ہی آئیں۔ چکنے والا یا نانا، گرہ دار مواد کے ساتھ۔ بائیں رحم میں بچہ دانی کی سختی پتھر کی طرح۔ جلدی الرض۔ کارحان موٹا پے کا رجحان۔

کالسنویا۔ حیض کی شدید بندش بواہر کے ساتھ شدید انہیٹن جس سے پہلے رحم میں درد ہو۔ دل کے اعصاب کی زرد حسنی جب دل کی تکلیف رک جائے تو دبے ہوئے حیض پھرے باہر ہو جائیں۔

میگنیشیا فاس۔ پُر درد حیض کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ تکلیف دہا ہونے لگی اور گرم چیزیں لگانے سے کم ہوتی ہے۔ مادکیوں میں ۶۶ طاقت اور بڑی طاقت مثلاً۔ ۱۔ ایم یا سی ایم طاقت کی ہر رفتہ یا پندرہ دن بعد مکمل علاج کے لئے دیجئے۔

ورمیٹرم ایلیئم۔ تکلیف دہ حیض کے لئے موت جیسی ٹھنڈک کے ساتھ ہونٹ نیلے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور نیلے۔ دل ڈوبنے کا احساس۔ ہکری کو جو منے کی خواہش۔

کلکیریا فاس۔ لڑکیوں میں بلوغت پر تکلیف دہ حیض بے اعتیاطی کی وجہ سے جو بائجھ پر منتج ہوا جس کا نتیجہ بائجھ بن ہو۔ رحم میں تکلیف جو جوانی سے متعلق ہو۔ تنچے کی طرح دباؤ کے ساتھ دردزہ جیسی دردیں۔

لوڑکیس۔ لیکوریا کے ساتھ جو انڈے کی سفیدی کی طرح اور مکی کی طرح ہو۔ حیض سے کئی روز پہلے۔ دردِ ذہ جیسی تکلیف۔

جبرائلی۔ جب حیض ٹھنڈک اور غشی کے احساس کے ساتھ ہو۔ سر اور پیٹ میں پکن دار درد۔ سردی کے ہمراہ۔ جبرائلی کے ایک یا دو قطرے گرم پانی کے ہمراہ فوراً درکار فائدہ کر دیں گے۔ سیدکل کار۔ حیض کا قلعہ بندی درد۔ ٹھنڈک اور گرمی برداشت نہ کر سکنے کے ساتھ۔ رحم میں جلن دار۔ بھوڑا۔ بدبودار۔ لیکوریا۔ لگاتار پانی جیسا پتلا خون رسے متھا کر دوسرا حیض شروع ہو جائے۔

گلگیر یا کرب۔ ایک شاندار انٹی سوریجک دوائی ہے۔ پچھلانی کی تکالیف نرمی پہلایین کے ساتھ۔ تھائی رائیڈ اور پچھلانی غدد کے کام کرنے کی خرابی۔ مثلاً پے کار جھان ظاہری اعضا تناسل پر خارش اور ان پر کثرت سے ٹھنڈا پسینہ۔ قبل از وقت حیض دو یا تین روز پہلے۔ غمخ خواب سردی۔ اعصابی کمزوری اور چھاتیوں کی سوزش حیض سے پہلے۔ رحم میں گولٹ۔ ہیلو نیاس۔ سست۔ تھکی ہوئی مریضوں جو اکیلی رہنا پسند کریں۔ رحم کی نااہلیت کی وجہ سے حیض دیر سے آئیں۔ حیض بدبودار اور جھمے ہوئے۔ گردوں کی سوزش۔ ذیابیطس۔ البیومن اور فاسفیٹ کی تکالیف کے ہمراہ۔

کونیم۔ کم حیض پچھلانیوں میں شدید درد کے ہمراہ۔ اکثر جھوٹا درد اور دھڑکنے پر خارش کے ساتھ۔ غیر شادی شدہ افسردہ۔ بزدل اور رونے کی طرف مائل لڑکیوں کیلئے موزوں ہے۔ ادفورنیم۔ حیض ہر ۴۰ سے ۶۵ روز بعد ظاہر ہوں جو پُر درد اور تھوڑے سے وقفہ تک رہیں۔ نسزج کی خارش۔

زینیتھوزائیکل۔ دے ہوئے حیض پُر درد حیض لیکوریا کے بغیر یا لیکوریا کے ہمراہ ۹ طاقت میں ہر تین گھنٹہ بعد دیجئے۔

میگنیشیا کرب۔ پُر درد حیض جو عام طور پر بہت دیر سے اور کم مقدار میں آئیں۔ حیض کا اخراج رات کے وقت کثرت سے ہوا اور لیٹنے کے دوران جب کھڑی ہو یا چلے تو رگ جاتیں شدید

کھوک اور معدہ میں درد۔ متلی۔ لنگڑا پن اور مسلسل درد حیض سے پہلے شدید درقونج۔
 نکسوامیکا۔ حیض بہت پہلے اور زیادہ دیر تک رہیں چڑے کے پچھلے اعصاب میں
 کھینچنے والے درد سستی برقونی کے ساتھ ہاتھ پاؤں میں گٹھیا۔ بے چینی۔ زرد رنج اور
 لڑاکا طبیعت۔ رحم میں انٹینشن۔

فاسفورس۔ حیض بہت جلد اور کثرت سے دروزہ جیسی تکلیف اور درقونج اور بہت
 دیر تک رہیں اور اطراف میں تکلیف کے ساتھ درد حصوں کے درمیان خون کا اخراج۔ جب
 حیض کم مقدار میں ہوں ان سے پہلے لیکوریا۔ کاٹنے والی تکلیف جیسے کہ چاقوؤں سے کاٹنا
 جاتا ہو۔ رونے والی طبیعت اور مواد کی قے۔

پلاٹینا۔ حیض بہت جلد اور کثرت سے دروزہ جیسی تکلیف اور انٹینشن۔ سیاہ اخراج
 جس کے بعد لیکوریا ہو بے چینی۔ بے خوابی۔ نسکی مزاج۔ برتری کا احساس۔ انٹینشن
 قونج دباؤ کے ساتھ رحم کے ساتھ۔ مہلوں میں کھینچاؤ قبض اور پیشاب کی کثرت سے خواہش۔
 سلفر۔ رُکے ہوئے اور پُر درد حیض بے چینی کے ساتھ۔ دباؤ۔ قبض اور پیٹ تانہوا۔ مزاجی ردائی
 جب دوسری منتخب ادویات ناکام ہو جائیں۔

آرژنٹم نامٹریکیم پُر درد حیض شدید خون بہنے کے براہ من رحم ہی سے خون نہ بہے بلکہ ناک
 چھال اور منہ وغیرہ سے خون بہے۔

بدبودار حیض

پلاٹینا۔ بدبودار اور متعفن اسقاط کے بعد بہت زیادہ خون بہے۔
 کروڈیلیس۔ بدبودار حیض رُکے ہوئے اور گلتے مٹرتے باقی ماندہ مواد سے۔
 لائیٹم گ۔ پہلے کم مقدار میں۔ مگر۔ لوتھڑے دار، بدبودار من حرکت کرتے وقت
 سے۔ منجھکی طن دباؤ کا احساس۔
 کالوسٹیکس۔ پچر دانی میں گومڑے کے ساتھ بدبودار۔

سلفر۔ کھٹی بُودالا

کالی کارب۔ ٹھنڈک کے ساتھ، انھیں وارور دین پیٹ میں بچھنے والا۔

قبل از وقت حیض۔

کلیک یا قاس۔ کمزور لڑکیوں میں مناسب عمر سے قبل حیض شروع۔ حیض بہت جلد بہت زیادہ مقدار میں اور چمکدار۔ اگر دیسے آئیں تو گہرا خون۔ اندھے کی سفیدی جیالیکوریا۔ سبائنا۔ حیض موزوں عمر سے قبل، کثرت سے اور چمکدار۔ سرخ۔ رحم کی ناطا قاتی کیا۔ کلیک یا کارب۔ چھوٹی لڑکیوں میں حیض جنسی اعضا میں جلن اور غارش حیض سے پہلے اور دودھیا۔ لیکوریا۔ حیض سے پہلے سرد درد اور درد قولنج۔

کاربووکیج۔ قبل از وقت اور کثرت سے حیض۔ زرد خون۔ فزح سوچی ہوئی حیض کے تلوؤں اور تھیلیوں میں جلن۔

کثرت حیض۔

چائنا۔ زیادہ خون بہنے اور دیر تک خون بہنے کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ سب سے پہلے یہ آزمائی جائے خاص طور پر جب مریضہ کمزور اور ناتواں ہو۔

ریس ایرو میٹیکا۔ رحم کی ناطا قاتی کی حالت کی وجہ سے خون قطروں میں مڑنیکچر دیجئے۔ تھلا پس۔ آہستہ آہستہ خون بہنا شروع ہو۔ تب کثرت سے خون بہے حتیٰ کہ مریض شدید کمزور ہو جائے۔ وہ بمشکل سے اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ دوسرے ماہ کا حیض شروع ہو جائے۔ مڑنیکچر میں قطروں میں خوراک دیجئے۔

مُچیللا۔ کثرت پیشاب کے ساتھ خون ہے جو کہ زیادہ آزاد نہ ہوا اور تسلی بخش نہ ہو خون سرخ چمکدار تکلیف دہ پیشاب کرنے کے ساتھ۔

سیلاڈونا۔ قبل از وقت اور کثرت سے حیض اس احساس کے ساتھ کہ ہر چیز رحم سے باہر

خارج ہو جائے گی۔ گندی بودالا، جما ہوا خون، تپکن دار سرد در، سرخ اور سوجا ہوا چہرہ -
 سٹر امونیم - سیاہ خون کا کثرت سے اخراج - جما ہوا خون - پیٹ میں کھینچنے والے درد -
 پہلوؤں اور بازوؤں میں کھینچنے والے درد - باتونی -

اگنیشیا - ہر پندرہ روز کے بعد حیض دیر تک رہیں - پیٹ میں ایٹھن اور سختی ہٹنا
 غشی کے ساتھ تسلی - روشنی کو برداشت نہ کر سکے - نظر دھندلی -

آرنیکا مانٹ - جب کثرت خون دباؤ یا غلط اقدام اٹھانے سے یا زخم کی وجہ سے ہے -

کیمو میل - کثرت حیض کھینچاؤ پیٹ کی اطراف ایٹھن دار درد قوی -

رٹنہیا - رحم سے خون بہہ، پیٹ اور چڈے میں درد کے ساتھ جو بچہ کی طرف منحنی اعضا
 کو دبا کر اس کے بعد لیکوریا ہو -

سیلشیا - جس وقت بھی بچہ چھاتی ہے درد دھ پیٹ - اندام بنانی سے خون ہے -

لیکسس - گہرے لوتھڑوں والا خون کثرت سے نکلتا ہے اور اذیت بخش دردیں -

جونہی بہاؤ شروع ہو - افادہ ہوا اور لوتھڑے خارج ہو جائیں - گرمی اور گرم موسم میں زیادتی -
 ٹھنڈ میں افادہ - گندی بلب کے ساتھ کثرت سے پسینہ - چھاتیاں نامکمل یا ابھی طرح سے بڑھی
 ہوئی نہ ہوں -

وسکم البم - ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھونے سے کثرت سے خون ہے -

ایسی فسطیم -

الیٹرس نارسیوسا - رحم کی کمزوری کی وجہ سے حیض کثرت سے اور قبل از وقت آئے -

حیض نہ ہونے کی وجہ سے درد زہ جیسی دردیں - رطوبات کے ضائع ہونے کی وجہ سے

کمزوری - بانجھ پن - اسقاط کی عادت کا رجحان - خورج رحم - قبض - خوراک سے نفرت -

بد بھنی - رحم سے خون ہے - اسقاط کا یا حیض کا ہو سکتا ہے - بڑے بڑے لوتھڑے جس کے

بعد کثرت سے خون ہے -

امبرگرسیا - اعصابی خواتین میں حیض کے دوران میں تھوڑے سے دباؤ کی وجہ سے

خون بہنے لگے - بہت جلد اور کثرت سے ۷ روز پہلے بہنا شروع ہو جائے اور تب شدید غماش

دکھن اور نئی اعضاء کی سوجن۔

فائیکس ریل۔ جسم کے کسی بھی حصہ سے بے شمول رحم بغیر کسی ظاہری وجہ کے خون بہے۔
کریوزوٹ۔ کوئی چیز اٹھانے یا طاقت سے زیادہ کام کرنے سے اور ہمیشہ مباشرت کے
بعد رحم سے خون بہے، مباشرت کے دوران درد نہ ہو۔ حیض باقاعدہ لیکن کثرت سے اور وقت
دار بعض اوقات سیاہ۔ شدید بدبودار۔ جنسی اعضاء پر اور کولہوں پر دکھن پیدا کریں۔ رکتا
ہے دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ جلدی شروع ہوتا ہے اور کافی دیر تک رہے۔ کمزیر متواتر
دھیمادھیمادرد۔ خون بہنے کے ایک روز بعد بائیں طرف شدید سردرد۔ دودھیا لیکور یا
حیض صاف لیتے پر یا چلنے پر رگ جائیں۔

سبائنا۔ نیچے کی طرف دباؤ کے ساتھ خون بہے۔ بعض اوقات خون کا بہاؤ اگلے
حیض تک نہ رکے۔ گٹھیا اور خون کا بہاؤ بالترتیب۔ جیسے کہ خون بہے جب گٹھیا رگ جائے۔
یا اس کے الٹ۔

کارلوانیمیل۔ حیض بہت پہلے، دیر تک رہیں اور کثرت سے۔ ہر حیض پر شدید
کمزوری۔ رحم میں جلن کہ جلتے ہوئے کوئلے اس پر رکھے ہوں۔ جھاتیوں میں خالی پن کا احساس
جب بھی بچہ کو درد دھر پلانا چاہے۔

کارلوزیج۔ رحم میں لچک نہ ہونے کی وجہ سے رحم کے نہ مکنے کی وجہ سے خون
بہے۔ یہ زچگی کے بعد۔ حیض کے بعد یا الفاقہ خون بہنے کے بعد۔

فاسفورس۔ خون بہے قابو میں نہ آنے والی ٹھنڈے پانی کی پیاس۔ سرگرم۔
امونیا کارب۔ حیض بہت جلد۔ خون سیاہی مائل اکثر تو قہڑوں میں۔ لیکور یا خراشدار
جنسی اعضاء کی سوزش۔ پکڑن اور درد قریح حیض سے پہلے۔ ہر حیض پر رکیم یا امعائے
مستقیم سے خون بہے۔

امونیا ایم۔ حیض بہت جلد۔ خون حیض کے ہمراہ آنتروں سے اور امعائے مستقیم
سے خون بہے۔ خاص طور پر زرد بیمار اور نازک عورتوں میں جو گرمی میں مبتلا ہوں۔ حیض ہر بار

جلد آئیں کمر میں درد کے ساتھ۔ رات کے وقت خون ہے۔

سیکل کار۔ سیاہ رنگ کا خون کثرت سے ہے۔ برف جیسے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے دہلی اور تکی عورتوں میں جو گرمی میں مبتلا ہوں۔ مریضہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا چاہے اور ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ خون پتلا اور بدبودار۔ خون لوتھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔

اسٹیلڈاگو۔ رحم کے پیچھے کی طرف جھکے ہونے کی وجہ سے خون ہے۔ خون سرخ چمکدار نیم سیال، نیم لوتھڑے دار معائنہ کرنے والی انگلی کو رحم نرم اور اسفنج کی طرح معلوم دے۔
ٹریلیم۔ چمکدار سرخ اور کثرت سے بالائی بیٹ میں غشی کا احساس۔ کمر میں درد ہاتھ، پاؤں ٹھنڈے کمزوری۔ نہایت باریک نبض رحم کے ریشوں کی وجہ سے خون ہے۔ یہ خون کو بند کر دیتی اور آگاد کو جذب کر لے گی۔

آکونائٹ این۔ جب ایلے ہوئے چمکدار سرخ خون کے ساتھ موت کا واضح ڈر ہو۔
فرم میٹ۔ حیض بہت جلد۔ کثرت سے بہت زیادہ دیر تک رہیں، مریضہ میں کمزوری پیدا ہو۔
ایسیکاک۔ خون ہے کمزوری کے ساتھ چمکدار سرخ خون کی دھار ابل کر کپڑوں سے بستر پر اور جوہر کی طرح فرخ پر سو خون جلدی سے نہتے۔ مریضہ زرد متلائے اور غشی طاری ہو۔
۲۰ یا ۱۔ اہم طاقت میں ہر بندہ منٹ کے بعد دیکھتے ہی کہ افاقہ شروع ہو جائے تب دوائی بند کر دی جائے۔

پلاٹینم۔ حیض ۱۲ یا ۶ روز پہلے آئیں اور بہت کثرت سے ہوں۔
کلکیریا کارب۔ رحم سے خون بڑے بڑے لوتھڑوں، چمکدار سرخ مائع کی شکل میں کثرت سے خارج ہو۔ ذہنی صدمہ سے خون ہے۔ پاؤں ٹھنڈے کنار۔ یہ دوائی ناگزیر ہوتی ہے جب حیض چند دن پہلے بہنا شروع کر دیں اور بہت زیادہ خون ہے۔

ونکامائیسر۔ کثرت حیض یا کم حیض جب خون ایک متوازی اور متواتر دھار کی صورت میں ہے جس کے ساتھ شدید کمزوری ہو۔

کاکولس انڈ۔ حیض بہت جلد اور بہت دیر تک رہیں، ایسی عورتوں میں جو غم اور پریشانی کی وجہ سے کمزور ہوں۔

فرکیسنس امریکانو۔ شدید درد حیض دیر سے لیکن کثرت کے حیض کم

سائیکالین۔ حیض کم، جکڑا اور سرد درد کے ہمراہ۔ پیٹ میں شدید درد جو کئی بڑی سے شروع ہو کر پیٹ کے دونوں طرف سے پیڑوں تک جائے۔ بے قاعدہ حیض کئی ماہ بعد ظاہر ہوں۔ مریض غمگین۔ افسردہ کوئی کام کرنے کے ناقابل ہست۔

پلسٹیللا۔ دیر سے اور مختصر حیض سائیکالین والی تمام علامات کے ساتھ سولے اس کے کہ پلسٹیللا کا مریض کھلی ہوا میں ہمیشہ افادہ محسوس کرتا ہے۔

سلفر۔ دیر سے حیض قبض کے ہمراہ جلدی پھنسیوں کا رجحان۔ چہرے کی سرخی قبل از دوپہر معده میں شدید جھوک کا احساس۔

الیومنا۔ حیض کم جن کے بعد عورت جسمانی طور پر اور دماغی طور پر بہت ہی تھک جائے۔ دو حیض کے درمیان لیکوریا کثرت سے ہو۔ خراش دار اور پھیلنے والا، ایڑیوں تک پہنچنے والا۔ گریفائیٹس۔ حیض کا کبھی کبھار بہنا جو بہت زرد اور تھوڑے وقت کے لئے ہوں۔ پیٹ میں درد۔ انڈام نہانی کی انٹینشن۔ بازوؤں میں گنٹھیاوی در دیں۔ ہاتھوں اور پاؤں کا استسقاء۔ کم حیض جس کے ہمراہ دوسری تکلیف جیسے کہ سرد درد اور جلدی بیماریاں ہوں۔ میگنیم۔ کئی خون والی ٹرکیوں میں حیض کم اور اکثر ہوں۔

نیٹرم میور۔ مٹی کے رنگ جیسی مریضوں میں قبض کے ساتھ کم حیض۔

اکٹیار سمیوسا۔ حیض کم۔ ہگرے اور جھمبے ہوئے۔ شدید عام کمزوری۔ دو حیضوں کے درمیان کم مقدار میں ہے۔

گن پاؤڈر۔ کم اور سرد درد حیض کے لئے شاندار دوائی ہے۔ حیض رکھتا ہے پھر بارہ گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے۔ $2 \times$ طاقت میں دیجئے۔

دودھ پستانوں کے نیچے
عورت کے زیر ناف بالوں والی جگہ

یلاٹینا۔ ٹھنڈی۔ چھونے کے لئے شدید حساس۔ چھوٹا درمال برداشت نہ کر سکے۔ فزج یا انڈام نہانی پر مستواتر دباؤ۔ پر درد۔
کو نیم۔ بڑے بڑے چھوٹے چھونے پر درد کریں۔ غارش۔

عورتوں میں خواہش جماع کا غیر معمولی غلبہ
 بڑھی ہوئی خواہش بھی دیکھئے۔

بڑھی ہوئی خواہش بھی دیکھئے۔
 پلاٹینا۔ خواہش جماع کے غیر معمولی غلبہ کے لئے مچوٹی کی دوائی ہے خاص طور پر زچاؤں میں
 (زچگی کے بعد) یا حمل کے دوران۔

فاسفورس۔ اگر لڑینا کام ہو جائے تو دی جائے۔
نکسوامیکا۔ جلق کے بعد۔

اگر کیس میسر۔ جنسی اعضا میں خارش اور سوجان بہم آخوش ہونے کی زبردست خواہش کے ساتھ۔

پیدا - جب لیکوریا ہمارا ہو تو دی گئی ترتیب میں دیجئے۔
پسٹیل - " " " " " "

گوشی اولیٰ - عورتوں میں خواہش جملہ کے غیر معمولی غلبہ اور جلیق کے لئے مخصوص ہے۔
ہائیموسائیکس - حیا کا کمی کی وجہ سے خواہش جملہ کا غیر معمولی غلبہ۔
نرکم - شدید جنسی لگائٹ جو خود کو غلط استعمال کی طرف لے جائے۔

میوہ ریکس۔ جنسی اعضا میں شدید اکساہٹ ہم آغوش ہونے کی شدید خواہش۔ اعضا کا معمولی سا جھوٹا بھی شدید جنسی اکساہٹ پیدا کر دیتا ہے۔

کیلیڈیم۔ رحم میں کرموں کے ریگنے کی وجہ خواہش جماع کا غیر معمولی غلبہ اور بھجان پیدا کر اور ریگنیم۔ جلتی کی خواہش کے ساتھ۔

سٹرامونیم۔ حیض کے وقت

کلکیر یا کارب۔ ذہنی اکساہٹ لیکن جسمانی خواہش نہ ہو۔

بچہ دانیال

رحم۔ بچہ دانیال کی سوزش بھی دیکھئے۔

ایس میل۔ دانیال بچہ دانی میں اجتماع خون اور سوزش کو لے تک سُن ہونے کے ساتھ۔ یا

اس کے بغیر بھاتی کی تنگی اور از خود یا بلا ارادہ کھانسی بھی ساتھ ہو۔

بیلادونا۔ بچہ دانیال کی حاد سوزش۔ لیکن دالی دردیں۔ بائیں طرف زیادہ تھوڑی

سی کرخت آواز پر درد شدید حساسیت۔

لیکسس۔ بائیں بچہ دانی میں درد جس کو رحم سے مواد کے اخراج کے ساتھ افاقہ

ہو۔ کوئی ذرنی چیز اس جگہ برداشت نہ کر سکے۔ یہ بائیں طرف بچہ دانی کے لئے مندرجہ بالا اعضا

کے ساتھ کے لئے بھی مفید ہے۔

آرسینکلم البم۔ بچہ دانیال۔ جلن دار شدید درد جن کو گرم بیسیوں سے افاقہ ہو۔ بے صبری۔

تھوڑے تھوڑے وقفوں پر تھوڑی تھوڑی مقدار پانی کی پیاس۔

پلاٹینم۔ بچہ دانیال میں جلن دار درد حساسیت اور جنسی اکساہٹ کے ساتھ دباؤ سے

درد زیادہ ہو۔

لیڈم ٹنگ۔ بچہ دانیال کا اعصابی درد۔ بچہ دانی سے جلن دار دردیں اور اوپر پٹینگ

اور نیچے کو لہوں تک۔ گولی لگے جیسے درد بائیں بچہ دانی سے پٹینگ یا پستان تک۔

کالوسنتھس۔ بچہ دانیال کا قولنج۔ پکڑنے والی دردیں جنکو دہرا ہونے پر ناتھو۔

ایسٹوڈین - دائیں بچہ دانی میں اجتماع خون اور استسقاء اور پستان کا گھٹنے گھٹنے کم ہونے کے ساتھ رحم میں دھیمی دبانے والی درد - دائیں بچہ کے علاقہ میں بھانے کی طرح کا درد اور فورنیم - بچہ دانی کی پھیلی کے لئے -
 پیلاڈیم - دائیں بچہ دانی میں درد جس کو دبانے سے فائدہ ہو -
 سچرس - بچہ دانی میں سوزش اور درد کے ساتھ دائیں بچہ دانی میں اینٹھن -
 میوفرف - بچہ دانیوں میں جان دار گرمی اور درد جو بچہ کو لہو تک جا میں حیض نہ آئے ہو انہوں اور کتہ دانوں کی پھیلی بچہ دانیوں میں -

کارلونیملٹ - بچہ دانیوں کی لاغری - مجامعت سے نفرت - فرج میں خارش -
 زیتھورائلم - بچہ دانیوں کا اعصابی درد، حیض سے بہت پہلے اور درد بھرے پیٹ کے نیچے حصہ اور چڑوں میں درد کے ساتھ - باضمناقص - بخوابی، پشت سر میں درد -
 مرک سال - دائیں بچہ دانی میں درد جس کو گرمی چیز سے لپٹنے سے افادہ ہو، اور پسینے سے افادہ ہو - ڈنگ لگنے جیسی بھاڑنے والی اور کاٹنے والی دریں - بچہ دانیوں میں -
 ویسپا - بائیں بچہ دانی میں درد - جلندار کثرت پیشاب کے ساتھ - باہر کے سوراخ کے ارد گرد پھیلن یا پھل جانا -

اسقاط حمل — حمل

اکونائٹ - این - خطرناک خوابوں کی وجہ سے اسقاط جیسے کڑا کو دیکھنا - آگ یا سمنہ میں ڈوب جانے وغیرہ کے خواب دیکھنا - ۲۰۰ طاقت میں دیکھنے -
 آئرلیکامائٹ - جب اسقاط غلط پاؤں پڑ جانے کی وجہ سے یا زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے یا زیادہ جسمانی محنت کرنے سے - حدوں سے - گرنے سے - خراشوں سے - چوٹ سے - درد اخراج مواد کے ساتھ یا اس کے بغیر یا مواد درد کے ساتھ یا اس کے بغیر ہے -
 سائنا - ہر دس یا تیس ماہ کے اسقاط کے لئے، اسقاط کی عادت گہرے خون کا بہنا چھوٹی

کر اور جنسی اعضا میں درد۔

426

واٹر نم پرو۔ حمل کے گرنے کے لئے شاندار دوائی خاص طور پر آٹھویں ماہ جب بچے پیدا ہو کر، پیدائش کے بعد جلدی مہ جاتے ہیں۔ اسقاط کے لئے لی گئی ادویات کے اثر کو زائل کر دیتی ہے۔ اگر یہ دوائی دے دی جائے تو کوئی عورت آسانی سے اسقاط نہیں کر سکتی۔ سیپیا۔ پانچویں یا ساتویں ماہ میں اسقاط۔ مریضہ دُبی تیلی اور نازک۔ لیکوریا اور قبض والا مزاج۔

جلیسیم۔ ذہنی اکساہٹ کی دجہ سے اسقاط۔ درد پیٹ سے شروع ہو کر اوپر جائے اور مکر ٹھہر جائے۔

آرم میو رینیٹ۔ جب مروکس کی سختی کی وجہ سے ہو۔

پلسٹیللا۔ اسقاط کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ ایک ماہ یا اس سے زائد عرصہ تک $\times 9$ طاقت میں دی جائے۔ یہ اگر $\times 2$ طاقت میں دی جائے تو ولادت قبل از وقت کو روکتی ہے۔ مریضہ بزدل۔ ٹھنڈا۔ پیاس نہ ہو اور مواد وقفہ وقفہ سے بہے۔

کروکس۔ تیسرے ماہ کا اسقاط، جیسے کہ کوئی چیز زندہ پیٹ کے اندر ہو۔

تھلاپیسی۔ جب مستقل خون بہنے سے اسقاط ہو مد ر ٹنگر استعمال کیجئے۔

گوپسیم۔ یہ ایک دوائی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسقاط کر دیتی ہے۔ یہ مد ر ٹنگر میں قطروں میں دی جاتی ہے۔

کلگیریا کرب۔ یہ پرخون کثرت حیض اور قبل از وقت حیض اور لیکوریا والی عورتوں کے لئے ہے۔ جھوٹی کمز میں درد۔

فرم میٹ۔ یہ بزرگان والی مریضوں جن میں حیض رگ گیا ہو اور لیکوریا میں مبتلا ہوں۔ کیہمفر۔ کمزور عورتوں کے لئے جو لیکوریا میں مبتلا ہوں۔ سینے پر ٹھنڈا سر پر ٹھنڈا زکام کے اخراج۔

اپریکاک۔ لگاتار سرخ چمکدار۔ تولیخ پیٹ میں کاٹنے والے درد۔ رحم پر شدید دباؤ۔

پلاٹینا - جب اپیکاک ناکام ہو جائے تو یہ دی جائے۔

سیمکس کار - جب رحم بیمار ہو جائے یا طاقت کی کمی۔ کمزور اور سخت تھکی ہوئی عورتوں کے لئے مفید ہے۔ تیسرے ماہ اسقاط۔

نوٹ:۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ وہ پیتی میں ایسی ادویات نہیں ہیں جو بیماری پیدا کرتی ہوں۔ پس اسقاط حمل میں ناکام ہو جانا عام اصول کی بات ہے۔ مندرجہ بالا ادویات البتہ ایسے کیسوں میں استعمال کرائی جاسکتی ہے جہاں مریضہ کی صحت کی بہتری کے لئے ضرورت ہو۔ صحت مند عورتوں میں اسقاط کرنا جرم ہے۔

پیشاب میں البیومن -

ایپس میل - حمل کے دوران پیشاب میں البیومن کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔
کینتھرکس - پیشاب میں البیومن آئے جلن اور گری پیشاب کرتے وقت۔ پیشاب کم مقدار میں۔
ٹریپتھنا - پیشاب رک جانے کے ساتھ البیومن۔ پیشاب قطروں کی صورت میں آئے۔
یونیمین - حمل کے دوران البیومن آئے۔ آدھے گلاس میں پانی اور اس میں ۲ گرین x9
طاقت کی دوائی ڈال کر دیجیے۔ ہر گھنٹہ کے بعد چائے کا ایک چمچہ دوائی فی خوراک کے دیجیے۔
ہیلونیاسکس - حمل کے دوران البیومن آئے۔
مرک کار - حمل میں گردوں کی سوزش کے ساتھ البیومن آئے
فاسفورس - حمل کے آخر میں اور دیر میں البیومن پیشاب میں آئے۔

مقعد

کیپیکم - حمل کے دوران مقعد میں جلن۔

نفرت

سیپیا - حمل کے دوران روٹی سے نفرت۔ خوراک کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ جاتی ہے۔

لارویہ اسس۔ حمل کے دوران خوراک سے نفرت۔

بچے کی طرف دباؤ

(رحم کے ضمن میں بچے کی طرف دباؤ۔ خروج رحم دیکھیے)

سیدیا۔ حمل کے دوران یا اس کے علاوہ بچے کی طرف دباؤ کے لیے چوٹی کی دوائی ہے۔ مائیں ماہ دروزہ جیسی تکالیف... ایسی ایم طاقت میں دیکھیے۔

سار سپر ملا۔ کمر میں کھینچنے والی درد جو ہاتھوں، پاؤں اور پنجوں تک جائے۔ پاخانے سے پہلے اور دوران کمر میں سخت درد۔

کالی کارب جھوٹی کمر میں شدید جیسے کہ پٹیر میں ایک ذرن دن رکھا ہوا ہے۔ ایک ہزار طاقت میں خوراک دیجئے۔ تین یا چار روز تک انتظار کیجئے۔

سیکل کار۔ اکثر اور دیر تک رہنے والی طاقت دروزہ۔ جسمانی طور پر تپلی اور بد مزاج۔ پلسٹیلما۔ بچے کی طرف دباؤ کے ساتھ دروزہ جیسی دردی۔ یہ رات کو نگرانی کرنے یا دہنی دباؤ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔

اسٹیلالگو۔ پُر درد اور لمبی مدت حمل کے لئے موزوں ہے۔

حمل کے دوران سانس

نکسوامیکا۔ حمل کے دوران مشکل سے سانس لے۔

حمل کے دوران کھانسی

کالی باکی۔ کھردری کھانسی۔ اعصابی اسقاط کا ڈر پیدا کرنے والی کھانسی۔ کالی بزم۔ حاملہ عورتوں میں از خود کھانسی یعنی بلا ارادہ کے خشک تنگ کرنے والی کھانسی رات کے وقت۔

کاشیکم۔ خشک کھانسی

کونیم۔ خشک کھانسی متواتر ہم جو ذمہ اور جسمانی زیادہ کام کرنے، پلنے، رات کو زیادہ ہو۔

بیل۔ کھڑی کھانسی خشک چہرہ۔ سُرخ ہو جائے۔

موت

اکونائٹ این۔ حمل کے دوران میں موت کا ڈر۔ ۲۰ طاقت میں دیکھے دو یا تین خوراکیں چار گھنٹے کے وقفے سے دیکھے کافی ہوں گی۔

خواہش

درہم البم۔ کٹھی یا تیزابی چیزوں کی خواہش۔ ٹھنڈی۔ نمکین خوراک کی خواہش ہو۔
سلفر۔ کھانڈ یا اچار کی خواہش۔
میگنیشیا کارب۔ خاص قسم کی خوراک کی خواہش۔
نیرم میور۔ نمک اور نمکین خوراک کی خواہش۔
چیلیدونیم۔ غیر معمولی اشیاء کی خواہش۔
نائٹرک الیڈ۔ مٹی۔ چاک یا چونا کی خواہش۔
الیومنا۔ کوئلوں۔ چاک یا چونا کی خواہش۔

استسقاء

ایپیس۔ پاؤں اور چہرہ کے استسقاء کے لئے شاندار دوائی ہے پیاس نہیں ہوتی۔
ایپوسائیم۔ جب استسقاء جگر کی وجہ سے ہو۔ پیاس ہو اور ریض کھلی ہو این رہا جائے۔
آر سینک البم۔ دل کی خرابیوں کی وجہ سے استسقاء تھوڑے تھوڑے وقفے پر تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس۔
ڈیجیٹالس۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ استسقاء۔
جھوٹا حمل۔

کروکس۔ رحم میں بچے کی شدید حرکات یا خیالی حمل۔
کالوفاسلم۔ جھوٹا حمل۔ خیالی حمل۔

جنین کا متحرک ہونا۔

پلسٹیل۔ جنین یا بچہ کو صبح جبکہ پر لانے کیلئے شاندار دوائی ہے۔ جب بچہ اٹا ہو جائے تب ٹھیک کر دیتی ہے۔

کالوفائیلیم۔ جب حرکات رگ جائیں۔

کروکس۔ جب حرکات شدید ہوں اور پردہ ہوں۔

محقوجا۔ ساتویں یا آٹھویں ماہ میں شدید حرکات جو حاملہ کی نیند میں خلل ڈالیں اور مٹیاب کرنے کی خواہش کو ابھاریں۔

آرنیکا مانٹ۔ جب جنین کی حرکات سے رحم میں حساسیت دھکن محسوس ہو۔

لائیکو پوڈیم۔ جب رحم میں جنین کی حرکت سے بہت زیادہ تنگی ہو۔

سلفر۔ ایسا محسوس ہو کہ بچہ رحم میں نکلے مار رہا ہے۔

پاگل پن

سٹر امونیم۔ حمل کے دوران پاگل پن ۲۰۰ x طاقت میں دیجئے۔

بچہ کی زندہ پیدائش (پیدائش۔ بھوٹی درزہ بھی دیکھئے)

اکٹیا ریموسا۔ ایسی عورتیں جن کے پہلے مردہ بچے پیدا ہوئے ہوں یا زندہ بچے ہوں۔

درز

واٹر برنم اوپ۔ حمل کے دوران پیٹ یا ٹانگوں میں تکلیف یا اینٹھن

بے خوابی

اینا کارڈیم۔ حمل کے دوران بے خوابی کے لئے ۲۰۰ x طاقت میں یہ دوائی دی جائے۔

کافیا۔ اگر اینا کارڈیم ناکام ہو جائے تو دوائی استعمال کر لائی جائے ۲۰۰ x طاقت کی ایک خوراک ہی کافی ہوگی۔

اکونائٹ - اگر درد سخت خوف یا پریشانی -
 ہائیموسائیمس - اگر اعصابیت اور عجز کی وجہ سے بے خوابی ہو -
 اگنیشیا - اگر فکر والے خیالات - غم - افسردگی یا جذبات کی افسردگی ہو -

حمل کے دوران دانت درد

سٹیفٹسگیریا - لیکن درد کاٹنے یا کھینچنے کا احساس دانتوں اور مسوڑھوں میں بخیریت
 بنانے والا - یا سوراخ کرنے والا سرد درد - دانت ڈھیلے - سیاہ - گلے ہوئے اور ٹوٹنے والے -
 سپائیکیلیا - پھاڑنے والی اور ناقابل برداشت درد - درد بھرے ہتھکوں کے ساتھ -
 ٹھنڈے زیادہ ہو - جب آرام کے لئے توشید درد ہوسر کو بستر بھکا دے اور زیادہ درد ہوسر
 اوپر اٹھائے سے کم ہو -

سپیشیا - حمل کے دوران دانت درد کے لئے جوٹی کی دوائی ہے -
 کیومیلا - جب درد ایک گلے ہوئے دانت سے بڑھے -
 پلسٹیلٹا - جب جڑے کی ایک طرف درد سے متاثر ہو یا درد جگہ بدلے -
 کانیا - جب شدید ہونے میں ٹھنڈا پانی رکھنے سے افاتہ ہو -
 نکس و امیکا - جب درد گلے دانت سے اٹھ کر چہرے کی ہڈیوں تک بڑھے - شراب کافی
 اور زہنی کام سے زیادہ ہو - درد ناقابل برداشت - کھینچنے والی - پھاڑنے والی - کھودنے والی اور
 جھٹکے دار درد

سیلاڈونا - جب سرد کے ساتھ پھاڑنے والا - کھینچنے والا اور لیکن والا درد -

حمل کے دوران پیشاب رگ بجائے

نکس و امیکا { حمل کے دوران پیشاب رگ جانے کے لئے دی گئی ترتیب میں ادویات
 کیمنفر
 پلسٹیلٹا { دیں - اگر ۲ گھنٹے میں افاتہ نہ ہو تو کچھ استعمال کیا جاوے -

سیسیا۔
کاشیکہ۔

ایامِ حمل کی متلی اور تے

نکس و امیکل { اگر یہ ادویات چند کے لئے اول بدل دی جائیں تو تھک جاتی ہے۔
انٹیم کروڈ [نکس و امیکل x ۹ طاقت اور انٹیم کروڈ ۶ طاقت میں دی جائے، علاوہ تسلی تھے
کے جو نکس و امیکل سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ زبان پر کریم کی طرح کی فرجی ہوتی ہے۔ تیزابیت اور
کلیجہ کی جلن، معدہ کا نظام بگڑا ہوا۔

منعمور بیکارپس ریس۔ جان نکلانے والی قتل گتارتے۔ شدید آبکایاں چوٹی کی دوائی ہے۔
۲۰۰ × طاق میں دیکھے۔

اپریکاک۔ شدید گیس بستی اور قے کے ساتھ اور کلیجہ کی جلن۔ حاملہ کی قے اور تلی کیلئے متاثرہ دار
دوائی ہے۔

کاجنیکم۔ سر میں تھی محسوس ہو۔ گاڑی میں یا سمندری سفر کرتے وقت زیادتی ہو۔ خوراک کی بُر
ہی سے متلی ہو۔

کالی کارب۔ قے کے علاوہ متلی جب چلے جب کوئی چیز کھائے تو شدید نیند آئے اس
دوائی کی نمایاں علامت ہے۔

لکبریا پیپس سے اور کثرتِ لعاب یا متعوق حمل کے دوران شہریہ کیسوں میں یہ دوائی آزمائی جانی چاہیے۔ ٹیپ دروں کے لئے شہرہ در دوائی ہے۔

اسرارِ میو رویم۔ محل کے دوران قلی۔

فاسفورس۔ جب پانی کو دیکھ کر حمل کے دوران متلی ہو۔ بہاتے وقت اپنی اکھیں لٹکی بند رکھے۔ گرم پانی میں ہاتھ ڈالنے سے زیادتی ہو۔

نکس ماسکٹا۔ رحم میں پیسری پہننے پر تسلی اور تے حمل کے دوران۔

کالی کلور - گلے کی دکھن کے ساتھ حمل کی تسلی کے لئے شائد ہے۔

کریوزوٹم - میٹھے پانی کی تسلی ادرتے۔

ایٹرس - زرد، بیمار اور سبز بھس والے چہرے کے ساتھ قے لیٹ جانا چاہیے سوائے کلام

کے کچھ نہ کرنا چاہیے۔ ایسی کمزور - حاملہ عورتوں میں تے۔

سپیا - حمل کے دوران تسلی ادرتے معدہ میں خالی پن کا احساس کھانا کھانے سے کونائی ہو

بانجھ پن

سپیا - بانجھ پن کے لئے جوئی کی دوائی ہے حیض کی بے تاہم لگی لیکوریا اور قبض کے علاوہ۔

بریشا کارب - پھر دانیوں اور پستانوں کے گھٹنے گھٹنے کم ہونے کی وجہ سے بانجھ پن لیکن

لفائی قدر در بڑھ جائیں۔

آرم میوزیٹ - بانجھ پن کے لئے مخصوص دوا۔ یہ 2×3 طاقت میں دی جائے پھر دانی

میں ناسور - سخت ہونا - پھر دانی کی خزن سوزش - اور ایس کے پھوڑے کو - پھر دانی کی

سوزش کو دور کرتی ہے۔ عادی اسقاط اور خرد رحم کو ٹھیک کرتی ہے۔

فاسفورس - دیر سے کثرت سے حیض - زیادہ عیاشی کے ساتھ۔

کالی بزمیٹم - بچہ دانیوں کی لاغری کی وجہ سے بانجھ۔

آرم میٹ - دماغی افسردگی کی وجہ سے بانجھ پن۔

نیرٹم کارب - عورت ہم آغوش ہوتے ہی مواد کا خارج ہو جانا اور اس کے نتیجے کے طور پر بانجھ پن۔

چمکوئین - یہ دوائی عورت کی منی گرنے کے بعد بیضہ دانی کے پھیلاؤ متوازن کر دیتی ہے۔

بانجھ عورتوں میں حمل ٹھہر دیتی ہے۔

ایگنس کاسٹس - جب جنس خواہش یا حیض نہ آئیں - زرد دھبہ ڈالنے والا لیکوریا ہو۔

ایٹرس فار - جب رحم کی کمزوری کی وجہ سے بانجھ پن ہو۔ یہ دوائی رحم کو طاقتور دیتی ہے۔

پلاٹینا - شدید جنسی خواہش والی عورتوں میں بانجھ پن - اس کا سال کے بانجھ پن کا علاج کیا

جا چکا ہے۔

تھو جا۔ لیگوریا کے ساتھ مانچہ پن۔ کئی خون بھی ہو عورت کے چہرہ اور ٹانگوں پر بال ہوں۔
جنسی اعضاء پر بدردار پسینہ ہو۔

بچہ کا دودھ چونگھنے سے انکار۔

سنا۔ جب بچہ پستان میں لینے سے انکار کر دے۔ اگر پیدائش کے چند گھنٹوں بعد پستان میں دیا جائے۔ $200 \times$ طاقت کی صرف ایک غوراک کافی ہے۔

مرک کار۔ اگر سنا ناکام ہو جائے تو $4 \times$ طاقت میں دی جائے۔

سیلشیا۔ جب بچہ فوراً پستان کو منہ میں لے لے۔ لیکن فوراً بعد دودھ واپس کر دے۔

گوٹر۔ (کینسر، پتیلی، ناک وغیرہ کا گوٹر)

متفرق کے نیچے کینسر بھی دیکھئے۔

پلسٹیللا۔ ریشہ دار گوٹروں کے لئے شاندار دوائی ہے۔ رحم کی دیواروں پر۔ رحم کے

پینڈے کے قریب $100 \times$ طاقت میں دوائی دیجئے ہر ماہ یا 3 ہفتے بعد غوراک کو دہرائیے۔

ہائیڈرامٹس۔ چھاتیوں کے گوٹر۔ سخت اور درد کرنے والے۔ جھنٹیاں اندر دھنسی ہوئی

رحم کے کینسر کے لئے بھی۔ پستانوں کے کینسر کے لئے بھی جورات کو زیادہ دیکھیں۔

اسٹریس رب۔ چھاتیوں کا گوٹر خطرناک یا عام۔

جما فیلا۔ چھاتیوں کا کینسر۔ سخت آگاہ ہو۔

کالی آئیوڈ۔ رحم کا ریشہ دار گوٹر۔ اگر پلسٹیللا ناکام ہو جائے تو یہ دوائی دی جائے۔ رحم

ریشہ دار گوٹر سے بند ہو جائے۔ بازوں پر تھکاوٹ اور نیند محسوس کرے۔ پاؤں گرم جلیں بعض

اوقات تمام جسم کانپے۔

کریوزوٹ۔ رحم کا کینسر خاص طور پر دوس کا شدید بدردار خون اور ناگوار لہو والا مادہ سے

لیکس۔ ریشہ دار گوٹر بنگلین۔ پریشیاں اور باقونی مریضیوں میں۔

آرم آر سیٹیم۔ رحم کا کینسر شدید بڑھی ہوئی جنسی خواہش۔ بچہ دانیوں کی سوزش۔ اندام نہانی پر

پھنیاں حیض نہائیں یا کثرت سے خواہندار اور کثرت سے۔ اندام نہانی کی غارش۔

فریکسینس ایم۔ [اول بدل پیشہ دار گوٹروں کے لئے درد والے حیضوں کے
دریٹرم ایلم۔] ساتھ فریکسینس ایم۔ رات سوتے وقت ۲ قطرے ملائیکچ کے دیئے
جائیں دریٹرم ایلم ہر صبح ۲۰ ملاقات میں دی جائے۔

لیپس ایلمس۔ رحم کاریشے دار گوٹر شدید ملین دار درد میں کمزور کرنے والا خون کثرت
سے ہے۔ رحم کا کینسر۔

کوہیوا۔ عورتوں میں مزمن درم شانہ۔ پیشاب کرنے کی لاماصل مگر متواتر کوشش
پیشاب کی بندش۔ شانہ میں درد کے ساتھ۔

ٹریٹیم پیڈولم۔ رحم میں ریشوں کی وجہ سے غوطی ہے۔ شدید دباؤ کے ساتھ خروج رحم
لیکورا۔ شدید زرد اور جھنڈے والا۔

سلفر۔ پھلانی کا گوٹر یا کینسر اندرونی غارش اور بوا سیر سے خون ہے۔ ہر حیض پر ا۔ ایم
یا سی ایم کی ایک خوراک دیجئے۔

پلاڈیم۔ پیچہ دانیوں کا گوٹر

تھلاپیسی بریسار۔ رحم کا کینسر جس سے خون ہے۔

ٹیوکریم۔ رحم میں کینسر۔

ایومن۔ رحم کا گوٹر صندی قبض کے ہمراہ ہر سفتہ ۲ ملاقات کی ایک خوراک دیجئے۔

کالی کارب۔ رحم کا کینسر کوہی سے شدید درد گھٹنے تک جائے۔ خاص طور پر دائیں طرف

ٹانگ میں درد ایک نمایاں علامت ہے۔ اس دوائی میں۔

تھوجا۔ رحم کی سرکس پر گوٹر خروج رحم۔ بگڑے ہوئے حیض۔ رحم کے حصے میں درد

کم اور ملین دار پیشاب کے ساتھ۔

کنڈورانگو۔ پستانوں کا کینسر۔ اندے کے حجم کا بائیں پھیلتی پر گوٹر جو مائیڈاسٹس اور
فائیولا کا دیکھے دوران بڑھتا۔ کونیم سے عارضی طور پر رک دیا گیا۔ کنڈورانگو ملاقات سے ٹھیک ہوا۔

کونیم۔ چھاتیوں پر مضبوط سخت گوڑ۔

سلیشیا۔ رحم میں مٹریا سنگترے کے حجم کے گوڑ جو رحم سے باہر کو ابھر ہوئے ہوں۔
فائیٹولاٹکا۔ چھاتیوں میں ٹھنڈے ڈھیلے۔ دودھ جم جائے۔ درد کرنے والا اور گاڑھا ہو
جائے دودھ پلانے والی عورتوں میں غولی دودھ اور دوسری عورتوں میں اس سے علاج کی جا سکتا ہے۔
ڈھیلے اور بڑھے ہوئے غدود درھنی ہوئی جھٹنیوں کے ساتھ۔

کیڈیم میٹ [رحم کا کینسر جب ریڈیم کا علاج ناکام ہو جائے۔
کیڈیم میٹ [دی گئی ترتیب میں سی ایم طاقت
کیڈیم سلف [میں دی جائے۔

سیوفو۔ سرخ دھاریوں کے ساتھ کینسر۔

سکروفلیریا۔ چھاتیوں میں گانٹھیں۔

رحم۔ رحم میں پیچھے کی طرف دباؤ

حل کے دوران بھی پیچھے کی طرف بھی دیکھیے

سپیا۔ یہ رحم کے پیچھے کی طرف دباؤ کے لئے یا خروج رحم کے لئے کمرے لیکر پیٹیک دباؤ
یہ اونچی طاقت میں دی جائے جیسے کہ ایک ہزار یا سی ایم ہر پندرہ روز کے بعد کمرے لیکر پیٹ
تک دباؤ یا در در جو سانس لینے میں دباؤ ڈالے۔ ماں کا ابھرا ہوا پیٹ۔

بیلادونا۔ جیسے کہ پیٹیک ہر شے باہر آجائے گی۔ کھڑے ہونے پر ناتھوئی کرے۔

لیئم ٹنگ۔ یہ سپیا جیسی ہے۔ جب سپیا ناکام ہو جائے تو یہ دی جائے۔ رحم کے پیچھے کی

طرف دباؤ کا احساس، احساس کہ جو کچھ پیٹو میں ہے۔ فرج یا اندام نہانی سے نکل جائے گا۔

فرج کو ہاتھ سے تقویت دینا پڑے، حیض قبل از وقت۔ کم مقدار میں۔ گہرے۔ موقع پرے دار۔

اور بدبودار۔ متواتر پیشاب ہے۔ پیشاب کرنے کی متواتر خواہش خروج رحم کی وجہ سے۔

آرنیکا مانٹ۔ جوٹ کی وجہ سے خروج رحم۔ خروج رحم کی وجہ سے میدھی زہل سکے۔

لیکس۔ سن یاں کے دوران خروج رحم۔ گرمی کے دورے۔ سرکی چوٹی پر گرمی۔ سر میں اجماع خون۔

ہیلونیاں۔ رحم کے بھاری پان کی وجہ سے خروجِ رحم۔ رحم نیچے گرا ہوا رحم کا پینڈا لگنے کی طرف
 ٹوٹا ہوا۔ یا بھکا ہوا۔ او ایس اور اسعاد مستقیم کے درمیان سے مشکل سے انگلی گزرے۔
 میموریکس۔ شدید نیچے کی طرف دباؤ جس کو ٹانگیں ایک دوسرے سے کراس کر کے رکھنے پر قائم ہو۔
 فارکس ایم۔ یہ رحم کا ٹانگہ ہے جس میں رحم کی بھاری حالتوں میں خروج کی حالت نیچے
 کی طرف دباؤ یا پٹھوں کے دھیلے ہونے پر تکالیف یعنی خروجِ رحم۔
 سٹانم۔ جب پانے کے دوران دباؤ کی وجہ سے خروجِ رحم زیادہ ہو۔
 اگرکس ایم۔ نیچے کی طرف شدید بانے والی دردیں جو تقریباً ناقابل برداشت ہوں۔
 ایسکولس ہیپ۔ رحم کی سروسٹوجی ہوئی اور پر کی طرف پڑھنا۔ خروجِ رحم۔ رحم کا بڑھ جانا
 اور سختی جب شدید گرمی اور تپکن دار۔
 آرم میٹ۔ زیادہ وزن اٹھانے سے خروجِ رحم جس کی زیادتی حیض کے دوران ہو۔
 پلوڈوفائیلزم۔ کمزوری کی وجہ سے رحم اور فرج کا خروج۔ طاقت سے زیادہ وزن اٹھانا۔
 خاص طور پر زچگی کے بعد شدید کمزوری کے ساتھ اور تھوڑا بہت خروج مقعد بھی ہو۔
 آر جینٹ میٹ۔ بٹھے۔ برا چڑا بندھن وغیرہ دھیلے ہو جائیں جس کی وجہ سے خروجِ رحم ہو۔
 سروسٹوجی میں اجتماع خون اور سخت کینسر کے ساتھ اور ملین اور ڈنگ لگنے جیسے درد پیدا۔
 رحم سے تھلا ہوا ہے۔
 ایلو۔ کافی عرصہ سے خروجِ رحم ہو رہا ہو۔ احساس کہ پیڑ کی ٹہنی اور دھجی کی ٹہنی کے
 دوران پھانز گڑا ہوا ہو۔ چٹون اور کمر میں درز جیسا درد کھڑے ہونے پر زیادہ ہو۔ رحم
 کا نیچے کی طرف کھینچاؤ جیسے کہ پیڑ کے تمام اعضاء یہاں سے نکل جائیں گے۔
 ایسٹریاس رپ۔ رحم میں باہر دھکیلنے کا احساس ایٹھن کے ساتھ۔
 نیٹریم بائیو کلوئر۔ پیڑ کا نیچے کی طرف دباؤ رحم پانی سے زیادہ لدل کی طرح۔
 پلیٹیل۔ نیچے کی طرف دباؤ بھوٹنے پر زیادہ ہو۔

رحم کی حسائیت

ہیلونیاس - رحم کی حسائیت - سروکس کا ناسور - خروخ رحم - گبرلہ بودار لیکوریا - پڑمجان - ہر کسی میں نقص نکالے - بے چین - جب جسم اور ذہن معصوم ہوں تو نفاق ہو -

رحم کی اینٹھن

کاشیکم - معدہ میں اچھاتی ہیں اور چھوٹی کمر میں اینٹھن دہری ہونے پر مجبور ہو جائے - کھانا کھانے پر زیادتی -

کاکولس - رحم میں درد والا دباؤ اور چھاتی میں اینٹھن - بے چینی اور خشی - قے اور ہکڑے -

کونیم - رحم میں اینٹھن مزاج میں سرگرائی - پیٹ تناہوا - اور چھاتی میں درد -

میگنٹیا میور - رحم کی اینٹھن درد کے ہمراہ جو کوکھوں تک جائے جس کے بعد لیکوریا -

اگنیشیا - رحم کی اینٹھن درد زہ جیسی تکالیف جس کے بعد لیکوریا ہو -

رحم کا اپنی جگہ سے ٹلنا

بسیلا ڈونا - پرخون ریشیوں میں رحم کا اپنی جگہ سے ٹل جانا -

پوڑوفائیلم - پیچیدہ اور خروخ مقعد کے ساتھ -

لیکم ٹنگ - اٹا ہوا رحم، سوراخ پیڑو رحم کا پینڈہ تکونیہ ہڈی کے خلاف - رحم کا قبض

کے ہمراہ ٹیڑھا پن یا اٹا پن - سوراخ نیچے پیڑو پر دھکیلا ہوا -

سیپیا - اٹا ہوا رحم سوراخ پیڑو کے ساتھ سختی کے ساتھ لگا ہوا - رحم کا پینڈہ - نیچے

تکونیہ ہڈی تک آیا ہوا -

ہیلونیاس - نیچے کی طرف خاصا ٹل جانا - پینڈہ آگے کی طرف اڑکا ہوا - سوراخ فرج اور

امعائے متعیم کے درمیان سے شکل سے انکلی گزاری جاسکے - کمزور ریشیوں میں -

نکسوا میڈیکا - رحم کا گر جانا - رحم کا ہرنیا - ٹیڑھا ہو جانا - الٹ جانا - سوزش کے ساتھ رحم سے خون کا بہنا۔

سبائنا - جو تھے یا بچے یا چھ ماہ حمل کے گر جانے کے بعد۔
 آرنیکا ایم - زیریں بطن پر چوٹ یا متکا لگنے کے بعد
 مرکوریس - جب رحم کی پھلیوں یعنی کی سوزش کی وجہ سے ٹل جانا رحم کا۔
رحم میں پانی کا پھرنا - استقاء رحم۔

پلٹیل - حیض نیکور یا نفاس کے دب جانے کی وجہ سے استقاء۔
 کریوزوٹ - جب کینسر کی وجہ سے۔

آرینیکم البم - جب وجہ معلوم نہ ہو۔ پیاس کے سہرا۔ بیجینی۔ گرم کو یا گرم بیجوں سے آفات۔
 گلکیر یا کرب { جب رحم کے گوڑی وجہ سے توری گئی ترتیب
 کونیم { میں ادویات دی جائیں۔

مقصوبا - قبل از وقت درزہ کی وجہ سے اپنے سائز سے درگنی ہو گئی ہو۔
 سیپا - سروکس چوڑی اور موٹی ہو جائے۔

اسٹیلگو - رحم کا بڑھ جانا نرم اور انفعی اوایس اور سروکس کافی کھلا انگلی گزرجائے۔
 کونیم - رحم کا بڑھ جانا، بھالا لگنے جیسے درد۔ بچہ دانیوں اور رحم کی سختی، خروج رحم اور سروکس کا ناسور۔

کارلوانیمیلس - حیض کی خرابیوں کے ساتھ رحم کا بڑھ جانا اور سختی مکر میں شدید درد جو کولہوں تک جائے قبض۔

فیٹرم میور - بوڑھی عورتوں میں سروکس موٹی ہو جائے رحم کے منہ پر ناسور ہوں۔
 گلنا سٹرنا - (زخموں کے مواد لگنے سے پھنسیاں نکلتا۔ رحم کے تحت ناسور بھی دیکھے)
 سیکل کار - رحم کی کنگرین یا گلنا سٹرا کیلے چوٹی کی دوائی ہے۔ ۲۳ یا ۲۴ میں دیجئے۔ اگر نہ کام ہو جائے تو آرینیکم البم ۳۰ اور کریوزوٹ ۳۰ دیجئے۔

گیس یا ہوا۔

ایسٹ فاس۔ رحم سے ہوا خارج کرنے کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ رحم کی ڈرم صبی سوجن کو درست کرتی ہے

لائیکو لودیم۔ جب رحم سے بدبودار گیس خارج ہو۔

کاربووینج۔ اگر مندرجہ بالا دونوں ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ ادویات چاہئے۔

دی جائیں۔

رحم کی سختی۔ (ناسور) بچہ دانی میں گوشت کا قطرہ۔ پانی سے بھری ہوئی تھیلیاں اور (افزونی) (کھینچے)

کینتھر۔ رحم سے گوشت کے قطرے باہر نکلانے کے لئے میں درج دیئے ہیں۔ دی گئی۔

سبائنا { ترتیب میں دیجئے۔

پلسٹیل { رحم کے گوشت کے قطرے کے لئے دی گئی ترتیب میں دیجئے۔

سیکل کار {

نایٹرک ایسڈ { افراط خون اور لطف کاٹھوس ہو جانے کے لئے

ایسٹ فاس { دی گئی ترتیب میں دوائی دیجئے۔

کلیریا کارب { رحم میں پانی سے بھری ہوئی تھیلیاں سی کے لئے

سیلیشیا { دی گئی ترتیب میں دیجئے۔

رحم میں درد (سختی اور ناسور کی وجہ سے)

کوئیم۔ سرکس میں ملن۔ ڈنگ گئے جیسے درد تیر کی طرح گئے جیسے درد۔ بھالا گئے جیسے درد

رحم کا اعصابی درد

پلسٹیل۔ رحم میں درد حیض کے رکنے کے ساتھ۔

لیکس - رحم میں درد جس کو خون بہنے پر افادہ ہو۔ بچہ دانیوں میں سخت مسلسل درد۔ نہنگی کے بعد۔ حیض کے دوران۔

میوہ رکس - رحم کے دائیں طرف جو بیٹ میں جائے۔ بعض کیسوں میں سارے پیٹ کو غور کر کے اوپر بائیں پستان تک جائے۔

ہائپریم - اپریشن کے بعد سارے پیٹ میں درد اور دھکن $\times 20$ طاقت میں دے جائے۔

سمبل - چست اور زندہ دل عورتوں میں چہرہ یا بچہ دانیوں کا اعصابی درد۔ بچہ دانیوں میں تیز درد نیچے کی طرف دباؤ کے تحت۔

لیئم ٹنگ - چست اور زندہ دل عورتوں میں چہرہ یا بچہ دانیوں کا اعصابی درد۔ بچہ دانیوں کا اعصابی درد۔ بچہ دانیوں میں تیز درد نیچے کی طرف دباؤ کے تحت۔

پلاٹینا - مزمن سوزاک کی وجہ سے بچہ دانیوں میں درد۔

یوڈوفائیلیم - کم حیض کے ساتھ بچہ دانیوں میں درد جن میں حرکت سے زیادتی ہو۔ لیٹے سے افادہ ہو، خراب جگر کی وجہ سے۔

اکٹیرا سیموسا - رحم کی سرورکس کی بھیلی کی سوزش۔

لیک کیٹیم - دائیں بچہ دانی میں درد جس سے چمکدار سرخ خون بہنے سے افادہ ہو۔

لوڈیم - دائیں بچہ دانی میں درد جو شروع اور نیچے رحم تک جائے۔

فاسفورس - حیض کے دوران بائیں بچہ دانی میں درد جو کولہوں تک بڑھے۔

برائی اونیا - دائیں بچہ دانی میں درد جو کولہوں تک جائے آرام سے افادہ ہو حرکت پر زیادتی یا چھونے پر زیادتی۔

آرٹھرمیٹ - خروج رحم کے ساتھ بائیں بچہ دانی میں درد۔

ہائپرڈروکوماٹل - فرج میں یا اندام نہانی میں گولی لگنے جیسا۔ تیر لگنے جیسا اور بحالہ لگنے جیسا درد۔

کریڈزٹ - اندام نہانی میں جلد نار اور شدید درد جس کو لیٹے ہونے سے اٹھنے پر زیادتی ہو۔ اندام نہانی سوچی ہوئی۔

الیومن - رحم کے پھوڑنے یا ناسور - درد کی وجہ سے مجامعت ناممکن ہے ہو -
 رحم کا وزن یا بوجھ سنبھالنے کی طرف ہو دہائے -
 آرم میٹ - بار بار کے استقاط کی وجہ سے رحم کی سختی اور اس پر پھوڑے
 یا ناسور -

اندامِ نہانی - یافُرج

دیکھئے - اندامِ نہانی کی خشکی - مجامعت کے تحت بھی دیکھئے -



۱۲
بارِ حواں
باب ۱۳

ہدیوں، خوروں اور پھٹوں
میں

ہڈیوں کا گھنا سڑنا۔

کلکیر یا فاس۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور لگتی مڑتی ہوئی ہڈیوں کے لئے جب وہ نرم ہو جائیں اور ضائع ہو جائیں نہ بڑھنے کے لئے شاندار دوائی ہے۔ ہڈیوں کا جھک جانا یا مڑ جانا۔
انگچھورادیرا۔ لمبی ہڈیوں کا گھنا سڑنا۔ جوڑوں کا ٹوٹ جانا۔ درد مکھ تک جائے۔
کلکیر یا کارب۔ ریڑھ کی ٹی بی۔ حرام مغز کی تہی کا گھنا سڑنا۔ ہڈیوں کا نہ بڑھنا۔ دانوں کا تھاجس نہ ہونا۔

کلکیر یا فلور۔ ہڈیوں کا کسی دھجے سے یا بغیر کسی دھجے کے بڑھنا۔ یہ دوائی کلکیر یا فاس سے اول بدل کر دی جاسکتی ہے۔ علامات کلکیر یا فاس سے ملتی جلتی ہیں۔
ایسٹ فلور۔ لمبی ہڈیوں کا پیپ کے ساتھ گھنا سڑنا، جوڑو وقفے وقفے سے ابھی ہو جائیں یا تکلیف بڑھ جائے، دریں رات کو زیادہ۔ شدید کمزوری۔ ہڈیوں کے ٹھکنے کی دھجے سے کان اور ناک سے بدبودار مواد ہے۔

پلاٹینیم۔ ہڈیوں کا گھنا سڑنا خاص طور پر ٹخنوں کی ہڈیوں کا۔
سیلشیا۔ ہڈیوں کا ٹھیرھا ہونا۔ کوئلے کی ہڈیوں کا بودا ہو جانا اور دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ناسوری سوراخ بدبودار مواد کا اخراج اور اس کے گرد جھٹخت اور بوجے ہوتے ہیں۔
آرم میٹ۔ آتش کی مریضوں میں جنہوں نے پارہ استعمال کیا ہو۔ سروریکل ہڈیوں کا گھنا سڑنا اور نالوک ہڈیوں کا گھنا سڑنا۔

ایسا فوٹمیڈا۔ بدبودار مواد کا اخراج کے ساتھ۔ ناقابلِ رواشت دھکن۔ ناسور کے قریب آتی دھکن یا تکلیف کر پٹی بھی رواشت نہ ہو سکے۔ تکلیف یا دریں متواتر کھینچنے والی اور جلد زار۔ آرام سے زیادتی ہو۔

ہیکلا الاوا۔ ہڈیوں کی بیماریوں میں جن میں ہڈی کا کینسر۔ خنازیری اور ہڈیوں آنکھی بیماریاں اور ہڈی کا پھوڑا۔

کالچیکم۔ ہڈیوں کا گھنا سڑنا۔ خاص طور پر ہڈیوں کے بڑھنے والا سروں کا گھنا سڑنا یا تانڑنا۔
 فاسفورس۔ ہڈیوں کے گھنے سڑنے میں چوٹی کی درائی ہے۔ جب سلیشیا مکمل آرام دینے میں ناکام ہو جائے یا ناقہ ہونا ٹھہر جائے۔

سٹیفٹگیس۔ بڑی ہڈیوں میں تبدیل ہونے والی درویں۔ اعصابی دردوں میں لگنے سڑنے میں۔
ریڑھ کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونا۔

ایسٹرفاس۔ ریڑھ کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونا۔ بہروں کے گھنے سڑنے کی وجہ سے۔

کلکیئر کا رب۔ ریڑھ کی ہڈی کا کمر کے حصے میں ٹیڑھا ہو جانا اور ایسی ہڈیوں، گروں اور کمر کے خم میں سوزش۔

سلیشیا۔ یہ ہڈیوں کی سوزش۔ نرم ہونا اور گھنا سڑنا جہاں کہیں بھی پایا جاتا ہے کراہم دیتی۔
 ہڈیوں کے پھوڑے۔ ناسوری سوراخ بے پردہ۔ پیپ کے اخراج۔

کلکیئر یا فاس۔ ہڈیوں سے پیپ پہنا۔ کوہے کے جوڑ کا گھنا سڑنا۔ ہڈیوں کا نرم ہو جانا۔

مکر کزور ٹھک جائے خاص طور پر بائیں جانب بوجھ نہ سہار کے۔

کلکیئر یا فلور۔ جب کلکیئر یا کی دیگر اقسام ناکام ہو جائیں تو یہ دی جائے۔

سلفر۔ کمر کے حصے میں مرموں کی وجہ سے ترخاش کے دب جانے۔ مکر کی ہڈی کا ٹھک جانا اور پسیلیوں کا بھی ہر ہفتہ ۲۰۰ طاقت کی ایک خوراک دیں۔

کالی ہائیڈر۔ کوہوں کا بیماریوں سے ٹیڑھا ہو جانا۔ آنکھ کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کا گھنا سڑنا۔

تھو جا۔ فرش پر بیٹھنے پر سر گھٹنوں میں گھس جائے۔ ٹیکوں کے اثرات بد۔ پیچھے کی طرف مڑ جائے۔ سیدھا نہ بیٹھ سکے۔

ہڈیوں کی سوزش

سلیشیا۔ کھوپڑی کی ہڈی کی سوزش۔
 سٹینجیا۔ ران کی ہڈی۔ پندلی کی ہڈی۔ کندھے سے کہنی تک دیگر ہڈیوں کی سوزش یا آتشک کہلاتی ہے۔
 سٹروٹشیا کارب۔ ہڈیوں کی سوزش خاص طور پر ران کی ہڈی۔ ناسور کے ساتھ جس میں سے کم و بیش ٹوٹی ہوئی ہڈیاں نکلیں۔

سٹینفسگیریا۔ ہڈی کے خلاف کی سوزش اور تکلیف ایک ہڈی سے دوسری ہڈی میں منتقل ہونے والی دردوں اور گلے ملنے۔

آرم میٹ۔ یہ ہڈیوں کے دردوں کی بہت اچھی دعا ہے۔

اگر کیسن ایم۔ ٹانگوں کی ہڈیوں میں در دیں۔
 میٹنگم۔ ہڈیوں میں در دیں جو رات کے وقت اور بھونے پر زیادہ ہوں مٹھلی ہوائیں افاق ہو۔
 ایسڈ فاس۔ رات کے وقت جلن۔ آتشکی۔ پارے کے یا خا زیری زہر کی دجہ سے۔

روٹا۔ زخموں کی دجہ سے ہڈیوں کی سوزش۔

سمفا ٹیم۔ ہڈی کے ٹوٹ جانے یا زخم کی دجہ سے سوزش۔

ہیکلا لاوا۔ ہڈیوں پر پھوڑے ہو جانا یا جسم کے کسی حصہ پر یہ پھوڑے پر یا کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں۔

کمر درد۔ (سوزاک اور آتشک بھی دیکھیے)

کالو سٹھس۔ کمر درد اور چھوٹی کمر میں درد جو آخر کار کوہے کے اوپر چم جائے اور چوڑے اوپر۔ درد ایک تھوڑی سی جگہ پر جو جس سے ملنے لگتا ہے۔ آخر کار وہ کھڑا نہ ہو سکے اور نہ ہی چل سکے۔ ٹکونہ ہڈی کے ساتھ شدید جلن۔

رسٹاکس۔ جب تکلیف کو پہلے پڑا تھا ہو پہلی حرکت اور آرام کرنے پر زیادتی۔ یہ رات کے وقت زیادہ ہو۔ ٹکونہ ہڈی کا درد۔ اگر افاق نہ ہو تو طاقت تبدیل کر دیجئے یعنی پٹنسی تبدیل کر دیجئے۔

انٹیم مارٹ - تھکا دینے والی مشقت کی وجہ سے کم درد - کمر کے پچھلے حصہ میں ازت ناک درد - چلنے کی تھوڑی سی کوشش بھی تھکے۔ ٹھنڈک اور سرد پسینہ آئے۔ نیچے ٹانگوں پر وزن کے ٹکے ہونے کا احساس یعنی ٹانگیں ذری محسوس ہوں۔
 امونیا کارب - کمر میں درد - سردی اور بخار کے ساتھ گردوں کو متاثر کریں۔
 اکیٹا ریسیروسا - بے چینی اور بے خوابی کے ساتھ ٹھنڈک کی تھکاوٹ۔ مریض اعصابی۔ افسردہ اور بے چین۔

برائی اونیا - جب درد حرکت پر زیادہ اور لینے سے اور آرام کرنے پر ناقص کمر میں خراشوں کا احساس دباؤ چاہے یا کمر کے نیچے کوئی سخت شے کا خواہاں ہو۔ ۹ بجے یا ۳ بجے درد کی زیادتی ہو۔
 بریسیرس ولگیس - پیشاب کی تکالیف کے ساتھ کم درد۔
 ڈلکا مارا - جب انداز بگھوں پر رہنے یا چوٹیں گھٹنے کے اندر اندر درجہ حرارت کی شدید تبدیلی کی وجہ سے کم درد ہو۔

کالی کارب - کمر کے پچھلے حصہ میں درد - کم درد حصوں میں ٹوٹی محسوس ہو۔ درد ٹانگوں کے نیچے تک جاتی محسوس ہو۔ مریض خطی مشکل۔ خواہ مخواہ پریشان ہونے والا ٹھنڈا اور زرد محسوس ہو۔
 میٹورنیم - ۲۰۰ - کم درد - لنگری کمر - کم درد ٹانگوں کی درد جو اکثر اوقات ٹانگوں تک جائے گردن کی گڈی میں کھنچاوٹ - کمر میں درد - عمل انگیز دوائی کے طور پر کامیاب ہے۔
 ایلو - کم درد جو سردی سے اول بدل کر ہو۔

نیرٹرمیور - کم درد جب مریض درد والی جگہ پر دباؤ ڈالنا چاہے۔ وہ اپنے پیچھے ایک کی رکھنا چاہیے۔ گرمی میں اپنے نیچے سخت چیز رکھنا چاہیے۔ مریض اپنے ہاتھ کمر پر رکھ کر کسی میں ادھر ادھر ہوتا۔
 ایونٹا - کمر میں درد جیسے کمر کے پچھلے ہروں میں گرم لوہے کی سلاخ ڈالی گئی ہو۔
 نکو امیکا - کمر کے بڑے ٹھنڈوں میں درد بہتر میں اونچے۔ درد سردی کی وجہ سے جس میں صبح زاتی ہو۔ گرمی سے افادہ ہو۔

ٹائیس پیکم - کوہنے کے جوڑ میں شدید اعصابی درد۔

ایسکولس ہرپ - زیادہ کام یا سخت مشقت کی وجہ سے تکنوئہ بڑی کو لمبے پردہ پاؤ کی وجہ سے درد - کھڑے ہونے پر درد میں اضافہ۔

کلکیر یا فاس - جب گردن میں درد اور سرویکل میں درد ہو۔ جب ریشاکس اور ایسکولس نام ہو جائیں تو یہ دوا استعمال کرائی جائے۔ کو لمبے کے جوڑ کی شدید تکالیف۔
یوٹیڈوریم پرف - گہری کمزور درجہ بڈیوں میں جائے۔ شدید بایس اور سردی۔ یہ طبریا کی خرابیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔

کلکیر یا فلور - کمزور جو آرام کرتے وقت زیادہ ہو اور گرمی سے افادہ ہو۔ کمزور جو تکنوئہ بڈی تک جائے۔ جب ریشاکس نام ہو جائے تو دیکھئے۔

سلفر - عیاش لوگوں میں کمزور۔ سیدھے زہل سکیں۔ کندھوں کے درمیان کھینچنے والی درد آرام کرتے وقت زیادہ ہو۔ رات کے وقت پاؤں کے ٹھنڈوں اور ہاتھوں میں جلن۔ ہسن جیسی ٹورڈا لاپسین۔
روڈروڈینڈرون - تمام بازوؤں میں پھارنے والی دریں۔ خشک ٹھنڈ لگنے سے کمزور۔
آرام کے وقت زیادہ اور طوفان آنے پر زیادہ۔ گرمی اور کھانا کھانے کے افادہ۔

بڈیوں کا ٹوٹ جانا اور بے قاعدہ بڑھوتری -

کلکیر یا فاس - یہ نرم اور آسانی سے ٹوٹے جانے والی بڈیوں کے لئے شاندار دوا ہے۔ سر کی بڈیاں بیت اور مقدار میں کم محسوس۔ وہ زیادہ موٹی اور تعداد میں کم۔ گردن کی بڈیاں اتنی چھوٹی اور کمزور کہ بڑے سر کو نہ سہاں نہ کر سکیں۔ ہاتھوں اور ٹانگوں کی بڈیاں کمزور اور ٹوٹنے والی۔ پانخانہ بنر خیر غم شدہ اور بلبور اور بھوک نہ لگنے۔ یہ بڈیوں کو بنانے والی اور خون کے نئے نیلے بنانے والی ہے۔ یہ تمام جسم کو جنرل تقویت دیتی ہے۔

کلکیر یا کارب - یہ کھلے تالو والے اور کھوپڑی کی بڈیوں کے کھلے جھڑوں والے مریضوں کے لئے مفید ہے۔ اگر بڈیاں بنانے والے مواد کی بہم رسانی تو ٹھیک ہو لیکن وہ مناسب طور پر تقسیم نہ ہو۔

کلکیر یا آئیوڈ - جب ٹھنڈوں کی کمزوری۔ چربی کی کمی اور بڈیوں کی کمزوری تب اس کے متعلق سوچنا چاہئے۔ غدد کی غیر صحت مند حالت کے لئے یہ دوا بہترین ہے۔

کلکیر یا فلور۔ اس دوائی کی نمایاں علامات دانتوں کا انمیل قبل از وقت خراب ہو جائے کسی
 تھکے یا عضو کے ڈھیلے ہونے کی حالت۔ یہ شریانوں اور وریدوں کے پیکدار رشتے تعمیر کرتی ہے۔
 سیلشیا۔ کلکیر یا فلور کے بعد یہ دوا دی جائے۔ جب کئی ہڈی مناسب طور پر ہڈی میں تبدیل ہو
 سکے۔ ہڈی سیلشیا اور کئی مواد سے بنتا ہے۔ اس لئے اس بیماری کے لئے سیلشیا بہت ضروری ہے۔
 پسینہ اور پیپ بننے کا رجحان۔ اس دوائی کی نمایاں علامات میں۔ سیلشیا کے مریض کو ٹھنڈک تکالیف
 میں زیادتی کرتی ہے۔

مغز ہڈی کی سوزش

سوزش ریڑھ۔ اعصابی نظام کے تحت۔
 سیلشیا۔ زخموں کو ٹھیک کر رکھنے کے لئے یا انہیں مندل کرنے کے لئے شاندار دوائی ہے
 یہ ہڈی کے چھوٹے ٹکڑے خارج کر دیتی ہے جو کہ زخم کے ٹھیک ہونے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔
 میڈورنیم۔ جب سیلشیا ناکام تو یہ دوائی دی جائے۔ مریض چڑچڑاہٹ۔ گرم۔ ہتھیلیاں گرم
 قبض میں مبتلا۔ ٹھنڈی خوراک اور ٹھنڈے مشروب پسند کرے اور ٹھیک خوراک کو پسند کرے۔ ٹھنڈے
 پانی سے بنانا پسند کرتا ہے۔ اگرچہ سخت ٹھنڈا موسم ہو۔ چھاتی اور گھٹنے میکنے کی حالت میں نیٹے اس "لٹی"
 کی خاص الخاص علامت ہے۔
 ایکینشیا۔ یہ اندرونی طور پر ۳×۲ طاقت میں دی جائے اور بیرونی طور پر نصف اونس
 پانی میں ۱۰ قطرے ملا کر لگائی جائے

درد گنٹھیا۔ وجع المفاصل

برائی اوینا۔ جب درد میں تھوڑی سی حرکت سے بڑھ جائیں۔ گرمی اور دبانے سے کم ہوں۔
 جوڑوں کی سوجن جو گرم ہوں اور سوجے ہوئے ہوں۔ مریض سردی محسوس کرتا ہے۔ یہ ۹ طاقت میں
 دیجائے۔ جب یہ طاقت کام نہ کرے تو ۲۰ طاقت دیں۔

لیڈم پال۔ گنئیے اور جڑوں کی دردوں کے لئے مخصوص ہے۔ جب دردی بچے سے اوپر کو جائیں۔ انگلیوں کے جڑوں۔ کلائیوں اور پنجوں میں چاک کا پتھر جمع ہو جائے۔ جوڑوں کی سوجن ہو سکتی ہے۔ مریض ٹھنڈا محسوس کرتا ہے لیکن پھر بھی ٹھنڈی چیزیں لگانے سے افادہ ہو۔ جڑ چڑا۔ اکیلا رہنا پسند کرے۔ درد شراب نوشی۔ کیڑوں کے ڈنگ لگنے یا زخموں کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ گرم پیوں سے درد میں اضافہ۔

کالیائٹھیولیا۔ گنٹھیاوی دردی جب اوپر سے بچے کو جائیں اور اعضاء میں ہو جائیں۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ اور سست نبض کے ساتھ درد۔ دردی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں۔ کلائی کے اعصاب میں درد۔

کالچیکم۔ گنئیے کے لئے عمومی دوائی ہے۔ خوراک سے نفرت (خوراک جس کے کھاتے وقت خوراک کی بو آئے) جوڑوں کی سوزش جو سرنخ یا زرد ہوں۔ پیٹ ہولے بھرا ہوا۔ بنیاب میں البیومن جو سیاہی کی طرح سیاہ ہو جائے۔ بنیاب کم استقامتی سوزش کے ہمراہ۔ دردوں اور خوشبوؤں سے بہت ہی بے چینی ہو جائے۔ حرکت سے۔ بھٹونے سے اور دماغی کام سے زیادتی ہو۔ گرمی سے آرام سے اور میٹھنے سے افادہ ہو۔ تبا کو نوشوں میں گنٹھیا اور نقرس۔

رٹاکس۔ جب گرم ہو اور ٹھنڈا ہو جاتے پر بار بار درد کے حملے۔ مندار موسم میں گنٹھیا اور موسم مندار میں زیادتی بے چینی اور پہلی حرکت پر زیادتی۔ کچھ حرکت کرنے پر افادہ لیکن، لیکن جب زیادہ دیر حرکت رہے تو تکلیف زیادہ ہو حتیٰ کہ مریض ٹھہرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ ایم طاقت میں بہترین نتائج دیتا ہے۔

کیکٹس گرینڈی۔ استقاء کے ساتھ گنٹھیا یا تھووں اور پاؤں کی استقامتی سوزش۔ گروے اور انٹریاں ملوث ہوں یا متاثر ہو چکی۔ دل کا درد جب دل متاثر ہو جوڑوں کے درد سے افادہ ہو۔ سٹیلر یا میڈ۔ یہ تبدیل ہونے والی دردوں میں جو ہر حصہ میں شدید دھکن کے ساتھ ہوں۔ جگر میں درد کے ہمراہ۔ حرکت سے زیادتی ہو۔ بڑھے ہوئے اور موٹے ہوئے گنٹھیاوی جوڑوں درد کریں۔ ایسڈرنگ پور میں روغن زیتون کے ساتھ ملا کر جوڑوں پر لگانا جاسکتی ہے۔

ٹوکا مارا۔ ٹھنڈا اور گھیلا ہونے پر جوڑوں میں دردیں۔ غدار جگہوں پر رہنے یا سہ ماہ گھنٹے میں درجہ حرارت میں شدید تبدیلی کی وجہ سے گرمیوں کے گرم دنوں میں جب راتیں ٹھنڈی ہو جائیں پسینے کے دب جانے سے گنٹھیا۔

پیلو سٹیلٹا۔ گھنٹے ٹخنے اور ماتھوں کے جھوٹے جوڑ اور پاؤں کو متاثر کرتی ہے۔ دردیں ایک جگہ سے دوسری مستقل ہوں رات کے وقت آئیں۔ گرم کمرہ میں اور آرام کی حالت میں کھلی ہوا۔ میں حرکت سے اور گرم چیزیں لگانے سے افاقہ۔ ایڑیوں میں سوسیاں چھینے جیسی دردیں شریف الطبع۔ بڑوں یا بزرگوں اور آسانی سے آنسو بہنے لگیں۔

گھٹھیا یا آئل۔ ۱۰۔ ۲۰ قطرے درد کو روکنے میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ اسکی سیانٹریٹ۔ دردیں آری تر چھی یا دتری یعنی ایک طرف کے بازو اور دوسری کی طرف کی ٹانگ میں دردیں ہوں۔

ملیریا آف۔ ملیریا بخار کے بعد گھٹھیا دی دردیں۔

فریم پکریٹکم۔ چلنے پر جو گھٹھیا دی درد زیادہ ہو۔

لایکولودیم۔ انگلیوں کے جوڑوں کا گھٹھیا پیٹ میں کیسا تھ۔

لیکٹک الیٹر۔ ذیابیطس کے ہمراہ گھٹھیا۔

گوئیٹکم۔ آتشکی اور ٹی بی والے مزاج کے آدمیوں میں گھٹھیا اور نفرس۔ دھکنے والے سوجھے ہوئے جوڑ جن میں چلتے اور گرمی سے زیادتی ہو۔ جوڑوں پر گھٹھیا دی پھوٹے۔ ٹانگ۔ ٹخنے

کی ہڈیاں خاص طور پر متاثر ہوں۔ ٹانگوں میں پاؤں سے گھٹھوں تک گولی لگنے جیسا درد ہو پینٹل کی بڑی ہڈی میں درد ہو۔ پینٹل کی بڑی ہڈی میں درد۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے آرام حاصل ہو۔

فارمیکا اینڈ فارماکالیکل۔ پیشاب میں یورٹ اور البیومن خارج ہونے کی وجہ سے گھٹھیا دی اور نفرس درد۔ جوڑوں کی سوزش جو بہت تکلیف دہ ہو حرکت پر زیادہ۔ ٹھنڈا اور طوفان سے پہلے باقی دباؤ سے افاقہ۔

فیتھم کارب۔ یورک الیڈ کی وجہ سے مزمن گنٹھیا۔ دل کی ٹھنک اور دل کے صدمے۔ تیلیوں کی در دیں اور جھوٹے جوڑوں میں درد اور ملن کا احساس۔

کالی کارب۔ سوئی لگنے۔ جیسے پھر اٹھو پنے جیسے اور بلند درد جو ٹھنڈی چیزیں لگانے سے وقتی طور پر لافاق ہو۔ آرام اور حرکت سے افادہ نہ ہو۔ درد کی وجہ سے مریض قیلاً تلبے شدید کمزوری کے ساتھ بہت زیادہ پسینے کے ساتھ کمزور۔ اگر درد والے حصہ کو دھانپ لیا جائے تو ننگے حصہ پر درد چلے جاتے ہیں۔ کھانا کھانے اور ننگا کرنے پر زیادتی ہو۔ ایک ایم طاقت میں دبیجئے۔

کلکیر یا کارب۔ ہڈیوں کا آہستہ آہستہ بڑھنا۔ ہڈیوں کا بے قاعدہ طور پر نشوونما پانا۔ ہڈی کا ایک حصہ کو خوراک ملے جبکہ دوسرا حصہ بھوکا رہے۔ رٹاکس کی طرح اس دوائی میں بھی متواتر چلنے سے افادہ اور لیٹے سے زیادتی۔ گنٹھیا دی سوزش یا ہاتھوں اور انگلیوں کے جوڑوں کا گرہ دار یا کھٹکھٹا گنٹھیا یا گنٹھوں کا پر گوشت یعنی موٹے تازے اور پسینے والے اشخاص میں۔ ٹھنڈک سے زیادتی ہو۔ میگنیشیا میوور۔ در دیں جب بیٹھنے سے زیادہ ہوں حرکت سے اور لیٹنے سے مکمل طور پر ہٹ جائیں یا دور ہو جائیں۔

سلیسلک الیڈ۔ جوڑوں کا گنٹھیا طور پر کہنی اور گھٹنے کے جوڑوں پر جھکاؤ ہو۔ شدید سوزش سرخی اور ترنخار۔ حاد لدر چھینٹنے والی درد جس کو گرمی سے افادہ ہو اور ٹھنڈے سے زیادتی ہو۔ شکشا پیمویر یا x9۔ دائیں کندھے یا جوڑ کا گنٹھیا۔ کلائی کے جوڑ کا۔ ٹخنے یا گھٹنے کا۔ یہ گھٹنوں میں رطوبات کو کم کرتا ہے۔

الیسڈ ٹارٹرکیم۔ پاؤں کی ایڑیوں اور تیلیوں میں درد۔ ٹرامیتھائل امیٹم۔ کلائی اور ٹخنوں میں درد بخار کے ساتھ یوٹیس کی مقدار کو کم کرتی ہے۔ سار سپر ملا۔ x20۔ سائیکوٹک اشخاص میں سوزاک کے دبنے۔ ٹیکوں کی وجہ سے یا دوسری چیزیں لگانے کی وجہ سے در دیں۔

برمیرس ولگیرس۔ ایڑیوں میں در دیں جن پر بہت زیادہ وزن ڈالنے سے افادہ ہو۔ جھڑوں کی اور گنٹھیا دی اثرات اگر گردوں میں چپکنے والی درد اور کمزور۔

مائیسٹیکا سیبی لیزا۔ جوڑوں کی سوزش یا ان میں پیپ پڑ جانا یا دوسرے حصوں میں انگلیوں کے ناخنوں اور ہاتھوں کی چھوٹی ہڈیوں میں درد۔

جیلڈونیم۔ سوزش یا سوجن گرمی۔ نازک پن اور سختی کے ساتھ گنٹھیاوی دردیں مفید پانچانے کے ساتھ قبض۔ تھوڑی حرکت یا جھوٹے پرورد یا زیادتی۔ صدف گرم پانی سے نہانے سے آدم آئے۔ کیوپرم ایٹیکم۔ دائیں طرف کے پاؤں کے پنجے کے جھٹوں کی اکڑن شدید درد کے ساتھ۔ نیفالیئم۔ نگرانی کا درد زیادہ زوردار سن ہونے سے ادل بدل کر ٹھنڈے میں نمدار موسم میں زیادتی۔ گریٹشی اولا۔ تیز آہستہ اور قبض کے ساتھ گنٹھیا۔ کندھوں۔ بازوں، انگلیوں خاص طور پر پٹنی اور کلائی کے جوڑوں میں گنٹھیاوی اور تقرسی درد۔

یوٹیڈیوریم پیر۔ انگلیوں کے جوڑوں کی گنٹھیاوی سوزش۔ کہنی کے جوڑوں۔ پنجوں۔ گنٹھیاوی اور تقرسی درد جو جوڑوں کی درد سے ادل بدل کر آئے۔

کالی ایٹوڈ۔ گنٹھیاوی تقرسی جوہر جوڑ کو متاثر کرے۔ بوڑھے گنٹھیا کے نکار نہیں کھلی ہوئیں حرکت سے افادہ، حرکت میں رہیں۔ جب وہ چپ کر کے لیٹ جائیں تو تھک جائیں۔ گرم۔ بد مزاج۔ چڑچڑا اور سخت ہوتا ہے۔

سہوڈوڈنیڈروان۔ گنٹھیاوی دردیں جو ایک جوڑے دوسرے جوڑے تک منتقل ہوں۔ جوڑوں کی سوزش کے ساتھ طوفان سے پہلے یا طوفان میں ٹھنڈے یا نمدار یا ناصاف موسم میں زیادتی ہو۔ گرم بڑے پینے سے افادہ۔ جوڑوں کا بڑھ جانا گنٹھیاوی مادہ جمع ہونے پر۔ گنٹھیاوی گانٹھیں۔ فائوٹولا کا۔ جسم کی زخموں پر کھائی ہوئی حالت یعنی بہت زبردست چوڑیں لگن ہوئی ہوں۔ بڑیاں دکھیں۔ جسم میں منتقل درد۔ جوڑوں میں درد۔ رات کو بستر کی گرمی سے یا گرم چیزیں لگانے سے درد دکھیں اور درد میں زیادتی ہو۔ وہ ٹھنڈی چیزیں پاتا ہے۔ جوڑوں کا گنٹھیا۔ کان کے پاس کے غدد اور غلے جڑے کے غدد بڑھے ہوئے۔ دل کے حصے میں درد جو دائیں بازو تک جائے۔

نیٹرم سلف۔ جب پیشاب میں لڑکائی لگس کی نکالیف کے ہمراہ ہو۔ میگنولیا۔ دل کی نکالیف کے ساتھ گنٹھیا۔ تلی اور دل کی نکالیف ادل بدل کر مرضی تھا ہوا ہو۔

لیکن سخت نہ ہو۔ بے قاعدہ تبدیل ہونے والی دردی۔ تنگی تنفس۔ جب تیز چلے تو دم گھٹنے کا احساس۔
 بنزواک الیڈ۔ گنٹھیاوی اور فحری دردی۔ خون میں پیشاب یا پیشاب میں کھار والی طبیعتوں میں،
 جب پیشاب کم مقدار میں مریض زیادہ تکلیف محسوس کرے بہ نسبت جب پیشاب میں زیادہ مواد تلچھٹ
 ہو اور کثرت سے ہو۔ تکلیف میں افادہ ہو۔ اس حالت میں پیشاب بہت ہی رنگدار اور گھوڑے کے
 پیشاب کی بودالا ہو۔ اس مواد کو کم کرنے سے تکلیف بڑھ جائے۔ پیشاب میں یورک الیڈ جو سرخ
 تلچھٹ بنائے زلزلہ کام کرنے پر گنٹھیاوی دردی رنگ جائیں زبان یا معدہ کی سوزش شروع ہو جائے معدہ
 کی سوزش۔ مریض ہر کھائی ہوئی چیز تے کر دیتا ہے۔ دلی ہوئی دردی معدہ میں چلی جاتی ہیں تب بنزواک
 الیڈ۔ انٹ کوڈ۔ اور سیگنور یا مفید ہو سکتے ہیں۔ دم کی پیچیدگیوں کے ساتھ۔ ٹانگوں کی سوزش
 کھتے وقت بھول جائے جب پسینہ آئے۔ غلی اور پریشانی۔ یوریا یعنی خون میں پیشاب شامل ہو جائے۔
 ٹھنڈا۔ اور رنگا ہونے پر۔ ٹھنڈی ہوا۔ موسم کی تبدیلی۔ حرکت اور شراب سے زیادتی ہو۔ گرمی یا زیادہ
 پیشاب سے افادہ ہو۔ چلتی پھرتی دردی۔ جراحی حالت اچانک بدلیں۔ جوڑوں پر گنٹھیاوی تلچھٹ۔ گنٹھیا
 کی دردوں کو دفر کرتی ہے۔

اگز الک الیڈ۔ بائیں طرف گنٹھیا بائیں پھیپھڑے کے پچھلے حصہ میں دردی خاص طور پر نمایاں
 ہوں اس دوائی میں قابل غور ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں کہ مرض خواہ کوئی ہو۔ بلوری۔ نمونیا یا دق جب
 درد موجود ہو اگز الک الیڈ اسے آرام دے گا۔ جوڑوں کا گنٹھیا خاص طور پر پسینوں سے زیادہ ہو خراب
 معدہ بے ذائقہ ڈکار معدہ میں جلن وغیرہ یہ پیشاب میں کیلیم اگز الیڈ کے اخراج کو دور کرتا ہے۔
 کندھے کے جوڑے کے نیچے درد۔ کندھوں کے درمیان جو نیچے کی طرف چھوٹی کمزور بڑھے۔ کمزور شدید
 درد جو کوہنے تک جائے جس کو حالت بدلنے پر افادہ۔

میگنٹم۔ بازو بے چینی سے پر یعنی شدید بے چینی گنٹھے کو بھی ہڈیاں دکھیں۔ لمبوں میں جلن۔ جوڑوں
 کی سوزش کا ٹرھ جانا۔ ہڈیوں کے خلاف میں درد۔ جوڑ دکھیں۔ یہ دوائی بار بار آنے والی تکلیف میں مفید
 ہے۔ اور پہلی دفعہ کے حملہ میں مشکل کام آتی ہے۔

کیفر۔ تکلیف نیم خوابی سی کیفیت میں محسوس ہوں اور جب ان کے متعلق سوچا جائے تو ہوا میں۔

کیومیلا۔ شدید تیز دریں جو اچانک آئیں جو مریض کو غلطی بنادیں مریض کہتا ہے کہ وہ دردوں کی بجائے موت کو ترجیح دے گا اور چیز کو پسند کرے بہ نسبت دردوں کی تکلیف کے۔ سن ہونے کے ساتھ دردوں کیلئے مخصوص ہے۔

سیکرم لیٹس۔ برف کی طرح ٹھنڈی دریں جو ہر طرف پھیلیں۔

انٹم کروڈ۔ گنٹھیا تھے کے ساتھ ادل بدل کر جب گنٹھیا رک جائے تو تھے شروع ہوں۔ انگلیوں کے جوڑوں پر گنٹھیا دی گانٹھیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہونے والی دریں جس کے ہمراہ سفید و والی زبان ناک اور منہ کے کناروں پر چیرے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے نفرت۔

میفائٹس۔ آوارہ دریں یا چلتی پھرتی دریں پشیماب کرنے کے لئے دباؤ ڈالیں۔

فیزولس این۔ گنٹھیا دی دریں جن کے ہمراہ دیا بیٹس ہو۔

سبائنا۔ گنٹھیا اور رحم سے خون ہے ادل بدل کر جیسے کہ خون کا بہنا شروع ہو جائے جب گنٹھیا دی درد کو خافہ ہو یا اس کے الٹ۔

سلفر۔ گرمی کے موسم صاف اور بادلوں کے دن زیادہ دریں۔ نمدار اور ٹھنڈے دن میں ناقہ۔

مزن جوڑوں کی دریں۔ تلووں کی جلن اور سر کی چوٹی کی جلن کے ہمراہ۔

لائیکوس وی۔ جب دریں گرم کرہ یا بستر میں کم ہوں۔ لیکن براہ راست گرمی سے کم نہ ہوں۔

اکونائٹ نیپ۔ گولی لگنے جیسی دریں جو شراب یا کسی محرک سے دوبارہ پیدا ہو جائیں۔ رات کے وقت زیادہ عام طور پر بیٹھے ہونے کی صورت میں غائب ہو جائیں۔

ایکٹ آر۔ گنٹھیا جس سے رڑھ کے جوڑے خاص طور پر گردن کے متاثرین۔ گردن کی گدی میں درد

اس کا مخصوص درد ہے جب گنٹھیا دی درد رک جائے تو دفاعی علامات ظاہر ہوں یا جب دماغ پر گندہ

نہ ہو تو اس سال شروع ہو جائیں۔ آرام حاصل کرنے کیلئے کچھ نہ کچھ رطوبات بہنی چاہئیں۔

اکٹیا پائیکٹیا۔ چھوٹے جوڑے اور کلائیوں میں پھاڑنے والے اور کھینچنے والے درد۔ تھوڑی سی شفقت

سے جوڑے سوچ جائیں۔

ابرفینم۔ اسپہال کو روکنے پر گنٹھیا دی درد شروع ہو جائیں۔ جوڑوں کا درد۔ دل کے درد میں

تبدیل ہو جائے۔ ریڑھ کے درد۔ کمر میں اچانک درد جس کو حرکت کرنے پر افادہ ہو۔ رات کو اور ٹھنڈی ہوا میں علامات زیادہ ہوں۔

آرٹھریٹک الیم۔ جلن دار دردی آدھی رات کے وقت اور درد والی طرف لیٹنے سے گرمی اور متاثرہ جگہ کو بلانے سے افادہ ہو۔ کہنی سے کندھے تک گنٹھیاوی درد۔

جینس میسم۔ جلن دار دردی جن کو گرمی سے آفادہ نہ ہو۔ اچانک صبح زیادہ ہوں۔ چلتی پھرتی دریں ہڈیوں اور جوڑوں میں رات کے وقت۔

ہائپیریکیم۔ گنٹھیاوی جوڑوں کے درد۔ یہ زخمی اعصاب کو ٹھیک کرنے میں حیران کن اثر دکھاتی ہے۔ گھٹنا نسا ہوا۔ ٹانگ۔ پاؤں تنبھے کافی سخت۔

مرک سال۔ گنٹھیاوی اور تقریبی دردی شدید بدبودار۔ پسینے کے ساتھ جتنا زیادہ پسینہ آتا ہے اتنی ہی تکالیف بڑھتی ہیں۔ ناتوانی۔ بستر میں افادہ، لیکن جونہی بستر گرم ہو جائیں دردی بڑھ جائیں اسے اپنے پڑے دور چھینکنا پڑیں تاکہ اچھا ہو جائے یا دردی کم ہو جائیں۔ دوسری حالت بھی دردیوں کو بڑھاتی ہے تب دوبارہ اسے بستر میں اپنے آپ کو ڈھانپنا پڑے پس تمام وقت ایسا ہی ہوتا ہے رات کے وقت زیادتی۔

کالی بالیگرومیکم۔ دردی حرکت سے زیادہ اور گرمی سے افادہ۔ ایک جوڑے دوسرے جوڑے چلتی ہے دردی کم ہوں جب اسہال یا نزلہ زکام کے اخراج دوبارہ ظاہر ہوں جو اس دوائی کی نمایاں علامات ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد ٹپختے وقت۔ تعویڑی جگہ میں دردی جن کو ایک انگلی سے ڈھانپا جاسکتا ہے چلتے وقت کو ہلے اور گھٹنے کے جوڑوں میں تکلیف۔

ایپس میل۔ جوڑوں کی سوزش۔ ڈنگ لگنے جیسے جلندار درد جو گرم کمرہ میں اور گرم پیوں سے زیادہ ٹھنڈی پیوں اور ٹھنڈی ہوا سے افادہ۔ جتنے سرخ نظر آئیں اور چھوٹے پر گرم محسوس ہوں۔ استسقاہ اونچی طاقت میں دیجئے۔

سیلینیم۔ ٹی بی والا گنٹھیا۔ لمبے بخار کے بعد شدید کمزوری۔ بڑی اور بہت عام کمزوری۔ بازوؤں کا مرجھا جانا۔ بالوں کا گرنا۔ پھل۔ شراب یا چائے پینے کے بعد اسہال۔

کاسٹیکم - گنٹھیاوی درد میں جو گرم اور نندار موسم میں ابھی ہوں۔ ٹھنڈے اور خشک موسم میں زیادہ بندھنوں کی سکڑن اور سختی کمزوری اور کانپنے کے ساتھ۔ گنٹھیاوی درد میں خاص طور پر جہاں جوڑ سخت اور بندھن چھوٹے ہو جائیں۔ بازوؤں بد وضع ہو جائیں۔ جوڑوں کی بد وضعی۔ جب بارش ہو تو مریض افادہ محسوس کرے۔ بازوؤں کا فالج کے نتیجے میں کانپنا اور کمزوری۔

میسڈورنیم - جب ابھی طرح سے منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دوائی دی جائے یہ ان گنٹھیاوی مریض کے لئے موزوں ہے جس میں دردی مریض کو خند سے جگا دیں۔ کم مقدار میں رنگ دار اور تیز بو والا۔ پشیاپ۔ سردی سے متاثر ہونے والے۔ تلوے دکھیں۔ ٹانگوں کو اوپر کھینچ کر لیٹے۔ یہ حالت اس کو افادہ دیتی ہے۔ تلوؤں میں درد۔ یادداشت کمزور۔ جرحری طبیعت۔ ۲۰ x طاقت یا اس سے اوپر کی طاقت استعمال کریں۔

سفلیئم - آتش کی مریضوں میں یا مزاج والے مریضوں میں جب ابھی طرح سے ظاہر ہونے والی ادویات ناکام ہو جائیں۔ رات کے دردی زیادہ ۱۰۰۰ طاقت میں سوتے وقت دیں۔

لیکس - گھٹنوں اور کہنیوں میں گنٹھیاوی درد میں۔ گھٹنوں کا سوج جانا۔ خون بہنے سے پرہیز۔ زبرد۔ پانی کے لئے شدید پائیں۔ پائیر جینیم - پہلی حرکت پر درد میں افادہ اور درد زیادہ جب حرکت وقفوں کے بعد جاری رکھی جائے۔ (رنگس کے آٹ) درد سے افادہ حاصل کرنے کیلئے مریض تصویر کی حرکت کرے پھر ٹھہر جائے تب پھر تھوڑا سا چلے پھر ٹھہر جائے تب پھر تھوڑا سا چلے پھر ٹھہر جائے اور اسی طرح مزید۔

ڈرومیرا - ران کی ہڈی میں اور لمبی ہڈیوں میں دردی۔

آرنیکا مانٹ - گنٹھیاوی درد کے لئے جب مریض چھوٹے جانے یا قریب آنے سے ڈرے وہ محسوس کرتا ہے کہ کو بھی چیز اس کی طرف آتی ہے اسے تکلیف دے گی۔ کیونکہ اس کا جسم دکھتا ہے اور نرم ہے۔ گنٹھیاوی بخار جب دل ملوث ہو۔

آرم میٹ - دردی ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں جائیں اور آخر کار دل میں ٹھہر جائیں جس کے نتیجے کے طور پر ڈل ہو۔ جوڑوں کی سوزش ہو۔ کڑی ہڈیاں دکھیں۔ ہڈیوں کے غلاف کی سوزش رات کے وقت زیادتی ہو۔

آرم میور۔ بھانسنے والے اور کھینچنے والے درد۔ دہانے اور چکپنے والے درد جن کو ٹھنڈک سے افائقہ ہو اور گرمی سے اور گرم چیزیں لگانے سے زیادتی ہو۔ رات کے وقت زیادتی۔ زندگی سے سخت متغیر ہو۔

فیٹرم فاس۔ راؤنڈ و مرکز و جے گنٹیا۔ دل کے پندے میں درد جب بازوؤں اور پنجوں کی درووں میں افائقہ ہو یا اس کے آلت ہو۔

آر جینٹ میٹ۔ گنٹیاوی دردی اعصاب کے ساتھ اور کڑی ہڈیوں خاص طور پر کبھی اور گھٹنے کی ہاگیں کمزور اور کانپتی ہوئی۔ میرٹھیاں اترتے وقت زیادہ دردی۔ گنٹوں کا سوج جانا۔ کڑی ہڈی سوچی ہوئی۔ اس میں ترہیاد ہو اور سخت گانٹھیں بن جائیں۔ کڑی ہڈیوں کا موٹے ہو جانا۔ کالوفائیلم۔ چھوٹے پٹھوں کا گنٹیا اور ہاتھوں اور پاؤں کے چھوٹے جوڑوں۔ انگلیوں کے جوڑوں اور کلائیوں اور انگلیوں کے جوڑوں کے درد۔ حیض کے وقت گنٹیاوی دردی زیادہ ہوں۔ جگہ بدلنے والے درد ہر چند منٹ بعد جگہ میں تبدیل کر لیں۔

پیٹرولیم۔ ایٹروں میں سوئی جھٹنے جیسی دردی جیسے کان میں لکڑی کی نوکدار تیلیاں لگی ہوئی ہوں۔ چلنے پر زیادتی۔

ارٹیکا یورنس۔ گاڑھے پٹیاب کے ساتھ گنٹیاوی دردی۔ ہر دو یا تین گھنٹے بعد درد ٹنکچر کے پانچ پانچ قطرہوں کی خوراکیں۔ یہ صحت درد کو ہی دور نہیں کرے گی بلکہ کافی زیادہ ہتھروں کو خارج کر دے گی۔

نیٹرم میور۔ ایسے مریضوں میں گنٹیاوی دردی جو ہمدردی، ہنگامہ یا شور۔ جربلی غذا اور نمکین غذا کو پسند نہ کریں۔ ایسے افراد میں گنٹیا جہنوں نے بہت زیادہ کونین کھائی ہوئی ہو اور ٹھنڈک ہوں۔ ہمدرد کے کنارے رہتے ہوں۔

کلکیریا فاس۔ ہڈیوں کی کمزوری اور زری۔ سردیوں میں یا ٹھنڈے موسم میں گنٹیا آئے گرم موسم آنے پر بہتر ہو۔

کاربونیم سلف۔ مزین گنٹیا اور نقرس کے لئے خاص طور پر جوڑوں کے گنٹھے کے لئے۔

کو نیم۔ جب بازوؤں کو لٹکانے سے دردوں میں افاقہ ہو۔
 اگر کیس میکرس۔ آئی ترقی دردی ہوں یعنی بایاں بازو اور دائیں ٹانگ یا اس کے الٹ۔
 میٹرٹولا۔ آئی ترقی دردی جسے کہ دایاں بازو اور بائیں ٹانگ میں درد ہو۔
 لائیکوپریٹیکم۔ گنٹھیاوی دردی جسے کہ گھرے باہر زیادہ ہوں۔ دہیں کندھے کے پٹھے میں
 زیادہ تکلیف ہو۔

سیلشیا۔ دچی کی ہڈی میں درد جسے کہ گاڑی کے بلے سفر کے بعد دچی میں ڈنگ لگنے سے
 درد جو دباؤ سے زیادہ ہوں۔ گھٹنے میں درد جسے کہ سختی سے بندھا ہوا ہو۔
 سٹیفٹیکریا۔ جوڑوں کا گنٹھیاوی۔ جوڑوں میں سختی اور سخت مشقت کا احساس۔
 جوڑوں پر سوزشی گانٹھیں، معمولی پھوٹنے پر درد میں زیادتی۔ اس دوائی کی نمایاں علامت ہے۔
 ایلوناسیلیکیٹا۔ جوڑوں میں دردی۔ بازوؤں میں کندھوں میں۔ کہنیوں میں اگلے
 بازو۔ ہاتھ، ٹانگوں اور پاؤں میں دردی۔ بچے سے اوپر کی طرف دردی جائیں۔
 امونیا فاس۔ گنٹھیا اور فقرے کے لئے مزاجی دوائی ہے۔ جب جوڑوں میں گانٹھیں ہوں۔
 جوڑوں میں ٹھوس جلاؤ اور ہاتھ ٹیڑھے ہو جائیں اور بد وضع ہو جائیں۔

تھو جاب۔ یہ گنٹھیاوی ریشہ دار ٹھوس مواد میں مدد دیتا ہے۔ خاص طور پر کندھے کے پٹھے
 اور کہلوں کے حصوں میں۔ یہ گھٹنوں کی چکنائی نکلنے کو ٹھیک کرتا ہے۔ ۱۔ ایم طاقت میں
 دیجئے۔ سوزا کی قسم کی جوڑوں کی گنٹھیاوی سوزش۔ یہ جوڑوں کو ڈھیلے کرنے میں حیران کن عمل
 کرتا ہے حرکت کرنے کے حل کو جاری کر دیتی ہے جبکہ دوسری نظر بخوبی ادویات ناکام ہو جائیں۔
 ویلیس راینہ۔ تبدیل ہونے والی گنٹھیاوی دردی جن کو اوپر نیچے چلنے سے اور ملنے سے افاقہ
 ہو۔ گرمی کے اچانک بھونکے سے پیاس اور تلی کے ساتھ۔ آدھی رات سے پہلے بے خوابی۔
 کلکیر یا فلور۔ جو نقص دار ہڈیوں کے اکاڈ کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ ہڈیوں کو کھانسی
 اور پھوڑے۔ مریض گرمی سے افاقہ محسوس کرتا ہے اور سردی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔
 فلورک الیڈ۔ یہ ہڈیوں کو نرم کرنے اور گانٹھوں کو اور دوسری زائیدگی ہوئی چیزوں کو جذب

کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ کافی درد، کچھ کمزوری اور سرخی ہوتی ہے۔ ماسخول کا جلدی بڑھنا ٹوٹنا۔
 پیکرک ایسڈ۔ ڈاکٹر ہال برٹ کے تجربے کے مطابق اس دوائی نے رب کے زیادہ اچھے نتائج دیے ہیں۔
 صفحہ ۱۸۴۔ زخم کی وجہ سے یا ویسے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے لئے۔ یہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے لئے
 بہترین دوائی ہے۔ خواہ وہ سادہ ہوں یا ٹکڑوں کی صورت میں پیچیدہ ہوں۔
 روٹنا۔ بڑی ہڈیوں میں درد خواہ زخم۔ گنٹھے کی وجہ سے ہو۔ یہ زخموں اور ہڈی ٹوٹنے کیلئے
 مفید ہے۔

یوفوریم۔ ہڈیوں میں جلن دار دردی یا کینسر کی طرح کئے بھئی کے بھٹکے گلے کے غددوں
 کی سوزش اور پیپ اور ہڈیوں کا گھٹنا۔ مچھی کی ہڈی میں درد۔
 میمس۔ ہڈیوں کے بیرونی طور پر دروں پر لگانے کیلئے اس دوا کی مدد کیجی لگائی جائے۔

ہڈیوں کا نرم پڑ جانا۔

کلکیر یا کارب۔ ریڑھ کی ہڈی کا خاص طور پر یا لمبی ہڈی کا خم کھا جانا۔ خنازیری لوگوں میں
 ہڈیوں کا ٹھیک نہ بننا۔ ہڈیوں کے سرے غلط کے، بد وضع۔ ٹیڑھی۔ نامکمل طور پر بڑھیں تالو
 کی ہڈیاں دیر بعد جڑیں۔ دانت دیر سے نکلیں اور تکلیف سے نکلیں۔ چھوٹے بچے والا بچہ۔
 کالی کارب۔ ہڈیوں کا گھٹ جانا۔

کلکیر یا فاس۔ ہڈیوں کا ٹھیک طرح سے نہ بننا ذہن میں کی کے برابر۔ ہڈیوں کے نرم ہونے
 کے لئے لیٹرین دوائی ہے۔ بچہ دہلا پتلا۔ کمزور اور پیٹ بھولا ہوا ہونے کی بجائے اندر دھنسا
 ہوا۔ بڑا سر اور تالو کھلا رہے۔ کلکیر یا کارب کے بچے کے مقابلہ میں۔

نیوہرکولینیم ۲۰۰ x۔ اس دوائی سے علاج شروع کیجئے اور ہر تیسے ماہ ایک خوراک اہریئے
 اس دوائی سے دودن پہلے اور دودن بعد کوئی دوائی نہ دیجئے۔

فلورک ایسڈ۔ آتشکی اور ریڑھ کی ہڈی کی سوزش کے میلان رکھنے والے اصحاب کیلئے بہترین
 دوائی ہے۔ جسمانی حالت کمزور اور زرد پٹھے نرم اور پٹیلے پاؤں اور ہاتھ تواتر پسینے میں نہائے رہیں۔

سلیشیا۔ کھلا لالو پیٹ پھولا ہوا اور گرم زیادہ مقدار میں سر پر کھٹا پسینہ اور جسم خشک پھوٹے
 پٹھنیاں۔ غدد وجن سے پیپ بہنے کا درد ہوا اس دوائی سے ہوجاتے ہیں۔
 بریٹا کا رب۔ جب ذہنی اور جسمانی برباد ہو یعنی ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر رعبوتری نہ ہو۔
 گلے ٹانسلز اور گردن کے غدد بڑھے ہوئے ہوں اور سخت ہوں۔
 گلکیر یا قلعور۔ نوزائیدہ بچوں کی کھوپڑی کی ہڈیاں بڑھ جائیں اور سنوریش زدہ ہوں۔ دانتوں
 پر کم مقدار انجیل۔ سردی کل غدد وغیرہ معمولی طور سخت اور ہڈیوں پر گانٹھیں پیپ کے ہمراہ۔
 کر یا زوٹ۔ بچوں کے قبل از وقت دانت گل سڑ جائیں۔ خاص طور پر دودھ کے دانت
 جن پر سیاہ دھبے اور ہونہی نکلیں وہ ٹوٹ جھوٹ جائیں۔

آر جٹم یا ٹیرکیم۔ ذہن اور قبل از وقت دماغی طور پر بالغ بچوں کے لئے، پانچاٹے نرم
 اور نصیدہ مٹھائیوں کی زبردست خواہش یعنی مٹھائیوں کے رسیا۔
 بریٹا میوور۔ زرد۔ کند ذہن اور کمزور ہڈیوں والے بچے جو بغیر مدد کے کھڑے نہ ہو سکیں۔
 ٹانسلز بڑھے ہوئے۔ کمزور دل اور بہت جلدی سردی سے متاثر ہوں یعنی ٹھنڈ لگ جائے۔
عرق النساء یا انگڑی کا درد یا درد ریگن۔

کالوسٹھ۔ حاد انگڑی کے درد کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ چوتھیں کند سوئی چھبے جی
 در دیں جو اچانک آئیں اور نیچے کی طرف، پچھلے حصہ کو پہلے یا گھٹنے کو یا پاؤں کو جائیں۔ گرمی سے
 درد کو آفاق، پھوٹنے یا حرکت، حرکت سے زیادتی۔ یہ بڑی طاقت میں دی جاسکتی ہے یعنی ۲۰۰x
 طاقت ۴-۵ گھنٹے تین یا چار بار دی جاسکتی ہیں۔

رٹاکس۔ جب درد کھلا رکھنے یا پٹھوں کی شدید مشقت کی وجہ سے ہو۔ رات کے وقت
 بستر میں زیادہ ہو۔ یا آرام کرتے وقت زیادہ ہو۔ پہلی حرکت سے بہت زیادہ تکلیف جو کھیلنے پر آتا ہو۔
 نیفا لیم۔ اعصاب میں شدید درد، جس کے ساتھ انٹشن اور ٹشن ہونے کے ساتھ ادل بدل
 کر لینے سے زیادہ پٹیڈل اور پاؤں میں در دیں ہوں۔

میکروٹیم۔ لنگڑی کے درد کے لئے شاندر دوائی تائی جاتی ہے ۲x طاقت میں دی جائے۔

ڈائسکوریا۔ ٹانگوں میں پھاڑنے والی درد جو حرکت کرنے پر یا بیٹھنے پر ہو۔

میگنیشیا فاس۔ بجلی کی مار کی طرح کی دردیں جو گرمی سے کم ہوں۔ دائیں طرف کی دوائی ہے۔

ایسڈ سلف۔ جب اچھی طرح سے منتخب کی ہوئی دوائیاں ناکام ہو جائیں تو اس سے بہت

کیس ٹھیک ہو گئے ہیں۔

آر سینکلم الیم۔ جب مریض میریا کے بار بار کے حملوں کا نشانہ بن چکا ہو اور دردیں دفعہ وار

ہوں۔ شدید کھینچنے والی۔ جلن دار۔ بائیں چوڑے میں پھاڑنے والی دردیں جو کولہوں تک پھیلیں

شدید بے چینی جس کو گرم چیزیں لگانے سے فائدہ ہو۔

روٹما۔ یرسٹاکس سے ملتی جلتی ہے۔ ہر علامت میں سوائے اس کے کہ روٹما کی دردیں

اعصاب کی رینچوں کو گہری جاتی ہے اندر کی طرف کو بجائے باہر کی طرف جانے کے ٹھنڈ اور لیٹنے

سے زیادتی ہو۔

کیمومیللا۔ لنگڑی کا درد جس کے ساتھ دماغی علامت کا درد سے تو موت بہتر ہے۔

کلکیریا کارب۔ لنگڑی کا درد پاؤں ٹھنڈے اور پیچھے رٹاکس کی طرح چلنے سے فائدہ ہو۔

ماربیلینیم۔ جب جھپک کے بعد لنگڑی کا درد ہو تو یہ بطور عمل ایجنز کے دی جاسکتی ہے ایکنازر

طاقت میں دیکھئے۔

ایسکوس۔ لنگڑی کا درد گہری کم درد کے ہمراہ جس سے چلنا مشکل ہو۔ ٹیڑھا ہونا اور دباؤ

سے اٹھنا سبب ہو۔

گلنیک۔ فلگرای کے درد کے لئے مخصوص ہے۔ جب اچھی طرح منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں۔

یہ تیزابیت۔ زبان پر تہہ جمی ہوئی۔ گندہ ذائقہ اور گندہ سانس یعنی منہ کا ذائقہ اور سانس گندہ۔

ایک ایم طاقت میں دیکھئے۔

امونیم میور۔ لنگڑی کے درد سے کہ اعصابی پٹے جھوٹے ہو گئے ہوں۔ بیٹھنے اور چلنے پر

زیادتی ہو۔ اور تکلیف بہت زیادہ ہو۔

میںڈورنیم۔ جب اچھی طرح منقب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں اور مریض بہتر نہیں ٹانگوں کو کھینچ کر لیتا ہے۔ یہ حالت اس کے لئے افادہ بخشتی ہے۔

کالچیکم۔ دائیں طرف کی تیز دریں جو گھٹنوں تک بڑھیں حرکت سے زیادہ۔ اچانک دریں مستقل اور ناقابل برداشت۔

برائی اونیا۔ لنگری کا درد گھٹیا دی قسم حرکت سے زیادہ سخت دباؤ سے افادہ ہو۔
پلمیم۔ پٹھوں کے کمزور ہونے پر لنگری کا درد بجلی کی طرح کی دریں دوروں میں انٹھن ہو۔
یا انٹھن کے درے

دوسرا حصہ جب پٹھے سکڑنے کے نااہل ہوں

جیلیم۔ پٹھے دھیلے۔ آسانی سے تھک سے جائیں۔ تمام نظام میں کمزوری اور کپکپاہٹ اعضا کا ڈھیلا پن۔ ہاتھ پاؤں میں طاقت نہ رہے۔ گھٹنوں میں احساس کہ ہڈیاں ٹھیک طرح فٹ ذاتی ہوں۔ اور ہڈیوں کو مضبوط ہو جاتی ہے۔

کوکولس۔ جب پکڑوں کے ہمراہ۔
کاسٹیکم۔ جب جیلیم ناکام ہو جائے تو یہ دوائی استعمال کی جائے۔ پٹھوں کا چھوٹے ہونا اور سخت ہونا جو ہاتھ سے محسوس کیا جاسکتا ہے جیسے کہ سخت کنارہ ہو۔ پٹھوں اور اعصابی بندھنوں کا سکڑنا۔

لیمٹھن (لکھنے والی کی انٹھن بھی دیکھئے۔)

بنزواک لیسڈ۔ جب چلے تو جوڑوں میں کرکٹن۔
رستاکس۔ ایسی انٹھن جو آرام کرنے پر زیادہ اور چلنے پر افادہ ہو، حرکت کرتے وقت جوڑوں میں۔

کلکیر یا کارب - اینٹھن رات کے وقت بستر میں اور ٹانگیں پھیلانے پر زیادہ ہو۔

کیو پریم میٹ - شدید اینٹھن خاص طور پر پنڈلیوں میں۔

سیکل کار - پنڈلیوں میں اینٹھن $\times 200$ طاقت میں دیکھئے۔

پٹرولیم - پٹھوں کی اکثر - جوڑوں کا کرکڑانا - جوڑوں کا نرم نہ ہونا یا نہ مڑنا - اینٹھن زیادہ۔

کلکیر یا فاس - پنڈلیوں میں اینٹھن - پنچوں میں ڈنگ لگنے اور گولی لگنے جیسے درد۔

میگنٹیا فاس - زیادہ شفت کی وجہ سے اینٹھن سختی - ٹسن ہو جانا - بد بھاپن - اعصاب کا مودہ ہو

جانا - لکھنے والوں کے ہاتھوں اور انگلیوں میں دیر تک لکھنے کی وجہ سے اینٹھن۔

ٹیڑم فاس - پنڈلیوں اور پاؤں میں اینٹھن - لکھتے وقت ہاتھوں میں اینٹھن جوڑوں میں کرکڑ۔

کیمنقر - بازوؤں اور پنڈلیوں میں برف جیسی ٹھنڈک کے ساتھ اینٹھن

پٹھوں کی کمزوری۔

کلکیر یا کارب - کرکڑے ٹھٹھے بڑی طرح رشہ دار نیچے کے بننے کی واضح علامات جن کی وجہ کمزوری ہو۔

کاسٹیکم - اس دوائی سے علاج شروع کیا جائے۔ ایک ایم پوٹینسی کی خوراک دیجئے۔ یہ پٹھوں

کی کمزوری کے لئے جس میں پھچھڑوں میں مصنوعی یا جعلی فالج کا احساس ہو اور ایک ایسی بیماری

رضا کا دھٹے شدید تا تو اس ہو جاتے ہیں جن پر مکمل طور کنٹرول ہو جاتا ہے۔

فیرم میٹ - پٹھوں کی کمزوری کے لئے شاندار دوائی ہے۔ کئی خون کے ساتھ کمزوری۔

پلیسم - پٹھوں کی اعلیٰ تہی پٹھوں کے فالج اور قبض۔ یہ ٹانگوں کے لئے خاص لگاؤ رکھتی ہے۔

سٹر امونیم - آسانی سے نقل و حرکت رضا کا دھٹے مرضی کے مطابق کام نہ کریں۔

اینا کارڈیم - رضا کا دھٹے کو کنٹرول نہ کر کے - ضعیف العقلی کے ساتھ فالج۔

پٹھوں کی سوزش

برائی اونیا - جب پٹھوں میں کام اور نوعیت کی تبدیلیاں ہو جائیں خاص طور پر بازوؤں

اور ٹانگوں میں پہلے پہل جھٹکے۔ سوئی لگتے جیسے پھاڑنے والے، جھنجھنے والی علامات اور بھر
سوزش۔ گرمی اور سرخی اور بھر سختی اور چلنے میں نمایاں یا شدید تکلیف۔ یہ علامات براہِ شیم جسم میں
داخل ہونے کے وجہ سے ٹپھوں کی سوزش میں پائی جاتی ہیں۔

آرٹیکا مانٹ۔ جب سوزش کی وجہ سے چوٹ یا کندازارے زخم ہو۔

رستمکس۔ جب مندرجہ بالا علامات گنٹھیاوی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہوں۔

تھو جوا۔ جب سوزش میں بڑی بنا شروع ہو جائے۔ یہ بڑی کے بننے کو روک دیتی ہے۔

پٹھوں کی بڑھتی ہوئی نا طاقتی۔ لاغری۔

پلمبم۔ یہ چوٹی کی دوا ہے۔ سادہ ہیجان سے لے کر پٹھوں کی مکمل تباہی تک کو درست کرتی ہے۔
یہ صرف دماغ کے پٹھوں ہی کو درست نہیں کرتی بلکہ دھڑ۔ ہاتھ پاؤں اور دس سر اعضا کے پٹھوں
کو درست کرتی ہے۔ احساس کا مکمل طور پر جاتے رہنا۔ کمزوری اور کلٹنے والے درد۔ کلٹنے والے۔
کا پختہ ہونے۔ بل کھائے گردن میں گولی لگنے جیسے کھینچاؤ اور کندھے کے پٹھوں کی نا طاقتی۔
استسقاء۔ غیر مستقل چال یا لرزہ خیزی چال۔ پٹھوں کا لمبائی میں کم ہونا۔ ۲۰ یا ۱۰ x ۱۰ فٹس دیکھئے۔
آر جینٹم ٹائمریکیم۔ ریڑھ کی ہڈی کی حساسیت۔ ریڑھ کی ہڈی میں شدید در درات کے وقت ہاتھ
پاؤں کا عمومی طور پر کانپنا اور کمزوری۔ آنکھیں بند کر کے نہ چل سکے۔ پنڈلیوں کی سختی اور کمزوری بھی۔
غیر مستقل یا دانواں ڈول چال چلے یا کھڑا ہو۔ رات کے وقت اور صبح سے زیادتی، تاؤ ہوئے لگتے ہو۔
برٹیا کارب۔ بلوغت کی عمر میں پٹھوں کی نا طاقتی۔

فاسفورس۔ بعض حصوں کا زیادہ بڑھ جانا اور بعض کا کمزور ہو جانا۔ مریض کا دھانچہ لمبا
کھوکھلی چھاتی۔ ٹی بی اور آتش کی مزاج۔ جلن کا پختہ کے ساتھ سن ہو جانا اور کمزوری نمایاں
علامت ہے۔


میورائیسڈ۔ انیم کے استعمال کی زیادتی کی وجہ سے پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔
تھیلیم۔ پٹھوں کی کمزوری۔ لرزہ خیزی چال میں تکلیف۔ لرزہ یا ریشہ معہ اور آتشوں میں
بجلی کے جھٹکوں جیسی تکلیف۔

کالی فاس - پٹھوں کی کمزوری کے لئے - یہ اس حالت سے متعلقہ وائرس کو مارتی ہے
یا تباہ کر دیتی ہے - یہ مزاجی دوائی ہے دوسری ادویات کے ہمراہ دی جائے -

آرژینکائیم
کیوپرمیٹ
بریٹا آئیوڈائیڈ
جائیں -
مندرجہ بالا بیماریوں میں مفید ہیں - یہ دی گئی ترتیب میں دی
جب مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں -
حرکت کرنے پر پٹھوں کا بہت زیادہ کھینچ جانا -

رشاکس :- یہ صرف واحد دوائی ہے جو پٹھوں کی کھنچاؤ میں دی جاسکتی ہے -
پٹھوں کی عام سوزش اور اسکے ہمراہ بڑی کا بننا -

کلکیریا فلور - یہ ایک شاندار دوائی ہے - یہ لمبے عرصے تک دی جانی چاہیے - اگر یہ دوائی ٹھیک
کرنے میں ناکام ہو جائے تو درج ذیل ادویات دی گئی ترتیب میں دی جائیں -
(۱) - کلکیریا فاس (۲) - ویسٹ فلور - (۳) سمفائٹیم -



تیرھوں
باب

جلد
بابوں اور فائزوں
کی بیسیاں

468

جلدی بیماریاں

۱- ایک معالج کے لئے جلد کی بیماریاں بہت اہمیت کی حامل ہیں ایسے کچھ متعلقہ معلومات حاصل کرنے کے لئے نہایت اہم باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ چند ایک کے علاوہ تمام بیماریاں اندر سے ظاہر ہوتی ہیں، پس یہ اندرونی دوائی کے ذریعہ ہی اندر سے ٹھیک کی جائیں۔ جلد کی اپنی آزادانہ زندگی نہیں ہوتی۔ اس پر پھوٹے پھنسیاں اندرونی بگاڑ کا اظہار ہوتی ہیں۔ مکمل متحکم جسم صحت مند جلد رکھتا ہے اور ایک بیمار جلد صحت مند جسم نہیں رہ سکتی۔ بیرونی طور پر دوائی استعمال کر کے مرض کو خائب کرنے کا مقصد اس کو دبا دینا اور کسی دوسرے عضو پر حملہ آور کرنا ہے۔ اور خطرناک نتائج ظاہر ہوں، جلدی بیماریوں کو بیرونی ادویات یا لوشنوں سے ٹھیک کرنا نظریاتی طور پر غلط ہے اور عملی طور پر نقصان دہ ہے۔

۲- جلد کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک مادے کو خارج کرنے والا عضو ہے۔ اور جسم کے ہر حصہ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے اندرونی اعضاء کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جلد کا ہر حصہ کسی کسی اندرونی حصہ سے گہرا تعلق رکھتا ہے پس جلدی بیماری کسی اندرونی بیماری کا اظہار ہوتی ہے بلکہ اس کو جسم کے اندر کی بیماری کا خبردار کرنے کا گنگل اور خطرے کی گھنٹی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

۳- جلدی بیماری میں مبتلا انسان کے لئے درد اور سوزناں اچھی خوراک میں گوشت یا انڈوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نظام انہضام کو صحیح حالت میں رکھنے کے لئے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔

۴- متاثرہ حصہ کو صابن کے ساتھ دھونے سے پرہیز کیا جائے۔ چکر یا بورے کے پانی سے متاثرہ حصوں کو صاف کیا جائے۔

مرتب



پہرے کے دانے

ایسٹریازوب - بلوغت پر پہرے کے دانوں یا پھنسیوں کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔

کالی بروم - اگر ایسٹریازوب ناکام ہو جائے تو یہ دوا دی جائے۔

تھوجا - پہرے کے دانے ناک کے دانے اور ناک کی جلد کی سوزش۔

آرینک ایوڈ { ضدی کیسوں میں دی جائے

سلفر ایوڈ { جو شدید قسم کے ہوں۔

ہائیڈروکوتائیل - پہرے کے دانے جن کے ہزارہ رحم کی خرابیاں بھی ہوں۔

اگرکس - پہرے کے دانوں کے ہزارہ بوائیوں کا بھی رجحان ہو۔

برومیس اونیولیم - لڑکیوں کے پہرے پر دانے۔ بڑی پھنسیاں اور کیل مہاسے۔ یہ پہرے کی رنگت

کو نکھارتی بھی ہے۔

ڈلکا مارا - جیسے پہلے پہرے پر دانے۔ نمدار پھنسیاں، ٹھنڈے اور نمدار موسم میں زیادتی ہو۔

سٹرپٹوکوکین - دانے جو اندھے کھانے اور سردی سے زیادہ ہوں۔ سر کے اگلے سرکار در جس

کو ٹھنڈی ہوائے افادہ ہو۔

ایکونائٹ لائیکوٹوم - پہرے پر سخت ٹی بی دے کیل مہاسے۔ ہونٹوں پر کیل مہاسے۔

سورانیئم - پہرے کے دانے جو محض - چوبلی غذا - کھانڈ یا میٹھی چیزوں - کافی اہد گوشت

سے زیادہ ہوں۔

کلیریناس - کئی خون والی لڑکیوں میں بلوغت پر چوٹی میں سرد دریا چند یا میں سرد دریا اور گیس

کے ساتھ تکی تفس جس کو کھانا کھانے سے افادہ ہو۔

تھوجا - چہرے پر دانے یا کیل مہاسے جب لگنے کے ستاروں یا کیے لگائے گئے ہوں۔

لووٹنا۔ کاسٹیکس یا کریم پاؤڈر لگانے سے چہرے پر دانے خاص طور پر گرمیوں میں زیادہ ہوں۔
 آرام آرٹیکم۔ چہرے اور ماتھے پر دانے کیل مہاسے۔ پھوڑے۔ چہرے کی جلد کی دق۔
 سینگنیریا سی۔ چہرے کے دانے جو حیض کے دوران زیادہ ہو حیض کم مقدار میں ہوں۔
 سلفر۔ یہ دوائی بطور ایک عمل انگیز کے دیکھائے جب ابھی طرح منتخب کی ہوئی ادویات آرام
 دینے میں ناکام ہو جائیں یا آرام آنے کی رفتار رک جائے۔ ۲۰۰ طاقت میں دیکھائے۔

ہیم سلفر۔ پھنسیاں جن میں سے سفید پیپ نکلتے۔
 آرٹیکم سلف ابرم۔ جب اگزیمیا اور جلدی خارش بھی ساتھ ہو چہرے کے دانوں کیلے مفید ہے۔

تھام کے اُترے کی لاگ سے خارش (داد بھی دیکھئے)

لیتھیم کارب۔ خارش، رخاروں پر داد والی خارش سرخ دکھنے والی جلد۔ اگر بہ طاقت ناکام
 ہو جائے تو ۲۰۰ طاقت دیکھئے۔

پٹرولیم۔ جلد خشک۔ حساس۔ کھردری اور جھٹی ہوئی۔ چہروں سے جلدی خون بہے۔
 سلفر۔ آئیوڈ۔ چہرے پر گومڑ والی پھنسیاں۔ بال ایسے کھڑے محسوس ہوں۔
 ٹیلیوریم۔ گول دائروں میں گڑھے متاثرہ حصوں سے بدبودار ہو آئے۔ جلد میں ڈنگ لگنے
 جلد میں ڈنگ جیسا درد۔

رسٹاکس۔ نائی کے اُترے کی لاگ کی خارش کے لئے شاندار دوائی ہے کوئی اور دوائی
 دینے سے پہلے یہ دی جائے۔

لیکس۔ نائی کے اُترے کی لاگ کی وجہ سے جب مواد کے رسنے کیساتھ چہرے ہوں
 دہنے کے بعد چہرے ظاہر ہو جائیں۔

لائیکو پوڈیم۔ پرت دار جڑ میں سے زرد منہ کے کناروں پر خون بہے۔
 سلفر۔ خشک خارش۔ ناک اور آنکھوں پر زیادہ ہو۔

گریفائٹس۔ خارش۔ اگزیمیا کی طرح کی چکنے والا مواد نکلتے۔
 سکوتادائر۔ تھام کے اُترے کی لاگ شیعہ کرنے پر۔

بھوڑے

بیلا ڈونا۔ جب سوزش کی شے میں بھوڑے سرخ ہوں۔ پیپ بنے بغیر تیکن دار درد۔ خونی بھوڑے۔

گلگیر یا کارب۔ جب بھوڑے سرخ نہ ہوں لیکن زرد اور بہت درد کرنے والے۔ ہر چار گھنٹے کے بعد ۲۰۰ طاقت کی ایک پڑا دیجئے۔ تین یا چار خوراکیں کافی ہوں گی۔

آر سینکلم الیم۔ گوشت خور بھوڑے کے لئے سب سے بڑی دوائی ہے جیسے کالک کے کوٹے متاثرہ جگہ پر رکھے ہوئے ہوں۔ کاٹنے والی اور جلنے والی درد آدھی رات کے بعد جب انصر کن نام ہو جائے تو یہ دوا دی جائے۔

ہیمپسلفر۔ پیپ بننے کے ابتدائی مراحل میں متاثرہ حصے شدید حساس ہوں تیز چھنے والی دروں کے ساتھ ہر نصف گھنٹہ کے ۶ طاقت میں دیجئے۔ پیپ کا بننا بند کر دگی یا چند گھنٹوں میں پیپ کو ختم کر دے گی۔ جب پیپ باہر آنا شروع ہو جائے تو یہ دوائی دی جائے۔ پیپ کا رخی۔ زرد۔ اور مریض بھوڑے پر حساس ہو۔ مریض ٹھنڈ محسوس کرے لیکن سلیشیا کے مریض کے برخلاف مندار موسم میں افاتہ محسوس کرتا ہے۔ یہ بھوڑوں میں بہت بڑی تسکین دہانے والی دوائی ہے۔ ناخنوں کے ارد گرد اور انگلیوں کے سروں پر پیپ کے لئے بہت اچھی دوائی ہے۔

سلیشیا۔ جب تندرست کرنے کی رفتار کم ہو۔ پانی جیسی اور پتلی پیپ بغیر درد کے بھوڑے جو ٹھیک ہونے کا نام نہ لیں۔ ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ طاقت ہفتہ بعد مہینہ بالترتیب دیجئے۔ مریض ٹھنڈ محسوس کرے خشک اور گرم موسم میں افاتہ محسوس کرے، مندار اور ٹھنڈے موسم میں زیادتی محسوس کرے۔ مرک آئیوڈ۔ سوزش کی شے میں یہ ایک اچھی دوائی ہے جب پیپ نہ بن رہی ہو۔ خدروں کے بھوڑے میں جب پیپ پڑ جائے تو یہ بڑ پتلی پانی جیسی ہو۔ شدید جھکدار سُرخ۔ تیکن دار اور ڈنگ لگنے جیسے درد۔

آرٹیکا مانٹ۔ ایک بعد دوسرے بھوڑے کے نکلنے کا رجحان جو بہت درد کریں۔ چھوٹے بھوڑے بہت زیادہ تعداد میں۔

سلفر۔ چھوٹے چھوٹے زیادہ مقدار میں جب سٹیک یا ٹکڑے ناکام ہو جاتے۔
 اتھیرکینم۔ گوشت خور چھوٹوں کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ تیز بخار کے ساتھ جلد نکلتی ہے
 ہر پندرہ روز کے بعد ۱۰۰۰ طاقت میں ایک پڑیاد دیجئے یا تو ٹھیک کر دے گی یا حالت کو بہتر کر دیگی۔
 گلکیر یا سلف۔ چھوٹے جن کو آہستہ آہستہ آرام آئے متواتر زرد پیپ خارج ہو۔ مریض کھلی
 ہو کو پسند کرے لیکن جھونکوں سے حساس ہو۔ چھوٹوں کے بننے کا رجحان۔
 ایکس۔ نیلے رنگ کے چھوٹے جن سے خراشدار۔ بدبو دار۔ پیپ خارج ہو۔ جلد دار

در دیں۔ چھوٹے سے حساس۔

ٹیرنٹولا کیو بنیز۔ پھنسیاں۔ چھوٹے۔ گوشت خور چھوٹے۔ لہبری۔ خبیث چھوٹے
 اور گنٹین۔ سخت۔ نرم سو جے ہوئے بال توڑ۔ کسی بھی بیج کے چھوٹوں کے لئے مخصوص ہے
 یعنی ہر قسم کے چھوٹے کے لئے مخصوص ہے۔ کھجالی کے لئے بھی انتہائی مفید و موزوں ہے۔
 گن پاؤڈر۔ چھوٹے۔ داد۔ کرموں کا جلد میں داخل ہونا اور خون میں بہہ کر کیلئے مفید ہے۔
 مارٹینیکا ایس۔ جوڑوں میں پیپ پڑ جانا۔ یہ پیپ پڑنے کے عمل کو تیز کرتی ہے اور اس کا وقت
 کم کر دیتی ہے۔ انگلیوں کے سروں پر چھوٹے اور پوروں پر چھوٹے۔ ۲ طاقت میں دیجئے۔
 کاربالک ایسڈ۔ ذیابیطس کے ساتھ کمر کے چھوٹے، کئی سوراخوں سے گندی بدبو دار پیپ
 ہے۔ مریض متلی اور بدبو دار قے میں مبتلا ہو۔ ۲۰۰ طاقت میں دیجئے۔

سٹر امونیم۔ شدید تکلیف دہ چھوٹے۔ سوزش۔ مزمن گوشت خور چھوٹے۔ چھوٹے جوڑوں
 میں چھوٹے خاص طور پر بائیں چولے میں چھوٹے۔ بڑی زہریلی حالت اور پیپ بنے۔

لیڈم پال۔ سوئی چھیدنے سے چھوٹے یا لہبری۔

پلرک ایسڈ۔ بیرونی کان میں چھوٹے۔

مارسلینیم۔ کان کے بیرونی چھید پر بار بار نکلنے والے چھوٹے شدید دردوں کے ساتھ پرانے
 پیچک کی تاریخ ملے۔

سیکل کار۔ چھوٹے چھوٹے چھوٹے۔ بہت دور کریں سبز مواد آہستہ آہستہ ٹھہریں۔

گوشت خور پھوٹے (دیکھئے پھوٹے) کٹے پھٹے ہاتھ اور ہاتھوں کی انگلیوں

کے سرے پر چیرے۔

پٹرولیم۔ انگلیوں کے سروں پر چیرے اور ہاتھوں کی پشت پر چیرے۔ جلد کھردری یا کٹی پٹی۔ خون بہے نیچے سخت۔ اکثر بہت زیادہ خارش تھوڑی تھوڑی جگہ۔ مہوہ۔ کمر اور پیٹ میں ٹھنڈک۔ رشتا کس۔ جلد کی خارش۔ جھنجھٹا ہٹ اور ملن کے ہمراہ۔ انگلیوں کے سر پر رینگنے کا احساس۔ جلد سرخ اور سوجی ہوئی۔ ٹھنڈک میں۔ مندار اور بارشوں کے موسم میں زیادتی۔

سیلیشیا۔ نرم زرد دھوسی جلد۔ انگلیوں کے سرے پر چیرے۔ بدبودار سپ۔ انگلیاں خشک بنیں کریں۔ انگلیوں پر موت دن کے وقت اور شام کے وقت خارش ہو۔ مریض ٹھنڈا۔ ٹھنڈے محسوس کرے آگ سے پیار کرتا ہے یعنی آگ تپتا ہے۔ جھونکوں سے نفرت کرتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے۔ سلفر۔ چیرے۔ جلد پر دوائیاں لگانے سے گھاؤ۔ کھرجنے اور دھوئے پر زیادہ۔ جلد خشک۔ برت دار اور غیر صحت مند۔ خارش ہو اور جلے۔ گرم پینے والے ہاتھ۔ نیند ملکی جلدی جاگ جائے۔ نیٹرم میور۔ انگلیوں کے ناخنوں کے قریب خشکی اور چیرے۔ تھیلیاں گرم اور پسینہ دار۔ ٹھنڈک شدید کمزوری اور تھکاوٹ معمولی معمولی چیزوں پر ناراض ہو جائے۔ ہمدردی زیادہ کرے۔ گرہیں لگنے کی طرح جلد۔

ایومنا سیلیکٹا۔ ہاتھ متواتر پھٹے ہوئے۔ ہاتھوں کی ٹھنڈک۔ ٹانگوں اور پاؤں کی ٹھنڈک ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے اور انگلیاں نیلی۔ ناخن بھڑبھڑے۔

زخم کے نشان پر دانے دار ابھار۔ بوائیاں۔

اگر کمین مسکیرس۔ جوئی کی دوائی ہے۔ ٹھنڈے موسم تکلیف دہ بوائیاں۔ خارش۔ ٹھنڈک دھڑے زخموں کے لئے جوئی کی دوائی ہے۔

سورانیئم۔ جلد کھردری آسانی سے پھٹ جائے یا چر جائے۔ موٹی اور پرت دار ہو جائے چیرے

پھوٹی پھوٹی پت وار چھٹیوں میں بدل جائیں۔ میلے یا غلیظ۔ گندے اور بُرے دکھائی دیں جیسے کہ گردے بھرے ہوئے ہوں۔

پٹھولیم۔ انگلیوں کے سروں اور ہاتھوں کی پشت پر چرے۔ جلد کھردری۔ کٹی پھٹی چربائے اور خون ہے۔ نسیمیں سخت۔ بوئیاں ٹوٹ جائیں۔ رلیض چڑچڑا اور آسانی سے ناراض ہو جائے۔ خارش والی بوئیاں اور کٹے پھٹے ہاتھ۔

رسوین۔ یہ خارش والی جلن والی بوئیسوں کے لئے مفید ہے۔ مدرنگہ بوئیسوں پر لگانے فوراً آفاقہ اور آرام ہو جائے۔

رٹاکس۔ موٹی ہوئی بوئیسوں کے لئے مفید ہے۔

ہیمپیرسلفر۔ بوئیسوں میں جب پیپ متوقع ہو۔

سٹیس کمین۔ سخت جگہوں پر چرے خاص طور پر ہاتھ سے کام کرنے والے آدمیوں میں۔

سلفر۔ یہ پڑھیمان، جلد والے لوگوں کے لئے مفید ہے۔

پلسٹیللا۔ دیر سے اور کم حیض والی لڑکیوں میں۔ کھلی ہوا میں آفاقہ۔ گرمی میں زیادتی۔

پاس نہ ہو۔ چربی سے نفرت کرے۔ بوئیاں جونیلی یا نیلی مائل سرخ ہوں۔

کروٹلیس۔ گنگوٹن ہونے کے قریب۔ مزمن لیکن بہت گرم موسم میں نہ ہوں۔ ناہلاقی کی وجہ۔

یمس۔ بوئیاں اور کٹے پھٹے ہاتھ۔

ایسڈ ٹائٹرک۔ بچوں میں بوئیاں۔ پاؤں کا پسینہ۔ بچوں میں دیکھن پیدا کرے رلیض۔

چربیلی اور نکین چیزوں کو پسند کرے۔

اندھا مال زخم کے بعد کا نشان (زخموں کے نشان بھی دیکھئے)

مکڑی کا جالا۔

گریفائیٹس۔ جلد پر متواتر مکڑی کے جالے کا احساس۔

زنکولس۔ جیسے کہ چہرہ مکڑی کے جالے سے ڈھانپا ہوا ہے۔

جسم یا چہرے کا رنگ۔

آئیوڈم۔ جسم کے رنگ کو نکھارنے کے لئے شاندار دوائی ہے۔ چھ ماہ تک ہر پندرہ روز کے ... طاقت میں استعمال کیجئے۔

کاسٹیکم
لائیو پوڈیم } دی گئی ترتیب میں ۲۰۰ طاقت میں
ہر ہفتہ ایک پڑایا استعمال اگر آئیوڈم ناکام ہو جائے۔
سارپیرنٹ۔ رنگ کو نکھارنے کے لئے۔

چند ٹپاں۔

فیرم پکریٹ۔ چند ٹپاں زرد بھوسے رنگ والی۔
تھو جا۔ چند ٹپوں کے لئے چوٹی کی دوائی ہے بیرونی طور پر مد رنگ لگائی جائے۔
سلفر۔ دباؤ کی وجہ سے گئے اور چند ٹپاں۔ اگر ایک جوتا کہیں زیادہ دباؤ ڈالے بہت بڑی
چند ٹپی بن جائے یا سوجن ہو جائے۔

زنکولس۔ جب چند ٹپاں پھوٹنے پر دکھیں۔
انگیشیا۔ پروردہ جیسے کر زخم ہو۔
اٹم کروڈ۔ چند ٹپاں سوجی ہوئی۔ پاؤں کے نمونوں کی جلد پر سینگ جیسی جگہیں۔ نمونوں
کی شدید حساسیت، تمام جسم کی استقامتی سرجن۔ نمونوں اور پاؤں کی جلد مڑی ہو۔
نیٹرم میور۔ چند ٹپاں۔ پروردہ نشان۔

بیرونی ہیجان کی وجہ جلد کی حاد سوزش

کیلنڈولا۔ جب بیرونی زخموں کی وجہ سے جوارس کی قسم کے ہوں ۲۰ طاقت میں کھلائے
اور ۴ حصے پانی ایک حصہ مد رنگ لگا کر کھائیے۔ ناسور کے نتیجے کے طور پر جلد کا برباد ہو جانا۔

آرنیکا مانٹ - لاطھی کی چوٹ سے آٹے ہوئے زخموں کی سوزش۔ مددکنچر لگائیے میرونی طور پر اور ۱۰۰۰ طاقت کی ایک خوراک ہر آٹھ گھنٹے بعد دیجئے حتیٰ کہ افادہ شریع ہو جائے، پھر سر چیتے روز بعد ایک خوراک دیجئے۔

ایپس ایم - حرارت کیوجہ سے یا زہریلی خارش جو ٹھنڈیا گرمی کی وجہ سے ہو۔ ملن - سرخی اور جلد کی سوزش، یہ پارہ یا کاربالک لائیڈ کو پکڑنے سے بھی ہو سکتی ہے۔

کیتھرس - پیشاب کی تکالیف کے ساتھ ملن - پیشاب جلندار اور اثر انداز۔ گرمی کی خارش۔ رشاکس - پارہ یا کاربالک لائیڈ پکڑنے والے لوگوں میں زہریلی خارش۔ دھوبی۔ رنگریز یا کانکن کی طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوں۔

کھال کا اتزنا۔ بے رنگ ہونا۔ (دیکھئے کھال اتازنا)

آرسینکیم البم - جلد دھبوں میں سیاہی نائل یا نیلی۔

سلفیورک لائیڈ - جلد پر سیاہ یا نیلے دھبے۔

فاسفورس - پیٹ پر زرد یا بھورے دھبے۔

آئیوڈیم - جب زرد جلد بھوری ہو جائے۔

لیکس - کاٹے جانے یا بخار کے بعد جلد نیلی ہو جائے۔ جلد جامنی۔

ایتھوزا - سیاہ یا نیلے دھبے تمام جسم پر یا تمام جسم سیاہ یا نیلے رنگ کا ہو جائے۔

فاسٹولا کا - جلد سے کے رنگ کی ہو جائے۔

ٹائپیکم - بازو یا ٹانگ تک سرخ لائیں یا دھاریاں جائیں۔

آرسینکیم آئیوڈیم - بیضے میں جلد کا سیاہ ہو جانا۔

آرٹھریس درس - جب پچش کے بعد جلد نیلی ہو جائے۔

کونیم - سبز جلد۔

لائیکوپوڈیم - جگر کے دھبوں کے لئے مخصوص ہے۔

کلائی آرٹینکم - کھجلی اور کڑھ کے بعد جلد کا رنگ بدل جائے۔
نیٹرم میور - بھوری جلد

سلفر - جب جلد ٹھنڈی معلوم دے۔ مریض عادت کے لحاظ سے گندہ ہو۔ نہانے سے نفرت ہو۔
برومیرس و لکیس - زرد چہرہ گندہ بھو این - رخساریں دھنسی ہوئی۔ اندر گئی ہوئی آنکھیں نیلی
یا سیاہی مائل بھورے حلقوں میں۔

بسمتھ - چہرہ مردوں میں زرد۔ آنکھوں کے گرد نیلے حلقوں کے ساتھ۔
کیپیکم - رخسار سرخ اور گرم یہ زردی کے بدلیں یعنی کبھی سُرخ اور گرم ہوں کسی زرد ہوں۔
چہرے پر سُرخ نقطے سے ظاہر ہوں۔

چائٹنا آف - چہرہ زرد۔ مرجھایا ہوا۔ آنکھیں اندر دھنسی ہوئی اور نیلے کن روں کے اندر ہوں۔
سٹنا - چہرہ زرد مردوں اور بیماریوں میں۔ منہ کے ارد گرد سفید اور نیلا اور آنکھوں کے بیچ گہرے گہرے۔
سیپیا - چہرہ اور آنکھیں سفید پردے کی زردی۔ چھاتی پر زرد دھبے۔ رخسار اور ناک کے
اوپر والے حصے میں زرد کاٹھی۔

بہرے کا بد صورت ہو جانا۔

دیر یو لینم - { چھوٹی جھپک کی درجہ سے چہرہ بد صورت بلے عرصہ تک دیر یو لینم ۲۰۰
سارینیا پی { ہر پندرہ روز بعد اور سارینیا پی ۲۴ دن میں تین دفعہ دیکھئے۔
سلیشیا - { بہرے کے دانوں اور زخموں کے نشانوں کی درجہ سے
کلکیریا فلور { جو ناسور اور چھوڑوں سے چھوڑ گئے ہوں۔

اگر میا - دیکھئے پھنیاں

سلفر - شدید ملین اور خارش کے گز رہا جو دھونے اور کھرچنے سے زیادہ ہو۔ جلد کھری اور موٹی
خشک اور پرت دار جسم کے سب سوراخ آگ کی طرح سرخ ہوئے اور کان وغیرہ بھی سرخ جسم سے

بہت بدبودار ہو آئے۔ معدہ میں ڈوبنے کا احساس۔ ہاتھ اور سر گرم۔ بستر کی گرمی۔ سرانے کی گرمی سے ہیمان اور غارش زیادہ ہو۔ بالوں کے رنگ لگانے سے اگزیمیا۔ مریض عموماً گندہ اور بے سلیقہ ہوتا ہے۔ نہانے دھونے سے بے رغبت رہے۔

گر لیفیٹس۔ بہنے والا اگزیمیا۔ کھرچنے پر شہد کی طرح کا چپکنا والا مادہ خارج ہو۔ ہاتھوں چہرہ۔ ہونٹ اور کانوں کے پیچھے جلد گلنے کے بعد دکھے اور سخت ہو جائے۔ گرمی سے اور رات کو زیادہ ہو۔ عاد کیسوں میں بخلی طاقت دن میں پھر دفعہ۔ مرن کیسوں میں ۲۰ یا ۱۰۰ x دبجے۔ اول الذکر ہفتہ ایک خوراک جبکہ موخر الذکر ایک ماہ بعد ایک خوراک دیجئے۔ اخراج چپکنے والا۔ چمٹنے والا اور لیس دار ہوتا ہے۔

وسٹاکس۔ خشک اگزیمیا سرخی اور سوزش کے ساتھ ناقابل برواشت غارش اور ملن کے ہمراہ جو گرمی سے زیادہ ہو۔ پھوٹے بچوں کی کھوٹری کا اگزیمیا۔ پھنسیاں گڑھے دار جن میں پانی کی طرح کا مواد انتہائی بدبودار خارج ہو جو ریت سے بنائے گڑھوں سے پیپ کا رجحان ۲۰ طاقت ہفتہ میں ایک بار یا ۱۰۰ x طاقت کی ایک خوراک مہینہ بھر کے لئے کافی ہے۔

اٹریکالیورٹس۔ عاد کیسوں میں جب ملن اور غارش ہو۔
لووسٹا۔ ہاتھ کی پشت پر اگزیمیا۔ نانبائیوں کا اگزیمیا۔ گھٹنوں کے اندر کی طرف مندار اگزیمیا جو پورے چاند میں ظاہر ہو۔ اکثر عورتوں میں جن کو پُر در حیفض آئیں۔

کالی بائیکرومیکم۔ کھوٹری کا اگزیمیا، گارٹھے ذرنی پھلکے جن میں سے زرد۔ گارٹھا اور چپکنے والا اور بہنے والا مواد۔

الیومنا۔ خشک اور بہت ہی پُر ہیمان اگزیمیا قبض کے ساتھ۔

سکوکم چپک۔ اگزیمیا۔ غارش۔ الزہی وغیرہ یا پتی اٹھلنا۔

سکوٹاوی۔ بالوں والے حصوں میں اگزیمیا۔ پھنسیاں قریب قریب ہوں۔ پیپ والا اگزیمیا جو

خشک ہونے پر سخت پھلکے ہوں اور ٹوپی کی طرح سخت ہو جائیں۔

نیرٹم سلف۔ دمر کے ہمراہ ماس لینے اور جلد کی علامات کے ساتھ۔

سورائیم۔ کھوڑی اور چہرے پر خشک اور پرت دار اگزیمیا کھوڑی پر پھلکے۔ بال گر جائیں
 نازج ہونے والا مادہ پھلکوں کو اوپر اٹھائے اور نئے گڑھے سے ظاہر ہوں۔ رات کے وقت اور
 بستر کی گرمی سے زیادتی۔ مریض بالوں۔ کم حوصلہ اور ناامید ہوتا ہے۔ پتلا۔ بدبودار۔ چمچے والا
 گلے شرتے گوشت کی بدبودار۔ حسی اور ہیار کر دینے والی بودا مواد درے۔ یہ سورائیم کی علامات
 کے خلاف ہے جو ٹھنڈے زیادہ ہو۔

مینگنم۔ جلد تندرست نہ ہو۔ معمولی سے زخم یا خراشیں یا سور بن جائیں۔

انٹھرم۔ کھوڑی۔ آرناسل اور شرمگاہ پر پھنکیاں۔

میرسلفر۔ جلد کی تہوں میں نندار پھنکیاں جوڑوں کے مٹنے والی جگہوں پر خارش۔ جلد پر
 پیپ بن جائے اور جلا پھوڑے بنیں یہ پارہ یا جھٹ کو پکڑنے یا پارے اور جھٹ کا کام
 کرنے سے ہو۔ پھوڑے پر حساس ہو۔ خشک ٹھنڈی ہواؤں میں زیادہ۔ نندار موسم اور گرمی میں افادہ۔
 پیٹرولیم۔ زردی نائل بنر موٹے موٹے پھلکے چہرے اور گردن پر جن میں بہت مواد ہے۔ یہ غنی
 جیروں والے اگزیمیا کو ٹھیک کرتا ہے۔ جس میں معمولی یا بالکل مواد نہیں ہے۔ اگزیمیا خشک پرت دار
 یا نندار بوگرمیوں میں غائب ہو جائے، سردیوں میں یا سرد موسم میں دوبارہ ہو جائے۔ یا تھوڑی کاشت
 یا کانوں کے نیچے اگزیمیا پتلا پانی جیسا مواد ہے۔

سٹرپٹوکوکین۔ بار بار کاٹا ہونے والا اگزیمیا، خون بہنے والے چہرے مریض خارش کرنے
 میں لطف اٹھاتا ہے ایک ایم یا سی ایم طاقت میں دیکھے۔

میریریم۔ ناقابل برداشت خارش جو بستر میں اور پھوڑے پر زیادہ ہو۔ کافی زیادہ خون آب
 مواد ہے۔ سرموٹی پھوڑے۔ پھلکوں سے سر بھرا ہوتا ہے جس کے پیچھے پیپ کی طرح کا
 مواد ہے۔ بال ایک دوسرے سے چپکے ہوئے اور اکٹھے ہو جائیں۔ پیپ کچھ دیر بعد بدبودار
 بن جاتی ہے اور کپڑے پیدا کر دیتی ہے۔ بالوں والی جگہ پر اگزیمیا۔ ۲۰-۳۰ میں دیکھے۔
 کلکیر یا کارب۔ ہر وقت شدید خارش صبح کے وقت بستر میں زیادہ۔ احساس جیسے کہ نندار اور ٹھنڈی
 جوا میں بنے ہوئے ہے۔ بوائوں میں قبل ہو نیکار جان۔ کلکیر یا کارب کا مزاج رکھنے والے بچوں میں اگزیمیا
 ۲۰ طاقت میں دیکھے۔

لونا۔ جلدی بیماریاں۔ اگزیمیا۔ جو پورے چاند میں زیادہ ہو۔

ٹیلیوریٹیم۔ ہاتھوں اور پاؤں کی خارش۔ داد کی طرح کی چھنسیاں۔ گولائی میں گہرے زخم بدبودار اخراج کے ہمراہ۔ نائی کے آسترے کی لاگ سے خارش۔ ڈنگ لگنے جیسی کانوں کی پشت پر اگزیمیا۔ اور کھوڑی پر اگزیمیا۔ پاؤں کا بدبودار پسینہ۔

لائیکوٹوڈیم۔ کانوں پر اور ان کے پیچھے اگزیمیا۔

کلکیریا سٹلف۔ بچوں میں خشک اگزیمیا۔ زرد پیپ دار پرت اور پھلکے۔ بالوں پر چھوٹے چھوٹے پھوٹے جن کو کھرچنے پر خون ہے۔

آرسینکیم البم۔ جلن اور بے چینی کے ساتھ اگزیمیا۔ خارش۔ جلن اور سوزش جو سردی اور کھرچنے پر زیادہ خشک کھردری پرت دار جلد گرمی اور گرم خردوات سے افاقہ توڑی کبھی بھی سخت کرنے پر شدید کھردری انگلیوں میں اگزیمیا اور انگلیوں کے سروں پر چھیرے۔ کھوڑی اور چہرے پر پرت دار بھوڑے۔ خراشدار اور بدبودار مواد خارج ہو۔ شدید جلن اور خارش۔

انٹیم کروٹ۔ معدہ کی خرابیوں کے ساتھ اگزیمیا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے حساس۔ جب بستر میں گرم ہو تو خارش۔ موٹے اسخت اور شہد کے رنگ کے پرت۔ بہت زیادہ جلن رات کو زیادتی۔

کالی سلف۔ دانے جو زرد پیپ دار اور بانی کی طرح کے مواد سے بھرے ہوئے ہوں۔ ہاتھوں اور انگلیوں کے اندر کی طرف بہت زیادہ۔ ہونٹ پھٹے ہوئے۔ ٹھکائیوں کی زبردست خواہش جس کی کلکیریا سٹلف۔ زنگولس بلب۔ جلد کے موٹا ہونے کے ساتھ اگزیمیا اور سخت، سینک جیسے پرتوں کا بننا۔

سٹیف سگیٹا۔ اگزیمیا۔ زرد خراشدار مواد پرتوں کے پیچھے سے ہے۔ مواد کے لگنے سے نئے پھوٹے بنیں۔ یعنی جہاں جہاں مواد لگے نئے پھوٹے بن جائیں۔ تر خارش۔ سرور کانوں کے پیچھے بدبودار چھنسیاں۔ کھرچنے سے جگہ بدل جائے لیکن مواد زیادہ ہے۔

نیٹرم میور۔ بالوں کے کناروں پر خاص طور پر سر کے پچھلی طرف اگزیمیا۔

مانسینیل۔ جلد کی سوزش بہت زیادہ پھالوں کے ساتھ۔ چپکنے والا خون آپ مواد سے پرت میں بھاری بھورے پرت اور تھیں بنیں۔

کلیٹش - سوزش دار اور پھوڑوں والا اگر کیا۔ پیپ دار اور پانی کی طرح کا مواد سے جس پر تدار
 تہیں بنیں جو سوجی ہوئی ہوں۔ بڑھتے چاند پر اور خشک گھٹتے چاند پر بگڑی کھردری اور مضبوطی سے چکنے
 والے پر ت کھوڑی پر کھال اُدھڑنے کے ساتھ زرد مواد ہے۔ خارش بستر کی گرمی اور دھونے پر زیادہ ہو۔
 کاچلیکم۔ بوزمھوں میں سرخ اگر کیا۔ بنیر شراب نوشوں میں نمایاں یورک حالتوں یا نظام کی کھداری
 حالتوں میں۔

اگر کیس میکس۔ جلن یکٹن اور شدید خارش کے ساتھ اگر کیا سوئوں سے پھیندنا جیسے درد
 جلد میں بجلی لگنے کے سے درد۔ جلد میں گہرے چھوٹے چھوٹے دانے یا گہرے سردیوں میں اگر کیا
 شدید اور بڑھوں کے ہمراہ۔

تھو جا۔ سائیکوٹک مریضوں میں سوزاک کے دب جانے یا ٹیکے لگانے کے بعد اگر کیا۔
 گندی بھری جلد۔ خارش والی پھنسیوں سے بھری ہوئی۔ اگر کیا کالیکیوں کی وجہ سے دب جانا
 یا جب ٹیکوں کی وجہ سے اگر کیا ہو جائے۔

ایکسر نری۔ ہاتھوں اور پاؤں میں گھٹنوں اور جوڑوں کے پھیلنے والی جگہ پر گہرے چیرے اور گڑباز
 اور بہت ہی گہرے گھاؤ گہرے نیلے چھوڑے جو جلنے سے ملیں۔ جلد خشک، پر ت دار۔ پھٹی ہوئی کس
 حصہ پر کافی سوزش۔ یہ گندھک کے غلط استعمال کو ٹھیک بھی کرتی ہے۔

یٹو بر کو لینٹم۔ بطور عمل انگیز دوائی کے جب ابھی طرح سے منتخب کی ہوئی دوائیاں ناکام ہو جائیں۔
 مریض نا امید اور غمگین۔ بہت جلد نزلہ زکام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آگ کی طرح سرخ جلد،
 دکھن چھین مکے ساتھ تمام جسم پر اگر کیا۔ خارش رات کے وقت زیادہ۔ جب پرے اتار دیا ہو
 تو شدید خارش ہو۔

گن پاؤڈر۔ بہت بڑی اینٹی سوزک دوائی ہے اور خون کو صاف کرنے والی بہت ہی اہم
 دوائی ہے۔ یہ جلد کی بہت سی خرابیوں کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ۳x طاقت میں
 لمبے عرصہ تک دی جانی چاہئے۔

جلد، ہاتھی کی کھال جیسی

ہائیڈرو کوٹائل - جب انسانی جلد، ہاتھی کی کھال کی طرح ہو جائے۔ اگزیمیا، کوڑھ
پھنسیاں اور دوسری جلدی بیماریوں کے لئے بھی

سوکھا مسان - لاغری -

کلکیر یا کارب - جلد کی کمزوری پٹے بڑھا ہوا۔ جلد میں بھریاں پڑ جائیں۔ ہڈیاں مکمل نہ ہو
پائیں اور رُخنا چھوڑیں۔ دانت نہ نکلیں۔

ایروڈیم - ٹانگوں سے کمزوری شروع ہوا اور آہستہ آہستہ اوپر کو آئے۔

کلکیر یا فاس - یہ سوکھا مسان کے لئے شاندار دوائی ہے۔ جلد کمزور ہو جاتی ہے۔
جلد خشک اور بھریاں پڑی ہوئیں۔

ٹیوٹرکولینیم - یہ سوکھا مسان کے لئے شاندار دوائی ہے۔ اور بطور عمل انجینر دوا کے
طور پر ضرور دینی چاہیے۔ اور ہر ماہ ۲۰۰ طاقت میں دہرائی جائے اس دوائی سے تین دن پہلے
اور تین دن بعد کوئی دوائی نہ دی جائے۔

نیٹرم میور - گردن اور بازوؤں کی کمزوری جو نیچے کی طرف بڑھے۔
ایوڈیم - جب بچہ چڑچڑاہوا اپنے قریب کسی کو بھی نہ آنے دے بہت زیادہ کھائے لیکن
پھر بھی کمزور ہی رہے۔

فاسفورس - بے قاعدہ - حیض کے بعد کمزوری۔

ہائیڈراسٹس - چھپک کے بعد کمزوری۔

سیکل کار - لاغر جلد کمزور - غیر متحدہ جلد - مامنی نیلی نیلگوں مائل جب دوران خون خراب
طور پر کمزور ہو۔

آرم میور - آتشک کی وجہ سے کمزوری۔

پیلیم - کئی خون کی وجہ سے کمزوری۔

جلد کی شاذ و نادر بیماریاں

تھوڑے دباؤ پر جسم پر آبلے پڑ جائیں۔

زنکولس۔ اس کے علاوہ مرض کو ٹھیک کرنے کی اکلوتی دوائی ہے۔

بیمھنیاں۔ (ایگزیمیا بھی دیکھئے)

گلکیر یا کارب۔ چھپاکی یا الرجی جو تھوڑی سی بھی تازہ ہوا لگنے پر غائب ہو جائے۔

رشاکس۔ بالوں والی جگہوں پر چھپاکی یا الرجی۔ باقصور کی تحصیلوں پر پھنسیاں جو مندرل ہونے کے بعد ایسی جگہ پر نہ نکلیں جب خارش کے جہاز تپ لڑے اور گنٹھیا ہو۔ بڑے بڑے پانی کے پچھالے۔ مرد اور عورت کے جنسی اعضاء پر پھنسیاں۔

کلورال۔ بڑے بڑے دانے جس طرح کہ استقامتی سوزش ہو۔

سارپیر ملا۔ حیض کے دوران خارش والی پھنسیاں۔ داہنے چڈے میں حیض کے دوران پھنسیاں نکل آئیں۔

لائیکو پوڈیم۔ کھوڑی پر پھنسیاں۔ چہرے پر کانوں کے پیچھے پھنڈوں میں ہوں اور بال گر جائیں۔ پانی جیسا یا زردی مائل مواد ہے۔ نوزائیدہ بچوں کا اگر گیا۔

نیرٹم کارب۔ انگلیوں کے سروں اور انگلیوں کے جوڑوں پر پنجوں پر بھی پھنسیاں گر گئے دار پھنسیاں جو پھٹ جائیں اور پھر بڑے بنادیں۔

کارڈس میریانس۔ پھنسیوں کے قطع یا ٹکڑے جو جوف سینہ کے نچلے حصہ کو ڈھانپ لیں۔ جگر اور دل کی خرابیوں کی وجہ سے سینے کا قطع۔

کوڈلیم۔ آتش کی گوشت کھانے والے جن سے بہت بری بو لاناخوں آئے۔ سرخ پھنسیاں جو تانبے کے رنگ میں تبدیل ہو جائیں۔

سورائیم۔ پرت دار پھنسیاں جو گرمیوں میں غائب ہو جائیں اور سردی میں دوبارہ آجائیں کہنسیوں

اور گھٹنوں کے جوڑوں پر پھنسیاں شدید خارش جو بستر کی گرمی اور کھجلا نے پر بڑھے۔ پھنسیاں یا الرجی گرمیوں میں غائب اور سردیوں میں دوبارہ نمودار آئے۔

کالی میور۔ پھنسیاں۔ پھوڑے۔ سفیدی مائل مواد کے اخراج کے ساتھ اور سفید زبان۔
سیلیم۔ جلد کی تہوں میں خارش اور جوڑوں کے قریب خاص طور پر پٹنوں کے جوڑوں میں۔
تھو جہا۔ تمام جسم پر پھنسیاں۔ گھٹنوں کے قریب پیپ دار پھوڑے۔ خارش والی پھنسیاں جن کو سہلانے سے افادہ ہو۔ رات کو زیادہ تکلیف ہو۔

کارلونیئم سلف۔ پھنسیاں۔ پھلکے۔ اگزیمیا۔ کھوڑی پر خارش۔ مندر پر تدار پھوڑے۔ دیکھیں اور پُر درد ہوں۔ کھوڑی کی پُرسوزش پھنسیاں۔

ایلیٹھس گلڈنڈلوو سا۔ قلعوں میں پھپھکی آئے۔ آہستہ آہستہ ظاہر ہو۔ جلد جانتی نظر آئے۔
اگر کیس ایم۔ بالوں کی کھوڑی کی خارش خاص طور پر صبح کے وقت۔ خارش کرنے کے بعد،
خارش زدہ حصوں پر ریت کی طرح ٹھنڈا پڑ جائے۔

انتھرا کوکالی۔ کھجلی۔ پرانی خارش۔ مزمن داد۔ تھنوں کے چیرے اور پھوڑے جو لورس چاند میں اچھے ہوں۔

سلفر۔ بے چینی یا تکلیف گرمی سے زیادہ اور کپڑے اتارنے اور بستر سے باہر پاؤں ٹکانے پر افاقہ
پلیٹیللا۔ سلفر کی تمام علامات کے ساتھ خارش لیکن مریض جلد رنے والا اور جھجھکا۔ ہمدردی
کو پسند کرتا ہے، معدہ یا پیشاب کے آلات کی سوزش۔

کروٹن ٹگلیم۔ گرٹھے دار یا گہری پھنسیاں۔ شدید جلن اور خارش اور کئی چھوٹے چھوٹے پھوڑے قریب
ان کے دہنے سے خشک نہ رکنے والی کھانسی ظاہر ہو۔ آنکھوں کے گرد۔ کھوڑی پر خاص طور پر آڑھ ناسل
خضبیوں کی پھیلی اور آڑھ ناسل پر پھنسیاں اور خارش۔ خارش کرنا چاہے لیکن سختی سے دیکھ کر چونکہ
یہ حقے بہت حاس ہوتے ہیں۔

ڈوکیکوس۔ پھنسیوں کے گرد خارش۔ رات کے وقت اور کھرچنے پر خارش میں زیادتی۔
لوہیلیا انفلیٹا۔ انگلیوں کے درمیان خارش اور پھنسیاں۔ ہاتھوں کی پشت پر ہوں۔ بازوؤں پر پھرنے پھرنے
آبوں پر شش ہو۔

اولینڈر۔ کھوپڑی پر شدید غارش جیسے کہ جوڑوں سے ہو۔ کھرچنے پر چھٹنے والے درد۔ بدبودار
بو والی پھنسیاں۔

روٹا۔ گوشت کھانے پر چھپاکی ہو جائے۔

اینا گلوس۔ ہاتھوں کی پھنسیوں پر غارش اور پھنسیاں۔ وہ دوبارہ اسی جگہ پر ظاہر ہوں
جہاں سے مندرجہ ہوئی تھیں۔

کاسٹیکم۔ پھنسیوں کے دپنے سے نایب۔ سرد درد اور اعصابی دردی شروع ہو جائیں۔
الیومنا۔ پھنسیاں اور غارش۔ جلد کی غارش بغیر پھنسیوں کے بھی کھجلاکتی اگر خون نکلے
کھجلانے پر پرت دار نہیں یا پھلکے سے نہیں۔ پہلے پہل کوئی پھنسی نہیں ہوتی اور جب جلد پر
غارش کی جاتی ہے تو پھلکے یا پرت بن جاتیں۔ ٹھیک ہونے یا زخم مندرجہ ہونے کے وقت غارش
زیادہ ہو۔ یہ صوف اس وقت کم ہوتی ہے جب جلد دکھے۔ مندرجہ ہوا اس سے خون بہے۔ بستر کی
گرمی سے غارش میں اضافہ ہو۔

ایپس میل۔ جسم پر اچانک پھپکاکی ظاہر ہو۔ لمبی زردی مائل سفید پھنسیاں جلد سے اوپر
کواٹھیں، ناقابل برداشت غارش کے ہمراہ جملن اور ڈنگ لگنے سے درد۔ پھنسیاں زکام کا نتیجہ
کے طور پر یا وقفے درجہ کے دوران ہو سکتی ہیں۔

گرفیٹیس۔ تمام جسم پر غارش پھنسیوں کے بغیر یا پھنسیوں کے ہمراہ رات کے وقت
گرم بستر میں زیادہ ہو۔ داد اور اگزیمیا میں سے لیس دار مواد ہے۔

آر سینکم البم۔ ایپس ہی کی طرح لیکن پھنسیاں ایپس سے چھوٹی ہوتی ہیں۔ خاص طور پر جب
پھلی کھانے سے یہ مرض ہوتی ہو۔ ٹرینٹینا اور کوہوا استعمال کیجئے۔ جب خاص طور پر شیل بھلی
کے کھانے سے پھپکاکی ہوئی ہو۔

ڈولکامارا۔ جسم پر پھنسیاں جو گڑھے بنائیں۔ پھلکے وغیرہ بنائیں۔ مکھن اور غارش کے ہمراہ۔
کھوپڑی پر پھنسیاں جن میں غارش لیکن غارش کرنے پر آرام نہ ہو۔
کالی بروم۔ جب اعصابی امراض کے ساتھ پھپکاکی ہو۔

ہورانی۔ خارش ہڈیوں کے اُبھرے ہوئے حصوں پر پھنسیاں۔ ڈاڑھ کی ہڈیوں وغیرہ پر انگلیوں کے سروں پر تپکن۔

مینریم۔ جسم کے بیرونی حصوں کی خارش۔ اعصابی احساس۔ کاٹنے والی جھنناہٹ والی۔ کھرچنے والی خارش ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلے۔ ہرے موٹے چمڑے چمکوں سے برجن کے نیچے گاڑھی سفید پیپ اکٹھی ہو جائے۔ بال آپس میں بڑ جائیں۔

سٹر امونیم۔ بہت ہی گہری سرخ چھپاکی جو سرخ بخار سے مشابہ ہو۔ چمکدار جو جلد کی سرخی۔ زنگولس بلب۔ ماتھ کی تھیلیوں پر نیگیوں یا سیاہ رنگ کے چھالوں جیسی پھنسیاں۔ بیریم سلف۔ کھوڑی کی خارش۔

اینا کارڈیم اور۔ جلد کی خارش شدید ملین اور خارش جو کھجلائے پر پڑھے۔ ایتھوزا۔ ناک کی نوک پر داد کی پھنسیاں۔

سفلیئم۔ تانبے کے رنگ کے پھنسیوں کے قطعے۔

لووڈسٹا۔ چھپاکی کے ساتھ اسہال اینٹھن اور نیچے کی طرف دباؤ۔

سیسیا۔ چھپاکی جو کھلی ہوا میں زیادہ ہو۔ ہنٹوں کا کینسر نفعوں اور ٹیکوں کا کینسر۔

تھائیرائیڈیم۔ جلد بہت سرخ بہت زیادہ خارش ہو۔ جلدی بیماری جس میں چھوٹے چھوٹے پھلکے جلد پر سے اُتریں۔

ریو میکس۔ کھلی ہوا میں زیادتی۔ خاص طور پر کپڑے اتارتے وقت۔

ونکا مائینر۔ کھوڑی۔ چہرہ اور کانوں کے نیچے پھنسیاں جن سے بدلوائے۔ یہ ایک پرت نادیتی ہے جس کے نیچے گلی سٹری پیپ جمع ہو جاتی ہے۔ بال گر جاتے ہیں اور بھور بال انکی جگہ اُگتے۔ سٹر پیٹو کو سین۔ جلدی پھنسیاں اور پھنسیاں جب دوسری ادویات ناکام ہو جائیں۔ گرھے زردی پھلکوں کے ساتھ جو بعد میں نیچے سے خون بہنے سے سیاہ ہو جائیں۔

پکس لیکو میڈا۔ ماتھ کی پشت پر پھنسیاں جن پر رات کے وقت ناقابل برداشت خارش ہوا اور کھجلائے پر خون بہے۔

بریٹا کارب - بچوں کی کھوپڑیوں پر خشک پھنسیاں - کھوپڑی پر بندار چھلکے - بالوں کا گرنا -
بچے ذہنی کمزوری کے ساتھ بونے قد کے ہوں -

ایسٹاکس ایل - مزمن قسم کی چھپاکی - سارے جسم پر چھپاکی خارش کے ہمراہ تنکا ہو کر زیادتی -
پیٹرولیم - پھنسیاں کھیلنے پر زیادہ خارش تھی اگر جلن ہو - خون بہنے پر نافقہ ہو - ہاتھوں کی جلد
کھردری، بھٹی ہوئی - انگلیوں کے سرے کھردرے اور ہر موسم میں مایں پھٹ جائیں - مرد اور عورت
کے اعضائے ناسل پر پھنسیاں -

بہ مھنسیوں کا دب جانا -

اٹپس - پھنسیوں کے دب جانے سے دماغ کی سوزش - چھوٹا سانس - استقاء گیس -
دماغ کے پردوں میں پانی کا آجانا -

گلگیر یا کارب - پھنسیوں کے دب جانے سے مرگی -
سلفر - تپکن دار دانت درد - اسہال - دمریرمب پھنسیوں کے دبنے سے ہو -
کیو پریم میٹ - پھنسیوں کے دبنے سے دورے یا تشنج -
گرنیفائیس - سر درد - جکڑ - کمزوری اور بھوک کا نہ رہنا -

سرخبادہ

اکونائٹ :- بہت ہی ابتدائی درجہ میں جھنجھٹا ہٹ اور جلن جب جلد مُرخ ہو چکے - گرم -
اور سُوجی ہوئی ہو -

پیسی فلورائٹک - سرخبادہ کے لئے مخصوص ہے - مد رنگ میں چار یا پانچ قطر سفی غور کرئے -
بیلادونا - جلد خشک - ہموار اتنی ہوئی - ابتدا میں سرخ چمکدار جلد - چہرے اور سر کے
سرخبادے خاص طور پر دائیں طرف کے تیز کاٹنے والی در دیں یا متاثرہ حصوں میں تپکن - بخار یا
بعض اوقات بڑیان -

ایپس میلیفیکا۔ گلے کا سرخبادہ کافی سوزش کے ساتھ۔ جسم کے کسی حصہ کی سوزش یا اپریشن کے بعد سوزش بھولی ہوئی اور استقامتی سوجن شدید درد کے ساتھ جس میں جلندار اور ڈنگ لگنے، نیسے درد ہوں۔ ٹھنڈی چیزوں کی خواہش یا ٹھنڈی بیٹیوں سے ان حصوں کو افادہ ہو کم مقدار میں شلاب اور اکثر البیون والا۔

آرینکم البم۔ سرخبادوں کے اچانک حملے کمزوری کے ساتھ بے چینی اور جلن دار درد۔ تھوڑے تھوڑے دھنوں پر تھوڑی تھوڑی مقدار میں ٹھنڈے پانی کی پیاس۔ مرض ایک حصہ جسم سے دوسرے حصہ پر چلی جائے۔ استقامت قے اور اسہال۔

بوریکس۔ چہرے پر سرخبادہ چہرے پر مکڑی کے جالے کا احساس۔ کینتھرس۔ گڑھے کی قسم کا خاص طور پر چہرے کا۔ ناک سے شروع ہو بے چینی اور جلن اور ڈنگ لگنے۔ جیسے درد۔ جلد کی شدید سوزش بڑے بڑے پھالے بننے کا رجحان۔ چھوٹی پھلیاں اکٹھی ہو کر بڑا جھالا بنادیں۔ شدید بخار۔ کروٹلیس ایچ۔ نیلے نظر آئیں ٹیکے لگنے یا کیڑوں مکوڑوں کے کاٹنے کے بعد کے سرخبادہ کے لئے مفید ہو۔

رسٹاکس۔ ٹائیفائیڈ کی علامات کے ساتھ گڑھے دار سرخبادہ سرخ کی بجائے گہری جلد ہموار ہونے کی بجائے کھردری خشک کی بجائے نمدار۔ شدید جلن اور خارش۔ کم اور ناگوں میں درد۔ بالوں والے حصوں کے کنارے اکثر مبتلا ہوتے ہیں۔ اسہال کے ساتھ۔ بے چینی بیہوشی میں شدید درد۔ بندھنوں اور جوڑوں میں شدید درد۔

لیکس۔ گرائیڈا جامنی رنگ کی جلد۔ قوت حیات کا بہت دب جانا۔ ذہنی کمزوری۔ چہرہ بھولا ہوا اور سرخ جب بیلا ڈونا کام ہو جائے۔ متاثرہ اعضاء میں گنگین کا خطہ ہو۔ جال کی طرح کے سیخ خاص طور پر بلوٹ ہوں۔

ایکینٹیا۔ سرخبادہ بہت ہی پُر درد پھوڑوں کے رجحان کے ساتھ۔ 2×2 قطر کی صورت میں میں استعمال کیجئے۔

ہیپر سلفر۔ جب پیپ پڑنے کا رجحان ہو تو سلفر دی جائے۔

سیلشیا۔ جب پھوڑے ٹھیک ہونے میں ناکام ہو جائیں جبکہ پیپ خشک ہو چکی ہو کیلئے شاندار دوائی ہے۔

سلفر۔ بطور عمل انجینئر دوائی کے مفید ہے۔ تبدیل ہونے والے کیسوں میں اور طول پکڑنے والے کیسوں میں یہ دوائی انتہائی عمل انجینئر ثابت ہوتی ہے۔

گر فیٹش۔ بار بار ہونے والے مزمن حالتوں میں انتہائی مفید ہے۔

روٹا اینڈ فاسفورک الیڈ۔ جب زخموں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں یعنی زخموں کے ساتھ ہوں۔

دیکھے۔ بوائیاں۔ سردی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں پھٹنا۔ دیکھے تیل والی جلد۔ گریس والی۔

سخت جلد

انٹم کروڈ۔ موٹی بھرت۔ شہر کے رنگ والی جلد۔ جب بستر میں گرم ہو جائے

ہائیدروکونائل۔ جلد ہاتھی کی کھال کی طرح موٹی ہو جائے۔

زنکولس بلیب۔ اگر نمایاں جلد سخت پڑوں کی صورت میں موٹی ہو۔

داد

رٹاکس۔ خارش والی داد کے لئے موزوں دوائی ہے۔ جلندار اور بھینٹا ہٹ والی درد

جو اکثر کیسوں کو ٹھیک کر دیتی ہے جس کے ساتھ علاج شروع کیا جائے۔ نائی کے استر کے لاگ

کی خارش جب جلن اور خارش ہو۔

زنکولس۔ جلن کے ساتھ داد۔ خراشدار اور سوئی لگنے جیسی دردیں۔ جب پھنسیاں خشک ہو

جائیں تو بہت زیادہ خارش گڑھے نیلیوں رنگ کے پھٹی ہوئی حرکت سے۔ ہمدار موسم میں موسم

کی تبدیلی پر اور درجہ حرارت کی تبدیلی پر۔ پھونے اور ٹھنڈی ہوا سے حساس ہو۔

آرٹینک الیم۔ جلندار اور بھالا لگنے جیسے درد کے ساتھ۔ رات کے وقت خاص طور پر اسے

صبح ۴ بجے تک زیادتی۔ بڑے بڑے اور گہرے پرت جب اتارے جائیں تو خون بہے۔ وقفے

وقفے پر تھوڑے تھوڑے ٹھنڈے پانی کی پیاس۔

مرکب سال - { نائبرٹک المیڈ - پیڑوں کی داد - نائی کے اُترے کی لاگ سے خارش بیرونی طور
نیٹرم میور - پر فاسٹولا لگا لگائی جاسکتی ہے -
اسٹاکس ایف - مزمن چھپاکی کے لئے تمام جسم پر چھپاکی خارش کے ہمراہ -
مینٹریکیم - پسلیوں کے بیچ یا آنکھ کے بالائی اعصاب پر داد - تیز درد بجلی کی طرح بعض اوقات
سورخ کرنے والی درد -

سکوٹا وائٹ - نائی کے اُترے کی لاگ سے خارش، شیو کی وجہ سے تکلیف -
تھوجا - ہر جگہ داد شدید اعصابی دروں کیساتھ - اگزیمیا جیسی یا پھوڑوں جیسی -
آئرس ور - یا تھم کی دار کے دائرے پھنسیوں کے ساتھ اگزیمیا جیسی یا پھوڑوں جیسی -
ڈلکا مارا - پیپ دار داد ٹھنڈے اور تندر گھروں میں رہنے سے -
کینتھرس - بڑے بڑے چھائے گہرے درد اور جلندار داد - اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر دیکھی جاسکتی
پروفس سپائٹوسا - داہم کے بائیں طرف استقاء - انگلیوں کی نوکوں یا سروں پر خارش کے
ہلکے کیسے کو ٹھنڈے جم گئی ہوں -

مصولہ شمم - داد کی پھنسیاں خاص طور پر جوڑوں کے غموں پر اور کھوٹوں پر خارش کے ہمراہ -
بدبو قوت حیات کی کمزوری - پھنسیاں خشک - پرت دار چھوٹی نوکلر پھنسیاں سرخ کناروں کے
ارد گرد - ٹھنڈا اور بستر کی گرمی میں زیادتی -

(دیکھئے پھنسیاں - پھپھکی - پھنسیاں - خارش)

زخم کے نشان کے پاس ریشہ دار ابھار

سلیشیا - یہ سب پہلے ہر رشتہ ۲۰ غلات میں چھ لہو اس سے زائد وقت تک دی جائے -
ایسٹ فلور - جب سلیشیا ناکام ہو جائے تو یہ ۲۰ میں دی جائے دن میں ۳ بار صبح دوپہر شام -
ٹیوبو کو لینم - جب مندرجہ بالا ادویات سے کوئی فرق نہ پڑے تو بطور عمل اینکڑ کے دی جائے -

کوڑھ۔ جذام

ہائڈروکوئٹائل - کوڑھ اور جذام کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔
 بلیسیلینیم - یہ دوائی بطور عمل انگیز کے ۲۰ x ۱۵ میں روز کے بعد دی جائے۔ اس دوائی سے
 ایک روز پہلے اور ایک روز بعد کوئی اور دوا ہرگز نہ دی جائے۔
 آرم میٹھ - جب ناک سے بدبودار مواد دھبے۔
 آریٹیکم آئیوڈ - جب ناک سے بدبودار مواد دھبے۔ موٹی پھینچے جیسا احساس گندہ دکھائی دے۔
 انگلیوں اور پنجوں کا سوجنا - غدد بڑھے ہوئے۔
 ہونگ نان - ہاتھ اور پاؤں کے سُن ہرنے کے ساتھ کوڑھ یا جذام۔
 ہورابرانز - کوڑھ یا جذام جب جلد کھال کے ساتھ بندھی ہوئی معلوم دے۔
 گریفائیٹس - چیروں سے لیس دار مواد ہے۔
 انٹم ٹارٹ - تھٹھے اندر کی طرف جھکے ہوئے ہوں۔
 تھائیرائیڈینیم - آنکھی پھنیوں کے ساتھ جذام - جلد کی پرانی سوزش - شدید سرخی اور
 ٹانگوں پر پھلکے یا پرت (جلد کا سفید ہو جانا)۔

بجھلہری - برص۔

ٹیوبرکولینیم - اس دوائی سے علاج شروع کرنا چاہئے۔ ۲۰ x کی ایک غوراک درج ذیل
 ادویات کے ہمراہ دی جانی چاہئے۔
 آرسینک سلف فلیو - بجھلہری کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔ یہ کافی لمبے عرصہ تک تبدیل شدہ طاقت
 میں دی جانی چاہئے، یعنی چھوٹی طاقتوں سے شروع کر کے بڑی طاقتیں بتدریج استعمال کرائی
 جائیں۔ پہلے پہل دواہ تک ۳ x دی جائے، پھر اگر چھوٹی طاقت سے افادہ رک جائے تو ۲۰ x دیکھائے۔
 اور اگر ۳ x بھی ۴-۵ مہ دینے سے بیماری کو نافذ نہ ہو تو پھر ہر ہفتہ ۲۰ x دی جائے۔

آر سینک الیم۔ خنزیر میں سفید جلد۔
ایپس ایم۔ جلد سفید۔ بچہ دانوں کی سوزش و استفاد کے ساتھ۔ بچے کا الٹ پلٹ ہونا قلعوں
کے گرد سُرخ ہو۔

کالی کارب۔ جب جلد دو دھیا ہو۔
ہائڈرو کوٹائل۔ اگر آر سینک سلف فلیو نا کام ہو جائے تو یہ دوائی دی جائے۔ یہ چھوٹی طاقت
یعنی ۲۴ میں دی جائے یا ۲۰ میں دن میں ۳ بار لمبے عرصہ تک دی جائے۔

بوریکس۔ سفید جلد سرخ قلعوں کے ساتھ۔
سورائینیم۔ سفید جلد کے قلعے اور سفید بالوں کے گچھے۔ اس دوائی کے تحت سیاہ قدرتی
رنگ کے ہو جائیں گے۔

بہرے پر چھوے یا تانبے کے رنگ کے داغ

لائیکو پوڈیم۔ بھورے داغ خاص طور پر پیٹ کے اوپر۔
ایپس ایم۔ جسم پر سفید رنگ کے قلعوں میں یا ٹکڑیوں میں۔
سیسیا۔ اگر لائیکو پوڈیم نا کام ہو جائے تو یہ دی جائے۔
پلمیم۔ سن یا س یا کثرت حیف میں۔
میزریم۔ چھاتی اور بازوؤں پر دھبے بہت گہرے رنگ کے۔
کیورارے۔ زردی مائل بھورے رنگ کے دھبے۔
(داد اور بھنیاں دیکھئے۔) چھپائی

تیل والی

برائی اونیہ۔ بہت ہی چکن۔ خاص طور پر بال۔ چہرہ نیلا۔ زرد۔ سوجا ہوا۔ استسقاء گرم اور
پرورد۔ انتہائی تکلیف دہ۔
مرک سال۔ متواتر نماز اور چلنا۔ بہت زیادہ بے رنگ۔ لیسڈ اسپین۔ رات کے وقت زیادہ۔

ٹیٹرم میور - جلد چکناہٹ والی تیل والی خاص طور پر بالوں والی جگہوں پر۔
 بلیسم - چہرہ کی چکناہٹ والی اور چمکدار۔
جلد اترنا -

ہیلی بورس - ناخنوں اور بالوں کے گرنے کے ساتھ جلد کا اترنا۔
 انتھر کیسینم - وسیع پیمانے پر جلد کا اترنا۔
 آئیوڈیم - جلد اترے ڈھیلے پرت دکھائی دیں - پکے بخارات کا اخراج۔
 مینٹریم - پرت دار جلد کا اترنا۔
 ایپس ایم - استحقائی سوزش کے ساتھ جلد کا اترنا۔
 ایلیم سیٹائیوا - ہاتھوں کی جلد اتر جائے۔

کھجلی کھجلی کا علاج اس دوائی کی سی ایم طاقت سے شروع کرنا چاہیے

سلفر - اس کے پندرہ روز بعد تک کوئی دوائی نہ دی جائے۔ کھجلی کا علاج اس
 دوائی کی سی ایم طاقت سے شروع کرنا چاہیے۔
 کالی بروم - آنکھ کی کھجلی جلد ٹھنڈی نیلی دھبے دار - بھریاں پڑی - بڑے بڑے بلداء بھڑے۔
 تھائیرائیڈسم - ٹھنڈے سوس کرنے والے اور کئی خون والے مریض میں خارش۔
 خشک کمزور جلد - ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے۔

ریٹیکم بروم - آئنا ناس کی کھجلی - چہرے پر مواد نکلنے والی خارش والی بھینیاں ہاتھ
 پر سرخ داغ کے قطے - تمام جسم پر جلن کا احساس اور خارش۔
 کورٹیکم بروم - ہتھیلیوں اور تلووں کی خارش - سرخ چپٹے ناسور - مونگے کے رنگ کے دھبے
 جو گہرے سرخ اور پھر تلبے کے رنگ میں تبدیل ہو جائیں۔

آرٹھریٹک بروم - ایک شاندار دوائی ہے جو $\times 2$ میں دی جانی چاہیے۔
 ایسڈ کرائیو فیکٹم - اس کے ۴ سے ۸ گرین، ایک انس ویزلین میں بیرونی طور پر استعمال کریں۔
 یہ اندرونی طور پر پین طاقت میں دیا جائے۔

آرسینک سلفرٹ - جلدی امراض کے لئے خاص طور پر کھجلی اور اگر نمایاں پھنسیاں اور بھڑے۔
 سیلینیئم - ہتھیلیوں پر انشلی کھجلی ہتھیلیوں کی خارش۔ ہاتھ بھری در۔ ہاتھوں میں پھارنے والے درد
 اگر اس سے افادہ نہ ہو تو علامات کے لحاظ سے دوائیاں دیجئے۔

ہائیڈرو کوٹائل - جلد کے بہت زیادہ ٹٹا ہونے اور کھال ادھرنے کے ساتھ۔
 میگزیم - ہتھیلیوں کی خارش یا کھجلی جو گرمی سے زیادہ ہو یا بڑھے۔

پٹرولیم - ہاتھوں کی کھجلی درازوں کے ساتھ جو ٹھنڈے موسم میں زیادہ ہو۔
 آرسینک الیم - کھجلی جو ٹھنڈی پٹیاں لگانے پر ادھتی سے بڑھے۔ گرمی سے افادہ ہو۔ ہر ہفتہ
 ۲۰ ملاقات میں ایک خوراک دیجئے۔

آرسینک آئیوڈ - کھجلی جو ٹھنڈے اور سرد یا ٹھنڈی پٹیاں لگانے سے کم ہو گرمی سے زیادہ
 ہو۔ بخلی ملاقتیں ۶ یا ۳۰ ترجیحا۔ اگرچہ جب بخلی ملاقتیں مکمل ہو جائیں تو ۲۰ یا ۱۰ ملاقتیں
 نظر انداز نہیں کی جاسکتیں یعنی یہ بڑی ملاقتیں دی جاسکتی ہیں۔

میگنیم - حیض کے دوران میں کھجلی ظاہر ہو یا بڑھے۔ پرورد درازیں یا چہرے۔

داد

بیسلیئم - داد کے لئے یہ ایک چوٹی کی دوا ہے۔ ۲۰۰ میں دی جائے۔ ہفتہ میں ایک خوراک دی
 جائے۔ اگر درازیا تین ہفتوں میں کوئی افادہ نہ ہو تو مندرجہ ذیل ادویات دی جائیں۔

سیسیا - اگر کوئی اور علامات نہ ہوں تو اس کے بعد یہ دوائی دی جائے۔

کلکیر یا کارب - ٹھنڈے زرد۔ حد سے بڑھے ہوئے خون والے لوگوں کے لئے ہاتھ اور پاؤں سردار۔

سلفر - جب داد کے ساتھ تیزابیت۔ بدھمی۔ آبکائیاں۔ بھوک کی کمی اور بے چینی ہو۔

ایپس میل - دار۔ خارش اور جلن کے ساتھ ٹھنڈی چیزیں لگانے سے افادہ۔ ۲۰۰ یا ۱۰۰۰

ملاقات کی ایک خوراک دیجئے۔

ٹیلیوریم - داد خاص طور پر چہرے اور جسم پر۔ جسم اور پسینے کی بوگندی اور لمسن جیسی۔

جلد کھردری

سورائینیم - جلد کھردری - چیرے - خون بہے اور پرت دار - دھونے ڈرے - میلی یا غلیظ نظر آئے - گندی - گندی جیسے کہ گرد و غبار سے دھانچی ہوئی - جلد کی تکالیف ہنسنے سے اور ستر کی گرمی سے بڑھیں۔

سلفر - چہروں کے بغیر جلد کی خشکی - (دیکھو غارش کا دب جانے سے - غارش)

لال بخار

بیلادونا - لال بخار کے لئے پھولی کی دوائی ہے - ہموار سرخ اور چمکدار پھنسیاں - گرم خشک اور سرخ چہرہ - معدہ پر بوجھان تلی اور تپے ہو - دیر حرارت اور بچا - بطور حفظ مآلقدم بھی کام کرتا ہے -
ایلیفٹھس گلیٹڈ - شدید ملین دلدرد کام جب متوقع چھپاں باہر نہ پہلے - خطرناک بخار - منہ اور منہ سے گندی بو آئے - بیہوشی کی حالت جس سے انتہا مشکل ہو - قدرتی اخراجات سکارک جانا - لال بخار کے دینے کے بعد توجہ مرکوز کرنے کے ناقابل - یادداشت نہ رہے - بیہوشی - ہنپان ہو -
رکشاگس - لال بخار کے علاوہ جب گرٹھ دار پھنسیاں - لونگھ ٹر بڑانے والے ہڈیوں کے ساتھ - پھنسیاں آہستہ آہستہ نکلیں۔

ایچیس میل - یہ صرف اس وقت فائدہ مند ہوتی جب گردے کی تکلیف کے ساتھ استفادہ ہو جلد صبروں والی سرخ اور سفید قطعے - چہرہ زرد اور پھولا ہوا - گلے کی سوجن ڈنگ گئے جیسی درد کے ہمارے پیاس کی کی اور گرمی سے بڑھنے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

لیکس - پہلے خون کا زہر لایا ہوا اور پھر طبعی جھلیوں کی تکالیف نمایاں - گلے کے گلے ترشے ہوئے ناسور - ٹانسلرین تکلیف۔

سکالینیم - بطور عمل ایچیز دوائی کے اور بطور حفظ مآلقدم کے برائے لال بخار کے ۲۰۰ ملاقات میں استعمال کی جائے - زخموں کے نشان۔

لیکس - پرانے زخموں کے نشانوں سے آسانی سے خون بہے کھل جائیں - سرخ زخم۔

کالی مسوڈ۔ چوٹے چھوٹے پھوڑوں کے شان چہرے گردن۔ کھوڑی۔ چھاتی اور کمر پر۔
 ویریولینیم۔ چہرے پر چھوٹے چھپکے نشان پر بندرہ نذر بعد ویریولینیم ۲۰۰ دیکھیے۔
 سارنسیا پی۔ { سارنسیا پی ۹ دن میں دو دفعہ سوائے اس دن کے جبکہ ویریولینیم دی جائے۔
 کاسٹیکم۔ گہرے شان۔ زخم دوبارہ دکھنے شروع ہو جائے۔
 لوئیسین۔ کتے کے کاٹنے سے زخم کا نشان رہ جائے۔
 گریفائیٹس۔ پرانے سخت شان۔

ایسڈ فلور۔ پرانے زخموں کے شان بن کے کنارے سرخ ہو جائیں۔ ان پر یا لن کے قریب غلامدار
 پھنسیا ہوں۔

تھائیوسینیم۔ زخم کے شانوں کو گھٹانے کے لئے بڑھے ہوئے حدود۔ چہرے کا دق۔ سکوٹے
 برے زخم۔ سٹے ہوئے زخموں کے نشان۔

فاسٹولا کا۔ جب مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں
 کرڈکس۔ پرانے مندل شدہ زخم بار بار کھل یا برسے ہو جائیں اور ان سے پیپ نکلے۔
 سلیشیا۔ پھوڑوں اور زاموروں کے نشان۔

نوزائیدہ بچوں کی جلد میں سختی۔

لیکس۔ یہ دوائی ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ طاقت میں ہفتہ یا مہینہ بعد بالترتیب دی جا سکتی ہے۔
 دیکھے داد بھی۔ داد۔

دھاریاں

ہائپریم۔ سرخ لائیں اور دھاریاں جو بازوؤں اور بغل تک جائیں۔ دھاریاں ٹانگوں کے اوپر نیچے۔
 دیکھئے مائیکسیکاسیل۔ نیلی نائل سرخ دھاریاں جو بازوؤں اور بغلوں تک جائیں۔ دھاریاں ٹانگوں
 کے اوپر نیچے۔

دیکھئے دھاریاں۔ دھاریاں۔ سخت۔ جلد موٹی۔

ناسور

سلیشیا - ناسور جو جلدی مند مل نہ ہوں۔ نہ درد ہونے والے بھجوروں کو ٹھیک کر دے۔ گرم چیزوں سے بچی کرنے سے افادہ ہو۔ انڈال شکل ہو یعنی جلد ٹھیک نہ ہو۔ کھنڈائے یا زخم کا انگور۔

ایسٹ فلور - ناسور جو ٹھنڈی ادویات یا پٹیاں لگانے سے افادہ محسوس کریں۔

ہیپرسلفر - ناسوروں کو ٹھیک کرنے کے لئے شاندار دوائی۔

گن پاؤڈر - شحتوں سے شرع ہونے والے ناسور جو گھٹنوں تک بڑھیں جن سے بدبودار پیپ نکلے۔ سوزش زیادہ نہ ہو سرخ اور چکدار۔

ارایا ڈائیٹ - گنگرین والے ناسور جب کلکیر یا ادرسلیشیا سے بڑھیں اور آرسینکیم البم معمولی افادہ دیں۔ ارایا ڈائیٹ مکمل طور پر آرام دیتا ہے۔ مریض ٹھنڈ محسوس کرتا ہے اور ایک دن ٹھیک رہتا ہے دوسرے دن وہ تکلیف محسوس کرتا ہے پھر اگلے روز افادہ محسوس کرتا ہے۔

ہائیڈرائس کین - گہرے گوشت خور جلد یعنی جھتیوں پر ناسور۔ گارمھی، ایسڈ اور زرد پیپ کے ساتھ۔

کوموکلڈ یا ڈینیٹیا - سخت کناروں والوں ناسور۔ مہلک قسم کی چھنیاں، بہت زیادہ سوزش شدید خارش ہو۔

کاربووکیج - جلد کی بھرپوری میں ناسور۔ نہ دکھنے والے ناسور جن سے متواتر خون بہے۔ جلندار خراشدار تپلا مواد ہے۔

سلفر - شدید خارش یا کھرچنے کے ساتھ ناسور۔

سٹیفیگیبریا - سوکھا سان والے بچوں میں خارش۔

نکس ماسکالا - ہسٹریائی مریضوں میں خارش۔

نیٹرم کارب - چلنے کے بعد اٹیروں پر ناسور یا چلنے پر اٹیروں پر ناسور ہو جائیں۔

سٹس کیناٹینس - بلادر اور گنگرین والے۔ گہرے گوشت خور ناسور۔ کٹنے اور پٹی کی کافی مقدار

میں خراشدار مواد ہے۔ نہانے سے تکلیف ہو۔ کھلی ہوا سے حساس۔ گرمی سے افادہ۔
 کالی سلف۔ کئی منہ دلا پھوڑا یا ناسور۔ مریض کھلی ہوا میں افادہ محسوس کرتا ہے۔
 کروکس۔ پرانے مندرل ہوئے ہوئے زخم جو بار بار کھل جائیں اور پیپ ہے۔
 فاسفورس۔ زخم جو مندرل ہوئے ہوئے معلوم ہوں لیکن بار بار کھل جائیں اور ان سے خون ہے۔
 ناسور پتیلی سی جلد (سکری) کی طرح تہہ کا بننا۔ جلد میں جلن۔

پنی اوٹیا۔ جو تے کی وجہ سے زخم یا ناسور کے لئے مفید ہے۔
 نیٹرٹولا کیو بیٹیز۔ مہلک گنگرین وٹے ناسور۔ ناسور اور پھوڑے۔ یہ پیپ کو بار بار بننے سے
 روکتی ہے جب سلیشیا ناکام ہو جائے۔

کنڈورا نگو۔ گندی بودالے ناسور۔ پتلا مواد سے ہڈی اور پرانے ناسور۔ کھنڈ دار۔
 اوپیم۔ ناسور جو مکمل طور پر بلا درد ہوں، جو ٹھیکت ہوں اور نہ ہی پھیلیں۔ زیادہ سوزش میں
 جلد میں حساسیت کی حس نہ ہو۔

سینی کولا۔ پنچول میں ناسور۔ (پھنسیاں بھی دیکھئے)
پھپھیا کی۔ پیتی۔

ایپیس ایم۔ پھپھیا کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ بستر کی گرمی سے زیادتی۔ خارش اور جلن ہو۔
 لیکن پیاس نہ ہو۔ دائرے دار سوزش جو سرخ اور زرد ہوشندیدہ خارش ہو 4×6 یا 6×4 میں دیکھئے۔
 اریکالورنٹس۔ پیاس دقت دی جائے جب ایپیس ناکام ہو جائے۔ یہ ایپس جیسی علامات
 رکھتی ہے۔ سوائے اس کے کہ اس میں پیشاب زیادہ آتا ہے۔

پلسٹیل۔ گیس کیوجہ پھپھیا کے لئے بہترین دوائی ہے۔ تے اور اسہال کے ہمراہ پھپھیا۔
 انٹیم کروڈ۔ جب گیس نزلہ یا تیزاب کے استعمال سے ہو۔ گرمی سے زیادتی۔

اسٹاکس فلیو۔ جلن اور خارش کے ساتھ پھپھیا کی جو گرمی اور حرارت سے کم ہو۔ پھپھیا کی تمام جسم پر
 خارش کے ساتھ۔ مزین پھپھیا۔

رٹاکس۔ جلن اور خارش کے ساتھ پھیپھیاں جو گرمی اور حرارت سے کم ہو پڑے تانے سے ملن لہ
خارش زیادہ ہو۔

نیرم میور۔ ہندی قسم کے کیس قبض اور مٹی کے رنگ جیسا پہرہ کا رنگ ہو۔
ریڈیم۔ رات کے وقت تمام جسم پر خارش۔ جلد لک کی طرح جلتے۔
ڈلکا مارا۔ تمام جسم پر پھیپھیاں۔ کھرپنے پر خارش بلند رہو۔ گرمی میں زیادتی، ٹھنڈ میں افادہ حیف سے
پہلے پھیپھیاں ہو۔

آرینیکم البم۔ جب ریش تھوڑے تھوڑے وقفہ پر ٹھنڈا پانی پیئے۔ جب پھیلی کا گوشت کھانے سے
پھیپھیاں ہوتو اس کے لئے مخصوص ہے۔ ابھرے نشانوں پر بہت زیادہ خارش اور ملن ہو سہا حل
سمندر پر پھیپھیاں۔ (متفرق کے نیچے بھی دیکھئے)۔

موبکے۔ مٹے

تھو جا۔ تل یا مٹے۔ اعضائے تناسل پر یا اس کے ارد گرد مٹے ۲۰۰ طاق میں دن میں دو
بار دیجئے، صبح شام دیجئے۔

کاسٹیکم۔ چہرہ۔ ہاتھوں یا آنکھوں پر مٹے
ڈلکا مارا۔ بڑے بڑے پر گوشت اور ہوا یا چٹے، وہ انگلیوں۔ چہرہ اور آنکھوں پر ہو سکتے ہیں۔
سٹیفیگیٹا۔ مٹے۔ سوزاک کی دگر سے فرج یا ذکر پر مٹے۔ گو بھی کے پھول کی طرح کے اکاؤ۔
ہر ہفتے ۲۰۰ کی ایک خوراک دیجئے۔

چھوڑے بھی دیکھئے۔ انگلی کی نوک پر پھوڑا۔

لسہری۔ چندرا۔

ماٹر سٹیکا۔ لسہری کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ پیپ جلد نکالتی ہے اور پیپ جلد نکالتی ہے۔
ہیمپر سلفر۔ یہ لسہری کے پھٹنے کے بعد دی جاتی ہے۔ یہ زخم کو مندرل کرنے میں مدد دیتی ہے۔
ناخن میں سے پیپ بہتی ہے۔ ڈھیلا ہوتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔

سلیٹیا۔ جب ہر سلفز ناکام ہو جائے تو یہ دی جائے یا جب مندرل ہونے کا عمل رک جائے۔
 لیڈم پال۔ سوئوں کے چٹنے سے بہری ہو جائے۔
 ڈالیکوریا۔ یہ بھی بہری میں مدگار ہے۔
 الیم سیبا۔ جب دوسری ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دی جائیں۔

دوسرا حصہ

پال

دیکھئے گزنا بالوں کا۔ گنجائیں۔ بھوسہ۔ سکری۔

سینکیولا ۲۰۰۔ کھوڑی پر پرت دار سکری۔ بھونڈوں اور دوسری بالوں والی جگہوں پر ہر ہفتہ
 بعد ایک خوراک دیجئے۔

فاسفورس ۲۰۰۔ بہت زیادہ۔ بادلوں کی طرح گہرے۔ بال چھوٹی کی طرح گریں۔ کھوڑی کی نارش
 گر لفاٹیس۔ داد وال سکری (وہ سکری جس کے ساتھ گزیا اور دوسری چھنیاں ہوں)۔ کھوڑی پر پرت
 اور بے چین کرنے والی نارش۔ تر۔ بالوں کا گزنا۔ چندیا پر چلنے۔
 کلکیر یا سلف۔ کھوڑی پر سکری، گار سے زرد قلعوں میں چھنیاں۔ گزیا۔ سکری دج سے
 چھوٹے چھوٹے چھوڑے۔ بالوں کا گزنا۔

تھوجا۔ سفید خشک اور سکری۔ بال خشک گریں۔
 سپیا۔ دائروں میں بھوسہ۔ رنگ درم کی طرح یا دھدری کی طرح۔ مندار کھوڑی۔ بال گریں
 ماتھے کے بالوں کے نزدیک چھوٹی چھوٹی چھنیاں۔
 کاربو نیم سلف۔ کھوڑی پر سکری۔ چھنیاں۔ پرت دار۔ گزیا۔ نارش۔ مندار۔ پرت دار۔
 چھوڑے دکھیں اور پرت دار۔

نیٹرم میور۔ سفید بھوسہ۔ نزلہ زکام اور بوسون گھنے کی حس کے خاتمہ کے ساتھ۔
 سوراٹنم۔ بھوسہ جس سے گندی بو آئے۔
 سلفر۔ جب اچھی طرح سے منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں۔

آری حکم الیم۔ کمزور مریضوں میں۔ مریض اچھے رنگ والے۔ کھوپڑی پر تقابل برداشت خارش۔ ننگے
 قلعوں پر گول دھتے۔ خشک پرت دار۔ رات کے وقت ملین اور خارش۔
 ایسٹ فلور۔ خشک مہجوی والی پُریجیان کھوپڑی بال کرنے کے ہمراہ۔
 میسریم۔ بہت زیادہ خارش اور بالوں کے کرنے کے ہمراہ

بالوں کا گرنا

تھو جا۔ خشک پرت دار مہجوی کی وجہ سے بالوں کا گرنا۔

گرفیٹیس { ڈارمی اور مہجوں کے بالوں کا گرنا۔
 انتھرم۔

سفنگورس۔ بالوں کا گرنا۔ خاص طور پر دارمی اور مونچھوں کے بالوں کا گرنا۔

اسٹیلو گو ایم۔ آتشک کی وجہ سے گنجا پن۔ بال گر جائیں اور دوبارہ نہ آئیں۔

ویز باؤن۔ ویز باؤن سے بال جلدی سے آگیاں گے۔ اور گرے ہو جائیں گے۔

فاسفورس { بال گچھوں میں گریں۔ ادھر ادھر بالوں کے بغیر قطع ہوں دی گئی ترتیب

کلکیر یا فاس { میں دی جائیں۔

ایسٹ فاس۔ سر کے بالوں کا گرنا اور مہجوں، پلکوں اور اعضائے خاسل پر سے بھی بال گریں۔

سلیسٹیم۔ تمام سر سے بالوں کا گرنا اور سر کی کھوپڑی، ہموار اور بغیر بالوں کے رہ جائے۔ مہجوں

اور چہرے پر سے بالوں کا جھڑنا جس کی وجہ سے چہرہ عجیب سا نظر آئے۔

ایو منٹا۔ کھوپڑی کے بالوں کا بڑی مقدار میں گرنا۔ یا یہ حصے مکمل طور پر ننگے ہو جائیں۔ تمام جسم پر

سے بشمول پلکوں پر بھی بالوں کا گرنا۔

ایسٹ فلور۔ آتشک کی وجہ سے بالوں کا گرنا۔ بال خشک۔ بال الجھے ہوئے ہوں۔ وہ علیحدہ

علیحدہ اور ٹوٹ جائیں۔ وہ گچھوں میں الجھ جائیں اور بغیر جاکے ہوں گے۔

نیٹرم میور۔ حمل کے دوران بالوں کا گرنا۔ نرمن سر درد کے بعد بالوں کا گرنا۔

لیکس۔ جل کے دوران بالوں کا گرنا۔

بورکس۔ بال کھردرے اور سخت۔ کنگھے سے ہوار نہ کئے جاسکیں۔ بال سروں پر الجھ جائیں۔
اور آپس میں جڑ جائیں۔ اگر یہ کچھے کاٹ دیئے جائیں یہ دوبارہ بن جائیں۔
پلسٹیلہ۔ آنکھوں میں بالوں کا احاس۔

ٹائٹرک الیڈ۔ بالوں کا بہت بڑی مقدار میں گرنا خاص طور پر چند یا پچھیسوں کا ساتھ یہ آتشک
کی وجہ سے اعصابی سردرد۔ کمزوری اور لاغری۔ کھوڑی حاس۔
ڈسکامینیر۔ گنے پن کے قطعے جن سے طوبت رسے بال آپس میں الجھ جائیں۔ کھرچنے یا غارش کی
نذر کئے والی خواہش۔

امونیم میور۔ مجبوری کے ساتھ بالوں کا گرنا۔

مانسی نیلا۔ شدید مادامراض کے بعد بالوں کا گرنا۔

کالی کارب۔ بھنڈوں کے بالوں کا گرنا۔

ریشاکس۔ پکوں کے بالوں کا گرنا۔

مرکیوس۔ آتشک کی وجہ سے بالوں کا گرنا۔

سلفر۔ بہت ہی بے قاعدہ بال۔ ریت جیسے۔ سخت اور غیر چمکدار۔ ہر طرف اگنے والے بال۔

میٹوونیم۔ کھوڑی پر غارش کے ساتھ بالوں کا گرنا۔ ساحل سمندر پر لپاقت۔

سیپیا۔ موقوفی حیض اور حمل کے دوران بالوں کا گرنا سردرد کے دوران بالوں کا گرنا۔

مباشرت کی خواہش مند نہ ہو۔

بالوں کا گرنا

تھوجا۔ بالوں کا ان جگہوں پر بڑی مقدار میں اگنا جہاں ضرورت نہ ہو۔ ہر ماہ ۱۔ ایم طاقت
کی ایک خوراک کافی ہوتی ہے۔

اولیم جیکو۔ یہ دوائی ۳۰ طاقت میں، گرمیوں میں اور طاقت میں سردیوں میں دن تین
دفعہ۔ ایک ایم تھوجا کے ساتھ دی جائے۔ یہ دوائی تھوجا کے ساتھ دی جائے۔ یہ دوائی تھوجا

دینے سے ڈوڈن پہلے اور دو دن بعد نہ دی جائے۔

نوٹ :- آرسنک کا زرد سفید اور ان بچھا ہوا سونا براہ مقدار میں لے کر ان کا گرم پانی کے ساتھ پیسٹ تیار کیجئے اور چہرہ پر لگاتے رہئے اور اسے خشک ہونے دیجئے۔ ہفتوں تک بال نہ آگیں گے۔ چند بار دہرانے سے ہمیشہ کیلئے بال آگنا بند ہو جائیں گے۔

بال قبل از وقت سفید ہوں۔

تھائیرائیڈین۔ اس دوائی کے ساتھ علاج شروع کیا جائے۔ یہ ایک ماہ تک دن میں تین دفعہ ۲۰ طاقت میں دی جائے اور اس کے بعد ۲۰ طاقت میں ہر ہفتہ ایک ماہ تک دی جائے۔

ایسٹراس - ۲۰ طاقت میں چھ ماہ تک اول بدل کر دی جائیں۔
 لائیکو لوڈیم - ۲۰ طاقت میں چھ ماہ تک اول بدل کر دی جائیں۔
 وائیسباؤن - اگر مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو ۸ طاقت میں دیجئے۔ ہر ماہ ایک ٹکٹ لٹیٹے۔
 فیٹرم میور - کمزور کر دینے والی تکالیف کی وجہ سے بال سفید ہو جائیں
 فاسفورس - ہر ہفتہ ۲۰ طاقت میں اول بدل کر دی جائیں۔
 آرسنیکم ہائیڈ - مرہ حصوں پر برف کی طرح سفید بال۔
 نکس و امیکا - بال سفید ہو جائیں (جسم کی اعصابی تکلیف کی وجہ سے)

تیسرے حصہ

ناخن

ناخنوں کی عام بیماری

تھوچا۔ انگلیوں کے ناخن بیمار عید نظر آئیں ہوی ناخن۔

مائرسٹیکا سیبر پیرا۔ انگلیوں کے ناخنوں میں تکلیف انگلیوں کی پٹیوں کی سوزش کے ساتھ۔

کلیر یا کرب - بھڑکے والے غیر ہوا ناخن - دھبے دار اور بے قاعدہ -
 سلیشیا - بچوں کے ناخنوں کا گوشت میں گھسنا۔ ٹٹے ٹٹے ہوئے۔ سینے کے ناخنوں کے اگنے میں
 حرکت پیدا کرتی ہے -
 فلور کی لیڈر - ٹوٹی بھوٹی اطراف -
 گریفائٹس - جب ناخن موٹے ہوں۔ سیلک کی طرح آگیں -
 ایپس ایم - ناخنوں کے نیچے خون جمع ہو جائے -
 کاسٹیکم - جب گوشت میں گھسے والے ناخنوں کے لئے جب سلیشیا نکالام ہو جائے -
 میگنٹیس کولس آسٹ - ناخنوں کے اندر کی طرف درد میس کر کہ گوشت میں گھس گیا ہو۔ بھڑنے پر بہت
 درد ہو یا بچوں پر جو رتے کے دباؤ سے ناخنوں پر میس کر چند ہی یا گئے -
 لیکس - اندر کی طرف گھسے، ٹھنڈے، جاتی اور ڈنگ لگانے والے -

ناخن کی جڑ کے قریب پیپ پڑ جانا

فیٹر میور - انگلیوں کا ناخنوں کے قریب خشک ہونا اور انگلیوں کا پھٹنا۔ سن ہونا اور بھجنا ہٹ
 بازوں اور گھٹنوں کی کھردھی - پچھلے ہونٹ کے درمیان میں چیلر - چھپاکی -
 سلفر - خشک پرت دار غیر صحت مند جلد - خارش اور جلن - کھرچنے اور دھونے پر زیادتی -
 پھنسیاں اور پیپ پڑنا - کانپتے ہوئے اور گرم پسینے والے ہاتھ -
 کلیر یا کرب - غیر صحت مند جلد - آسانی سے ناسور بن جائیں - چھوٹے چھوٹے زخم آہستہ آہستہ
 مند ہوں - مٹے اور بوائیاں - ٹھنڈے مند راپاؤں - رات کے وقت ٹھنڈے اور مڑھ محسوس کرے -
 پھٹنے والے اور دھبے دار ناخن -

انٹم کروڈ - ناخن بھر بھرے۔ بھدے آگیں۔ سخت مٹے ہاتھوں اور پاؤں کے تلووں پر پیدا
 ہوں - جلد خشک - جب بستر گرم ہو تو خارش ہو - بہت پتہ جھان اور زبان پر گارھی لیسڈ اسفید تہ -
 گرمی اور ٹھنڈے پانی میں نہانے سے زیادہ ہو -


سلیشیا۔ انگلیوں کے ناخنوں کی بیماریاں اگر ان پر سفید دھبے ہوں۔ خشک ٹھنڈے پاؤں۔
پیسے کے ساتھ۔ بے ڈھنگے ناخن۔

الیومنا۔ بھر بھرے ناخن۔ انگلیوں کے بچے کاٹنے والا درد خشک جلد۔ آسانی سے ٹوٹیں جب
بستر میں گرم ہوں تو نارش۔ انگلیوں کی جلد بھر بھری۔ قبض۔
ایسڈ ٹائٹرک۔ ٹھنڈے نیلے ناخن۔ ہاتھوں پر مسوں جھکودھونے پر خون ہے۔ شور۔ پھرنے
اور درد حساس۔

مقوجا۔ ناخن نرم اور بھر بھرے۔ بے ڈھنگے یا ترے ترے۔ ہاتھوں اور بازوؤں پر پھرے
داغ۔ چکناہٹ والی جلد۔ بالوں میں بھوسی یا سکری۔ پسینہ میٹھا اور زبردست۔
گر لیا میس۔ ناخن موٹے ہو جائیں۔ پھٹے ہوئے اور بے ڈھنگے۔ مریض نگین۔ ناامید۔ رقا
ہے۔ موت کے سوائے کسی چیز کے متعلق نہیں سمجھتا۔

ہیلی بورس۔ جلد کے چھل جانے یا ادھڑ جانے سے ناخنوں کا گر جانا۔
الیومنا سلیکیٹ۔ ناخنوں کا بھر بھر اپنی۔ ہاتھ متواتر کٹے پھٹے۔ ہاتھ اور پاؤں ہرٹ کی طرح
ٹھنڈے۔ ناخنوں کے قریب ناسور۔

ایسڈ فلورک۔ ناخن ترے ترے یا بے ڈھنگے۔ لمبائی کے رخ ناخنوں بھر بھریاں۔ ناخن تیزی
سے اگیں اور جھکے ہوں یعنی وہ بد وضع ہوں اور بے ڈھنگے بعض جگہوں پر بہت موٹے اور بعض
جگہوں پر بہت پتلے آسانی سے ٹوٹیں اور ٹوٹنے والے۔



حدود صواب
باب ۱۲

عام فہم
محکمات

عام بخار

ایکونائٹ - سخت بخار - بے چینی - شدید پیاس - بہت زیادہ
مقدار میں پانی پینے کی خواہش - چہرہ پر خون - ٹھنڈی ہوا لگنے سے

یہ صرف ابتدائی حالت میں دی جانی چاہیے۔

پیشینیا - پیاس اور محک کے ساتھ بخار - کھانا کھانے کے بعد تمام جسم بہت گرمی محسوس کرتا ہے۔ بے
چینی اور رت میں اصرار اصرار ہے جب بخار تیز ہو تو باتونی ہو۔ گندی بودا لے مہال یا مریض گہری بیہوشی میں ہو۔
بیلادونا - چہرہ پر خون - چمکدار سرخ - زیادہ بخار - پیاس نہ ہو۔ آرام سے لیٹنا چاہیے۔ اس دوائی کی
نمایاں علامت ہے۔ سردرد - گردن میں نالیوں میں ٹپکن - سوزج کی گرمی میں کام کرنے یا چلنے سے بخار۔
جیلسمیم - چہرہ پر خون - گلہ - گردن کی گڈی سے درد شروع ہو، پیاس نہ ہو۔ آرام سے لیٹنا چاہیے۔
نکسوسامیکا - مریض دن کے گرم ترین حصے میں بھی ٹھنڈ محسوس کرے۔ اگرچہ ٹھنڈ محسوس کرے
لیکن کپڑے اتار دے۔ خدی قبض منہ کا ذائقہ کڑوا۔ دن کے ۱۱ اور ۱۲ بجے بخار زیادہ ہو۔

آرمینیکم البم - بے چینی کے ساتھ بخار - تھوڑے تھوڑے وقفے پر تھوڑی تھوڑی مقدار میں پیاس۔
کنوری اور لاغری - بخار کی سردی شدید قسم کی۔ ایسا معلوم ہو کہ جسم میں دھڑکا ہوا خون برفانی پانی ہے۔
بخار کی حالت میں محسوس کرے کہ ابلت ہوا پانی خون کی نالیوں میں دوڑ رہا ہے۔

برائی اونیا - خشک کھانسی کے ساتھ بخار تمام جسم میں دھڑکیں ہوں۔ آرام سے لیٹ جانا چاہیے۔ کسی سے
دوا بھی پسند نہ کرے۔ بہت لمبے وقفے پر بڑی مقدار میں زیادہ پانی پئے۔

ٹرائی اوٹیم - گیس یا ٹائیفائیڈ بخار کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ ہر قسم کے بخاروں کیلئے مخصوص ہے۔
کیلیدیم - ہر شام بخار کے دوران سولے۔ اور جب بخار اتر جائے تو جاگ جائے۔

نیکشیتھس - قے کے ساتھ صفراوی بخار - معدہ میں جلن - متلی - ٹھنڈ کے ساتھ شدید پیاس - وقفہ
دار بخار - انتہائی سندس کے ساتھ۔

اگنیشیا - سردی کے دوران بخار اور پیاس - دوسری حالت میں نہ ہو۔ بیرونی گرمی سے سردی میں
انقرہ سو - بیرونی طور پر پیٹے سے گرمی بڑھے۔ سردی کے دوران چہرہ سرخ۔

عام بخار

ایکونائٹ - سخت بخار - بے چینی - شدید پیاس - بہت زیادہ
مقدار میں پانی پینے کی خواہش - چہرہ پر خون - ٹھنڈی ہوا لگنے سے

یہ صرف ابتدائی حالت میں دی جانی چاہیے۔

پیشینیا - پیاس اور محک کے ساتھ بخار - کھانا کھانے کے بعد تمام جسم بہت گرمی محسوس کرتا ہے۔ بے
چینی اور رت میں اصرار اصرار ہے جب بخار تیز ہو تو باتونی ہو۔ گندی بودا لے مہال یا مریض گہری بیہوشی میں ہو۔
بیلادونا - چہرہ پر خون - چمکدار سرخ - زیادہ بخار - پیاس نہ ہو۔ آرام سے لیٹنا چاہیے۔ اس دوائی کی
نمایاں علامت ہے۔ سردرد - گردن میں نالیوں میں ٹپکن - سوزج کی گرمی میں کام کرنے یا چلنے سے بخار۔
جیلسمیم - چہرہ پر خون - گلہ - گردن کی گڈی سے درد شروع ہو، پیاس نہ ہو۔ آرام سے لیٹنا چاہیے۔
نکسوسامیکا - مریض دن کے گرم ترین حصے میں بھی ٹھنڈ محسوس کرے۔ اگرچہ ٹھنڈ محسوس کرے
لیکن کپڑے اتار دے۔ خدی قبض منہ کا ذائقہ کڑوا۔ دن کے ۱۱ اور ۱۲ بجے بخار زیادہ ہو۔

آرمینیکم البم - بے چینی کے ساتھ بخار - تھوڑے تھوڑے وقفے پر تھوڑی تھوڑی مقدار میں پیاس۔
کنوری اور لاغری - بخار کی سردی شدید قسم کی۔ ایسا معلوم ہو کہ جسم میں دھڑکا ہوا خون برفانی پانی ہے۔
بخار کی حالت میں محسوس کرے کہ ابلت ہوا پانی خون کی نالیوں میں دوڑ رہا ہے۔

برائی اونیا - خشک کھانسی کے ساتھ بخار تمام جسم میں دھڑکیں ہوں۔ آرام سے لیٹ جانا چاہیے۔ کسی سے
دور بھی پسند نہ کرے۔ بہت لمبے وقفے پر بڑی مقدار میں زیادہ پانی پئے۔

ٹرائی اوٹیم - گیس یا ٹائفاؤئڈ بخار کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ ہر قسم کے بخاروں کیلئے مخصوص ہے۔
کیلیدیم - ہر شام بخار کے دوران سولے۔ اور جب بخار اتر جائے تو جاگ جائے۔

نیکشیتھس - قے کے ساتھ صفراوی بخار - معدہ میں جلن - متلی - ٹھنڈ کے ساتھ شدید پیاس - وقفہ
دار بخار - انتہائی سندس کے ساتھ۔

اگنیشیا - سردی کے دوران بخار اور پیاس - دوسری حالت میں نہ ہو۔ بیرونی گرمی سے سردی میں
انقرہ سو - بیرونی طور پر پیٹے سے گرمی بڑھے۔ سردی کے دوران چہرہ سرخ۔

الستونیا۔ اسہمال کے براہ دیمبا بخار

ایسٹ فاس۔ ہلکی قسم کا بخار۔

کیڈیمیم۔ { زرد بخار شدیدتہ اور تلی کے براہ۔
کروٹیلیم ہوور۔

ایسٹیک الیڈ۔ رات کو پینے کے ساتھ دیمبا بخار۔ جلدی صندی۔

ایمیس کین۔ تمام جسم کا پنے جیسے کہ خون بنانی ہو پانی میں تبدیل ہو گیا ہو۔ ٹھنڈا کر تک نہ چھے جلے۔

سورائیم۔ بخاروں میں جب گرمی اور پسینہ بہت زیادہ ہو۔ اہلتا ہو پسینہ جیسے کہ بھاپ کی طرح گرم۔

ایمیس ایم۔ بخار میں خشک گرمی اور پسینہ اول بدل کر آئے۔ کالانز بخار جس میں تلی بڑھ جائے پیاں

کے ساتھ یا اس کے بغیر یا پاس نہ ہو۔

پانی کی ٹھنسی۔ بخار کے آبلے۔

نیٹرم میور۔ بخار کے آبلوں کیلئے شاندار دوائی ہے۔ یہ کی بھی موقع پر دی جاسکتی ہے لیکن اگر۔

ناکام ہو جائے تو دوسری ادویات دی جاسکتی ہیں۔ وقفہ دار بخار میں۔

اگنیشیا۔ وقفہ دار بخار۔ جب نیٹرم میور ناکام ہو جائے۔

ایسٹ فاس۔ پرت دار یا نیفاٹہ بخار میں۔

لیکفلک الیڈ۔ مرض بنیادوں والی چنسیوں سے جڑے ہوئے آبلے۔

میپیر سلفر۔ چنسیاں رکھیں۔ چھینے والے درد۔ سفید بھوڑے جو اندر سے سرخ ہوں۔

سلیشیا۔ پرت دار۔ کانوں سے مواد بہے۔

رٹاکس۔ بخار کے آبلے۔

ہیٹیشیا۔ ٹائیفس بخار میں دانتوں پر گندی میل جم جائے۔

لاکڑا کا کڑا۔

دیرویلونیم۔ یہ دوائی علاج کے شروع میں دی جانی چاہیے۔ ۲۰۰ میں دن ایک خوراک بچائے۔

اس دوائ کا دیا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دوائی بیماری کا دورانیہ کم کر دیتی ہے۔
 انٹیم ٹارٹ - یہ دوائی دیرپا لینیم کے ۴۸ گھنٹے بعد دی جائے یہ ہر دو گھنٹے بعد دی جائے حتیٰ کہ
 بخار اتر جائے۔

برائی اونیا - اگر بخار کے ساتھ خشک کھانسی بھی ہو تو یہ دی جانی چاہیے۔ مریض چپ چاپ
 لیٹ جانا چاہتا ہے۔

مرک سال - جب بخار اتر جائے تو اس کے متعلق سوچا جائے۔ یعنی یہ دوا دی جائے۔
 کلکیریا فاس - یہ دوائی بطور ٹانکس بھوٹی چھپک - لاکڑا کا کڑا اور چھپک کے بعد دی جائے۔
 ڈینگو بخار - کمر ٹور بخار۔

برائی اونیا - تمام جسم میں دردیں - لیکن گہری ہڈیوں میں نہ ہو۔ آرام سے لیٹ جانا چاہیے۔
 زیادہ دفعہ پر زیادہ مقدار میں پانی کی پیاس۔
 یوٹیوریم پرن - کمر ٹور بخار کے لئے شاندار دوائی ہے۔ دردیں گہری ہڈیوں تک جائیں۔
 قے اور بے چینی ہو۔

رسٹاکس - کمر ٹور بخار کے لئے جب ٹھپوں میں تکلیف ہو تو دی جاتی ہے۔
 خُناق - (ناک، گلے کے تحت خُناق دیکھئے) سُرخ بادہ - (جلد کے تحت سُرخ بادہ دیکھئے)
 جسم کا شدید بخار - تیز بخار

بیلڈوٹا - تیز بخار مقابلہ خون میں زہر نہ ہو۔ جلد نار - چھنے والی بھاپ کی طرح گہری - ہاتھ
 پاؤں برف کی طرح سرد، پیاس نہ ہو۔

ورٹیم ورائیڈ - تیز بخار - بہت تبدیلیوں والا۔ یعنی کبھی زیادہ شدید بخار اور کبھی کم بخار۔
 انفلوئنزا۔

آرمیک ایلم - انفلوئنزا کیلئے چوٹی کی دوائی ہے۔ اگر یہ بغیر سوچے سمجھے بھی دے دی جائے تو بھی

دی جائے تو ۹ فیصد کیسوں کو درست کر دیتی ہے۔ اس کی علامات درج ذیل ہیں۔ پھوٹے پھوٹے
 وقفوں پر قصوری مقدار پانی کی پیاس۔ پھینکیں۔ ناک سے پتلا اور غراشدار پانی کا بہنا۔ الفلوئیزا
 کے بعد بھی دی جا سکتی ہے جب کا بلوڈ ٹچ ناکام ہو جائے۔

سلفر۔ یہ ایک حل انگیز دوائی ہے جو الفلوئیزا میں کسی نہیں بھولنی چاہیے۔ اگر بخار ۳۸ گھنٹے میں نہ
 اترے تو یہ صبح سویرے معہ ۲۰۰ میں دی جائے۔ یہ مکمل طور پر ٹھیک کر دے گی یا دوسری ادویات
 کے لئے علامات کو واضح کر دے گی جب یہ دوائی دی جائے تو دوسری کوئی دوا ۱۲ گھنٹے کے اندر اندر
 ہرگز نہ دی جائے۔

جیلمسیم۔ فلوی ابتدائی مٹیج میں دی جائے۔ اس میں شدید سردی اور پھینکیں کر کے اوپر نیچے جائے۔
 بہرہ ورنہ۔ مگر اس رخ۔ ناک سے پانی جیسا اخراج جو غراشدار نہ ہو۔ پٹھوں میں مستقل درد پیاس نہ ہو۔
 شدید درد ۹۹ دیکھئے۔

لوپٹیلوریم پرف۔ بخار میں سردی اور تھکے کے لئے موزوں ہے۔ کپکپاہٹ کرے نیچے پاؤں
 تک پھیلے۔ ہڈیوں میں گہری نکالیف جو حرکت سے کم ہوں۔ پیاس معلوم ہو لیکن پانی کا ذوق نہیں پاتا
 تیل والا معلوم ہو۔ زکام پھینکیوں کے ہمراہ گلا بیٹھا ہوا۔ اور قابو آنے والی کھانسی ۲۲ طاقت میں
 دیکھئے۔ جینم خلک۔

برائی اوینا۔ جب فلو کے ساتھ نمونیا بھی ملاحظہ ہو۔ پٹھوں میں گولی لگنے جیسے درد جو قصوری
 حرکت سے بھی زیادہ ہو جائیں۔ خشک کھانسی جو پھپھڑوں اور چھاتی میں بہت تکلیف دے جسم کو
 پسینہ آئے۔

کالی بائیکرومیکم۔ بخار کے بعد کھانسی جو پھپھڑوں اور چھاتی میں تکلیف دے۔ جسم کو پسینہ
 آئے خشک کھانسی نہ ہو۔ چکنے والی بلغم جو تاروں میں کھینچی ہے یعنی تاردار بلغم کمزوری تک
 کی بلغمی جھلیوں پر پھنسیاں ناک کی جڑ میں خشکی کے ساتھ تکلیف اور سخت مواد کا جماد۔
 نیٹرم سلف۔ یہ دوائی الفلوئیزا کے لئے مخصوص ہے۔

رٹاکس۔ متواتر سردی لگنے کے ساتھ فلو جیسے کہ جسم پر ٹھنڈا پانی گرا یا جاتا ہے کہ دریدوں میں

ٹھنڈا خون گردش کر رہا ہو۔ بازوؤں میں دردوں کے ساتھ بے چینی، ریاض اور دھڑکھڑکاتے۔ جس سے اس کو آفتاب تو رہا ہے۔ نگوں سے سرے کے ساتھ زبان خشک۔ سر اسٹ والی سخت کھانسی۔ ڈلکا مارا۔ صلت حاد میں ایک بہترین دوائی ہے۔ آنکھیں چڑھی ہوئی۔ گلہ کھڑا۔ چھوٹی کی دھکن سے کھانسی تکلیف دہ ہونی کی وجہ سے ہوا گرم موسم ٹھنڈے موسم میں تبدیل ہو جائے۔

کاسٹیکم۔ تیر بخار، سرخ چہرہ، سردی، نالگے، شدید کمزوری، بستر پر سے بے شکل اٹھ سکے، ناک بند۔ ناک بند، ناک بھر پور، پانی والا۔ گلہ میٹھا ہوا۔ خشک متواتر کھانسی ایک عظیم طاقت میں غور کی دیجئے۔ کارڈس میریانس۔ جب بگڑتا ہو چکا ہو تو نگوں کے لئے مفید ہے۔

انفلوئنزا نیم۔ یہ ایک نوسود ہے (بیماری کے مواد سے تیار کردہ دوائی ہے) یہ بطور عمل انگیز دوائی کے دی جاتی ہے جب اچھی طرح منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں۔ یہ دوائی نگوں میں بطور حفظ ماقدم کے دی جاتی ہے۔ یہ آرام بھی دیتی ہے اس دوائی سے علاج شروع کیا جائے۔ کاربوو کج۔ یہ دوا انفلوئنزا کے بعد کے اثرات یا علامات جیسے کمزوری، طاقت کی کمی، برانکائیٹس کی باقی ماندہ تکالیف، تلوؤں میں جلن جیسے کہ سرخ مریج سے ہو رہی ہے کیے مفید ہے۔ دن میں ۲۰۰ طاقت دو دفعہ دیجئے۔

انونیم کلاب۔ انفلوئنزا کے بعد کھانسی جب برائی آوینا اور دوسری ادویات ناکام ہو جائیں ایسی کھانسی کے لئے پہلے انونیم کلاب دی جائے۔ ۲۰۰ x میں دیجئے۔

بیٹیشیا۔ دوائی انفلوئنزا، مدہوشی، سہجہ کے ساتھ، چند ہی آنکھوں، سر میں درد، گلہ دکھے، تمام جسم میں دھکن اور دردیں شدید کمزوری، مدہوشی کے ساتھ، احمق دکھائی دے اور مدہوشی سے بے شکل جاگے۔

لائیکوپوڈیم۔ جب دوائی فلیو کے بعد اپنے آپ کو کام کرنے کے اہل نہ پائیں۔ یہ دوائی آنکھوں کی دھکن، ملیں ریا۔

چائنا۔ میرا کے لئے چوٹی کی دوائی ہے اس میں مریض ٹھنڈک محسوس کرتا ہے بغیر پیاس کے پہلی دو ابتدائی سٹیجوں میں یعنی ٹھنڈک اور گرمی میں دوسری سٹیج کے آخر پر پیاس لگتی ہے۔

جب بخار اترنا شروع ہو جائے۔ پیاس پسینے کی بیج میں نمایاں ہوتی ہے۔ دوسرے کس سردی سے پہلے اور بعد میں پیاس ہوتی ہے۔ ہر تیسرے روز علامات زیادہ ہوتی ہیں۔ حملوں سے پہلے متلی۔ ہجیان۔ دل کی دھڑکن سردی اور جھک کا احساس ہو۔ حاد کیسوں میں 29×9 طاقت دیں۔ مزمن کیسوں میں 200 یا 1000 طاقت میں دیں۔

جینینم سلفٹ۔ اس دوائی میں مرض کا دورہ 10 یا 11 بجے صبح یا 2 اور 10 بجے رات۔ سخت۔ ہلا دینے والی سردی۔ پیاس کے ساتھ۔ گرمی کی حالت بہت شدید ہوتی ہے اور اکثر اوقات اس کے ہزارہ جھائیاں اور جھینگیں ہوتی ہیں۔ اس بیج میں پیاس بھی ہوتی ہے۔ پسینے کی بیج کے ساتھ بھی۔ پسینہ کفرہ کر دینے والا اور دیر تک رہنے والا ہوتا ہے۔

آرسینکیم البم۔ شدید کزوری۔ پریشانی۔ بے چینی۔ شدید جلندار پیاس معدہ کے ہجیان کیساتھ منہ کا ذائقہ کڑوا۔ یہ مزمن کیسوں میں دی جائے۔ ٹھنڈا عام طور پر رات کی بے چینی سے پہلی ہوتی ہے۔ سردی اور گرمی اول بدل کر۔ شدید ہلا دینے والی سردی جو سال دن ہی رہے۔ تھوڑے تھوڑے پانی کی تھوڑے دھنوں پر پیاس، سردی کی بیج میں وہ محسوس کرتا ہے کہ خون کی نالیاں برف کی طرح ٹھنڈی ہیں اور پیاس نہ ہو۔ گرمی کی بیج میں محسوس کرے کہ اس کی نالیوں میں ابلتا ہوا پانی بہ رہا ہے۔ تھوڑے وقفے پر تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس۔ پسینے کی بیج میں زیادہ مقدار میں پانی کی پیاس۔ کونین کے غلط استعمال کے لئے جب بخار کی تینوں بیجین صاف نہ ہوں تو یہ دوائی مفید ہے۔

لوئیٹوریم پوٹ۔ ڈیروں میں دردیں جیسے کہ ٹوٹی ہوئی ہوں متلی اور تے جب ٹھنڈا گزر جاتی ہے۔ کمرے ٹھنڈا سرد اور تمام حصوں کی طرف جاتے۔ ٹھنڈا جھپٹوٹ کرے شروع ہو جو حرکت کرنے پر پانی پینے اور کپڑے اتارنے پر زیادہ ہو۔ ٹھنڈا بند ہونے پر متلی زیادہ ہو اور مریض کڑوا پانی والا مواد خارج کرتا ہے۔ گرمی کے دوران شدید پیاس۔ اکثر کیسوں میں پسینہ آتا ہے۔ کڑے ذائقہ کے ساتھ زبان پر گاڑھی تہ۔ کھوٹھی پر دباؤ۔

نیٹرم میور۔ لیکن دار۔ تھوڑے لگنے جیسا سردی اور شدید پیاس۔ جو مریض کو دوبارہ دورہ بڑی خبر دیتا ہے۔ لمبے۔ شدید سخت کپکپانے والی سردی جس کے ساتھ پیاس جو مریض ڈرتا ہے۔ ہنر مری

مواد کی تہ سردی کے دوران اور سردی میں۔ ہر بخار بہت زیادہ پسینہ کے ساتھ ختم ہو۔ ۱۱۰ اور ۱۱ بجے صبح دور ہو۔ اس دورانی کی یہ نمایاں اور سرخی سے لگتی جانے والی ہے۔ سردی انگلیوں۔ پنجوں اور کمر سے شروع ہو کر گھٹنوں پر ہے۔ انگلیوں کے سرے اور ہونٹ نیلے ہوں۔ گرمی کافی دیر تک رہے اور سردی کے ساتھ بڑھے جو ناقابل برداشت ہو جائے۔ اور اکثر بد بوٹی یا بدبوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ چہرہ زردی یا ریل مجبوراً تلی اور جگر ٹرسے۔ ہونٹوں پر پھیلے۔

پلسٹیل۔ معدہ کی تھوڑی سی گڑبڑ سے بخار کا حملہ ہو جائے کڑوا، ذائقہ یا کھٹی بلیغم کی تہ یا صفراوی تہ حملہ کے دوران پیاس نہ ہو یا گرمی صرف بخار کی گرم بیچ پر ہو۔ شام کے وقت حملے ہوں۔

برائی، ویسا۔ جب معدہ خراب ہو یا معدہ کی خرابیاں۔ ڈکار۔ منہ کا ذائقہ کڑوا۔ زبان پر زبرد قبض یا اسہال۔ جمائیاں لے۔ بخار کے دوران پہلوؤں میں سوزیاں چھتی ہوئی محسوس ہوں۔ پیاس بہت زیادہ یا سردی سے پہلے گرمی محسوس ہو ٹھنڈی حالت میں سرخ بخار۔

جیسا سیم۔ جب سردی ریڑھ کی ہڈی تک جائے یا پاؤں سے شروع ہو۔ گردن کی گڈری میں سردی دن کے دوپہر کے وقت سردی لگے۔ اونگھ۔ لاپرواہی اور جگر پیاس نہ ہو۔ پنجوں کیلے خاص طور پر مفید ہے۔

وتھیا۔ ابجے صبح موزی سردی کے دوران ٹھنڈے برت جیسے پانی کی پیاس۔ بخار کے ساتھ پیاس نہ ہو۔ تمام اہل شدید پسینہ۔ پسینہ کے دوران شدید سردی۔

رکشا کس۔ ٹھنڈی بیچ میں ٹھنڈا احساس اور بخار کی بیچ میں گرمی کا احساس جو خون کی نالیوں میں چھید کرتی معلوم ہو۔ خشک زبان۔ سردی سے پہلے خشک کھانسی۔ ماتھے اور آنکھوں میں جلن مژندار۔ بے چینی جس کو حرکت سے افادہ ہو۔ پانی جیسے زرد پاخانے۔ زبان کی ترک ٹکونی۔ سردی پہلو میں سے یا کندھوں کے درمیان میں سے شروع ہو۔

ایپس میل۔ اچانک اور شدید تہ، سردی کے پہلے بخار شام کے وقت ۶ اور ۷ بجے کے درمیان۔ ٹھنڈ بھاتی اور بیٹ سے شروع ہو۔ بھاتی پر وزن کا احساس۔ جلد خشک اور گرم۔ جلن اور بھاتی پر دباؤ۔ نمایاں علامات ہیں۔ اور نگلی تنفس خطرناک ہے

سیدرن - گھڑی کی طرح معرہ وقت پر بخار لوٹ آئے۔

مینا تھخص - بخار جس میں دیر تک سردی محسوس ہوتا، اٹھ اور پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے
۲۰۰ یا ۱۰۰۰ طاقت میں دیکھئے۔

فرم آریٹیکم - میرا۔ تلی اور مگر کے بڑھنے کے ساتھ۔ یہ مزن کیس کو ٹھیک کرتی ہے ۶ میں دیکھئے
نکسوا میکا - انگلیوں اور ہرہ کا ٹھنڈے کے ساتھ شدید۔ دیر تک کا پینا۔ خاص طور پر ہونٹوں اور
انگلیوں کے سر کے ٹھنڈے کپکپانا۔ کپکپاہٹ کے دوران میں پیاس نہ ہو اور بخار کی حالت میں شدید
پیاس۔ سر جکرائے جیسے کہ شرابی رکھی ہو۔ پیٹ اور نڈلیوں کے ٹپھوں میں اٹھن۔

دریثم ایلیم - صبح کے وقت شدید ٹھنڈک اور بہت زیادہ پسینے کے ساتھ بخار آئے جو بعض
کو کمزور کر دے اور لاغر بھی کر دے۔ بازو بہت ٹھنڈے ہوں یعنی مردوں کی طرح ٹھنڈے بازو۔

ملیریا آف - یہ ایک نوسوڑ ہے۔ مزن کیسوں میں یہ اونچی طاقت میں دی جانی چاہئے یا جب
اچھی طرح سے منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں۔ یہ علاج کو مکمل بھی کرتی ہے مستقل دروں جو بخار
کے اترنے کے باوجود قائم رہتی ہیں اس دوائی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔

کیلیدیم - ہمیشہ بخار کے دورے کے دوران سوجاتا ہے اور بخار کے اترنے کے باوجود قائم رہتی
ہیں اور بخار اترنے پر جاگ جاتا ہے۔

نکیتھخص - ملیریا بخار صفرادی تے۔ قبض۔ معدہ میں جلن۔ قلی شدید پیاس۔ سردی استثنائی
سوجن کے ساتھ ہو۔

سائیکس - ٹھنڈے پسینے پیاس۔ سردی دوران جوڑوں میں درد، کھینچاؤ جیسے کہ بندھنی پٹھے
شدید طور پر کڑکے ہوں۔ ٹانگیں پھیلائی نہ جا سکیں۔ پانی پینے سے کھانسی یا سردی میں اضافہ
ہوتا ہے یا دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

چیچک

برائی اونیا۔ چیچک کے لئے شاندار دوائی ہے یہ ۲ طاقت میں دی جائے۔
یہ مرض کو ختم کر دیتی ہے اور لیتیہ مرض کا درازہ کم کر دیتی ہے۔ یہ پھیچڑوں کی تکلیف کو روکتی ہے
جو کہ عام تکلیف ہو جاتی ہے۔

سیلیشیا۔ چیچک کے بعد کھانسی کے لئے یہ دوائی دی جاتی ہے۔
 پلسٹیللا۔ یہ دوائی مرض کی ابتدائی ٹیج کے لئے مفید ہے۔ زکام اور بہت زیادہ آنسو بہیں۔
 جیلیسیم۔ جب مریض اونگے اور لاپرواہ ہو۔ چہرہ سوجا ہوا اور سرخ پیاس نہ ہو۔ بعض بھلے لیکن
 نرم اور دھیمی ہو۔

ڈرومیرا۔ چیچک کے دوران اور بعد کی کھانسی۔
 ایپیس۔ چیچک کے دوران یا چیچک کے دب جانے کے دہرے دم داغ۔ مریض تکلیف دہانی کیوجہ سے
 اچانک چمخ مارے۔

کالی بائی۔ پلسٹیللا میں سادہ نزلہ کی بجائے قرنیہ پر سپہ دار پھنسیاں بن جائیں۔ تکلیف کیوجہ سے
 گلا سوجا ہوا گلے سے لے کر کان تک زکام کی وجہ سے بہہ رہی۔

میلنڈریم۔ چیچک کے لئے حفظ اقدم کے طور پر ۲۰ x میں ہر گھنٹہ میں ایک غورک دیکھئے۔
 یوفریزیا۔ آنکھوں اور ناک کی بلغمی تھلیوں کی سوزش۔ ناک سے سادہ پانی بہنے کے ساتھ تھینکیں۔
 اور آنکھوں سے غرا شذر بار پانی بہے۔ یہ چیچک کو سادہ قسم میں تبدیل کر دیتی ہے۔ پھنسیوں کو باہر نکال
 دیتی ہے۔ بخار کو کم کر دیتی ہے اور کھانسی سے نجات دلاتی ہے۔

آرسینکیم الیم۔ جب بہت زیادہ کمزوری ہو، تھوڑی تھوڑی مقدار میں تھوڑے وقفہ پر پانی کی پیاس۔
 بے چینی۔ سبز اسپہال جو آدھی رات کو زیادہ ہوں۔

ایلیٹھس۔ چیچک کو دبانے کی شاندار دوائی ہے۔ یہ چیچک کو بنے پر دم دمان کے لئے مفید ہے۔
 مواد کے اخراج کے دہرے سے بیہوشی دہلے ہوئی۔ گرمی دانے اچانک غائب ہو جائیں یا ظاہر ہوں۔

کینیٹریے۔

بیسلاڈونا۔ کینیٹریے کیلئے شاندار دوائی ہے۔ یہ مرکب آئیڈائیڈ ۳۰ x کے ساتھ اول بدل
 کر دی جاسکتی ہے۔ دونوں ادویات ہر نصف گھنٹہ بعد اول بدل کر دی جائیں۔
 فائٹولاکا۔ اگر مندرجہ ذیل ادویات ناکام ہو جائیں تو یہ دی جائے اور جب گوشت اور جلد زرد ہو۔

پلسٹیلٹا۔ جب کان ملوث ہو اور درد بہت شدید ہو۔ درد کو گرمی سے افاقہ ہو۔ جب کپٹیر سے
حصیوں اور پستانوں کو متاثر کریں اور سوزش نذرہ ہوں۔

ایرومینٹ۔ جب کپٹیر سے خستے اور پستانوں کو متاثر کریں اور پلسٹیلٹا ناکام ہو جائے۔
پروٹینٹیم۔ یہ ایک نو سوڈ ہے اور کپٹیر سے کیلے حفظہ ماتقدم کے طور پر استعمال کیجاتی ہے
یہ ۲۰۰ ملٹات میں دی جاتی ہے۔ ہفتہ میں ایک دفعہ دو یا تین پختے دی جاتی ہے بطور حفظہ ماتقدم
یہ بطور ٹھیک کرنے والی دوائی کے بھی استعمال ہوتی ہے۔ دوسری ادویات کے ہمراہ دی جانی چاہیے
ایسی حالت میں اسکی ایک خوراک دی جائے باقی تمام ادویات کو روک کر۔

پائیکو کارپٹیم۔ بطور حفظہ ماتقدم کے شاندار دوائی ہے۔ یہ دن میں دو دفعہ ایک ہفتہ تک دی جائے۔
طاعون۔ پلیگ۔

اگنیشیا۔ بطور حفظہ ماتقدم اور علاج کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ مدیکچر میں دی جائے ایک
نظرہ فی خوراک۔ دی جانے۔ اچھے نتائج دکھاتی ہے۔

اوپر کیولینا۔ جب ہلکے خندو دہیڑھ جائیں اور سخت ہو جائیں پھوڑے اور پھنسیاں بخار
کے ساتھ بے چینی۔ زیادہ ہونا اور ہڈیاں بکنا۔

ٹیرنٹولا کیو بیٹیر۔ متعفن اور زہریلی حالتوں میں بھڑکے بہت زیادہ نوشی اور درد کیساتھ
آرٹیکلیم۔ اسہال کے ہمراہ شدید کمزوری۔

کروٹیلس آپس۔ دائیں طرف تکلیف ہوں۔ خون بہنے کا رجحان۔ مریض ان علامات کیساتھ سوجاتا ہے۔
پائیر و جینٹم۔ شدید بے چینی کے ہمراہ متعفن حالت۔ بہت ہی بدبودار۔ اخراجات خلاء اسہال
ہوں۔ تے۔ پسینہ یا سانس۔ متاثرہ جگہوں پر شدید درد اور جلن ہو۔

رشاکس۔ ٹائیفائیڈ بخار کے ساتھ۔ ہڈیاں اور زبروں سے ہو جانے کا احساس اور خوف ہو۔

بیٹیسینم (پلیگنیم) بیماری کے دوران بطور مل ایجنٹ دوائی کے دی جائے۔
بیلادونا۔ مرض کے ابتدائی دور میں جب حاد ہڈیاں خشک ملن اور گول لگے جسمی دردوں کے ساتھ
بخار۔ چہرہ اور آنکھیں چمکدار۔

لیکس۔ شدید بے چینی اور کمزوری۔ تمام جسم پڑکھن۔ آنکھیں زرد۔

ناجا۔ ہندوستان اور پاکستان میں ہلیک کے لئے مفید دوائی بتائی جاتی ہے۔ اور لیکس کی بگڑی جاتی ہے۔
فاسفورس۔ جب نیا کے ہمراہ ہلیک ہو۔

ہائیڈروکسیٹک۔ حالتِ نرس میں مفید ہے۔

تھوجا۔ درد والے۔ بدبودار پھوڑے یا پھنسیاں۔ گہری سوجی ہوئی جگر پر خاص طور پر اسٹیکٹو
مضموں کے لئے بہت مفید ہے۔

ساراسینیا۔ چھپک کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ کسی بھی بیج میں دی جاسکتی ہے۔ یہ صرف کے خیر
دورانیہ کو ٹھیک نہیں کرتی۔ بلکہ گڑھے پڑنے کو بھی ٹوک دیتی ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بطور
حفظِ مقدم اور شفا بخش دوائی کا کامیاب دوائی ہے۔

دریٹرم ورائیڈ۔ نبض بھری ہوئی اور تیز سر درد۔ سر کے پھلی طرف زیادہ پسینہ کے ساتھ بخار۔
سرگرم اور اٹھ پاؤں ٹھنڈے۔

میلنڈریم۔ نبض بھری ہوئی اور تیز سر درد۔ یہ دوائی پیچیک ایک اور حفظِ مقدم کے طور پر
استعمال ہونے والی دوائی ہے۔ ٹیکوں کے اثرات بد۔ اگر ٹیکوں کے ساتھ دی جائے تو ٹیکے اثر
نہ کریں۔

مکریورس۔ یہ اس وقت دی جاتی ہے جب خدر و خاص طور پر کان کے نیچے کے خدر و ملتے ہیں۔
بہت زیادہ بخور اور بزر بلغم والے۔ پاخانے والی نمایاں علامات ہوں۔ یہ گڑھے بننے کو روکتی ہے
کیو پیم الیکیم۔ چھپک تیز نبض کے ساتھ۔ چھاتی میں اینٹھن دار دورے۔ منگل کی نسلے
کمزوری۔ بھوک نہ ہونا۔ چہرہ سرخ اور سوجا ہوا۔ بدحواس۔ پنڈلیوں میں اینٹھن مختلف جہات
کے پھوڑے پھنسیاں۔

میلوڈونا۔ لیکن دار سر درد۔ بیگنی رنگ کا چہرہ۔ خشک گلا۔ اچھلتی ہوئی پھر پھر نبض۔ پھر جاتا
ہے اس کا سر پکڑا جائے اور کپڑے کے ساتھ تختی سے باندھ دیا جائے۔

فاسفورس۔ جب غریبہ کے بگاڑ یا خون بہنے کی علامات کے ساتھ یا دونوں حالتوں میں پھر پھر

سے چکدار خون جو آنا زیادہ ہو کر غشی اور شدید کمزوری ہو۔ چھوٹی چھوٹی جگہوں یا علیحدہ علیحدہ جھپک کے زخموں سے خون بہے۔

ہیما میلنس۔ خون بہنے والی جھپک بگڑا مواد سے۔ موٹروں۔ بکن۔ اس کے مستقیم اور اعضا کٹا لے سے خون بہے۔

ایسڈ ٹائٹرک۔ آنتروں سے خون بہے۔ ناک سے بہت زیادہ خون بہے۔ خون چکدار اور گرم ہوتا ہے۔

میوٹریک ایسڈ۔ جھپک کی آخری سیج جہاں پسینہ بکثرت بہے اور مریض دل ڈوبنے کی حالت میں ہو۔ بہت کمزور اور حالت نزع میں ہو۔ خون کا نظام درہم درہم ہونے کی وجہ سے مریض اپنے افعال پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔

لیکسس { مرض کی گلی مٹری ہوئی حالت عام کمزوری کے ساتھ۔ مدہوشی اور غری نظام کا درہم درہم ہو جانا۔
ایپسلفر { یہ دوائی بیمار غدار اور چھوڑوں میں پیپ ہضم کے عمل کو تیز کر دیتی ہے۔

اہم علامات ہے جو اکثر ٹائیفائیڈ کے کیس میں ہوتا ہے۔

لیکسس۔ یہ پیشینہ جیسی علامات رکھتی ہے سوائے اس سے کہ مریض کی حالت نیند کے

بعد زیادہ بُری ہوتی ہے اور بگڑے رنگ کے خون بہنے کا حجاب ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے جانے سے

حساس ہوتا ہے۔ خاص طور پر گردن اور کمر پر بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ دانغ کے فالج کے نشانات

جیسے کہ نچلے جڑے کا گر جانا۔ بدبودار اخراجات۔ دھیمے انداز میں بڑانے کا ہڈیان خشک پٹنے والی زبان۔

ایسڈ میوٹریک۔ یہ دوائی آنت سے خون بہنے کے لئے ہوتی ہے۔ بدبودار سانس۔ گندی یا گلی

شری پوشیدہ کمزوری۔ پانانے متواتر ہوشی مرائیں۔ جڑا نیچے ٹک جائے حقیقت میں مریض قبر کے

کنارے ہو یعنی قریب المرگ ہو۔ زبان خشک منہ میں کھڑکھڑاتی ہے۔ نبض وقفہ دار۔

سفلینیم۔ ٹائیفائیڈ بخار کے بعد جب مریض آشک کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا

ہو۔ سفلینیم اونچی طاقت میں یعنی ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ میں دیجئے۔

ابن سقیم - ٹایفائیڈ میں بے خوابی - دماغ کی جڑیں اجتماع خون -

اوپیم - ناجی حالت، گہرا سرخ چہرہ اور خراٹے دار سانس -

کلیریا کلاب - آنکھیں بند کرنے پر چیریں اور انسان دیکھتا ہے - آنکھیں کھولنے
بسیلا ڈونا - پردہ غائب ہو جائیں -

ایسڈ فاس - ٹایفائیڈ بخار کے بعد کمزوری اور لاغری -

کیسٹورم - ٹایفائیڈ بخار کے بعد کمزوری کیساتھ چڑچڑاہٹیں کمزور کرنا لاپسیہ خاص طور پر عورتوں میں -

کیورپرم پیٹ - بہوشی کے ساتھ ٹایفائیڈ بخار - نفس معلوم نہ دے - پیشاب کا گھٹ جانا یا دب

جانا - پیٹ دھول کی طرح پھولا ہوا یا تنہا ہوا - بے ہوشی - قرش پر کی روز روز اور دھڑلے شدید کمزوری

اور اعصابی برائگیختگی - ہر ۱۲ گھنٹے کے ۲۰ طاقت میں دیکھتے تھے کہ افاقت شروع ہو جائے -

سٹرا موئم - منہ سے خون سیاہ بہنے کے ساتھ ٹایفائیڈ بخار - زبان خشک - اتنی سوچی ہوئی


کہ منہ بھر جائے نقشے دار سرخ جیسے کہ گوشت کا کٹڑا -

ٹیبر پٹھنا - ہموار چمکدار سرخ زبان شدید روجن کے برابر -

کروئن ٹیکیم - اسہال کے ساتھ درد قلوب کی خرابیوں کے برابر

کالی فاس - خشک مہجوری زبان - دانتوں پر خشک پرت - ذہنی دباؤ - ہڈیاں گندے بدبودار اڑھتا -

ویکسینیم مائیرٹیلیس - زرد پتلے پانانے بہت زیادہ پیاس اور ٹھنڈ محسوس ہو -



پندرہواں
۱۵

باب



بیشی مرض

انہم کر ڈو۔ شام کے وقت تیز بلوں سے۔ گرمی سے شراب سے۔ پانی سے دھوئے اور نہانے سے مرض میں زیادتی ہو۔

سینچیا۔ دوپہر سے پہلے اور شام۔ دھونے سے نمی سے۔ بائیں جانب۔ پسینے کے بعد ٹھنڈی ہوا اور طوفان سے پہلے۔ ہمدردی ظاہر کرنے پر آنکھیں بند کرنے پر مرض میں زیادتی ہو۔

نکسوامیکا۔ صبح کے وقت۔ ذہنی اکساہٹ زیادہ۔ ذہنی کام۔ کھانا کھانے کے بعد چہرے پر شور سے۔ گرم مصالحوں۔ ہیجان خیز۔ مسکن۔ خشک موسم۔ کھلی ہوا۔ ٹھنڈ۔ گیلی جگر پر بیٹھنے سے۔ تنہا کو نوشی سے۔ بستر میں مرنے پر۔ ٹینٹ اور دوسری دوائیوں سے۔ خوشبودار۔ کر ڈی بناتی گولیوں سے۔ بیٹھنے رہنے کی عادت سے مرض میں زیادتی ہو۔

آرینکم البم۔ نمدار موسم۔ شام کو۔ آدھی رات کو یا اس کے بعد۔ ٹھنڈے مشروبات یا ٹھنڈی غذا سے۔ ساحل مندر۔ اندھیرے۔ پھلوں کے کھانے سے پھینکیں آئیں۔

برائی اوتیا۔ حرکت سے۔ گرمی سے۔ صبح کے وقت۔ کھانا کھانے سے۔ گرم موسم میں۔ زیادہ کام کرنے۔ جھوٹے۔ ناگوار اور کڑھ آواز سے۔ بغیر تکلیف والی طرف لیٹنے سے مرض میں زیادتی ہو۔ چامہ سنہ۔ تھوڑا سے جھوٹے سے۔ ہوا کے بھونکوں سے۔ ہر دوسرے دن رطوبات زندگی بخش رطوبات، مثلاً خون وغیرہ بہنے سے یا خارج ہو جانا۔ اسہال وغیرہ۔ رات کو پھل کھانے سے مرض میں زیادتی۔

یکمو میلا۔ حرارت یا گرمی۔ کھلی ہوا۔ ہوا سے۔ رات کے وقت۔ بغیر درد والی طرف لیٹنے سے مرض میں زیادہ ہو۔

سٹس کیناؤنٹس۔ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا لگنے سے۔ دماغی مشقت سے۔ جوش سے مرض میں زیادتی ہو۔

مرک سال۔ رات کے وقت یا آدھی رات کے وقت۔ گیلے۔ نمدار موسم میں دائیں جانب لیٹنے

سے۔ پسینہ آنے پر۔ گرم کمرے میں اور گرم بستر مرض میں زیادہ ہو۔ درجہ حرارت کی شدت سے زیادتی مرض۔ گرم اور ٹھنڈے موسم میں زیادتی ہو۔

کاسٹیکم۔ ٹھنڈی ہواؤں سے خشک۔ صاف موسم میں ٹھنڈی ہوا سے۔ گاڑی کی حرکت سے زیادتی مرض ہو۔

کالی کارب۔ جماعت کے بعد ٹھنڈے موسم میں۔ شور بے اور کافی سے صبح کے تین بجے کے قریب بائیں اور لیٹے سے پردہ۔

سورائیم۔ کافی سے زیادتی ہوتی ہے۔ یہ دوائی لیتے وقت کافی نہیں لینی چاہیے۔ موسم کی تبدیلی سے۔ گرم سورج کی دھوپ میں۔ ٹھنڈے بہت معمولی ٹھنڈی ہوا لگے جھونکے کے ڈر سے مرض میں زیادتی ہو جاتی ہو۔

سلیسیا۔ نئے اور پورے چار چاند۔ صبح کے وقت دھونے سے جھینس کے دوران۔ کپڑے اتارنے پر۔ لیٹے سے۔ نمی سے بائیں جانب لیٹے سے۔ ٹھنڈی ہوا سے۔ ہمدردی ظاہر کرنے سے امراض میں زیادتی ہوتی ہو۔

زنگم میٹ۔ شراب پینے سے تمام قسم کی تکالیف بڑھیں جو مریض کو مدہوش کر دے خواہ تھوڑی سی مقدار میں پی جائے۔

ایسڈ فاس۔ مشقت سے۔ اس کے ساتھ بولے جانے پر۔ رطوبات جسمانیہ کے اخراج سے جلدی افعال کی زیادتی۔

فاسفورس۔ چھونے پر جسمانی یا ذہنی مشقت۔ بہت زیادہ روشنی۔ گرم کھانا یا گرم کھانا مشروبات موسم کی تبدیلی سے گرم میں موسم میں بھیگ جانے پر۔ شام کے وقت۔ بائیں جانب یا درد والی طرف جانب لیٹے سے۔ طوفان کے دوران۔ سیڑھیاں چڑھنے سے۔

لائسیسین۔ چلتے پانی کو دیکھنے یا اس کی آواز سننے پر یا پانی انڈیلنے یا صحت یا معات کے متعلق سوچنے سے چندھیلنے والی یا منعکس شدہ روشنی۔ سورج کی گرمی۔ ٹیڑھا کھڑے ہونے سے یا ٹیک لگا کر کھڑے ہونے پر مرض میں زیادتی ہو۔

سے۔ پسینہ آنے پر گرم کمرے میں اور گرم بستر مرض میں زیادہ ہو۔ درجہ حرارت کی شدت سے زیادتی مرض گرم اور ٹھنڈے موسم میں زیادتی ہو۔

کاسٹیکم۔ ٹھنڈی ہواؤں سے خشک۔ صاف موسم میں ٹھنڈی ہوا سے۔ گاڑی کی حرکت سے زیادتی مرض ہو۔

کالی کارب۔ جماعت کے بعد ٹھنڈے موسم میں۔ شور بے اور کافی سے صبح کے تین بجے کے قریب بائیں اور لیٹنے سے پرورد۔

سورائیم۔ کافی سے زیادتی ہوتی ہے۔ یہ دوائی لیتے وقت کافی نہیں لیتی چاہیے موسم کی تبدیلی سے گرم سورج کی دھوپ میں۔ ٹھنڈے بہت معمولی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے در سے مرض میں زیادتی ہو جاتی ہو۔

سیلیشیا۔ نئے اور پورے چار چاند۔ صبح کے وقت دھونے سے جھین کے دوران۔ کپڑے اتارنے پر۔ لیٹنے سے۔ نجی سے بائیں جانب لیٹنے سے۔ ٹھنڈی ہوا سے۔ ہمدردی ظاہر کرنے سے امراض میں زیادتی ہوتی ہو۔

زنگم میٹ۔ شراب پینے سے تمام قسم کی تکالیف بڑھیں جو مریض کو مدہوش کر دے خواہ تھوڑی سی مقدار میں پی جائے۔

ایسڈ فاس۔ مشقت سے۔ اس کے ساتھ بولے جانے پر۔ رطوبات جسمانیہ کے اخراج سے جلدی افعال کی زیادتی۔

فاسفورس۔ پھونے پر جسمانی یا ذہنی مشقت۔ بہت زیادہ روشنی۔ گرم کھانا یا گرم کھانا مشروبات موسم کی تبدیلی سے گرم میں موسم میں بھیگ جانے پر۔ شام کے وقت۔ بائیں جانب یا در والی طرف جانب لیٹنے سے۔ طوفان کے دوران۔ میڑھیاں چڑھنے سے۔

لائیمین۔ چلتے پانی کو دیکھنے یا اس کی آواز سننے پر یا پانی انڈیلنے یا صحن یا باغات کے متعلق سوچنے سے چند حیلانے والی یا منعکس شدہ روشنی۔ سورج کی گرمی۔ میڑھا کھڑے ہونے سے یا ٹیک لگا کر کھڑا ہونے پر مرض میں زیادتی ہو۔

سٹر امونیم۔ اندھیرے کمرے۔ علاجی دوا میں پکڑا اور روشن اشیاء دیکھنے پر نیند کے بعد۔
 ننگے پر مرض میں زیادتی ہو۔

کونیم۔ لیٹنے پر بستر میں۔ پہلو بدلنے پر۔ تجرد کی زندگی (بغیر شادی کے زندگی گزارنے پر) حیض سے
 پہلے اور اس کے دوران زکام لگنے پر جسمانی اور ذہنی مشقت پر مرض میں زیادتی ہو۔
 سلفر۔ آرام کرنے پر اور جب کھڑا ہو۔ بستر کی گرمی۔ دھونے پر۔ ہانے پر۔ صبح کے وقت الہجے
 قبل از دوپہر۔

نیٹرم میور۔ شور سے۔ گانے سے۔ گرم کمرے میں لیٹنے سے۔ ایک قبل از دوپہر۔ ساحل سمندر
 پر۔ ذہنی مشقت بھردی ظاہر کرنے پر۔ گرمی اور بولنے پر مرض میں زیادتی ہو۔

لیکسس۔ نیند کے بعد یا سونے کے بعد۔ حیض کے سوتے وقت زیادتی مرض ہو۔ سکالیف جو
 نیند کے دوران آئیں۔ پہلے بائیں جانب اور پھر دائیں جانب۔ موسم بہار میں۔ گرم پانی سے ہٹانے پر
 گرم مشروبات۔ آنکھیں بند کرنے پر۔ تنگ کپڑوں سے حیض کے بند ہونے پر سکالیف میں زیادتی ہو۔
 ڈکامار۔ رات کے وقت۔ عام طور پر ٹھنڈے۔ نندار موسم برسات میں سکالیف میں زیادتی ہو۔
 ایرانیڈائیڈ۔ نندار موسم میں زیادتی۔ سر پہرے کے بعد اور آدھی کے وقت مرض میں زیادتی ہو۔
 نیٹرم سلف۔ گانے جو عورت کو غلین کر دیں۔ بائیں جانب لیٹنے سے۔ نندار موسم یا نندار جنگ
 پر برائش۔ طوفان سے زیادتی ہو۔

پلسٹیل۔ گرمی سے۔ چوبلی خوراک سے جسے کر میٹری۔ کھانا کھانے کے بعد۔ شام کے قریب۔
 گرم کمرہ۔ بائیں جانب لیٹنے سے یا بغیر تکلیف والی طرف لیٹنے سے۔ جب پاؤں نیچے لٹکائے۔ متلون
 مزاج (گھڑی میں تولد گھڑی میں ماشہ) جگہ تبدیل والی سکالیف۔ حیض سے پہلے اور حیض کے دوران۔
 لیڈم پال۔ بچہ کی طرف حرکت کرنے سے زیادتی ہو۔

سینی کوللا۔ رات کے وقت اور بستر کی گرمی اور کی طرف حرکت کرنے پر زیادتی ہو۔
 امبر گریسیا۔ دوسرے لوگوں کی موجودگی اور مکالمات یا بول چال سے علامات برصی میں۔ گھانسنے
 سے مرض بڑھتا ہے۔

نیٹرم آرسینکیم - ٹھنڈے مشروبات - ٹھنڈی خوراک - چربی بھل - دودھ - سوز کا گوشت - برکے ذائقے والے کھانے سے سوائے گھلے اور معدے کے جو گرم مشروبات سے افاتہ پذیر ہوتے ہیں۔ احساس جرم کی وجہ سے ناپائیدار مرض ہوتی ہے۔

الیومنا۔ نمک شراب برک۔ مرچ اور شراب والے مشروبات۔ دقاً فوقاً۔ سبب۔ آلوں سے صبح کے وقت جاتے پر۔ گرم کرے میں زیادتی ہو۔

ایک کینم - صبح کے وقت - ایک دن میں اور دوسرے دن شام کے وقت زیادتی - جلد جلد بولنے والی (گھڑی میں تو رگھڑی میں ماشہ) متواتر تبدیل ہونے والی تکلیف کی زیادتی
کر دس شامیوا :- بیٹنے سے زیادتی - گرم موسم - گرم کوہ - صبح کے وقت - روزہ رکھنے سے - صبح کے ناشتے سے پہلے کسی چیز کو جم کر دیکھنے -

بسیلا ڈوفا۔ چھوٹے پر شور یا کثرت آواز۔ سخت جھونکا۔ شام کے وقت بیٹھے سے بال کٹوانے پر ڈیڑھ دو
ہمیر پلنگر۔ ٹھنڈی خشک ہواؤں سے۔ ٹھنڈی ہوا سے تھوڑے سے چھونکے سے۔ پارے سے چھوٹا درد
والی جگہ پر بیٹنے سے زیادتی۔

شیفگیر یا - غصے سے زیادتی۔ برہم ہونے پر علم سے جذبات کے مجروح ہونے پر۔ رطوبات زندگی کی کمی سے سلق۔ جنسی بے اعتدالیوں سے۔ تباہ کنوشی۔ متاثرہ حصہ کو ذرا سا چھونے پر۔ دوسروں کے غلط کاموں کی وجہ سے زیادتی۔

کاربرد و تیج - شام کے وقت رات کو کھلی ہوا میں - ٹھنڈی - چوبلی خوراک سے - مکھن میٹھی - کافی - دودھ - گرم ہندو موسم اور بیشاب سے زیادتی -

کالوشنٹھ - غصے اور برہم ہونے پر - نیاداتی مرض -

لوڑ کھیں۔ بچے کی طرہ حرکت۔ شور۔ تباہ کن نوشی۔ گرم موسم حیض کے بعد۔

اگیشیا۔ بُری خبر سنکر۔ مجمع کے وقت کھلی ہوا میں۔ کھا کھانے کے بعد۔ کافی۔ تباہ کن فحش۔ مالمعات
ہر طرف گری اور شور ہے۔

کالچیکم - سوز مزاج ہونے سے سوز نکلتے ہیں۔ حرکت سے۔ نیند نہ آنے خود کار کی بوت سے
شام کے وقت ذہنی اور شور۔

کاکولس - کھانا کھانے کے بعد۔ نیند نہ آنے سے۔ کھلی ہوا میں۔ تبا کو نوشی سے۔ سواری کرنے سے
تیراکی سے چھوٹنے سے۔ شور سے۔ حرکت آواز سے۔ شام کے وقت جیٹھ کے دوران۔ جذبات کے
درہم برہم ہونے پر۔

کارلوا ایمیلیس - شیو کرنے کے بعد حیوانی لطوبات کے منافع ہونے پر
رکشا کس - رات کے وقت۔ نیند کے دوران میں۔ مندر بارش کا موسم اور بارش کے بعد آرام کے
دوران۔ جب کر کے بل یا دائیں طرف لیٹے۔

رسوڈونڈرون - طوفان سے پہلے۔ کھردرے موسم میں تمام علامات واپس لوٹ آئیں۔ رات کو۔ صبح
کے قریب زیادہ ہوں۔

کوکا - بلندی سے پہنچے اترنے پر۔

کلکیر یا فاس - مندر ٹھنڈا موسم لگنے پر برف پگھلنے پر۔

فیرم میٹ - آرام کے دوران تکالیف کی زیادتی ہو۔ تنگی تنفس اور کمزوری بھی آرام کے
وقت زیادہ ہو۔ آہستہ روی سے اتفاق لیکن کوئی کبھی مشقت مرض کو زیادہ ہو جائے۔

میگنیشیا پور - سونے کیلئے آنکھیں بند کرنے پر زیادہ۔ آنکھیں بند کرنے پر آئینہ پریشان
ہو جائے۔ بے چینی۔ جھلپا پن کردہ اور پرکے کپڑوں کو دور بھینک دے۔ لباس سانسے یا کوئی اور
کام کرے۔ نیکین چیزوں اور سمندری ہوا میں سانس لینے سے زیادتی۔

میگنیشیا فاس - دائیں طرف ٹھنڈے یا رات کو چھوٹنے سے زیادتی۔

جیلیسیم - مندر موسم میں زیادتی۔ دھند۔ طوفان سے پہلے۔ جذبات۔ جوش۔ بری خبر۔
تبا کو نوشی۔ جب اپنی تکالیف کے متعلق سوچے تو زیادہ ہو۔

ڈالسکوریہ - شام اور رات کو لیٹنے پر اور دہل ہونے پر مرض میں زیادتی ہو۔

برومیم - شام سے آدھی رات تک کو، جب گرم کرے میں بیٹھا ہو۔ گرم مندر موسم جب آرام کرے
اور بائیں جانب لیٹے۔

سائیکل میں۔ کھلی ہوائیں۔ شام کو بیٹھے ہوئے۔ کھڑے ہونے پر۔ ٹھنڈے پانی میں زیادتی ہو۔
اینا کارڈیم۔ گرم پانی لگانے پر زیادتی۔

کیو پریم میٹ۔ حیض سے پہلے۔ تے کرنے پر اور پھوٹنے پر زیادتی ہو۔
ایپس میل۔ گرمی کسی بھی حالت میں ہواس سے زیادتی۔ چھوٹے پر۔ دباؤ۔ سر پہرے بعد۔ سونے
کے بعد۔ بند اور گرم کمرے میں زیادتی ہو۔

آر جفٹم ٹائپریم۔ گرمی خواہ کی بھی حالت میں اس سے زیادتی۔ رات کے وقت ٹھنڈی خوراک
سے مٹھائیوں سے کھانا کھانے کے بعد۔ حیض کے دوران۔ جذبات سے بائیں جانب۔

الرجی

دیکھئے سمندری سفر میں جی کا مسئلہ۔ ہوائی سفر میں جی کا مسئلہ۔
الرجی کسی چیز سے غیر معمولی اور بالغ آئینہ تک مخصوص طور پر متاثر ہونے کی ایک کیفیت ہے
جو اکثریت کے لئے اسی مقدار اور انہی حالات میں بے ضرر ہو جاتا ہے۔ پھلی۔ بیریز۔ انڈھے۔ سفید روٹی
دیگر اشیائے خوردنی سے جو علامات مثلاً چھپاکی۔ متلی۔ تے۔ دردیں۔ جلاب۔ آدھے سر
کا درد۔ دم اور دوسری قسم کی بہت سی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ جو دوسرے بہت سے لوگوں
کے لئے موافق ہوں۔ الرجی کی علامات یا زہریلے اثرات پیدا کر دے۔ یہ لوگ اس خاص قسم
کی خوراک یا دوائی کے لئے حساسیت رکھتے ہوں۔

یو بر کو لینیم } یہ دودھ۔ دودھ کی مصنوعات انڈوں۔ سارڈائن پھلی۔ جانوروں
سلفر } کی پکائی ہوئی خوراک بالوں کو رنگنے والے رنگوں وغیرہ سے الرجی کے لئے
جوئی کی دوائی ہے۔ یو بر کو لینیم سب سے ۲۰۰ طاقت میں دی جائے اگر خوراک ۲ سے جو ہر منبتہ ایک
خوراک دینے پر کوئی اتفاق نہ ہو تو سلفر ۲۰۰ ہر منبتہ ایک خوراک دیجئے۔ اگر یہ طاقت بھی مطلوبہ کام نہ کرے
تو ۱۰۰۰ طاقت کی ایک خوراک دینے پر یا دودھ خوراک ہر منبتہ روز بعد دیجئے۔ سلفر کے لئے نیچے دی گئی
علامات بھی دیکھئے۔

تھامروڈین۔ یہ ناک کی الرجک سوزش کے لئے شاندار دوائی ہے۔ جس میں شدید چھپکیں۔
 بلغھی جھلیوں کی سوزش اور استقامت ظاہری سبب کے بغیر تنگی یا غیر واضح علامات کی وجہ سے
 تنگی تنفس۔ الرجک دمر شدید تنگی تنفس کے ساتھ۔ چھپکی۔ اگر نیا۔ چکر۔ سر درد۔ جی متلانے
 اعصابی دردیں وغیرہ جب الرجی کی وجہ سے ہوں۔

سورائینم۔ گندم کے لئے الرجی جو اگر نیا کا سبب بنے۔ یہ یورکولینم کے لئے ختم ہے جہاں
 یورکولینم ناکام ہو جائے یا جزوی طور پر نفاذ دے۔ جب سلفر ناکام ہو جائے تو یہ معالی ناکام
 ہو جائے تو یہ دوائی استعمال کرائی جائے۔

ایپیمر گریو۔ ایک قسم کی اجوائن کھانے سے الرجی جس کی وجہ سے خارش پیدا ہو جائے۔ ۲۲۰۰
 ۲۱۰۰۰ ہفتہ یا پندرہ دن کے بعد دیں۔

فرنگیر یا دیریکا۔ سٹرابیری سے الرجی جو چھپاکی پیدا کرے۔ بعض اوقات سانس لینے میں قوت
 ہو جیسے کہ حثاتی پر وزن ہو۔

پلسٹیللا۔ کاڈ مچھلی کے جگر کے تیل سے الرجی۔ چربی سے سسکرتے کے رس سے۔
 پروٹین یا لحمیات والی خوراک سے حساس۔ تیوں۔ چربیوں سے صفراوی دی ہو جائے۔ زکام
 لگنے کا رجحان اور آسانی سے ٹھک جانا۔

تھوجا۔ پیاز سے الرجی جو اس کے لئے زہریلی طرح ہوں۔
 لاسیکو پودیم۔ کستورہ مچھلی سے الرجی۔ اس کے لئے کستورہ مچھلی کا استعمال زہریلی طرح ہو۔
 میکرم آف۔ کھانڈیا گنے سے الرجی۔

ارٹیکا یورینس۔ دودھ سے الرجی جو چھپاکی پیدا کر دے۔
 نیٹرم میور۔ انڈوں۔ نشاستے۔ دودھ۔ شہد۔ ریگ۔ میٹھے نرد دانوں۔ پیاز۔
 گندم۔ جانوروں کی خوراک وغیرہ سے الرجی۔

فرم میٹ۔ انڈوں سے الرجی
 سلفر۔ برون اور چاکلیٹ سے الرجی۔ ایسے بعض کے بنار کا بی کا علاج جو کپڑوں والا

سرما نہ استعمال کرتا ہے۔ بالوں کو رنگنے والے رنگ سے حساس جو اگر زیادہ پیدا ہوئی حیوانی خوراک سے الرجی۔ جب بالوں کو رنگنے سے رنگ کی الرجی سلفرے ٹھیک نہ ہو تو یوریکولیم $\times 20$ دیتے۔ از جنٹم ٹائٹرکیم۔ تمام قسم کی الرجی کی بیماریاں جو جلد کے لئے بہت الفت یا محبت رکھتی ہوں بلغمی جھپٹیاں۔ دوسرے حصے اور اعضاء خاص طور پر پچھڑے زیادہ محبت رکھتے ہوں۔

کمی مرض - مرض میں افاقہ

نمکس و امیکا۔ ہلکی نیند یا قیلول سے آفاقہ اگر یوری کر لینے دی جائے۔ شام کے وقت سونے پر آرام کرنے پر بخدا تر موسم میں شدید دباؤ سے۔
آرسینکیم البم۔ گرمی سے۔ سراوڑ اٹھانے سے۔ گرم مشروبات۔ پسینہ۔ کندھے اور پراٹھا کر لکر کے بل لیٹنے سے۔ دباؤ۔ آرام۔ ٹھنڈی چیزوں سے آفاقہ ہو۔
چائنا۔ آگے کی طرف جھکنے سے سخت دباؤ کھلی ہوا گرمی سے آفاقہ ہو۔
برلانی اونیا۔ تکلیف والی طرف لیٹنے سے۔ دباؤ۔ آرام ٹھنڈی چیزوں سے آفاقہ ہو۔
کیمومیل۔ اٹھائے جانے پر (بچوں کو گود میں اٹھائے جانے پر) گرم تر موسم۔ پسینے کے آنے پر آفاقہ ہو۔

سٹس کیناؤنٹس۔ کھانا کھانے کے بعد آفاقہ۔
کاسٹیکم۔ بخدا تر موسم۔ گرمی۔ بستر کی گرمی اور نہانے سے آفاقہ۔
کالی کارب۔ گرم موسم میں آفاقہ اگرچہ بخدا تر موسم۔ دن کے وقت ادھر ادھر حرکت کرنے پر بستر میں بیٹھنے پر آفاقہ ہو۔

سورائیم۔ گرمی سے آفاقہ۔ گرم کپڑوں سے آفاقہ گرم موسم میں بھی۔
سیلیشیا۔ گرمی۔ سر کو پیٹنے سے۔ گرمیوں کے موسم۔ تر یا بخدا تر موسم۔ بخدا تر گرم موسم میں۔
ایسٹفاس۔ گرم رکھنے پر آفاقہ۔ پیشاب خراج کرنے پر آفاقہ۔
فاسفورس۔ اندھیرے میں۔ دائیں طرف لیٹنے سے ٹھنڈی خوراک سے۔ ٹھنڈی کھلی ہوا۔

ٹھنڈے پانی سے دھونے سے۔ نیند سے افاقہ۔

سٹر امونیم۔ چمکدار روشنی سے۔ لوگوں کی موجودگی میں یعنی مجلس میں۔ گرمی سے افاقہ۔
کونیم۔ دھڑہ رکھنے پر افاقہ۔ اندھیرے میں۔ بازوؤں کو بچھلکے رہنے پر۔ حرکت اور دباؤ پاؤں
گرمی پر رکھنے پر افاقہ۔

سلفر۔ خشک گرم موسم میں افاقہ۔ اندھیرے میں دائیں جانب لیٹنے سے متاثرہ بازوؤں کو اوپر
اٹھانے پر افاقہ ہو۔

نیرٹرم میور۔ کھلی ہوا میں افاقہ۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے۔ کھانا باقاعدگی سے نہ کھانے
پر۔ دائیں طرف لیٹنے پر۔ کمر پر دباؤ ڈالنے پر۔ تنگ کپڑے پہننے پر۔ ہمدردی کے اظہار پر افاقہ ہو۔
لیکس۔ اخراجات کے جاری ہونے پر مثلاً عیض کے دوران۔ ٹھنڈی ہوا۔ کلکریوں کو کھول
کر رکھنا پڑے۔ دیفرہ دیفرہ۔

ڈلکا مارا۔ ادھر ادھر حرکت کرنے یا ہٹنے پر۔ بیرونی گرمی پر افاقہ۔

ارانیٹا ڈائیڈ۔ تباہ کن روشنی سے افاقہ ہو۔

پلسٹیل۔ کھلی ہوا میں افاقہ۔ کھرکیں کھلی رکھے۔ حرکت۔ ٹھنڈی چیزیں لگائے یا ٹھنڈے
پانی سے دھونے پر نہانے پر۔ ٹھنڈی خوراک اور ٹھنڈے مشروبات پینے سے اگرچہ پیاس نہ ہو۔
آدھی رات سے تہی کر دوپہر ہو جائے۔ سر کو اونچا کر کے لیٹنے سے۔

لیڈم پال۔ ٹھنڈے پاؤں کو برقی طرح ٹھنڈے پانی میں رکھنے پر افاقہ ہو۔

لائیکو پوڈیم۔ حرکت سے افاقہ۔ آدھی رات کے بعد گرم خوراک اور گرم مشروبات ٹھنڈا ہونے
پر۔ کپڑے اتارنے پر۔

اگر کیس۔ نیند سے افاقہ ہو۔

کارلوقچ۔ ڈکاروں سے افاقہ۔ پکھکھارنے۔ ٹھنڈے افاقہ ہو۔

کالو شتقس۔ ڈکاروں۔ آگے کی طرف جھکنے۔ سخت دباؤ۔ گرمی۔ سر کو آگے کی طرف جھکا کر لیٹنے سے

سیکل کار۔ ٹھنڈے کپڑے اتارنے یا ہٹانے۔ ملنے۔ بازوؤں کو بچھیلانے پر افاقہ ہو۔

ایو مٹا۔ کھلی ہوا میں افاقہ۔ ٹھنڈے پانی سے دھونے سے۔ شام کے وقت۔ ایک دن چھوٹ کر یعنی تیسرے دن۔ مندر موسم میں افاقہ ہو۔

آگیشیا۔ کھانا کھاتے وقت افاقہ۔ حالت بدلنے پر ٹھوس چیز نگلنے پر سخت دباؤ سے افاقہ۔ رشا کس۔ گرم خشک موسم میں بہتر۔ حرکت۔ چلنے پر۔ حالت کو بدلنے پر۔ ملنے پر۔ گرم چیزیں لگانے پر۔ بانوؤں کو پھیلانے پر درو کی دجہ سے بے چینی پر افاقہ ہو۔

آرنیکا ایم۔ بے چینی یا پریشانی جس کو متواتر حرکت سے افاقہ ہو یا حالت تبدیل کرنے پر جو درد کی دجہ سے۔ بلکہ دکھن کی دجہ سے ہو۔

رہوڈوڈینڈران۔ جب طوفان قہم جائے تو افاقہ ہو۔ گرمی اور کھانا کھانے سے افاقہ ہو۔ کوکا۔ شراب سے۔ سواری کرنے پر کھلی ہوا میں تیز حرکت کرنے پر افاقہ۔

کلیکریافاس۔ گرم خشک موسم میں۔ گرمیوں میں۔ خشک ماحول میں افاقہ۔ میگنیشیا فاس۔ گرمی سے افاقہ۔ آگے کی طرف بھگنے۔ دباؤ۔ گرڑنے سے ملنے سے افاقہ۔ جیلسمیم۔ کثرت سے پیشاب آنے۔ آگے کی طرف بھگنے۔ کھلی ہوا میں۔ لگاتار حرکت۔ محرکات سے افاقہ ہو۔

کالچیکیم۔ ٹیک لگا کر کھڑے ہونے پر افاقہ۔ ڈائسکوریہ۔ سیدھے کھڑے ہونے پر کھلی ہوا میں حرکت پر۔ دباؤ۔

برومیم۔ کسی بھی جرات سے افاقہ۔ درزش اور ساحل سمندر پر افاقہ ہو۔ جگلس سنیرا۔ گرم ہونے پر افاقہ۔ درزش۔ کھرچنے۔ صبح سویرے اٹھنے پر افاقہ ہو۔

یوفوبیالیتیم۔ پسینے سے افاقہ۔ تیل لگانے اور بند کرے میں افاقہ ہو۔ ہیلونیاس۔ کچھ کچھ کرنے پر افاقہ (یعنی معرہ اپنے پر افاقہ) ذہن کو دوسری طرف منحرف کرنا۔

سپائجیلیا۔ سراونچا کر کے دائیں طرف لیٹنے سے۔ سانس اندر لیجاتے وقت۔ سائیکلین۔ حیض کے دوران۔ ادھر ادھر حرکت کرنے پر۔ جھٹوں کو ملنے پر یا مالش کرنے پر۔

گرم کرہ اہلیموں کے پانی سے افاقہ ہو۔

ایسا کارڈیم - کھانا کھانے سے - پہلوؤں پر لیٹنے سے ماش کرنے یا ملنے پر افاقہ -
 کیو پریم میٹ - پسینے کے دوران افاقہ - ٹھنڈا پانی پینے سے - نیند سے افاقہ ہو -
 ایپس ایم - کھلے ہوا میں آفاقہ - کپڑے اتارنے پر - ٹھنڈے پانی سے ہلنے سے -
 آر جینٹل ٹائٹر ٹیم - ڈکاروں سے افاقہ - تازہ ہوا - ٹھنڈے - دباؤ سے -
 ہیمپسلفر - نندار موسم میں افاقہ - سر کو اوپر سے لیٹنے سے - گرمی سے - کھانا کھانے کے بعد -
خون کی قلت - اینمیا -

فیرم ایسٹریٹ - سخت قسم کا قلت خون - یہ دوائی لوہے کے دوسرے مرکبات کی نسبت قلت خون کے لئے مخصوص ہے، ترجیحاً اسے استعمال کیا جائے۔ ۱۔ ایم ایسی ایم طاقتوں میں بچائے۔
 فیرم میٹ - وقفے دار بخاروں کے بعد قلت خون میں - دماغ کی قلت خون یہ ہوش ہونے والی طبیعت کے ساتھ - ان مریضوں میں قلت خون جو کسی وقت پر خون تھے - اب زرد ماتھ پاؤں پھوٹے ہوئے ہوں - شدید زردی کے ساتھ قلت خون چہرہ پر اجانک آگ جیسے خون آئے - مریض پھوٹا ہوا اور استفاد میں مبتلا - جلد زرد اور اس میں گرٹھے پڑیں -
 آر سنگم البم - شدید کمزوری اور پریشانی - استفاد دل کی شدید دھڑکن - شدید پیاس اور معدہ میں سیمان کے ساتھ - دماغی قلت خون - میلیریا کیوجہ یا کونین کے زیادہ استعمال کیوجہ سے -
 زنگم میٹ - مزمن دماغی قلت خون - فالجی حالت کے ساتھ -
 فیرم فاس - سر میں شدید تکین دار دلا کھوڑی بہت حساس - دماغ خون سے پر لیکن یہ پانی والا خون ہوتا ہے -

چینیم آر سینکم - نیند کے دوران کثرت سے پسینہ آئے اور کمزور کرنے والا ہو -
 چارٹن - جب خون کے بہنے یا دیگر رطوبات کے ضائع ہونے کی وجہ سے قلت ہو - دماغ میں قلت خون - سر درد کے ہمراہ اور کانوں میں گرج ہو -
 فاسفورس - بہت زیادہ لمبی افسردگی کی وجہ سے قلت خون - جھاتی کی تنگی اور دکھن کیساتھ

دل کی دھڑکن۔ رمانی قلتِ خون دماغ پر دباؤ کی وجہ سے۔
 نیٹرم میسور۔ کم اور دیر سے حیض آنے کی وجہ سے قلتِ خون مزمن نکام۔ جب خون اور رطوبات کے
 ضائع ہونے کی وجہ سے قلتِ خون ہو۔

پیکرک لیڈ۔ بڑھنے والا مسک قلتِ خون۔
 ایسٹیک لیڈ۔ کمزوری کے ساتھ۔ لاغری۔ بھوک نہ رہنے۔ موروثی دق۔ جلندار پائیں اور کثرت سے
 زرد منیاب کے ساتھ قلتِ خون۔

مینٹگم۔ بہت ہی بگڑی ہوئی صحت۔ خون کا باسکل نہ ہونا۔ موی اور ریشیانا چہرہ جب وہ خون یا
 دوسری رطوبات کا بہنا نہ ہو۔

لیسی تھین۔ یہ خون میں سرخ جسمیوں کی تعداد بڑھاتا ہے اور ہیموگلوبین کی مقدار بڑھاتا ہے۔
 ایومنا سلیکیٹ۔ نمایاں کمزوری اور قلتِ خون بہت زیادہ کمزوری مریض ہر وقت بستر میں لیٹے
 رہنا چاہتا ہے گوشت کم ہوتا ہو۔

ٹرائی ٹائیر وٹالودین۔ اسلحہ کی فیکٹری میں کام۔ ٹی این۔ ٹی کو استعمال کرنے والے کا ریگن خطرناک
 قسم کا قلتِ خون اور یرقان۔ سانس بھولی ہوئی۔ سرگرائی۔ سرورد۔ بیہوشی۔ دل کی دھڑکن اور یرقان۔
 الشرس فیروسیا۔ سبز یرقان۔ جسم اور ذہن کی تھکاوٹ بیماری کی وجہ سے سبز جھپس والی لڑکیوں
 اور حاملہ عورتوں کے لئے موزوں ہوتی ہے۔ اسقاط کی عادی عورتوں کے لئے انتہائی مفید ہے۔
 کلکیریا کارب۔ قلتِ خون بہت پیچھے۔ بچپن سے خاص طور پر سفید بلغمی مزاج والوں کے لئے
 نرم جسم۔ موٹا ہونے کے رجحان کے ساتھ۔ حرکت اور دانت چھلانے میں مست ہونا قابلِ مضمہ اشیاء
 کی شدید خواہش۔

مٹھائیر اٹینیم۔ گھٹروا لے مریضوں میں قلتِ خون جو اعضا بی لرزہ۔ چہرہ اور بازوؤں کا لرزہ
 دل کی دھڑکن اور سردی۔ لاغری۔ اعصابی کمزوری پسینہ اور جھنجھناہٹ کے احساس والے مریضوں
 کے لئے مفید ہے۔

تراتیق

لیڈم پال - کیڑوں - مکوڑوں اور جانوروں کے ڈنگ کے لئے تراتیق -

تھوہجا - چائے کے زہر اور ٹیکے کے زہر کے لئے تراتیق -

الیومن - سیسے کی زہر کے لئے تراتیق - چھاپہ خانہ میں کام کرنے والوں میں یہ سیسے کے

الیومن - رجمان کو دُر کرتا ہے -

فاسفورس - کلوروفارم کو فوراً بے اثر کر دیتا ہے اور تھے کو روک دیتا ہے -

سانس رک جانا

انٹم ٹارٹ - زرد چہرے یا گہرے سرخ چہرے اور نیلے ہونٹوں - اعصابی تشنج کے ساتھ فحشی

چھوٹے بچوں میں کھڑکھڑاہٹ والی گلیے اور چھاتی کی آواز - ادنگھ کے ساتھ سانس رک جائے -

اوہیم - کاربانک ایسڈ گیس میں سانس لینے پر - نوزائیدہ بچوں میں جب انٹم ٹارٹ ناکام ہو جائے

نفس ناقابل محسوس چہرہ بینگنی رنگ کا -

لووڈسٹا - کونٹے کی گیس (کاربن مانو آکسائیڈ) کی وجہ سے سانس رک جانا -

کاربونیم سلف - جب کول گیس سو گنگھنے یا شراب سو گنگھنے سے سانس رک جائے -

کو کلیریا - ظاہری مرگی والے کی موت - بھیچڑوں اور ناک سے خون بہنے کے بعد - بچوں میں

کالی کھانسی -

چائٹنا - والدہ کا بہت زیادہ خون بہنے کے بعد نوزائیدہ بچوں میں یا بچہ بہت زرد ہو -

کیمر - ظاہری موت جب وجہ معلوم نہ ہو -

بے ڈھنگا

اگر کیس میسر - جسم کے ٹپوں کی حرکت میں مطابقت میں مشکل

ہو - وارغ اور حرام مغز میں مطابقت میں وقت - چیزوں کو استعمال کرتے وقت یا اٹھاتے وقت

ہاتھوں سے گرا دیتی ہے۔ پیٹیں ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ مریض گرمی سے آگ کے قریب بیٹھتا ہے۔
پر لافانہ عکس کرتا ہے۔

ایس ایم۔ اگر کمزوری والی علامات سولے اس سے کہ ایس کا مریض ٹھنڈ میں ناناٹہ محسوس کرتا ہے اور کچن اور باد چھانی خانہ گرمی سے دھڑبھڑاتا ہے ہوا گرمی کی حرارت سے بچ جائے۔
کیمیکل۔ نچے بے ڈھب اور تھکاوہ گھر کو یاد کریں اور سکول سے گھر جانا چاہیں۔ گول
مٹول اور گول جن میں قوت برداشت نہ ہو۔

ضعیف العقل، بے وقوف۔ معمول کے مطابق نہ بڑھنے والے بچے۔

برٹیا کلاب۔ فہم کی کمی۔ دماغی الجھاؤ۔ ضعیف العقل کی حالت۔ آہستہ آہستہ سمجھیں۔
آہستہ حرکت کریں۔ ہر کسی سے ڈرے۔ اجنبیوں سے زیادہ ڈرے۔ بات تو جس سے نہ سنے اور
غیر مستقل۔ بچہ اپنے والدین اور ساتھیوں کے لئے سخت دل ہو۔ اور کسی کی تکلیف متاثر نہ
ہو۔ سوچنے اور عمل کرنے میں مطابقت نہ ہو۔

سٹر امونیم۔ تشدد اور اعصابی۔ پریشان۔ ناراض۔ چلائے۔ اونچی آواز سے بولے۔ بلے
کاٹے اور دوڑ جانا چاہے۔ آسانی سے ڈر جائے اور نیند میں اچانک ڈر جائے وحشیانہ انداز میں
علیحدہ باسکل نہ رکھے، لوگوں میں رہنا چاہے۔ اندھیرے سے ڈرے اور روشنی کو پسند کرے۔
کلکیر یا کلاب۔ کمزور بے ہمت۔ آہستہ رو اور سرد مہر، بے حس۔ بات سمجھے میں اور اس پر عمل
کرنے میں آہستہ تمام ذہنی کام اسے تھکادیں۔ چہرہ اور ہاتھ پر کثرت سے پسینہ۔ سر اور پیٹ
بڑا۔ پیٹ میں تیزابیت۔ جب قبض ہو تو بہتر عکس کرے۔ جلد زرد، سفید یا چاک جیسی۔ دیر
سے چلنا سکھے۔

سفلینیم۔ یہ ضروری ہے کہ یہ دو ای برٹیا کلاب اور سٹر امونیم کے ساتھ بطور عمل ایگزروائی
کے دی جائے۔ طبیعت بہت بدلتے پھٹ جانے والے تہمتے کے بعد شدید غمی۔

ٹیو برکولنیم۔ یہ ایک اور دو ای ہے جو بطور عمل ایگزروائی کے دی جا سکتی ہے۔ دوسری

مطلوبہ ادویات جو ادیردی گئی ہیں۔ اس دوائی سے علاج شروع کرنا ہمیشہ فائدہ مند ہو کر آتا ہے۔
ذہنی اور جسمانی بڑھوتری رکھی ہوئی اور دانت نہ نکلیں۔

آرم میٹ۔ کم حوصلہ۔ بے جان یادداشت نہ ہو۔ طفلانہ عادات نہ ہوں۔
سیلشیا۔ زرد۔ بیمار بچے جو چڑھے چڑھے ہوں پھر نہ کیکیں اور کھیلیں بھی نہ۔ معمولی کا دہر
داری سے دور رہیں یا نفرت کریں۔ خود اعتمادی بالکل نہ ہو اور اپنے آپ سے کام نہ لے سکیں۔
اگر کیس ایکم۔ بچے جو بولنا اور چلنا دیر سے کیکیں۔ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا دماغ۔ بچے جو یاد
نہ رکھ سکیں غلطیاں کریں اور آہستہ آہستہ کیکیں۔
نیرم میور۔ بولنا دیر سے کیکیں۔

نیونو۔ فہم کی بڑھوتری کی کمی۔ جسم بڑھ جائے لیکن۔ بیوقوفانہ حالت قائم رہے۔ ڈر اور بادلہ پن۔
تھو جا۔ دماغی طور پر پیچھے نہ چکے۔ بہت گندے۔ پیشاب اور پاخانہ رات کے وقت بلا ارادہ
خارج ہو جائے۔ کتے کا پاخانہ کھا جائے۔ یہ کمی زیادہ ٹیکے لگانے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔

ٹیکوں کے بُرے اثرات

کیلنڈر لا۔ دماغ میں کمزور پن کے لئے نشانہ زد دوائی ہے۔
نوٹ۔ مندرجہ بالا ادویات ۲۰۰ طاقت میں آؤں بدل کر دی جائیں۔ تین چار ماہ کے کورس میں دو
دوائیوں سے زیادہ نہ دی جائیں۔ ٹیوبرکولینم اور سفلیئم جو ایک ایک ماہ کے موقع سے دوسری
دو دوائیوں کے ساتھ دی جائیں۔ ۲۰۰ سے زیادہ طاقت استعمال کی جائے جب کوئی مصلح
نظر نہ آئے یا ناقص ہونا رک جائے۔

دارمی۔ (بال بھی دیکھیے)

انتھرم۔ دارمی کے بالوں کا گر جانا۔

سفلگورس۔ بالوں کا گر جانا۔ خاص طور پر دارمی اور مونچھوں کے بالوں کا گر جانا۔

بستر کے زخم ایکس۔ نیلے کناروں والے زخم (ٹائیفائیڈ بخاریں)

سلفر۔ گنگرین میں تبدیل ہو جائیں۔ کاٹنے والی درد۔

کروڈیلکس۔ خون کی بری حالت کی وجہ سے۔

آرٹھرمائیزم۔ زخم کا درمیانی حصہ خشک خون کے پردوں سے ڈھانپا ہوا ہو۔

آزیکا مانٹ۔ خاص طور پر چوڑوں اور پیچھے کے حصہ میں۔

نوٹ۔ بیرونی طور پر زخموں پر کیلنڈر لا کر کچل لگائی جائے۔ عام حالت میں یا ہلکا کر کے۔

کاٹنے کے زخم

لایسپرکیم۔ کیٹوں سکورڈوں کے کاٹنے پر کتے کے کاٹنے پر یا دوسرے زخم مند
نہ ہوں۔ جب جلن اور ڈنگ لگے جیسی درد ہوا اور سرخ کنارے چمکتے ہوں۔

ایسٹک الیڈ۔ بلی کے کاٹنے پر (خواہ پاگل ہو یا نہ ہو) چیرا بھڑا ہوا زخم۔ ٹانگ کا اوپر کا اور پچھلا
حصہ سوجا ہوا۔ بیرونی طور پر بھی لگائیے۔

لایسین۔ کتوں کا کاٹنا۔ جلن گرم بھاپ سے افاقہ کتے کے کاٹنے پر سرد درد۔ چوڑوں میں یا
قریبی حصوں میں ایک خاص قسم کا احساس۔ سوئی چھینے کا احساس۔ سوراخ کرنے والا درد اور
جلن زخم سے باہر کو جانے۔

ایکس۔ جو کھوکھوں کے کاٹنے پر گنگرین والی جگہ۔ یہ کتے کے کاٹنے کے لئے مخصوص ہے۔
گولونڈ رینا۔ سانپ کی زہر کے لئے تریاق۔ یہ سانپ کے زہریلے اثرات کے خلاف قوت ملتی
پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک حفظی مقدم کے طور پر استعمال ہونے والی دوائی ہے۔

لیڈم پال۔ چربوں اور مچھروں اور پھتو کے کاٹنے کے لئے لیڈم پال۔ بیرونی طور پر استعمال کیجئے
یہ مچھروں، مکھیوں کے ڈنگ وغیرہ کے لئے فوراً افادہ کرتا ہے۔ مشتعل شدہ یا ناراض جانوروں کے کاٹنے
کے لئے۔

سٹیکس۔ کینیا۔ پاگل جانوروں اور زہریلے زخموں کے لئے۔

امریکا یورپس۔ مکھیوں کے ڈنگ کیلئے شاندار دوائی ہے۔ بیرونی طور پر مدرنیکر لگانے کے لئے استعمال کرنے سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ بھڑکے ڈنگ میں یہ آئرکامانٹ کی طرح کام کرتی ہے کینتھرس x ۲۰۰ بھی اندرونی طور پر دیکھئے۔

ہونگ نان۔ سانپ کاٹنے کے لئے بڑی مفید ہے۔

میڈرن۔ ٹانگ کے کاٹنے کیلئے یا دوسرے بہت ہی زہریلے سانپوں کے لئے اکیس ہے۔

آئرکامانٹ۔ بھڑکے کاٹنے کیلئے آئرکامانٹ مدرنیکر بیرونی طور پر لگائیے اور کینتھرس x ۲۰۰ اندرونی طور پر استعمال کرائیے۔ انتہائی مؤثر ثابت ہوئی ہے۔

ایپیس ایم۔ مکھیوں کے ڈنگ کے لئے جن کی وجہ سے سوجن اور استفادہ ہو۔ یہ مکھیاں پالنے والوں کو مکھیوں کے ڈنگ سے محفوظ کر دیتی ہے۔ اگر کچھ حصہ کے لئے ۹ یا ۶ طاقت میں استعمال کی جائے۔

اگینشیا۔ خساروں کے اندر کی طرف کاٹنا جب گھنگو کہے یا چبلے۔ جب کھائے تو زبان کو کاٹ لے۔

آرم ٹرائفلم۔ ناخون کو کاٹنے حتیٰ اگر خون نکل آئے۔

ایسڈ فاس۔ نیند کے دوران زبان کو بلا ارادہ کاٹ لینا۔

سینیکا۔ شعل جانوروں کے کاٹنے کے لئے۔

کاسٹیکم۔ چلتے وقت زبان اور خسار کاٹ لے۔

اولیم ایمیل۔ کھاتے وقت زبان کاٹ لے۔

پی اوینا۔ جوتوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے ناسور۔ عام ناسور۔

بنزواک ایسڈ۔ کھانا کھانے کے دوران ہونٹوں کو بلا ارادہ کاٹنا۔

یوفوربیا ریڈ سیٹیا۔ زہریلے کیڑوں اور سانپوں کے لئے جتنی دوائی خاص طور پر پیش سانپ کیلئے۔

فاسٹولا کا۔ دانتوں اور مسوڑھوں کے کاٹنے کی زمرہ کنے والی خواہش۔

خون بہنا۔ (دیکھیے ناک کے تحت اور امعاء مستقیم، پانخانے اور آنکھوں سے خون بہنا۔)
 ایکس۔ کسی بھی سوراخ۔ سوزنوں۔ منہ۔ آنکھوں سے خون بہنا۔ ہر غشاء یا تھوڑا سا کٹ جانے سے زخم سے خون جاری رہے۔

کرڈ میلس ہو رہا۔ خون بہنے کے رجحان والی طبیعت یا مزاج۔ آنکھوں کانوں۔ ناک اور بشمول رحم جسم کے ہر سوراخ سے خون بہے۔ سیاہ بدبودار شہتے والا خون رسے۔ خون والا پسینہ۔
 کرڈیوٹ۔ گردوں۔ آنکھوں۔ ناک اور رحم وغیرہ سے خون بہے۔ ان سے بہت دیر تک خون بہے۔ انگلی میں سولی جھنسنے ہی سے خون بہے مرنے تک ایک قطرہ خون بہنے کی بجائے۔ جب آنکھیں سرخ اور سوچی ہوئی اور ان سے آسانی سے خون بہے۔

ملی فولیم۔ خون کی نالیوں کی نا طاقتی۔ کسی بھی جگہ جسم سے خون بہنا زخموں سے۔ ناسور سے پھیپھڑوں سے۔ معدے سے۔ ریکٹم سے۔ ناک سے۔ دانت نکلنے کے بعد خون بہنے۔ خون عموماً چمکدار یا سرخ ہوتا ہے۔

فاسفورس۔ معمولی سے زخم سے بھی بہت سا خون بہے۔

سیکل کار۔ معمولی سے زخم سے ہفتوں تک نہنے۔ بازوؤں میں بھجنا ہٹ۔

کاربلوڈج۔ سوزش زدہ جگہوں میں خون رسے۔ ناسوروں سے سیاہ خون کا بہنا۔ کسی بھی سوراخ سے۔ پھیپھڑوں سے۔ رحم سے۔ مثلاً سے خون بہے۔ یہ تمام نازک۔ کمزور دوران خون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ خون بہے۔ تیز نہ ہو۔

فیرم میٹ۔ خون بہنے والا مزاج۔ خون چمکدار سرخ جلد ہی بند ہو جائے۔

سنا موغ۔ ناک۔ آنکھوں۔ پھیپھڑوں یا معدے سے خون بہے۔ کسی بھی سوراخ سے خون بہنے کے لئے یہ نشاندار دوائی ہے۔

سانس لینا۔ جلن۔ گرم دودھ یا بھاپ سے جل جانا۔

دیکھیے تنگی تنفس۔ تیز یا مشکل سے سانس لے۔ گرمی۔

کینتھر۔ ہر قسم کی جلن وغیرہ کے لئے شاندار دوائی ہے۔ یہ پھلے پرنے سے روکتی ہے۔ گردوں کے

خراب ہونے اور تنگی، تنفس پیشاب خارج کرتے وقت درد تانہ سے خون بہے۔ زخمی حصوں کو مدد پر رکھ کے چند قطرے پانی میں ملا کر دھونے سے، ڈبلنے سے افادہ ہو جاتا ہے۔

آرٹیکلیم۔ جب گنگرین کا درد یعنی جب گنگرین ہو جانے کا احتمال ہو۔

کاسٹیکم۔ جب تیسری سیج میں زخم داخل ہو جائیں اور یہ مزین حالت اختیار کریں اور ناسور ٹھیک ہونے میں آئیں ۶ طاقت میں استعمال کیجئے جو درد کو فوراً دور کر دے گی۔ بیرونی طور پر بائیرکیم کوکشن ۱۔ اور ۸ کی نسبت سے ملا کر استعمال کریں۔

آرٹیکا لیورنس۔ حادہ تکلیف دینے والی درد۔ چھپاکی کی طرح کا احساس بیرونی طور پر اور ۱۵ کی نسبت سے مدد پر رکھ کر استعمال کریں۔

پیرولیم۔ جب جلد میں دکھن اور درد کے ساتھ جلد کے مچھٹ جانے کا رجحان ہو۔

سٹرولونیم۔ جب جلن میں دی جاتی ہے جب ڈیوڈنیم میں ناسور اور اعصابی مریضوں کی جاتی ہے۔

کیڈمیم سلٹ { کینسر کی صورت میں ریڈیم سے کینسر کے علاج کے دوران جل جانے کے لئے
فامفورکس } تریاق ۱۔ ایم طاقت میں استعمال کیجئے۔

بائیرکیم۔ جلے ہوئے حصے ٹھنڈی چیزوں کے لگانے یا ٹھنڈی ہوا میں افادہ پذیر ہوں۔ اعصابی مریض کا نتیجہ ہوئی آواز کے ساتھ شدید چڑچڑاہٹ، ذہنی پرگندی یا الجھاؤ کے درد۔ ۱۔ ایم طاقت میں دیجئے۔

نوٹ ۱۔ بیرونی طور پر لگانے کے لئے پانچ فیصد ٹینک لیڈ یا کینتھرس مدد پر استعمال کیجئے مگر اگر

ایک ڈرام ایک اونس ٹھنڈے پانی میں ملائیے۔ جلے ہوئے حصہ کو جھالوں سے محفوظ رکھنے کیلئے

ترکیہئے۔ یہ اکیلے ہی مریض کے جلے ہوئے حصوں کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اگر ایک گھنٹہ یا اس سے زائد وقت تک لگائی جائے۔ مولین آئیل سے پی بھی مفید ہوتی ہے۔ جلے ہوئے کس میں۔

جوڑوں کی جھیلیوں سے برآمد ہونے والی چکنائی

آرٹیکا۔ جب زخم کی وجہ سے۔

سٹیکٹیل۔ سادہ یا بلا جلا۔

سیلشیا - پیپ کا ڈر ہو یا پیٹ پرنے کا احتمال ہو۔
ایوڈیم - تھیلی

کینسر

کینسر کا علاج کرتے وقت کینسر کی مزاحمتی کیفیت کا تریاق کیا جائے۔ $x200$ یا 1000 طاقت کو تھیم خالی معده دیں۔ کم از کم اس کے 23 گھنٹہ بعد یا قاعدہ علاج شروع کیا جائے۔ دوسری عمل انگیز ادویات سورائیم 200 اور میڈرونیٹ $x200$ استعمال کی جائیں۔ یہ دونوں دوائیاں بالترتیب انٹی سورک اور انٹی سائیکوٹک ہیں۔ سورا اور سائیکوٹک دو خلیتیں یا میازم ہیں جو کینسر کو پیدا کرتے ہیں اگر خاندان میں ٹی بی کی ہٹری بھی ہو تو سوربرکولیم $x200$ بھی بطور عمل انگیز کے دی جائے۔

فاسفورس - ماتھے کا کینسر کھلے زخم کے ساتھ جو بڑی سے شروع ہو جس کی سطح بھریاں زدہ ہو یا کھردری ہو۔ خون اور پیپ پڑتی ہو۔ متاثرہ حصہ میں پھارنے والا درد اور جلن دار دریں ہوں۔ $x200$ میں ہر ہفتہ دہرائیے۔ زبان کا کینسر جیسے کہ درمیان میں ایک سوراخ کھود دیا گیا۔ زبان سوجی ہوئی اک رے سخت اور اوپر کو اٹھے ہوئے۔ مریض گھٹنوں اور کہنیوں کے بل سوئے۔ آرسینکیم البم - معده کا کینسر جلن دار گرمی اور جلد خشک۔ پیاس سبے چینی اور اندیشے ہوں $x200$ طاقت ہر ہفتہ دہرائیے۔

نائٹرک ایسڈ - سوتی چھنے جیسی درد کاٹنے کے ہمارے معده کا کینسر جلن دار درد کے ہمارے پیاس پانی ناقابل بیان تسلی کی کیفیت پیدا کر دے۔ خوراک کو معده اپنے اندر نہ رکھ سکے ہو تھوڑی سی مضمت کرنے کے بعد واپس ٹوٹا دی جاتی ہے۔ لیسدار مادے اور خون کی تھ۔ غنی اجابت۔ چہرہ زرد۔ کاسٹیکم - سوتی چھنے جیسی درد کے لئے۔

الیومن - چھاتی کے کینسر کے لئے۔

ایپس ایم - کج ڈنگ لگنے جیسی درد ہو، درد کے ساتھ فائرس بھی ہو۔

کلیمٹس - ہونٹ کا کینسر اگر ایسے علاوہ مئے آگے ہوئے ہوں۔ دکھانا یا بھی ادل بدل کر دی جاسکتی ہے۔

سیدیا۔ کینسر کی وجہ سے سختی۔ ہونٹوں کا کینسر۔
 سلیٹیا۔ بلا درد کینسر جو اوپری سطح پر چپٹے ہوں۔ اُتھلے یا کم گہرے۔ نیلگوں مائل سفید
 بنیاد نمایاں کن رے۔ چکر۔ یہی ایم طاقت میں دی جائے۔

چیلیڈریم۔ معدہ میں کئی قسم کی دردیں جو گرم چیزیں نکلنے اور آگے کی طرف جھکنے سے افاقہ پذیر
 ہوں۔ معدہ میں درد شروع ہوتا ہے اور پھاتوں تک بڑھتی ہے اور دائیں کندھے کے نیچے کھریا
 ٹکونی حصہ تک بڑھے گرم پانی کے ساتھ ہی ایم طاقت میں دیجئے۔ کئی ماہ تک دہرائیے حتیٰ کہ درد
 قریح غائب ہو جائے۔ یا کم ہو جائے۔ اس دوائی کے بعد آرسینکیم البم دی جائے تاکہ علاج مکمل ہو جائے۔
 یوفوریم۔ شدید جلن دار درد جن کو ٹھنڈی چیزیں لگانے سے افاقہ ہو۔ بجلی کے شاٹ جیسا درد۔
 ہو جس سے مریض بستر پر سے چھلانگ ہی لگا دے یا بستر پر سے کود جائے۔ پیڑوں کی ہڈی کے
 کینسر کو اس دوائی کے بار بار دینے سے افاقہ ہوتا ہے۔

سلفر۔ معدہ کا کینسر معدہ کے گوشے میں ڈوبنے کا احساس جیسے کہ بھوک لگی ہوئی ہو۔ سخت
 تیز ادویات کے استعمال کرنے سے مرض کا دب جانا۔ بیرونی بواسیر جس پر غارش ہو لیکن خون دہے
 امعائے مستقیم یا ریکٹم کا خروج یہی ایم طاقت میں بطور عمل انگریز دوائی دی جانی چاہیے۔ جب
 اچھی طرح سے منتخب کی ہوئی ادویات ناکام ہو جائیں۔

کریوزوٹ۔ رحم کا کینسر، رحم سے خون بہے۔ چند ماہ کے لئے حیض رک جائیں اور پھر گہرے
 گہرے خون اور بدبودار غراشلر خون سے تلے مواد۔ کھٹنے والے۔ رحم میں نیچے کی طرف دباؤ اور ذرن
 کے احساس کے ساتھ رحم میں غارش ہو۔ سرد کس کا کینسر جس سے بہت ہی بدبودار رطوبت رے۔
 فاسٹولا کا۔ پستانوں کا کینسر سخت۔ بے قاعدہ رسولیاں۔ اندر کو دھنسنے ہوئے نپل کے ساتھ۔
 بازو تک دکھن۔ نپل میں درد جس کی چوٹی میں درد۔

کوئیم۔ یہ ہونٹوں کے کینسر سے کے لئے بہت ہی نمایاں دوائی ہے۔ پتھر کی طرح سخت گلیٹیاں
 تیز درروں والی ہوں۔

کیلینڈرولا۔ یہ دوائی جرمی میں سینسر کے لئے آزمائی جا چکی ہے۔ یہ کینسر کی کسی بھی سیج میں دیا جاسکتا ہے

یہ دردوں کو روکتی ہے اور مریضوں کو بہت آرام پہنچاتی ہے۔
 کندہ راگو۔ یہ ہونٹوں کے کینسر کو حقیقی طور پر ٹھیک کر دیتی ہے اور معدہ کے کینسر جب مریض
 کے منہ کے کونوں میں پردہ چسے ہوں۔

کالی فاس۔ کینسر کو دور کرنے کے بعد جب منہ کی جلد کو سختی سے زخم پہنچنے سے
 ہوائنگ نان۔ غددوں کا کینسر اور ناک کے کاٹے کے لئے۔
 یو بکولینیم۔ بطور عمل انجین دوائی کے دی جاتی ہے۔ اگر خاندانی ٹی بی مہلری پائی جاتی ہے۔
 آرم ایسٹوڈ۔ کینسر اور کلسی مٹریوں کیلئے۔ غددوں اور اعضا میں اجتماع خون۔ یعنی
 میں افتادہ گرمی سے زیادہ مریض۔

نیٹرم میور۔ ناک اور جلد کا کینسر جو خرابوں اور کانوں تک بڑھ جائے۔ میریا میں زیادہ مقدار
 میں خون کو نین کے استعمال۔ میریا کے دب جانے کی وجہ سے۔ نمک کی زبردست خواہش۔
 دوسروں کی موجودگی میں پیشاب نہ کرے۔

ہائیڈراسٹس۔ خنازیری اور کینسر کی طرح کی خرابی۔ ہونٹوں اور پستانوں کا کینسر۔ کینسر
 سخت۔ پکڑنے والا۔ چاقو سے کاٹنے والی دردوں کی طرح دریں۔ اس دردانی کا مددکنگر
 بیرونی طور پر ہونٹوں کے کینسر میں لگایا جاتے۔

آرم آریسٹک۔ چہرہ اور ہونٹوں کا کینسر۔ ہونٹ پٹے ہوئے۔ پھنسیاں۔ چہرے کی جلد کا دق
 بے رنگ ہو جانا۔ نیگلوں یا نیگلوں کی طرح کا۔ مٹی کی طرح کا زرد۔

اسباب۔

کیمفر۔ ٹھنڈی ہوائ۔

کیڈمیم سلف۔ ٹھنڈی ہوائ کے جھونکوں سے۔
 لیٹکس۔

مرکبورس پروٹو۔ پسینے آئے ہوئے جسم پر ٹھنڈی ہوائ کے جھونکے سے۔
 کاربوج۔ آگ سے گرم ہوا کو پیچیدوں میں لے جانے پر۔ گرم ہوا میں مانس لینے سے۔

کو نیم { سیپیا } برف جیسی ٹھنڈی ہوا سے ۔
 سلفیورک ایسڈ ۔ بازو اوپر اٹھانے سے ۔
 رسٹاکس ۔ بازو اوپر اٹھانے سے چیزیں اوپر اٹھانے کے لئے ۔ تازہ پانی یا نمکین پانی
 میں نہانے سے ۔
 کاربوڈیج ۔ گندے انڈے گندی مشروبات اور گلی ٹری چربی ۔ اور مکھن کھانے سے نڈر گرم مہم ۔ بد ذوقی ۔
 پلاٹینا ۔ غم زدگی ۔
 پی او نیا ۔ تنگ بوٹ اور جوتے ۔ بہتر پرپے رہنے سے دباؤ کی وجہ سے زخم ۔
 پیرو لیم ۔ گوبھی سے ۔
 روٹا ۔ زیادہ وزن اٹھانے سے یا طاقت سے زیادہ وزن اٹھانے سے ۔
 نیٹرم میور ۔ ناسیاتی نیچوں کی جلن اور تباہی چاند کی وجہ سے ۔
 اوپیم ۔ کوئلے کے بخارات ۔ شرم کی وجہ سے ۔
 آرمینک الیم ۔ پہاڑوں پر چڑھنے ۔
 کالی سلف ۔ جب جسم بہت گرم ہو، ٹھنڈی ہوا لگ جائے ۔
 میگنیشیا فاس ۔ ٹھنڈی نمی کے ساتھ کام کرنے پر ۔ پانی میں کھڑے ہونے ۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے
 سے ۔ ٹھنڈی ہوا سے ۔
 کاربو انیمیلز ۔ گلی ٹری بنیاد کھانے ۔ خراب شدہ مچھلی ۔
 پائرو جینیم ۔ زخموں کو چیرنے پھاڑنے سے ۔ خون کا زہر ہلایا ہوا ۔ جانوروں کے گلے سڑنے
 سے پیدا شدہ عفونت ۔ گندے نالے کی گیس ۔
 ڈائسکوریٹ ۔ خوراک کی خرابی ۔ روزہ رکھنے ۔
 اکیٹارسی ۔ کاروبار ناکام ہونے پر ۔
 ریویوم ۔ کچھیل ۔ خشک آلود بخار کھانے سے ۔

فاسفورس۔ گیس۔ بال کٹوانے۔ کپڑے دھونے۔ لائڈری کا کام کرنے والے سخت بدبو میں۔ بارش میں بھیگنے۔

نیشٹرم کارب۔ گیس کی روشنی۔
 آرجنٹم ٹائیٹرکیم۔ بے اعتدالیوں سے۔
 دریشٹرم البم۔ عزت نفس کے مجروح ہونے یا فخر یا غرور۔
 سیلینیم۔ لیون کے پانی۔
 کالچیکم۔ دوسرے لوگوں کے ناشائستہ حرکات۔
 کروٹیلیس۔ بُری بُور اور سورگیس۔
 تھوجا۔ پیاز۔
 کونیم۔ جنسی اعمال سے اجتناب۔
 سول۔ سورج کی گرمی یا سن سڑک۔
 آرجنٹم ٹائیٹرکیم۔ کھانڈ۔
 کانیا۔ لہجے سفر۔
 میگنیشیا فاس۔ کیتھڑ کے استعمال سے۔

سبترقیان

میگنیم۔ تھکی مادی اور کمزور حیض کا خون کم مقدار میں ایک یا دو روز بھیے اور جلدی آئے
 حیض زرد رطوبت یا تھوڑا لیکوریا۔ جھوٹے دکھے۔ گلابیٹھا ہوا۔ آواز نہ نکلے۔
 امونیا کارب۔ قلت خون والا چہرہ۔ چکروں کے ہمراہ شدید سر درد۔ اکثر قے۔ زبان پر تہہ جمی
 ہوئی۔ پیاس نہ ٹھوکر۔ حیض۔ چھوٹے سانس۔ ہر حرکت پر دل کی دھڑکن۔ نبض کمزور اور سخت
 انٹم کرود۔ اکثر سر درد لاحق ہو۔ خبطی اور غصہ سے پھری ہوئی طبیعت۔ بھوک کی کمی۔ بہت
 بہت زیادہ سستی ہو۔ اسے دن کے وقت سونے پر مجبور کر دے۔ حیض جو پہلے باقاعدہ طور پر آتے
 ہوں رک جائیں۔ جلد زرد۔ ہونٹ اور زبان اپنا قدرتی رنگ کھو بیٹھیں۔

آرٹھکیم البرم۔ سبزیقان کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ ریشہ۔ اکثر غشی کے دور سے شدید چھانی
تھکاوٹ۔

کاکولس۔ کافی یا دوسری سکن یا خواب اور ادویات کے غلط استعمال کی وجہ سے سبزیقان خون
حیض دبا ہوا یا کم مقدار میں۔ لیکوریا۔ سنگی نفیس۔ چھاتی میں اینٹھن یا تشنج۔ افسردگی۔ بے چینی کھلی
ہو اسے حساس۔

کلیریا کارب۔ سبزیقان کے لئے مخصوص دوائی ہے۔ کم مقدار میں حیض اور دل کی دھڑکن ٹوٹ
دل کی دھڑکن۔ تمام چھاتی میں سن کے کپٹی کی شریانوں کی شدید ٹپکن۔ معدہ میں دبانے والا درد
ٹانگیں آسانی سے تھک جائیں۔ ٹانگوں کی استقامتی سوجن پہلوؤں تک جانے۔ چند قدم چلنے پر تنگی
زرد موی۔ بیمار۔ زرد ہونٹ۔ زرد کان۔ انگلیوں کے سرے زرد۔ اس دوائی کی طرف رہنمائی کرتے
ہیں۔ خاص طور پر قلت خون والی لڑکیوں میں

لائیکو پوڈیم۔ کلیریا کارب کے پرائر عمل کے بعد لائیکو پوڈیم دی جائے۔ یا جب حیض مکمل طور
پر رہ جائے۔ تھکاوٹ۔ بازوؤں کی کپکپاہٹ اور سن ہونے۔ اونگھ۔ افسردگی۔ لوگوں سے نفرت
یا مجلس سے نفرت۔ بال گریں اور مٹھائی کی خواہش۔

کارلوو بیج۔ لیکوریا۔ ترخارش کے ساتھ۔ مسوڑھوں میں سکری۔ دانت ڈھیلے۔

چائنا آف۔ ٹانگوں اور بازوؤں کے استسقاء کے ساتھ سبزیقان خاص طور پر پاؤں
کے ٹلوؤں کا۔ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔ پیٹ ابھرا ہوا۔ بیٹ میں درد کے ساتھ قبض۔ نظام
انبضام درہم برہم۔ کھٹے دکار۔ ناقابل ہضم چیزوں کی زبردست خواہش۔

فریم میٹ۔ جب دوسری ادویات ناکام ہو جائیں تو سبزیقان کے لئے چوٹی کی دوائی ہے سبزیقان
لوا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اس کے مرکبات فریم اور فریم کلاب بھی مفید ہوتے ہیں۔ فریم کے مریض پیلا
سچولا ہوا چہرہ۔ ٹھنڈی جلد۔ جلد پر دباؤ گہرا گرما چھوڑتا ہے۔ نشانات خاص طور پر ٹخنوں کے
قریب۔ شدید تھکاوٹ۔ تھکاوٹ کا احساس۔ آسانی سے زود سے۔ بھوک نہ ہو۔ خوراک سے نفرت
معدہ میں تیزابیت۔ حیض کم مقدار یا دے ہوئے۔

فاسفورس۔ ہنزریقان حیض کے دب جانے سے۔ شکل سے سانس لے بھوک نہ ہو۔ اکثر ہر روز تھے ہو بہد زراحی کے ساتھ۔ جب فیرم ناکام ہو چکی ہو تو یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔
سیسیا۔ اس کا سبب ہمیشہ جنسی نظام میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ جنسی اعضاء میں مختلف اقسام کا ہیجان، پیڑوں میں بیج کی طرف تکلیف دہ دباؤ جیسے کہ رحم کی ہر چیز اندام نہانی سے باہر نکل جائیگی۔ اندام نہانی میں تشنج یا اینٹھن اور سوئیاں جھنچھن جیسا درد اوپر کی طرف، خون کے ایک قطرہ کے اخراج کے ساتھ بھی پیڑوں کے حصے میں سوزش بلند اور رطوبات کے اخراج کے ساتھ۔ زرد چھو۔ موم کی طرح بے رخی کا اظہار۔ مریض ہمیشہ ٹھنڈ محسوس کرتا ہے۔ سر میں تیکن دار بھینٹناہٹ۔ نھوڑی کی شفت سے دل کی شدید دھڑکن شروع ہو جائے۔

سلفر۔ بطور عمل انگیز دوائی اس دوائی سے علاج شروع کیا جاسکتا ہے۔
پلسٹیل۔ لوہے کے غلط استعمال۔ کانوں میں جلن۔ ٹانگوں میں بھاری پن۔ نگلی تھن گیس مصالحہ دار اشیاء کی نمایاں خواہش ڈرپوک یا شریعت طبیعت۔
نکس دامیکا۔ نیتھے رہنے کی عادت کی وجہ سے ہنزریقان۔
نیرٹرم میور۔ سانس دب جائے یا گر جائے۔ کافی دیر سے
اگنیشیا۔ دماغی جذبات کی براہ نگینی۔ غم۔ ڈر اور محبت میں ناکامی کی وجہ سے ہنزریقان۔
ہیضہ۔ انگلیوں کا ٹیڑھا ہونا۔ مجھدا۔ ٹھنڈ۔

دیکھئے اعصاب مستقیم اور پاخانہ کے بیچے۔ مجھدا
لارومیرکوس۔ ہنزریقان میں۔ دق میں۔ انگلیوں کا ٹیڑھا ہونا۔ اس دوائی کی عام سی علامت۔
کیوریم آرسینک۔ جسم کا ٹھنڈا پن۔ اینٹھن دار غذائے قسم کی ہچکی کے ساتھ۔ کثرت سے تے جلاب اور ٹھنڈے پینے۔
ایلوڈرما۔ تمام جسم کا ٹھنڈا پن۔ تمام اندرونی اعضاء جیسے کہ دل، دماغ بھی ٹھنڈے کرے۔
دیزہ سانس بھی ٹھنڈا آنے فالج اور کپکپاہٹ کے ساتھ جسم کی ٹھنڈک جیسے کہ جھ ہوا ہو۔

ست اور ڈوبنے والی بغض ۲۰۰ طاقت میں دیکھے۔

سینیا۔ ڈریکس میں ٹھنڈک کا احساس۔

درتیز گرم البم۔ تمام جسم میں سردی رہے گی۔ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے اور نیلے۔ نیلے ناخنوں کے ساتھ جب کہ پاؤں ٹھنڈے یا اس کے الٹ یعنی پاؤں ٹھنڈے۔ ہاتھ گرم۔ کثرت سے اخراجات دھتیا۔ سردی ۱۱ بجے صبح۔ سردی کے دوران برف جیسے ٹھنڈے پانی کی پیاس گرمی کے ساتھ پیاس نہ ہو۔ تمام رات پسینہ کثرت سے ہو۔ پسینے کے دوران شدید سردی۔

پٹرولیم۔ بخروں یا قطعوں پر ٹھنڈک۔ اس دوائی کی نمایاں علامت ہے۔ معدہ میں ٹھنڈک رجم میں۔ پیٹ میں۔ کندھے کے جوڑے۔ احساس جیسے کہ دل ٹھنڈا ہو گیا ہو۔

سیکل کار۔ چھوٹے پر ٹھنڈک لیکن ڈھانچا جانا پسند نہ کرے۔

روٹا۔ ریڑھ کی ہڈی سے خچے کی طرف ٹھنڈک۔

تھو جا۔ ساری ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ معد

کلکیر یا کالرب۔ ٹھنڈا پسینہ۔ قلعوں میں ٹھنڈک۔ ٹھنڈی غذا جو اسے حساس۔ پسینہ قلعوں میں آئے۔ جسم برف کی طرح ٹھنڈا اور ٹھنڈے پسینوں کے ساتھ۔

لیکس۔ رات کے وقت۔ چہرہ پر ٹھنڈی کی سرخ لہر کے دورے اور دن کے وقت گرم مریخی کی لہر کے دورے۔

کیمفر۔ باہر کی طرف سے سردی اور اندر کی طرف گرمی۔ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے۔ نمایاں تکی

ویلیر یا نہ۔ سر میں سردی کا احساس۔

لارو میر کوکس۔ عام شدید ٹھنڈک۔ اگر مریخی گرم کرے میں جلے تو ٹھنڈک سے اناد ہو۔

توجی بہت تھلا تا ہے اور ماتھے پر پسینہ بھڑ پڑتا ہے جو اسے دوبارہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ مروت کھلی ہوا میں ہی گرم کیا جاسکتا ہے۔

امونیا میور۔ کندھوں کے جوڑے کے درمیان برف جیسی ٹھنڈک جو گرم کپڑوں کے پٹینے سے بھی ٹھیک نہ ہو۔ منہ قلعوں کے اندر برف جیسی سردی۔

سکرم - ٹھنڈک اور گرمی کا احساس - برف کی طرح در دیں ہر طرف کو جا میں -
 نیشتر فاس - ہاتھ پاؤں اور ٹانگیں ٹھنڈی - دن کے وقت پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے اور رات کو
 لائیکو لوڈیم - آنکھوں میں برف جیسی ٹھنڈک، چھاتی وغیرہ میں بھی خاص طور پر ۳ سے ۸ بجے
 شام تک شدید زیادتی ہو -

حالت نزع یا غشی -

کیمفر - حالت نزع - تمام جسم کی حالت برف جیسی ٹھنڈی لیکن ڈھانپا جانا پسند نہ کرے -
 طاقت کا اچانک ڈرنا - نبض پھٹی اور کمزور -
 کاربو و تھج - رطوبت زندگی کے بہہ جانے کی وجہ سے قوت حیات کم ہونے کی وجہ سے حالت
 نزع - بڑھے لوگوں میں کافی ایسٹھیک ادویات کے استعمال کی وجہ سے - مریض زندگی کے بغیر مسلم ہو -
 سرگرم جسم اور سانس سرد - پکھا اھلانا پسند نہ کرے اور کھڑکیاں کھول دینا چاہیے -
 وریٹیم ایلمیم - حالت نزع کی مکمل تصویر - کمزوری - نیلا سہٹ - اپریشن کے بعد صدمہ - ہاتھ پر
 ٹھنڈا پسینہ - زرد چہرہ - اور تیز نرم نبض -
 ہائیڈرو سائٹک الیٹر - پھیپھڑوں کی حالت کی وجہ سے حالت نزع جیسی - دل کی وجہ سے نہ ہو -
 ٹھنڈک - اینٹھن - تشنج یا اسی طرح کی تکالیف -

انگیولیوں کا ہتھیلی کی طرف کھینچ کر سکڑ جانا -

سلفر - اچھے نتائج حاصل کرنے کے لئے کافی لمبے عرصے تک دی جانی چاہیے -
 لیکس - جب درمیانی مصلب کے درد کی وجہ سے ہو -

قبل از وقت موت

الغلفاء - بچے یا بڑے لڑکے جو اگرچہ مضبوط ہوں ۱۸ سال کی عمر میں کھل کھل کر مر جائیں - مدد کمزور
 ۲ تھوڑے تقریباً غیوراک کے حساب پھل لہ نک دیں -

سلفر۔ اگر بچے بچپن میں مری تو والدہ حمل کے دوران x۶ سلفر اور x۶ طاقت کلکیریا فاس۔ { کلکیریا اول بل کر دیں ہر روز ایک خوراک دیں۔
 وائبرنم پرنس۔ جب بچے آٹھویں ماہ پیدا ہوں اور سیدائش کے فوراً بعد مرنے والے بچوں کے لئے بہترین دوائی ہے۔ یہ آٹھویں ماہ حمل کے گرجانے کو روکتی ہے۔ x۹ طاقت میں والدہ کو توقع پیدا لائش سے ۲ ماہ پہلے ۲ بار دن میں دیں۔

کمزوری (تھکن بھی دیکھئے)

انڈول۔ شدید اڈنگھ۔ کام کرتے وقت سوجائے۔ اڈنگھ کے ساتھ سرد دریا اڈنگھ کے ساتھ دہنی ٹیلیف۔
 بلیس پرنس۔ تھکاوٹ کا احساس لیٹ جانا چاہے۔ گنٹھے یا جوڑوں کے درد کے حملہ بھگوت۔
 کارلسباد۔ کمزوری۔ لاغری۔ کیکسپاٹ تھکے ہوئے اور افسردہ خیالات۔
 کیورارے۔ رطوبات کے ضائع ہونے سے اور بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری۔
 فارمیکا۔ بخلی ٹانگوں کی کمزوری۔
 مرک ڈلس۔ مرہ جیسا زرد چہرہ ڈھیلا۔ ڈھالا ابھرا ہوا۔ زرد روپچے سرویکل اور دوسرے غدود بھولے ہوئے۔

نکس ماسکٹا۔ ٹھنڈک کے ساتھ اڈنگھ لیکن پیاس نہ ہو۔
 بیئرٹولا۔ کمزوری سن ہونا۔ بازوؤں میں بے چینی۔ بازوؤں میں درد۔ فالج۔ کانپنا جھٹکوں والی اینٹھن۔ جلد پڑھتے آہستہ چلنے اور ریگنے کا احساس۔
 سیلینیم۔ تھوڑی سی حرکت سے بھی شدید تھکن اور کمزوری پیدا کر دے خاص طور پر گرمی کے موسم میں بیماری کے بعد اور ضعیف بے اعتدالیوں کے بے اعتدالیوں کے بعد بھی۔
 گریشی والا۔ اعصابی کمزوری نمایاں کستی ذہن اور جسمانی کمزوری کے ساتھ۔
 سیکل کار۔ کمزور۔ گھٹلا ہوا۔ تھوڑوں والا جلد کا غیر تندرست نظر آنا۔ اندرونی طور پر سارے جسم میں جلن لیکن جب حصوں کو ہاتھ لگایا جائے تو وہ ٹھنڈے محسوس ہوں۔ گلے۔ پیچھے۔ ٹھون۔ شاناز اور

امعانے مستقیم سے خون کا رستا جبکہ کوئی سوزش نہ ہو۔ ڈھانپا جانا پسند نہ کرے۔
 سار سپرٹیا۔ کمزور۔ گھٹا ہوا۔ شراب اور عورت کی وجہ سے کمزور ہوا ہوا۔ بچے کمزور۔ چہرہ بڑھے۔
 آدمی کی طرح دکھائی دے۔ بڑا ہیٹ۔ خاندانی آتشک کی وجہ سے۔
 پکڑ کر لیڈ۔ جسمانی اور دماغی کمزوری۔ جسمانی کام سر میں درد اور بازوؤں میں درد پیدا
 کر دے۔

ناجا۔ شدید ناتوانی اور تھکاوٹ۔ تھکا ہوا محسوس کرے۔ دماغی اور جسمانی طاقت میں کمی
 کھلی ہو میں چلنے سے افاقہ۔ ٹھنڈی ہولے حساس۔ بستر میں کئی راتیں اور کئی راتیں لیٹا
 رہنا چاہے کیونکہ ایک دن رات کا آرام ایسے سکون دینے میں ناکام رہے۔ طاقت کی کمزوری خالص
 طور پر ناہنگیوں کی۔ چلتے وقت لڑکھڑائے۔

سٹر کو لیا۔ کافی دیر تک جسمانی مشقت کو برداشت کرنے کی طاقت دے دے بغیر کھائے پیے
 اور کمزوری کے احساس کے۔ ۱۰ سے ۲۰ مشقت ایک باری خوراک دیجئے۔

کارلور دتج۔ بچے کو دودھ پلانے سے کمزوری۔ عادی بیماری اسہال، انفلوئنزا کی کمزوری کو
 کو ٹھیک کرنے کیلئے شاندار دوائی ہے۔ ۲۰ میں ہر چار گھنٹے بعد یعنی دن میں ۲ بار دوا تک
 دیجئے۔ تب ایک اہم طاقت میں اگلے دو ماہ ہر روز دوا تک دیجئے۔

کوکا۔ یہ طاقت مختل اور طاقت دینے کا اثر رکھتا ہے وہ گرمیوں کی گرمی برداشت کرنے کے
 اہل ہو جاتا ہے بہ نسبت سردیوں کی سردی کے۔

الیومنا۔ سارے جسم کی شدید کستی۔ سست۔ لڑکھڑائی چال۔ شدید تھکاوٹ۔ خاص طور پر بولنے
 وقت شدید غنودگی۔ اور تھکاوٹ۔

کیمفورا۔ شدید طور پر سست نبض محسوس نہ کی جاسکے۔ گنتی نہ کی جاسکے۔ بہت تیز تمام جسم پر
 برف جیسی ٹھنڈک چہرے پر مردوں جیسی زردی۔ ٹھنڈا۔ کمزور کر دینے والا پسینہ۔ چہرہ زرد یا
 نیلا ہونٹ، ہرے نیلے۔

ایسٹ فاس۔ اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری کے بعد دماغی کمزوری (پہلے دماغ تھک جائے۔

یہ بھول جائے اور تب جسمانی کمزوری ہو۔ نادانستہ وجوہات کی وجہ سے کمزوری۔
میوٹرک السیڈ - یہ ایسڈ فاس کا آلٹ ہے۔ اس میں جسمانی کمزوری پہلے آتی ہے۔ تب اس کے بعد دماغی کمزوری۔

الیومن - اعصاب کی فالجی کمزوری۔ مطابقت کی کمی۔ ٹانگیں اور بازو کمزور۔
نیرٹرم میور - کمزوری لاغری اور اعصابی کمزوری اور مرض کا بڑا پڑا بن۔ پیکلدار جلد کے ساتھ زرد، موسی، رنگت جیسے کہ گرس لگائی ہوئی ہو۔

شٹانم میٹ - بڑھتی ہوئی کمزوری۔ جسمانی خلل۔ نزلاوی حالت۔ اعصابی کمزوری کافی سالوں سے لگے کا بیٹھ جانا۔ کمزوری کی وجہ سے آواز کا جلتے رہنا یا آلاتِ صوت کی فالجی کمزوری۔
الفلقا - جہتی پیدا کرتا ہے اور نسیجوں کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ یہ اعصابی کمزوری۔ پیشاب میں کھانا۔
اعصابی بدھمی - اعصابی کمزوری۔ ٹی بی یا ذیابیطس کی وجہ سے کمزوری۔ مدد کچر کے ۵ تا ۱۰ قطرے روزانہ دن میں تین مرتبہ دیجئے۔

کارلونیئم سلفٹ - نمایاں شدید کستی۔ اور لگاتار پڑے رہنے کی خواہش جب کمزوری شراب جیسے محرکات کی وجہ سے ہو۔ ٹیرھیاں چڑھنے سے دم گھٹتا ہے اور کمزوری کھلی ہو میں افادہ لیکن تیز جھونکوں میں زیادہ مرض۔

آئیوڈیم - پلٹنے سے شدید کمزوری اور تھوڑی سی مشقت سے بکثرت پسینہ (کالی آئیوڈ کا کا مرض بغیر تھکاوٹ کے کافی چل سکتا ہے)

کوکولس انڈیکسا - دودھ پلانے کے بعد جسمانی اور دماغی کمزوری۔ پریشانی سے۔ گھبراہٹ۔ اور نیند کی کمی کی وجہ سے کمزور لوگ۔ جسمانی کمزوری کے نتیجے میں نالیج ہو جائے جسمانی یا ذہنی۔

مشقت یا دباؤ۔ جھیلنے کے نااہل مہرب کام بعد از وقت کرے۔

ایسٹیک السیڈ - کئی برسوں کی کمزوری۔ قلبِ خون۔ کمزوری۔ بھوک کی کمی۔ درشتی دق بلندار پیاس۔ زرد پیشاب بکثرت۔

سنا - جب نائٹروجن کے مرکبات کے ضائع ہونے کی وجہ سے تمام صحت برباد ہو چکی ہو۔ تھکاوٹ

کھانا کھانے کے بعد دل ڈوبنے کا احساس۔

کالی فاس۔ دماغی دباؤ کی وجہ سے کمزوری۔

چائنا فاس۔ رطوبات زندگی بہہ جانے اور خون کے ضائع ہونے سے کمزوری۔ فلو کے حملے کے

بعد۔ اسہال اور دیگر تکالیف یا رطوبات کے ضائع ہونے جیسے کرخون۔ مادہ منور کے اخراج

اور اسہال کے بعد زرد محسوس کرے۔ مہجایا ہوا چہرہ۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں اور نیلے مقلول

سے گہری ہوئیں۔

الٹرس فیری نو سام { رحم کے فروغ کی وجہ سے کمزوری۔ یا

ہیلو نیاس { رحم کے باہر نکلنے کی وجہ سے کمزوری۔

نکسوامیکا۔ ایلو پیتھک ادویات کے استعمال کی وجہ سے کمزوری۔

امونیا کرب۔ کمزوری۔ طاقت کی کمی۔ قوت۔ زور کی کمی۔ کمزور۔ تھکا ہوا۔ دماغ اور جسم کا تھکا

کر چڑھنا۔ حرکت پر دل کی دھڑکن اور مشکل سے سانس لینا۔

جیلیڈونیم۔ جھانپوں کے بغیر شدید سستی اور اونگھ سستی۔ تھکا ماندہ۔ کست طبیعت۔ یہ نہ

جانتے ہوئے کراہیں کیا خرابی ہے اچھا محسوس نہ کرے۔ کمزوری اور سستی۔

آرنیکا مانٹ۔ زیادہ مشقت اور ٹھپوں کی تھکاوٹ کی وجہ سے کمزوری جو زخموں کی وجہ سے ہو۔

فیرم میٹ۔ قلت خون کی وجہ سے کمزوری۔

ایومنا سلیسکیٹ۔ ذہنی اکساہٹ کی وجہ سے اعصابی کمزوری۔ غصہ سے اور زیادہ مشقت

کے کام سے غیر حاضر دماغ۔ بازوؤں کی کمزوری۔ میزجیوں پر نہ چڑھ سکے جیسے کہ جسم بہت زیادہ

وزنی ہو۔

سورائینیم۔ حاد امراض کے بعد کمزوری۔ افسردگی۔ ناامیدی۔ رات کے پسینے۔ تمام اخلاقیات

کانوں سے۔ انٹرویلوں سے لیکوریا۔ پسینہ۔ متھوک وغیرہ بدبودار۔

دانت

یکمو میلا۔ دانت نکلنے کی تکالیف کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ بچہ چڑچڑا اور بڑبڑاے بنز

اھر بدبودار اسپہال کے ہمراہ، مسوڑھے سرخ اور دکھتے ہوں۔ درد سے چیخے اور جب کھانے کو دیا جائے، اپنے نو دیا جلے یا کھلونے دیئے جائیں تو وہ لینے سے انکار کر دے۔ ڈھانپا جانا پسند کرے۔ کلکیہ یا کرب۔ دانت آہستہ آہستہ بڑھیں یا دانت دیر سے نکلیں جب مسوڑھے زرد اور چمکدار ہوں۔ ماتھے پر پسینہ اس کی نمایاں علامت ہے۔

کلکیہ یا فاس۔ کمزور بچوں، کھلے تالو والے بچوں جن کے دانت آہستہ آہستہ نکلیں اور ان کے دانت، ہڈی بنانے والے مواد کی کمی کی وجہ سے تیزی سے گل مٹ جائیں۔ دانت نکلنے کے دوران اسپہال۔

کالو منٹھ۔ جب کوئی بچہ اپنی خوراک بغیر چبائے جلدی جلدی کھاتا ہے۔ یا اسے پسند نہیں کرتا۔ گیس کی وجہ سے پیٹ کی تکالیف۔

پلسٹیل۔ جب بچہ خیریت۔ اچھی قسم۔ ڈرپوک اور صحت تعجب پانے پر مطمئن ہو جائے۔ ٹیوبیکرولیم۔ کمزور بچے جن میں۔ ذہنی اور جسمانی بھڑکری رکی ہوئی ہو کمزوری کی وجہ سے دانت دانت نہ نکل رہے ہوں۔

فائٹولا کا۔ جب بچہ دانتوں اور ہونٹوں کو کاٹے۔

کریوزوٹ۔ جہاں دانت درد اور تکلیف سے نکلیں۔ مسوڑھے سفیج کی طرح ہوں اور درد کریں۔ جب دانت باہر نکلیں تو گلنے گلنے کے عمل کا اظہار ہو چکا ہو۔ بے چینی اور ادھر ادھر نکلنے کے لئے۔ ادھر ادھر کوٹیں بدلے قبض اور غیر منظم شدہ خوراک کے اسپہال۔

زنجیم میٹ۔ مسوڑھوں کو آپس میں دبائے کارباجان۔ تکلیف دہ دانت نکلنے کے دوران دانت پسینا۔ دانتوں کا ڈھیلے ہونا یا ہلنا اور مسوڑھوں سے خون کا بہنا۔

ذیابیطس۔

ایٹیک ایڈ۔ ذیابیطس جس میں بکثرت پانی پیدا پیشاب شوگر کے ساتھ یا شوگر کے بغیر شدید پیاس۔ کمزوری۔ زرد اور گشت کی کمی ہو۔ یعنی مر لیض دہلا پتلا ہوتا چلا جائے۔

لیک دیک ڈیفلو۔ پیشاب بکثرت پانی جیسا شدید پیاں۔ اور گاڑھا پیشاب بکثرت۔ کمزوری۔ قلت خون۔

آرسینکیم برمیٹم۔ قبض اور پیاں کے ساتھ ذیابیطس کے لئے شاندار دوائی ہے ۹x میں ۲ قطرے فی خوراک ۳ بار ہر روز استعمال کرائیے۔

تھائیرائیڈین۔ ذیابیطس کے لئے شاندار دوائی ہے جس میں گال سوجے ہوئے ہوں۔ بہت تیزی سے علامات ظاہر ہوں شدید کمزوری ہو۔

ایسڈ فاس۔ اعصابی مریضوں میں ذیابیطس۔ پیشاب بہت زیادہ آئے۔ یہ دودھیا رنگ کا اور ایمیں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے۔ شدید کمزوری اور ٹھپوں میں شدید دگھن۔ غم۔ پریشانی اور پیشانی کی دہرے ذیابیطس۔ ابتدائی سٹیج میں ذیابیطس کا یقینی علاج پچھوئے بھی ہو سکتے ہیں۔ سائیکسٹرکیم۔ ذیابیطس اور بلڈ شوگر میں اس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بہت کارآمد دوائی ہے۔ شدید پیاں اور پیشاب بہت زیادہ۔ ذیابیطس کے لئے یہ ایک مخصوص دوائی ہے۔ ۵ تا ۱۰ قطرے ہر روز ہر ۳ گھنٹہ بعد دن میں چار بار۔

یورینیم ٹائیٹرکیم۔ قوتِ بازو کی وجہ سے کمزوری اور اس کی وجہ سے ذیابیطس۔ نظام ہضم کمزور۔ سستی اور پیشاب میں کافی شوگر۔ کافی بھوک اور پیاں۔ ضعفِ معدہ میں ذیابیطس میں اس کی کافی تعریف کی جاتی ہے۔ شدید پیاں۔ کثرتِ پیشاب۔ زبان خشک۔ شدید بھوک اگرچہ جب سے خوراک سے بھلا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔

آرڈیم میٹ۔ سوجے ہوئے ٹخنوں کے ساتھ ذیابیطس۔

آرڈیم ٹائیٹرکیم۔ پیشاب میں شوگر کے ساتھ شدید پیشاب۔

نیرم میور۔ گنڈیادی لوگوں میں ذیابیطس جلد کی خشکی کے ہلرہ۔ تمام جسم پر خارش۔ بے جھانیاں اور اندر دگی ہر گھنٹہ بعد پیشاب آئے۔

لیکک الیڈ۔ گنڈھیا کے ساتھ ذیابیطس۔

تھوجا۔ سوزاک کے مریضوں میں ذیابیطس۔ اعصابیت۔ بے خوابی۔ قبض۔ بعض اوقات دل کی دھڑکن۔ پیشاب میں شوگر۔

گلسترین - کمزوری کے ساتھ ذیابیطس - سر درد - تنگی تنفس ایسٹون کے ہمراہ پیشاب میں شوگر -
 البیون کے ساتھ یا اس کے بغیر پانچھٹیاں - گنٹھیا کے ہمراہ یا اس کے بغیر -
 پیکر الیڈ - شدید پیاس کے ساتھ شوگر اور رات کے وقت پیشاب بکثرت -
 ماسکس - شوگر جس کے ہمراہ نامردی ہو -
 ٹارکیسیکم - پیشاب کی خواہش کے ہمراہ ذیابیطس - پیشاب بکثرت آئے -
 الیون - خدی قسم کی قبض کے ہمراہ ذیابیطس - پانخانہ تپلا اور چپٹا - پانخانہ خارج کرتے وقت بہت
 وقت لگے -

چیمونٹھس ویر - قبل از وقت ذیابیطس کی حالت اور مگر کے مریض ہو ذیابیطس میں مبتلا ہوں -
 شدید پیاس - بہت زیادہ مقدار میں گہرا پیشاب صغریٰ رنگوں اور گلوکوز کے ساتھ - انسولین کی مزارحت
 الیونیم میٹ - ذیابیطس میں غشی - لوگوں کو پہچان نہ کر سکے یا سوالات کے جواب نہ دے سکے -
 قبض لیکن اکثر علاوہ پیشاب خارج کر دے - ۲۰۰ ملاقات میں دیجئے -

کارلوانیٹس - موٹے آدمیوں میں ذیابیطس اور کئی دفعہ پیشاب خارج کریں - گیس اور قبض ہو -
 آرٹیکٹک الم - ایک شاذ ار دوائی ہے لیکن ڈاکٹروں نے اسے بہت زیادہ نظر انداز کیا ہے -
 ذیابیطس کے علاج میں ہمیں خشک ٹوٹے والی جلد - منہ کی خشکی - زبان اور ہوا کی مالی میں نہ بھنے
 والی پیاس - بھوک نہ ہو اور قبض ہو پیٹ میں جلن کا احساس جو منہ تک ہو - مریض ہڈیوں کا ڈھانچہ
 بن جائے - وہ اپنی طاقت کھودیتا ہے اور بعض اوقات دانت بھی گر جاتے ہیں - مریض خوش فاق
 ہوتا ہے - صاف ستھرے کپڑے اور ہر چیز سلیقے سے رکھنا چاہتا ہے -

کینٹھرس - پیشاب میں البیون کے ساتھ ذیابیطس
 کارلوتج - صبح کے وقت منہ میں بہت زیادہ خشکی - شدید بھوک - جگر میں درد جیسے کہ خنسی ہو -
 اچانک کمزوری اور غشی جمانی سستی اور افسردگی -
 آرنیکا مانٹ - جگر چرٹ یا ٹمکتے لگتے ہیں -

نکس وایکا - ذیابیطس ، بیہوشی اور چکروں کے ہمراہ - کانوں میں صنبناہٹ - بے خوابی

سب دماغ اور حرام مغز کی خرابیوں کی وجہ سے ہو۔

گر لیفائٹس - تباہ شدہ تحت - گنٹھیادی مزاج، لانگری اور عمومی کمزوری - بازوؤں میں انٹیکس اور

جوڑوں کی ناچکی کمزوری - راتوں کی بے خوابی کے ساتھ بے چینی - 557

بلیٹیم - رخسار سوچے ہوئے قبض کے ہمراہ ذیابیطس پیشاب میں البیومن اور جھلیاں -

فاسفورس - ذیابیطس یا پیکریاز کی امراض خاص طور پر بی بی یا گنٹھیادی مزاج لوگوں میں

بے چینی اور منہ میں خشکی ۲۴ گھنٹے میں ۴ یا ۵ پیٹ پیشاب - ٹھنڈے پانی کی پیاس -

رہنہیا - ذیابیطس میں کم پیشاب -

ناراض نچے یا بچیہ مزاج نچے

کیموٹیل - پُرسیمان - بے چین بے صبرے لیکن جب اٹھایا جائے تو مطمئن اور چُپ - ایک چیز

کی خواہش کرے لیکن جب پیش کی جائے تو دُور بھینک دے اور کوئی دوسری چیز مانگے - زہون ٹرکوں

کی چھاتیوں میں ناقابل برداشت درد اور حساسیت نمایاں خصوصیات ہیں -

اگنیشتیا - اعصابی - شدید جذباتی - افسردہ - اور ٹمگین - چُکے چُکے غم میں گھٹنے کا رجحان - پریشان

بلا ارادہ آہیں - متواتر جہانیاں اور معمولی معمولی چیزوں پر رودے - ذہنی طور پر افسردہ -

پلسٹیل - غیر متوازن و تبدیل ہونے والی طبیعت - ڈر لوک اور جذباتی - معمولی معمولی باتوں پر

رودے - ہنسنے پر آنسو بہیں - ذہنی تھکاوٹ - غیر حاضر دماغ - ارادے کا کچا - پریشان - ناخوش -

یا احسان فراموش - صنف مخالف سے ڈرے - بے خوابی - پیاس با سکل نہ ہو - چُپنیاں -

سچییا - کسی بھی چیز میں دلچسپی نہ لے - ہر چیز سے لاپرواہ چاہے کھیل ہو یا نہ ہو - انعام - نمایاں

پوزیشن وغیرہ - کسی بھی چیز میں دلچسپی نہ لے اور کوئی بھی چیز اس کو خوش نہ کر سکے - کم حوصلہ اور تھکاوٹ

عکس کرے - کونے میں تھپ کر آہستہ آہستہ روئے - بہت ہی جذباتی - ناک پر زرد دھبے - سر کر

کی خواہش - گوشت سے نفرت، دودھ ہضم نہ کر سکے -

آسودہ دم۔ لالچی۔ پکھچان، آرام سے نہ بیٹھ سکے۔ ہمیشہ بھوکا کبھی بھی کھانے سے تسلی نہ ہو۔
 اچھا بھلا کھانے کے باوجود تیزی سے ڈبلا ہو۔ غدد کی رطوبات کی غلط افرازات مثلاً تھائیرائیڈ
 بغل کے غدد۔ ماساریقی غدد۔ چٹے کے غدد وغیرہ وغیرہ۔
 ہمیشہ سلفت۔ ظالم۔ غلط کام کرنے کی تحریک یا خواہش مارنے کی آگ لگانے کی کبھی بھی نہیں
 نہ ہو۔ ہمیشہ جگہ تبدیل کرے۔ غیر متعزز جلد۔ خراشدار بکثرت پسینہ۔

ایسا کارڈیم۔ محرک جن سے محبت کرتا ہے انہی سے اختلاف کرے جانتے ہوئے ایسا کرے
 لیکن مجبوراً کرے یا اس کے بغیر نہ رہ سکے۔ بخیرہ موقعوں پر ہنسے لیکن معمولی چیزوں پر یا باتوں پر
 بخیرہ ہو۔ پریشان۔ بڑبڑا۔ ظالم۔ قسید کھائے اور لغتیں سمجھے کھانا کھانے کے بعد اچھا ہو۔
 لائیکوپوڈیم۔ ناراض۔ شدید بڑبڑا۔ شدید الفاظ میں اظہار کرے۔ اچانک چونک پڑے پانے
 اور پر کوئی کٹرول نہ کر سکے خود اعتمادی کا فقدان۔ ذمہ داریوں کے کئی ترانے یعنی ذمہ داریاں قبول
 نہ کرے۔ جب جاگتا ہو تو بدمزاج یا دداشت جاتی رہے۔ لکھتے وقت الفاظ بھول جائے۔ اپنا
 مافی الضمیر ادا کرنے کے لئے مناسب الفاظ نہ پائے یعنی اپنے خیالات کے اظہار کیلئے نوزوں الفاظ نہیں
 کاٹھیکم۔ ڈرپورک۔ نہ بٹھا ہوا بچہ بولنے اور چلنے کے عمل میں دیر کرے۔ شام کے بھینٹے میں پشیمانی
 اور بڑبڑا ہن پچہ بستر میں نہ جائے۔

سینٹی کولا۔ ضدی۔ خود سر۔ بچہ جو روز بروز لاغر ہوتا ہو۔ بچہ گندہ نظر آئے۔ بوڑھا۔ گریس لگا
 ہوا معلوم دے۔ گردن کے قریب جلد بھریوں والی اور نیچے لکے۔

آرڈنٹم ٹائیکیم۔ بچہ سکول جانا پسند نہ کرے۔ اس کی مہم دردن میں ۴ بار دینے سے سکول
 جانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔

سلفر۔ خمور۔ درمیں متواتر مبتلاء۔ آگزیما۔ صبح کے وقت اسہال۔ بے خوابی۔ کمزوری۔ شدید
 کمزوری۔ شدید کمزور۔ کھڑا نہ رہ سکے۔ ورزش سے نفرت۔ ہانسنے اور دھونے سے نفرت۔ جلن۔
 خواب۔ (دیکھئے بھیانک خواب)

نکسوامیکا۔ عادات کے خواب نیند سے جگا دیں۔ ہر قسم کے حقے یا زہنی خواب اعتقاد کے ساتھ۔

علیحدہ کوئی میں بیٹھ کر کر رہے۔ کافی یا شراب پیئے کا خواب۔

پلسٹیلہ۔ سیاہ دزدوں کے خواب۔ بائیں طرف لیٹے پرول اور چھاتی میں اجتماع خون۔

مرکبوریس۔ جانوروں کے خواب۔

میگنیشیا میور۔ جب نیند کے دوران بولے اور چلائے۔ پریشان کن خواب

رسٹاکس۔ ٹائیفاؤئڈ میں کاروبار کے متعلق خواب۔ ہوا میں اڑنے کے خواب۔

ڈفنے۔ سیاہ بلیوں کے خواب۔

چیلیڈونیم۔ بناروں کے خواب۔

آرنیکا۔ قبروں کے خواب۔

تھوجا۔ مردہ لوگوں کے خواب۔ خوابوں کی وجہ سے غیر محنت فینڈ۔ بلندی پر سے نیچے گرنے والوں

کے خواب یہ سب زیادہ ٹیکے لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اہم طاقت میں دیکھئے۔

سلفر۔ خواب کہ اس کو کتے نے کاٹ کھایا ہے۔ خواب میں پیشاب کرنے والے برتن کے اوپر

بیٹھتی ہے لیکن اپنے بستر کو گیلیا کر لیتی ہے۔

بیلادونا۔ آگ کے خواب۔

کالی کارب۔ معبوتوں کے خواب۔ تصوراتی۔ بد قسمتی کے خواب۔

کیمفر۔ روحوں کے خواب

سلیشیا۔ قتل کے ڈراؤنے خواب۔ لاشوں اور مردہ لوگوں کے۔ زہر مئے جلنے کے خواب

دہ گھٹنے کے خواب۔ گھر میں چوروں کے داخلے کے خواب میں سے فینڈ میں خلل پڑ جائے۔ اہم طاقت میں دیکھئے۔

کریوزوٹا۔ خواب میں ابھی طرح سے پیشاب کر لے اور رات کے وقت بستر کو گیلیا کر دے۔

گلوزائن۔ آنسوؤں کے ساتھ خواب میں روئے۔ ڈراؤنے خواب۔

برائی اونیا۔ تمام رات اپنے کاروبار پر غلط اور پریشان کن ترجمہ۔ گھر میں مسائل تمام اہم طاقت میں دیکھئے۔

لیک کنیم۔ سانپوں کے خواب۔ پیشاب کرنے کے خواب۔ حادثے کو روکنے کیلئے جاگ جائے۔

چائنا آف۔ زندہ کٹرے قے کے ذریعے نازک کوئی کے خواب۔

پیکرک الیڈ - خواب دیکھ کر وہ حاملہ ہے یا اپنے حاملہ ہونے کے خواب -
 آرٹیکا مانٹ - ڈراؤنے خوابوں سے پر - بھیانک خواب - کچھ والے پانی کے خواب - ڈاکوؤں کے
 خواب - رات کے وقت خوف -

جبرائیلی - حادثات اور لڑائیوں کے خواب -
 ایمر کتھاٹس - نگاہوں اور شدہ زندگی کے خواب -
 میگینشیا کارب - آگ کے خواب - سیلاب - ڈاکوؤں - لڑائیوں - روپوؤں - خوشیوں - بدقسمتیوں
 مرے ہوئے لوگوں کے خواب -

کوکولس - پوشیدہ چیزوں کے ڈراؤنے خواب جب آنکھیں بند کرے اس پر ظاہر ہوں -
 اگنیشیا - تمام رات ایک ہی قسم کے خواب -
 نیرٹرم میور - لیٹوں کے ڈراؤنے خواب - قاتلوں - چوروں اور آگ کے خواب - جلن دار پیاکسٹس -
 ایلو - پاخانہ خارج کرنے کے خواب -

کروٹلیس - قتل کے خوفناک خواب - موت کے - مردہ لوگوں کے - مردہ جسموں کے - مردوں اور لاشوں کے
 ساتھ ٹھہرنے قبرستان میں ہونے کے خواب - نفس کے خواب بھی آئیں - ذکر کرنا سے بیدار ہو جائیں
 لیکس - خوفناک خواب نیند کو درہم برہم کر دے - دم گھٹنے کے خواب - کافی دیر تک سونے کے بعد -
 نیرٹرم سلف - لڑائیوں کے خواب

نیرٹرم فاس - بہت زیادہ خواب آئیں - خواب پریشان کن - عشق پر خواب - مرے ہوئے لوگوں کے
 پریشان کن گزسے ہوئے واقعات کے خواب آگ کے - خوفناک و خوشگوار پریشان اور زردار خواب -
 نیرٹرم ایسود - چوروں کے خواب

لوناپین - (ذہنی اور جسمانی طور پر بچے بھی دیکھئے)

ٹیوکرکولنیم - یہ اونچی طاقت میں دی جائے ۲۰ سے کم طاقت میں نہ دی جائے - اسے بار بار نہ
 دہرایا جائے - اس دوائی سے علاج شروع کیجئے -

سفلیئم۔ ٹیوبرکولینم سے اول بدل کر دی جائے۔ ۲۰ یا ۱۰۰ طاقت میں ٹیوبرکولینم اور سفلیئم کی ہر ہفتہ
یا سندرہ روز کے بعد دوائی کی طاقت کے مطابق دیا جانے سے یہ بوناپن کو ٹھیک کر دے گی۔
برسٹیا میور۔ جسمانی اور ذہنی طور پر نہ بڑھنے والے بچوں کو ۲۰۰ طاقت میں دیں۔ ٹیوبرکولینم
کے ایک ہفتہ کے بعد دی جائے۔

آرجنٹم نائٹرکیم۔ زردی نائل بننا سہال کیساتھ سوکھا مسان ۲۰۰ طاقت میں دیجئے۔
سلفر { اگر بچے بچپن میں مرجائیں۔ والدہ کو حمل کے دوران دیں۔ سلفر ۶ طاقت
کلکیہ یا فاس } اور کلکیہ یا فاس ۶ طاقت میں ہر روز ایک خوراک اول بدل کر دیں۔
زیر و فاسلم۔ کند ذہن۔ پڑھائیں لیکن پڑھائی پر توجہ مرکوز نہ کر سکے۔ نام بھول جائے۔ الفاظ
کا آخری لفظ پہلے لکھ دے۔ عام الفاظ کے غلط جوڑ کرے۔

برسٹیا کارب۔ جسم اور ذہن کا بوناپن۔ دماغی بوناپن یا اعضاء کا بوناپن۔ بچے دیر سے چلنا سیکھیں
اگرچہ ان کی ٹانگیں کافی مضبوط ہوں۔ بولنے اور سمجھنے میں سست ہوں۔ ایک خاص عضو بڑھنا چھوڑ
دے جبکہ دوسرے اعضاء مکمل طور پر یا اصل سے زیادہ بڑھ جائیں۔ بچہ ڈر پرک اور اجنبیوں سے
شرماتا ہے جو نہ کسی اجنبی کو دیکھتا ہے اپنے آپ کو اس سے چھپاتا ہے۔ چہرے پر ہاتھ رکھ لیتا
ہے۔ اور انگلیوں کے درمیان میں سے شرمیلے پن سے دیکھتا ہے۔ لڑکیاں بلوغت کے دور میں بھی
بچوں کی طرح کے اعمال کا اظہار کریں اور گڑبوں سے کھیلیں۔
ٹیٹرم میور۔ بچے دیر سے بولنا سیکھیں۔

کلکیہ یا کارب۔ ٹانگوں کی کمزوری کی وجہ سے بچے دیر سے چلنا سیکھیں۔ دیر سے دانت
نکلیں۔ تالو کی ہڈیاں آہستہ آہستہ ملیں۔ سوکھا مسان اور ہڈیوں کا گلنا سٹرنا۔
اگر ٹیکس میکرس۔ بچے بولنا اور چلنا دیر سے سیکھیں۔

الفلفا۔ بچے یا بڑے لڑکے اٹھارہ برس کی عمر میں کافی مضبوط ہونے کے باوجود مرجائیں۔
مڈنچر کے دو قطروں کو بطور فی خوراک چھ ماہ تک دیں۔

کلکیہ یا فاس۔ بولنے بچوں کے لئے جو چھوٹے۔ کمزور۔ زرد۔ سر بہت بڑا۔ تالو بڑا اور کھلا

ہوا اور اُبھر ہوا۔ کھوپڑی کی ہڈیاں تیلی اور دباؤ کے تحت پتلے کاغذ کی طرح آواز دیں۔
 سیکل کار۔ حرام مغز کی بناوٹ میں تبدیلی کی وجہ سے جسم کی غلط بناوٹ۔ ہاتھ اور ٹانگیں
 نہ بڑھیں۔ وہ بڑھاپے کی گنگرین کی طرح گر جائیں۔

تنگی تنفس - (دیکھئے، دم۔ دل اور کالی کھانسی)

ناجا۔ دم گھٹنے اور دم رکنے کی وجہ سے چھاتی پر دباؤ۔
 کلورلیم۔ شدید تنگی تنفس چھاتی پر وزن اور تنگی کا احساس۔ بے خوابی کیساتھ دم۔
 نمکس و امیکا۔ پیٹ میں گیس بھرنے کی وجہ سے تنگی تنفس۔
 نیٹرم میور۔ ٹھنڈے ساتھ سانس کا نہ آنا۔ کھلی ہوا میں افاتہ اور اس کی خواہش رکھے۔
 شقت کرنے پر تنگی تنفس۔

کاربووئج۔ سانس لینے میں شدید تکلیف میں پکھا بھلا چاہتا ہے۔
 سیڈرن۔ جماعت اور جنسی عمل کے دوران تنگی تنفس۔
 سیفیکیریا۔ جماعت کے آخر پر تنگی تنفس۔
 آرنک البم۔ پیشاب میں البیومن کے ساتھ تنگی تنفس۔
 ایپس میل۔ داغی بھیلیوں میں پانی پڑنے پر تنگی تنفس۔
 پیرولیم۔ تمام دن تنگی تنفس۔

گلوٹائین۔ سن شروک (لوگنے پر) پر۔ پیشاب میں البیومن بھی ہو سکتی ہے۔
 لیکسس۔ نیند کے دوران دم گھٹے جاگنے پر سانس لینے کیلئے نہ کھولے۔ شرب پینے کے
 بعد تنگی تنفس۔

فاسفورس۔ معمولی سی خوراک کھانے پر تنگی تنفس۔

امونیا کارب۔ تنگی تنفس دل کی دھڑکن، تھکاوٹ اور دل کی کمزوری کی وجہ سے لیکن کسی فعل
 یا نایاتی نقص اور دم کے بغیر۔ تھوڑی سی حرکت پر بھی تنگی تنفس۔ گرم کرہ میں زیادتی ٹھنڈی کھلی ہوا
 میں افاتہ ہو۔

کاربونیئم سلف - تیز سانس یا سانس مشکل سے آئے۔ شراب یا کولہ گیس کی وجہ سے دم گھٹے۔ شام کے وقت یا سیر پھیاں چڑھتے وقت۔ بند کرے۔ کھانا کھانے کے بعد کھانسی۔ بخوری یا شفت پر بھی زراعت کر لیا۔ جس سے دم گھٹے اور اکثر رات کو سانس لینے کیلئے اٹھ کھڑے۔ ڈی ۵ ایسپیڈ سپرما۔ دل کی تکلیف کی وجہ سے تنگی تنفس۔ پھیپھڑے کی آرٹری میں خون کے جم جانے پر۔ پیشاب کی وجہ سے تنگی تنفس۔ یہ دوائی خون میں اکسیجن کی مقدار کو زیادہ کرتی ہے۔ سیلشیا۔ ٹیک لگنے پر تنگی تنفس۔

فیرم میٹ۔ آرام کے دوران تنگی تنفس میں زیادتی۔ آہستہ آہستہ غامضی سے چلنے پر آفاقہ۔ تیرپنے پر زیادتی۔ سوراخیم۔ بیٹھے پر تنگی تنفس، بازو جسم سے دور رکھ کر لیٹے پر آفاقہ۔ جب بازو جسم کے قریب لائے جائیں تو مرض میں زیادتی ہو۔

میڈوریم۔ سانس کی نالی کا منہ کا تشنج۔ ہوا تکلیف سے غارت ہو۔ لیکن آسانی سے انداز کے۔ منہ کے بل لینے پر آفاقہ ہو۔

اکوئیٹم فیروکس۔ تنگی تنفس اس حد تک شدید ہو کہ مریض نصف بیٹھا ہوا ہو اور اپنے سر کو ہاتھ کی پھیلیوں پر رکھائے ہوئے ہو۔

بجلی کے جھٹکے

الینتس۔ سر سے بازوؤں میں بجلی کی رو بہنے کا احساس۔

یوفوریم۔ بجلی کے جھٹکوں جیسی دردیں جو مریض کو بستر سے کودنے پر مجبور کر دیے۔

سٹرکیم۔ کسی شخص میں بجلی کے جھٹکے لیکن جب اسے چھوا جائے۔ جب بستر میں لیٹا ہو۔

جب موٹر کار میں بیٹھے ہوئے شخص کو چھوا جائے تو بجلی کے جھٹکے لگیں۔

بیریم سلف۔ سر میں بجلی کے جھٹکے اور کپٹیوں میں نیکن دار نبض۔

نوٹ :- اگر بجلی کا جھٹکا لگ جائے تو ملک شوگر میں بجلی کی رد گزار کر مریض کو دی جائے

جس سے مریض فوری طور پر بحال ہو جائے گا۔

لاغری، شریانوں میں خون کے لوٹھڑے بننا

(بھڑکیاں - سوکھا مسان - بھی دیکھئے)

کیلکٹس جی - جب لوٹھڑا دل سے آئے تو اس کے بار بار آنے کو روکتی ہے - مریض جذباتی اور اعصابی ہوتا ہے - تیز بھال لگنے جیسی اور دم گھٹنے والی بغض - چلنے اور بائیں طرف لیٹنے پر زیادہ دل کو ایسے سیکڑے جیسے کر لوہے کی پٹی سے بھینچا جا رہا ہے -

زخم فاس - زیادہ خون کے بہنے کی وجہ سے دماغ کا اتیر ہونا یا بگڑنا - مرگی کے دروں کے تشنجی اثر کی خرابی اور برد مائیک کے غلط استعمال کی وجہ سے -

آر جینٹ نامیٹرکیم - جب دماغ کی اتیری شراب اور تباہ کنوشی کی وجہ سے ہو -
کالچیکیم - دماغ کا نرم پڑ جانا - تمام جسم میں دروں کے ہمراہ قوتِ شام کی شدت ہو -

تھکاوٹ (مکڑی بھی دیکھئے)

جھنگ - تھکاوٹ کے احساس کو دور کرتی ہے - طاقت کی خوش کن ہر در ادیتی ہے اور بازوؤں میں پک پید کرتی ہے اور ذہن میں صفائی پیدا کرتی ہے -

آرنیکا مانٹ - زیادہ مشقت کا کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ - سخت کھیل کھیلنے سے - تیزی سے چلنے سے زیادہ وزن اٹھانے پر تھکاوٹ -

چیلڈونیم - تھوڑی سی مشقت سے بھی ٹھک جائے - ہلنے یا چلنے سے نفرت -
آر جینٹ میٹ - ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ - قوتِ یادداشت - دلیل دینے کی قوت کا درجہ برہم ہونا یہ کاروباری حضرات - طلباء - مطالعہ کرنے والے - زیادہ سوچنے والوں کے لئے مفید ہے -
چلنے کے بعد تھکاوٹ -

کاربووکیج - تھوڑی دور چلنے پر تھکاوٹ
سیپیا - تھوڑی دور چلنے یا معمولی مشقت کرنے پر ٹھک جانا -

پیکرک ایسڈ۔ معمولی سی مشقت سے تھک جائے۔
 سٹرکولیا۔ کسی بھی درجہ سے تھکاوٹ۔ کھانا کھانے کے نصف گھنٹہ بعد درنگ پھر کے قطرے
 دن میں دو مرتبہ دیں۔

انگیٹوں کا سن ہونا۔

نیزم میور۔ اعصابی کمزوری کی درجہ چیریں گرا دیں۔
 میزیریم۔ ہاتھ نا طاقت ہونے کی درجہ سے کسی چیز کو پکڑ نہ سکیں۔
 کالی بروم۔ پیکر تھام نہ سکیں۔ چیزوں کو جلدی سے نیچے رکھ دیں یا ان کو گرنے دیں۔

ہڈیوں کا ٹوٹ جانا

آزیکا۔ ہڈی کے ٹوٹ جانے کے فوراً بعد یہ دوائی دی جائے۔ لیکن فوری طور پر کسی سرخنی کے
 پاس مریض کو لیجا یا جائے تاکہ ہڈی کو ابھی سے سیٹ کر دے۔ پہلے ۱۲ گھنٹوں کے لئے... طاقت
 ہر ۳ گھنٹے بعد دی جائے۔ اس کے بعد درج ذیل ادویات دی جائیں۔ تاکہ جلدی سے ہڈیوں کے
 جڑنے کا عمل تیز ہو سکے۔

کلکیر یا فاس۔ یہ دوائی $4 \times$ طاقت میں ہر دو گھنٹہ بعد دن میں ۶ بار ایک ہفتہ تک دیں۔
 سمفاٹیم۔ یہ دوائی کلکیر یا $4 \times$ کے ادل بدل کر دیکھئے یعنی ایک ہفتہ کلکیر یا فاس دوسرے ہفتے
 سمفاٹیم $3 \times$ طاقت دی جائے۔ بہت زیادہ اثر پذیر ثابت ہوں گی۔

روٹا۔ ہڈی جڑنے کے بعد یہ دوائی ہڈی کو سخت کرنے اور ٹکڑے پن کو ختم کرتی ہے اس
 سلسلے میں یہ نہایت کارآمد دوائی ہے۔ بہت قیمتی دوا ہے۔ یہ $9 \times$ طاقت میں دی جائے اور
 ہر ایک دوائی ایک ایک ہفتہ اول بدل کر دیکھئے۔

اگنیشیا۔ زخموں کا اہم۔ افسردگی۔ کانپنا۔ اینٹھن۔ آواز کا برداشت نہ کر سنا۔ غنیمت کم اور بے چینی
 کی نمیند۔ دردوں کے لئے بہت زیادہ حساس۔

رشتا کس۔ جب بندھنی اٹھے پھٹ جائیں یا ٹوٹ جائیں اور بعض گنٹھیاوی طبیعت کا ہو جائے۔
 لیکس۔ شدید پریشانی۔ باتونی۔ چلبلا اور ڈرنے والا۔ بے خوابی۔ پریشانی۔ بے چینی کیساتھ
 جب کلکیر یا فاس اور آرسینک لٹائی ہوئی ہڈی کو ٹھیک کر دیا ہو تو مندرجہ بالا علامات کیلئے یہ دوائی
 کلکیر یا کرب۔ موٹے آدمیوں میں ہڈی کا ایک طرف ٹوٹ جانا اور دوسری طرف سے ٹر جانا
 یا دھرا ہو جانا یا جھک جانا۔ موٹے یا سو بے ہوئے پیٹ اور لپینہ والے سروا لے آدمیوں
 کے لئے مفید ہے۔ ۲۰۰ × طاقت میں استعمال کر لیئے۔

پھپھوندی کی بیماری

لیکس۔ گرم پسینے کے ساتھ نیلگوں مائل جاسنی نظر آئے۔ نیلگوں مائل کن روں کے
 ساتھ ناسور۔

فاسفورس۔ پھوٹے ناسور جن سے بہت زیادہ خون ہے۔
 تھو جا { اگرچہ مندرجہ بالا ادویات ناکام ہو جائیں تو
 آرسینک البم { یہ دئی گئی ترتیب میں دی جا سکتی ہیں۔

ملف کا ٹھہر۔ ملفوف رسولی۔

روٹا { بنزد واک الیڈر
 میلشیا۔ { کلائی کی پشت پر ملفوف رسولی۔

نرم گوشت کا گلنا سٹرنا

آرسینک البم۔ بوڑھے لوگوں میں خشک گنگرین۔ دھن اور جلن کو گرمی سے افاقہ ہوئے مہنی
 اکثر چھپٹوں کی گنگرین میں ظاہر ہو۔ بدبو دار اسہال شدید کمزوری کے ساتھ۔

لیکس - زخموں یا چوٹ کے بعد گنگرین - خون میں زہر پھیل جائے - جھٹے نیلے اور جامنی رنگ کے ہو جائیں تب گہرا سٹرا ہو خون اور پیپ خارج ہو - ماتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہونے کے ساتھ سردی محسوس ہو -

سیدکل کار - بڑھاپے کی گنگرین، جھنجھناہٹ اور کڑے رنگینے کا احساس - گرمی سے زیادتی - پنچوں اور پاؤں کی خشک گنگرین - پیچھے اور انگلیاں علیحدہ ہو جائیں اور پینک ڈی جائیں - جلد بھری دار خشک سکڑی ہوئی اور ٹھنڈی - احساس زہر - بڑے بڑے دانہ اور خونی پھالے جو گنگرین میں تبدیل ہو جائیں - اس دوائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں - مریض ٹھنڈے سے افادہ محسوس کرتا ہے اور ڈھانپا نہیں جاسکتا - آرسینکیم البم کے الٹ -

کرڈیلیس ایچ - گرم، اپنی، خمدار یا تر گنگرین بازو سیاہ پھالوں سے بھر جائے اور بہت سو جا ہوا - بدبو دار بو خارج ہو -

کریوزوٹ - پھیپھڑوں کی گنگرین -

کاربوو تچ - بھوڑے اور پھنسیاں گنگرین قسم کی ہوں - متاثرہ حصے جامنی رنگ کے نظر آئیں - برف کی طرح ٹھنڈے - اخراجات گندے اور شدید کمزوری - سلفیورک ایسڈ - چوٹوں کے بعد گنگرین ہو جائے -

عام باتیں - عام علامات

بیلنس پرنس - کوئی سی بیماری جو ٹھنڈا پانی پینے یا آئس کریم کھانے سے جب جسم گرم حالت میں لاحق ہو جائے - جب ایک آدمی گرم ہے یا پسینہ میں شرابور ہے اچانک سردی لگ جائے - تر ٹھنڈے یعنی گرم جسم یا پسینہ کے ہوتے ہوئے ٹھنڈی بارش میں بھیگ جائے - بوریکس - پیشاب کرنے سے پہلے پانا نہ خارج کرنا -

ایسٹمیوور - بستر کے قریب گر پڑتا ہے اور اکثر اٹھایا جاتا ہے - بستر سے نیچے پھیل جاتا - زنگولس بلب - گرم سے ٹھنڈی حالت یا ٹھنڈی حالت سے گرم حالت میں جانے پر زیادتی - ابا

درجہ حرارت کی تبدیلی پر کوئی بھی تکلیف ہو جائے۔

سٹریمونیم۔ یہ مٹھیاں اترتے وقت وہ دو پائیدان نیچے پاؤں رکھتا ہے اور گر پڑتا ہے۔

آسینک البم۔ { ٹھنڈے مریضوں کے لئے جو ٹھنڈ میں زیادہ
کلکیر یا کارب۔ { تکلیف محسوس کریں۔ گرم موسم اور گرم چیزیں
سلیشیا۔ { لگانے سے افادہ محسوس کریں۔

فلورک لیٹڈ۔ گرم مریضوں کے لئے جو گرمی سے یا موسم گرمیاں زیادہ تکلیف محسوس کریں یا ٹھنڈی
کالی آئیوڈ چیزیں لگانے پر افادہ محسوس کریں۔

مرک بال۔ زیادہ گرمی یا زیادہ سردی برداشت نہ کر سکتا۔ درمیانے موسم میں اچھا محسوس کرے۔

ہائیوسائیمس۔ بے شکے یا غیر مہذب کام کرتا ہے۔ جسم کو بگڑتا۔

ایسنتھیم۔ تشدد پسند، متشدد۔ ظالم دبے دم۔ بلاوجہ معروف رہے۔

غدد (تھائیرائیڈ غدد کا صحیح طریقہ پر کام نہ کرنا)

ٹیوبرکولینیم۔ گردن میں ٹی بی کے غدد۔ ۲۰۰ سے ۱۔ ایم یا سی ایم طاقت تک دیں،
یہ ایک ہی ایسے غدد کی سوزش کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اگر ناکام ہو جائے تو درج ذیل ایڈیا کوآزائیس۔
کلکیر یا آئیوڈ۔ یہ دن میں ۳۰ تین بار دے جائے۔ ٹیوبرکولینیم جو بطور عمل انگریزی جاسکتی ہے
۲۰۰ طاقت ہر ماہ دیجئے۔

کلکیر یا فلور۔ غدد کی سختی اور ان میں جماؤ۔ سیج کا بناؤ اور ہڈی کا بننا۔ پتھر کی طرح سخت
غدد و کری ہڈی میں جادلوں کا جماؤ۔

برٹیا آئیوڈائیڈ۔ جب غدد کے بڑھنے کے ساتھ ٹائلسز کی سوزش بھی ہو۔

ہیپر سلفر۔ مفلع غدد کا بڑھ جانا جو سخت اور پیپ کے بغیر۔ سرد موسم آنے پر۔ غدد
سے پیپ بھی خارج ہو رہی ہو۔

سٹس کیناڈینس۔ غدد کی سوزش اور اس میں سے پیپ کا بہنا۔ یہ پرانے ناسور اور گلے مٹانے

کے عمل کو روکتا ہے۔ گردن کے غدود لائونوں میں گائٹھوں والی رسی کی طرح بڑھ گئے ہوں۔
تھائیرائیڈین - تھائیرائیڈ غدود کے نہ بڑھنے یا اپریشن کے ذریعہ خارج کرنے سے بیماروں
کا پیدا ہونا۔ ۳۰ طاقت تین دن تک دی جائے۔

کالی آئیوڈ - بلا درد غدود سخت کناروں والے اور سوزش غدود میں سے وہی جیسی تپتی خراشدار
ہیپ ہے۔ غدود کا لاغر ہونا۔ سخت ہونے سے پہلے سوزش۔ آتشکی۔

کالی میور - کیسوی عمل درہم برہم چہرہ گردن وغیرہ پر پھنسیاں۔ سوزش کے بعد لطف کارنا۔

رٹاکس
پلسٹیل
ایمپوزینیا
سیلشیا

لمف غدود کی سوزش - دی گئی ترتیب میں دیکھئے
جب ہر سلسلہ ناکام ہو جائے۔

فیرم فاس - لمف غدود کی سوزش۔ جذبات کی تصویری ہی انگخت کی وجہ سے چہرہ پر خون ہو
جائے۔ جیض بہت کثرت سے اور بہت زیادہ مقدار میں قلت خون۔

فاسفورس - اسہال اور پسینہ میں مبتلا، کمزور لوگوں میں غدود کی بیماریاں۔
آئیوڈین - تھائیرائیڈ غدود کی سوزش یا بڑھ جانا۔ میرٹھک غدود کا گائٹھوں کی طرح
محسوس ہونا۔ مریض کمزور اور قلت خون میں مبتلا ہو۔ جڑ سے لے کر پنجے کے غدود کی سوزش معمولی سی
بھی دل کی دھڑکن۔ غدود مریضیں جبکہ جسم پتلا ہو رہا ہو۔

سپونجیا - خارش۔ سوزش اور غدود کا سخت ہو جانا خشکی۔ گرمی اور بے صبری۔

لائیکوپس ویر - دل کی نمایاں علامات کے ساتھ غدود کی سوزش۔ یہ بلڈ پریشر کو کم کرتی
ہے۔ نبض کی شرح کو کم کرتی ہے اور کافی حد تک کسٹوں کی لمبائی کو بڑھاتی ہے۔

کالبروائیمیا - گلے کے غدود۔ پستانوں اور نعل کے غدود جامنی ہو جائیں اور سخت ہو
جائیں۔ نرم ہونے کا رجحان نہ ہو۔ یا ہیپ پڑنے کا رجحان نہ ہو۔ غدود زیادہ نہ بڑھیں۔ لیکن ان
میں کوئلے جلتے جیسی جلیں ہو۔ یہ سخت قسم کو ٹھیک کر دیتی ہے۔

کو نیم۔ غدد رخت اور دھیس۔ بغل کے نیچے غدد سوج کر ناسور بن جائیں۔ گردن۔ چٹوں۔
اور پیٹ کے غدد بڑے ہو جائیں۔ غدد کی سوزش لعل کے راستے، بخیر کی طرح کی گانٹھیں بنائی۔

غدد کی سوزش

برومیم۔۔۔ غدد کا بڑھ جانا، خضیوں کا درم پیپ پڑنے کا رجحان کے بغیر سختی۔

کلکیر یا آئیوڈ۔۔۔ غدد کی سوزش اور سختی۔

کلکیر یا فلور۔۔۔ سر ویکل اور لعل غدد کی بلا درد بڑھنا اور سختی۔ برائے کائی اور میز نٹرک غدد
کی بڑھوتری۔ ہمارے موسم میں زیادتی گرم ٹیوں اور ملنے پر آفات۔ ۶ مہینوں میں استعمال کیجئے۔

بیلادونا۔۔۔ غدد کی سوزش جن میں پیپ پڑنے کا اندیشہ ہو۔ یہ بغل کے حصہ میں یا پستانوں
میں چوڑی سرخ اور حساس ہوں۔ سرخ دھاریاں جو سوجے ہوئے غدد سے نکلیں، شدید گرمی اور
سوئی چھبے جیسی دردیں ہوں۔

کلکیر یا کارب۔۔۔ غدد کی سوزش جن میں پیپ پڑنے کا رجحان ہو۔ سر پر کھٹا اور بدبودار پسینہ۔

گریفائیٹس۔۔۔ بغل۔ چٹوں اور گردن کے غدد کا بڑھ جانا، جلدی علامات کے ساتھ۔ پیٹ
بڑا اور سخت ہو۔

سکروفولیریا۔۔۔ غدد کی سوزش جن میں پیپ پڑنے کا رجحان ہو شاندار دو آئی ہے۔ چھاتیوں کا گوڑ۔

مرک آئیوڈ۔۔۔ غددوں میں درد کے ساتھ سوزش۔ سخت اور سرخ۔ یہ بیلادونا کے بعد اچھا کار

کرتا ہے۔ بہترین دو آئی ہے۔

لیپس البس۔۔۔ یہ مختلف قسم کے آگاہ کوٹھیک کرتی ہے۔ غدد بڑھے ہوئے کچھ نرم، نسبت

پتھر کی طرح سخت ہونے کے جیسے کہ کلکیر یا فلور میں سخت ہوتے ہیں۔ میز نٹرک غدد کی سوزش۔

آئیوڈم۔۔۔ غدد کا بڑھنا (بیشمول ٹانسز) تمام جسم کے پتلا ہونے کے ساتھ بٹھے سکر جائیں

اور جلد میں جھریاں پڑ جائیں۔ سوائے پستانوں کے سب بہت گھٹ جائیں تمام غدد بڑھ جائیں۔

کاربوا نیملیس۔۔۔ غدد کی سوزش۔ غدد آہستہ آہستہ بڑھیں۔ تب ٹھہر جائیں اور بڑھیں اور

اور نہ ہی پیپ پڑے اور سخت ہو جائیں۔

جیلیسیم - غدود بڑھ جائیں اور سوج جائیں۔ بخار جو ۱۰ اور ۱۱ بجے صبح ہو بغیر پیاس کے اور شام کو مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے۔ دماغی علامات جیسے کہ سر میں بے چینی چکر وغیرہ بھی ہوں غیث گوٹر۔ ایکونائٹ لائیکوٹوم - سر ویکل - بغل اور پستانوں کے غدود کی سوزش اور جہاں ہالکسز کی بیماری کا خطرہ ہو۔

ایٹھوزا - گردن کے قریب تسبیح کے دانوں کی طرح غدود کی سوزش۔

گلاب

ایوڈم - یہ گلاب کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ دبلے پتلے گہرے چست ریشوں کے لئے مفید ہوتی ہے۔ یہ ایک ایم طاقت میں دی جائے۔ نمایاں سختی کھنچاؤ کے احساس کے ساتھ۔ دونوں لوہوں کا بڑھ جانا۔ گوٹ بہت زیادہ سوج جانا اور انتہائی تکلیف دہ ہر بار رخصت کے آنے پر۔ سائز میں بہت زیادتی خاص طور پر دائیں طرف اور نرم بغیر کسی نرمی کے۔ بغیر لوہے کو مرط بچنے کے سر جتنے سائز کا۔ اندرونی حصہ یا درمیانی حصہ میں گلاب کی طرح سرخ۔ بھاری ذرئی اس دوائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مریض پتلا ہوتا ہے لیکن کھانا بہت زیادہ ہے۔ گلاب نرم گرمی کے ساتھ اور نصف تیز۔ ایوڈم کے مریض۔ یلوس کم حوصلہ اور خود کشی کرنے والے ہوتے ہیں۔

برومیم - جب ایک ایم طاقت ایوڈم ناکام ہو جائے تو یہ دوائی ایک ایم طاقت میں آزمائی جائے۔ غدودوں کا بڑھنا اور نرم ہونا۔ دل کی دھڑکن کی وجہ سے مریض دائیں طرف زلیٹ سکے۔ مریض کا رنگ ہلکا اور مزاج خنازیری۔ خوش مزاج اور خوش باش ہوتا ہے۔

لایکو پوڈیم - دائیں طرف سخت۔ ہموار۔ چمکدار کھنچاؤ کے احساس کے ساتھ گوٹر۔ اگرچہ زیادہ بڑا ہرگز نہ ہو۔

نیرم میور - ابتدائی سٹیج میں مریض طوفان سے ڈرتا ہے۔ رات کے وقت اکیلے ہونے سے ڈرتا ہے۔ دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے۔ جب سٹیج کو سکوپ استعمال کی جاتی ہے جب بغض دیکھی جائے تو بغض تیز ہو جائے۔ کٹھنہ والا۔ لاغری کمزوری۔ کانپنا۔ دل کی دھڑکن۔ پیاس۔ اعصابی پٹخڑا پن اور بے خوابی۔

لیکس۔ ہلکا رشتہ گرم خون کا بھوکے طرف آنے کے ساتھ۔ دل کی دھڑکن اور گرم احساس۔
ابتدائی سٹیج کے لئے ابھی دوائی خیال کی جاتی ہے۔

فینکس ویکس۔ قطرہ کی صورت میں مدر ٹیکر دیجئے۔ گلہڑ کی اصلی دوائی ہے یا بنیادی دوا ہے۔
بد چھٹی۔ گیس اور قبض اس کی نمایاں علامات ہیں۔

کلکیر یا کارب۔ موٹے آدمیوں میں سادہ گلہڑ اسرار گردن پر سپینہ۔ یہ ۲۰۰ طاقت میں ہر دو گھنٹہ
بعد دن میں چھ مرتبہ دی جائے حتیٰ کہ آفتاب شروع ہو جائے۔

ایڈرینالین۔ گنٹھ مالا۔ تیز نبض۔ دل کا عمل تیز اور تنگی تنفس۔ آنکھوں کے ڈیلے باہر کو
نکٹے ہوئے۔ گردن کی پھلی طرف ٹیکن ڈارشرائین۔ یہ ۲۰۰ طاقت یا ۱۔ ایم طاقت میں دی جائے۔
اگر یہ ناکام ہو جائے تو کیٹکس دیجئے۔

تھائیرائیڈین۔ اگر آئیوڈیم اور برومیم ناکام ہو جائیں تو یہ دی جائے ۲ یا ۴ میں دیجئے۔
سپونجیا۔ تکلیف دہ گلہڑ۔ قلت حیض کے ساتھ دوسرے نکتے پر تکلیف۔ وادیوں میں رہنے
والوں کے گلہڑ۔ یہ مریض کا روپ درنگ اور غددوں کی بھڑھوری تو برومیم جیسی رکھتی ہے اور
ذہنی پریشانی اور کم حوصلگی آئیوڈیم جیسی یعنی جسمانی علامات برومیم جیسی رکھتی ہے۔ ذہنی علامات
آئیوڈیم کی کٹھی اس ایک دوائی میں پائی جاتی ہیں۔

فیرم میٹ۔ گنٹھ مالا خاص طور پر حیض کے دب جانے پر۔
لیپس البس۔ غدد کی خنازیری بھڑھوری۔ معدہ اور رحم اور چھاتیوں میں جلن اور ڈنگ
لگنے جیسے درد کے ساتھ گلہڑ۔

لایکوپس۔ گنٹھ مالا دل کی تکلیف اور سانس کا آنا کی تکلیف کے ساتھ۔
اگنیشیا۔ جب اعصابی مریضوں میں گلہڑ میں درد ہو۔
(دیکھئے خون بہنا۔ خون جاری ہونا بھی دیکھئے)

گرمی

دور لیوورا۔ جسم کے مختلف حصوں میں گلا، ملن، معدہ، ہیٹ۔ اسواء مستقیم اور چھاتیوں میں جلن۔

کیمفر۔ اندرونی طور پر گرمی باہر کی طرف ٹھنڈ۔

در شرم البہم۔ جلن جبکہ ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوں۔ سردی اور گرمی مادل بدل کر۔

سلفر۔ گرمی کے چھونکے گرمی کی ہر جسم کے کسی بھی حصہ میں جو بالآخر پسینہ میں تبدیل ہو جائے۔

مکروں میں گرمی۔ پاؤں کے تلوؤں اور ہاتھوں کی تھیلیوں میں گرمی۔

آر سینکلم البہم۔ متواتر جلن دار گرمی جس کو گرم ٹیپوں یا گرم مکروں میں افادہ ہو۔ لیکن سر کی اندرونی

جلن۔ ٹھنڈے پانی سے دھونے سے افادہ پذیر ہوتی ہے اور گنٹھیاوی حالت میں جو کھوپڑی

اور بیرونی اعصاب کو متاثر کرتی ہے۔ ایسی جلن کو گرمی سے افادہ ہوتا ہے۔

ایکونائٹ این۔ بے بیٹھی کیساتھ جلندار گرمی۔ ٹھنڈی چیزیں لگانے یا کھلی ہوا میں افادہ۔

لیکٹک الیڈ۔ دیا بیٹس کے دوران جلن۔

فاسفورس۔ جسم کے کسی بھی حصہ میں جلن۔ ہڈیاں یا دہنی بگاڑ۔ ٹانفائیڈ۔ ٹیکن دلدار اور۔

الش کرنے پر افادہ

امونیم میور۔ تمام جسم میں اپنے کا احساس جیسے کہ خون کی دہیدوں میں ٹھنڈے حس

کھلی ہوا میں تکالیف برصیں۔ گرمی کے چھونکے جو پسینے میں تبدیل ہو جائیں۔

سیمیپا۔ ہاتھ گرم اور پاؤں ٹھنڈے یا اسکے الٹ یہ اس کی نمایاں علامات ہیں۔

پلسٹیللا۔ صرف ایک حصہ کی گرمی جب کہ دوسرا حصہ ٹھنڈا ہو۔

تھریڈین۔ گرمی میں آواز اور چھونے پر انتہائی حس۔

لائیکو لودیم۔ کندھوں کے دوران خاص طور پر جلن۔

میڈورٹیم۔ پاؤں کے تلوؤں میں جلن۔ کمر کے گرد جلن دار گرمی جیسے کہ کمر دیکے کلوں پر رکھی ہوئی ہو۔

اگنیشیا۔ ایک کا اور، ایک کا رنگ سرخ اور دکھتا ہوا۔

ایمرس ور۔ منہ، زبان، گلے سے معدہ تک جلن۔ جب اسہال میں مبتلا ہو تو بازوؤں میں جلن۔

ایمپس ایم۔ سرخی اور سوزش ڈنگ لگنے جیسے درد اور جلن دار درد چہرہ۔ آنکھوں پر پوٹوں

ہونٹوں۔ زبان۔ گلے۔ بازوؤں اور خضیوں میں ہو۔

بیلادونا۔ سرخی کے ساتھ شدید جلن۔ پھونے پر شدید گرم۔
 پیکرک الیڈ۔ تھوڑا سا مطالعہ کرنے پر بھی ریڑھ میں جلن۔ ذہنی شقت پر جلن۔ تکلیف کے بہترین جلن۔
 سیلیائی۔ جلد اور چہرے کی جلن دار جلن۔ سانس نختوں کو بھی جلا دے۔
 ٹیبرینتھنا۔ جسم کے تمام حصوں اور سوراخوں میں جلن۔ معده۔ اعضاء مستقیم۔ مثانہ اور رحم میں جلن۔
 فلورک الیڈ شام کے وقت جسم میں شدید گرمی نکلنے کا احساس بغیر درجہ حرارت بڑھنے کے پاؤں
 جلیں اور بستر سے باہر کھنٹے پڑیں۔ رات کے وقت وہ سر اور چہرہ کو دھونا چاہے۔
 ناجا۔ بھرے اور سر پر توتر گرمی۔ مہتیلیوں کی سوزش۔ حرارت ناقابل برداشت۔ گرم لہے
 کا احساس۔

روٹا۔ آنکھوں میں حرارت اور آگ کا احساس۔
 الیوناسلیکٹا۔ شدید گرمی طاقت ہی کو سلب کر لے یا کمزور کر دے۔ بھل چل سکے اور
 ریڑھ میں شدید جلن۔
 لیکس۔ دن کے وقت گرمی کے جھونکے سے اور رات کے وقت ٹھنڈک کے جھونکے بخوابی۔

ہک دوم

تھامبول۔ ہک دوم کے لئے مخصوص دوائی ہے، ۶ طاقت میں دن میں دو دفعہ یعنی صبح شام دیجئے۔
 چینو لوڈیم۔ ہک دوم کیلئے قطرے مار نکھر من تین خوراکیں دیجئے ہر دو گھنٹے بعد ایک خوراک دیجئے۔
 کاربن ٹیٹر اکلورائیڈ۔ یہ ہک دوموں کے لئے بہترین دوائی ہے۔ جس نلک میں بہت زیادہ ہک دوم
 ہوں وہاں پر دی جائے۔ ۳۔ ۴ سی سی کی ایک خوراک جوان آدمیوں کے لئے ۹۵ فیصد ہک دوم
 اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

بارمونز یہ تعریف ایسی اندرونی افرازات کے لئے جس میں بغیر نالی کے غدودوں میں
 سے ایڈرینالین، تھائیرائیڈین، انسولین وغیرہ اندرونی طور پر خارج ہوتی ہیں۔ جب یہ بے
 نالی کے افرازات کم ہو جائیں تو مخصوص قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جن کا علاج ان غدود کو ٹھیک
 کرنے سے مناسب ہو مگر ٹھیک ادویات کے استعمال سے ہی ہو سکتا ہے۔

یہ تعریف ایسی اندرونی افرازات کے لئے ہے جس میں لیغزائی کے غدودوں میں سے ایڈرنیالین
 تھائیرائیڈین - انسولین وغیرہ اندرونی طور پر خارج ہوتی ہیں جبکہ کسی دوسرے سے یہ بنائی غدود
 کی افرازات کم ہوجائیں تو مخصوص قسم کی بیماریاں لاحق ہوجاتی ہیں۔ جن کا علاج ہومیوپیتھک ادویات
 کے استعمال سے ان غدود کو ٹھیک کرنے پر ہوجاتا ہے۔ مثال کے طور پر باؤں کا قبل از وقت سفید ہو
 جانا اور گنہا پن تھائیرائیڈ غدد کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تھائیرائیڈ ۳۰ x ۲۰۰ میں صوف
 باؤں کو گرنے ہی سے نہیں روکتا بلکہ قدرتی رنگ بحال کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح انسولین ۲۰
 یا ۲۰۰ فزیا پیس میں بطور عمل انیگرز کے کام کرتی ہے اور ان غدودوں کو انسولین بنانے کے اہل بناتی ہے۔

سوزش

بیلادونا - جب سوزش سرخ ہو، جلن کے ساتھ اور تپکن دار درد - سوزش زدہ حصے چھونے
 پر یہ گرم محسوس دیں -

ایپیس ایم - بھولی ہوئی سوجن جیسے کہ مکھیوں کے کاٹنے سے ہو۔ پیشاب کم مقدار میں
 اور پسے ہونٹ کی سوزش بغیر کسی چیز کے کاٹنے سے -

کلکیریا کارب - جب سوزش زرہ جگہ سخت ہو تو ۲۰۰ x دن میں ۳ دفعہ دیجئے -
 تھائیرائیڈ ٹنیم - نائٹیریا میں (ایک قسم کے دم جو جلد کے نیچے اکٹھے ہو کر سوزش پیدا کرتے
 ہیں) سوزش بلا درد ہوتی ہے -

آرم سلف - بغل کے غدود اور پستانوں کے غدود کی سوزش -
 لائیکولس ور - سوزش درد کے ساتھ - اس دوائی سے درد مکمل طور پر برہٹ جاتی ہے
 اگرچہ بلا درد سوزش رہتی ہے -

چوٹیں

ہائپرپیکم - جب نرم حصے کے ساتھ اعصاب کو بھی چوٹیں آئیں جیسے کہ ناخنوں کا کچلے جانا -

سوں یا لگنا۔ نہیں چھب جانا۔ کیڑے کھڑوں کا کاٹنا اور جانوروں کا کاٹنا۔ چھدے ہوئے۔ پھٹے ہوئے۔ یا زخمی حصوں کے لئے مشاغلہ دردوائی ہے۔ جن میں اعصاب بہت زیادہ ہوں جیسے کرپٹ اور انگلیوں کے سرے۔ یہ ریڑھ بڈی کے زخم اور دمچی کی ہڈیوں کے زخموں کے لئے بھی مفید ہے ٹینس کور کرنے کیلئے فورالیدم پال دیجئے۔ ٹینس کے دوران ناقابلِ برداشت تکلیف کی موجودگی میں جو کرپٹ کی وجہ سے ہو۔ پرانے زخموں کے نشانوں میں درد جو جسم کے ساتھ چلیں اعصاب کے ساتھ ساتھ۔

سمفا ٹیمم۔ گندالات کے لگنے سے زخم۔ الپٹین کے بعد پرورد منڈ۔ جب بندھنوں کے زخم میں روٹا نام کام ہو جائے تو یہ دی جائے۔ آہستہ آہستہ زخم مندمل ہوں گے۔ سٹیفسگیہ یا۔ تیز دھار کے آئے زخموں میں یا جب سوراخوں میں ڈنگ لگنے والے صلب دار درد یا کسی سرجن کے کئے ہوئے غیر صحت مند زخم ہوں۔

لیڈم پال۔ سوراخ والے زخموں کے لئے جو چھوٹے پر ٹھنڈے محسوس ہوں اور مریض کو بھی ٹھنڈے محسوس ہوں۔ لیکن ٹھنڈی بنیاں لگانے سے افادہ محسوس ہو۔ زخم جن میں سے خون کم نکلتے۔ درد سو جن اور ٹھنڈک ہو۔ چوڑے لگنے پر سیاہ آنکھ کی طرح کا نشان۔ زنگ آلود میخوں کی وجہ سے ہونے والے زخم کیل یا میخ پر پاؤں رکھنے کی وجہ سے ہاتھوں یا پاؤں کی نیلیوں میں زہریلے زخم ہو زخم ہو جائیں۔ یہ ٹینس کور کرتی ہے لیکن جب ٹینس شروع ہو جائے تو ٹامپیریکم دوائی کرتی ہے۔ بیمار شدہ بازو کا زخم یا چھدنے کے بعد تباہ ہونے کی حالت میں مفید ہے۔

اینا کارڈیم۔ جب بندھن تاشر ہو چکے ہیں۔ ارٹھولوکیا۔ جوتے کے لگنے کی وجہ سے۔ گھوڑے کی پیٹھ کے لاگے کی وجہ سے کشتی زانی یا باغ میں کام کرنے کی وجہ سے چھالے یا زخموں وغیرہ کیلئے مفید ہے۔

روٹا۔ موچ یا موچ کے بعد گلیٹیاں۔ موچ کے بعد لنگر اپن خاص طور پر زخموں اور کلائیوں میں۔ زخموں یا موچ کی وجہ سے ہڈیوں پر بندھنوں کا الگ ہو جانا۔ فٹ بال اور کھسکے کھلاڑیوں کے پاؤں پر چوٹیں بڑی تیزی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ہڈیوں۔ بندھنوں اور کڑی ہڈیوں کی چوٹوں کیلئے مفید ہے۔

آرنیکا مانٹ - شدید درد کی وجہ سے انتہائی حساس۔ گنٹھیا۔ چوٹ یا دوسرے زخموں کے لئے مفید ہے۔ نرم حصوں میں زخموں کے لئے۔ طاقت سے زیادہ شفقت۔ دباؤ اور موج کے لئے تمام جسم دکھے موج کے۔ سیاہ یا نیلے نظر آنے والے نشان اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیلنڈر والا۔ تیز دھاراؤں کے زخموں کے لئے مفید ہے۔

ایلیم سیپیا۔ اپریشن کے بعد ڈنگ لگنے جیسی دریں۔ جلن دار دریں۔ رسٹاگس۔ موج اور طاقت سے زیادہ وزن اٹھانے کے لئے شاندار دوائی ہے جب پٹھوں اور مہضوں میں موج آجائے اور آرنیکا ناکافی معلوم دے۔

کلیریا فاس۔ جب ہڈیاں ٹوٹ جائیں یہ دوائی۔ آرنیکا۔ ۱۔ ایم سے بدل کر دی جاسکتی ہے روٹا اور مفاہیم ہر دوسرے روز ۱۔ ایم طاقت میں استعمال کرائی جائیں۔ پنی اونیا۔ دباؤ سے مسور جیسے کر لبر پریس رہنے سے زخم ہو جائیں یا تنگ جوتے پہننے سے زخم ہو جائیں۔

بیلیس پریٹیس۔ زخموں اور موجوں کے لئے شاندار دوائی ہے جس میں چھونے سے تکلیف ہو۔ یہ خون کی نالیوں اور اعصاب کو متاثر کرتی ہے۔ پس اس میں آرنیکا اور ٹیمپر کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ چوٹ لگنے پر پستانوں کا سخت ہو جانے کے لئے مفید ہے۔ کروکس۔ پیپ دار زخموں کے لئے۔

ٹانگوں کا ختم کھانا

چلتے وقت گھٹنوں کا رگڑ کھانا ^{۲۰} ٹیوبرکولیم۔ اس دوائی سے علاج شروع کیا جائے اور ہر ماہ ایک خوراک دی جائے باقی وقت درج ذیل ادویات دی جائیں سولے ٹیوبرکولیم دینے کے دو دن پہلے اور دو دن بعد یعنی ٹیوبرکولیم دینے کے دو دن پہلے۔ دو دن بعد کوئی دوائی نہ دیں۔

کلیریا فاس۔ کافی لمبے عرصہ تک دن میں تین دفعہ دی جائے۔ لتھائیٹرس۔ چلتے وقت گھٹنے آپس میں رگڑ کھائیں۔ رگڑائی چال سختی اور ٹانگوں میں انٹھن۔

جوہنیں۔

سٹیفسکیئر۔ جب جوہن زیر زان پائی جائیں یہ سر کی جوڑوں کے لئے بھی مفید ہے۔
لایکوپوڈیم۔ جلد کی جوہن۔ جلد کی جوڑوں کیلئے مخصوص ہے۔ جوڑوں کے پھول کیلئے۔ یعنی
برصی ہوئی جوڑوں کے لئے۔

سورائیم۔ سر کے بالوں کی جوہنیں۔ اگر ناکام ہو جائے تو کاربالک ایسڈ استعمال کیجئے۔
کاربالک ایسڈ۔ یہ دوائی جوڑوں کے لئے شاندار دوائی ہے۔

چہرے کی جلد کا دق۔

بیسلیئم۔ اس دوائی سے علاج شروع کرنا چاہئے۔ یہ ۲۰۰ میں دی جانے۔ اس کے
ایک ہفتہ بعد دوسری ادویات دی جائیں۔

ریڈیم بروم۔ چہرے کی دق کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔

آرسینکیم ایسم۔ شدید کمزوری۔ بے چینی۔ گرم چیزیں لگانے سے اجتناب اور ٹھنڈی چیزیں لگانے سے زیادتی۔

ایومون (ایومونا)۔ چہرے کا دق۔ ناک کا کینسر۔ مردہ کی طرح چہرہ زرد۔ ہونٹ نیلے۔

نوٹ:۔ اوپر دی گئی ہر دوائی کو کافی عرصہ کیلئے استعمال کیا جائے مگر نتائج خوشگوار
ہو سکیں یعنی کم عرصہ دوائی استعمال کرنے سے کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا۔

سوکھا مسان (بھریاں بھی دیکھئے)

میگنیشیا کارب۔ بچے جن میں ہڈی کی ہڈی کے ڈوبنے یا سر کی ہڈی اور اس کھوڑی کی
ہڈی سے اوپر ابھرنے کا ایک گڑھا پڑ جائے۔ یہ حالت محروماً ناجائز بچوں (اولاد الزنا) میں پائی جاتی
ہے جو چوری چھپے مجامعت کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوتے ہیں۔

ایروٹیم۔ بچے جن میں مانگوں کی کمزوری نمایاں۔ جلد پھلپھلی اور جھرولیوں کی صورت میں شکے سرکندہ اس کو اوپر نہ اٹھائے۔

کلکیر یا فاس۔ سوکھا سان کے لئے شاندرود دوائی ہے۔ یہ 4×6 میں دی جانی چاہئے۔ جلد خشک اور بھری دار ہو۔

نیٹرم سیور۔ بچوں میں گردن کا سوکھا سان۔ پانی کی شدید کمی غلگین اور حسرت بھرے انداز میں دکھائی دے۔ بچہ چھوٹا بغیر بالوں کے بندر دکھائی دے۔

پیکرک لیڈ۔ بچہ بوڑھا۔ گنڈا اور گریس لگانے پر صحتی ہوئی کمزوری جلد کھردری۔ بھری درگوں اور ہاتھوں کے قریب ہتھیں۔ ذہنی طور پر مضمری اور خود سر متواتر بدلتا رہے۔ رات کے وقت سر کو پسینے کے جو تکیہ کو تر کر دے۔ پاؤں کا پسینہ بربودار۔

سیسٹی کولا۔ بچہ کمزور ہو رہا ہو۔ شدید بھوک یعنی زیادہ کھائے پیئے۔

آئیوڈم۔ جب سوکھے سان کا رجحان ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ بچہ چڑا پن بچہ قریب ٹھکے نہیں دیتا۔ یعنی بچہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے قریب آئے لیکن پھر بھی دُبلتا پتلا۔ بگڑے ہوئے اور سوجے ہوئے جوڑ۔

برٹیا کارب۔ بچوں کی لاغری بلوغت کی عمر میں۔ موٹے تازے خوش خورد کا لوگوں کا آہستہ آہستہ پتے ہونا۔ بڑھے ہوئے غدود اور پیٹ کے ساتھ بچوں کا کمزور ہونا۔

آئیوڈم۔ جب سوکھے سان کا رجحان ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ بچہ چڑا پن۔ بچہ اپنے قریب ٹھکے نہیں دیتا یعنی بچہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے قریب آئے۔ بہت زیادہ کھائے، لیکن پھر بھی دُبلتا رہے۔ بگڑے ہوئے اور سوجے ہوئے جوڑ۔

ٹیوبو کولینیم۔ یہ بطور عمل ایگر دوائی کے دی جاتی ہے ہر ہفتہ ایک بار ۲۰ طاقت میں دیکھئے۔

کنپٹیوں کی ہڈیوں کی سوزش

کیپسیکم۔ سوزش چھوٹے پردہ کرے۔ کنپٹیوں کی ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔

سلیشیا - کپٹی کی بڑی گھنا سڑنا -
 پلاٹینا - کپٹی کی بڑی کائن ہونا کپٹی کی بڑی کے اجماع میں شدید من ہو کر جان جیسے کہ مرکب کھینچنے
 کینتھرس - بھانسنے والی دردیں جیسے کہ بڑی ٹکڑوں میں ٹوٹ جائیگی -
 مرکر ایٹورڈ - کپٹی کی بڑی کی سوزش -
 میلادونا - ابتدائی دور میں جب سوزش ہو اور کسری ہو -
 فلورک لیڈ - کپٹی کی بڑی کا چھوٹا متواتر کارھی زرد پیپ نکلے - ذیابیطس بہت زیادہ مفید ہوگا
 اور پیاس - شدید جینی تحریک یعنی مجامعت کی خواہش -

ٹانگ کی ایک سو جن جو خون کی نالیوں میں رکاوٹ پر واقع ہوتی ہے -

پلسٹیل - مذکورہ بالا مرض کے لئے سچائی کی دوائی ہے - زردی مائل سفید سو جن - درید کے
 تنے کے ساتھ ساتھ درد اور دھکن - ٹھنڈا ٹھوس کرے - لیکن ڈھانپنا چاہنا پسند نہ کرے -
 لائیگولوڈیم - ران کی دو رگوں کا بھول جانا اور دم - دونوں گریں بڑی ہو جائیں اور دکھیں -
 یہ اور ترک دیکھی جاسکتی ہیں -

سلیشیا - نیچوں اور بندھنوں کے ٹکڑے پر -
 لیکسس - جب پلسٹیل ناکام ہو جائے اور دل بھی ساثر ہو چکا ہو - ہمیں صبح کے وقت
 زیادتی ہوتی ہے -

ہیمامیلنس - یہ ایک اور دوائی ہے جب پلسٹیل ناکام ہو جائے اور لیکسس کی صلاحیت
 بھی نہ پائی جاتی ہوں - تو یہ دوائی بڑی کامیاب نتائج کی حامل ہے -

کمی ویشی (دیکھیے زیادتی اور کمی)

سبائٹا - گانا ناقابل برداشت - گانا اعصابیت پیدا کرتا ہے - ٹڈیوں اور ٹڈیوں کے
 گودے میں اثر کرتا دکھائی دے -

تھوجا۔ گناسن کر دپڑے۔

جسم پر پیدائشی نشان مثلاً تل وغیرہ

تھوجا۔ اس کا علاج ۱۔ ایم طاقت سے شروع کیا جائے۔ صبح و شام منڈیکھ لگائی جائے۔
ریڈیم برہم۔ مندرجہ بالا دوائی تھوجا کے ساتھ ہفتہ میں ایک بار دی جائے جس دن یہ دی جائے
تھوجا ہرگز نہ دی جائے۔

فاسفورس۔ اگر مندرجہ بالا لعقیات ناکام ہو جائیں تو یہ دی جائے۔
ویکسینیم۔ یہ دوائی ۲۰ طاقت میں لبرل عمل انگیز کے دی جائے اس دن اس کے علاوہ
کوئی دوسری دوائی ہرگز نہ دی جائے۔

ہڈی کا گل سٹر جانا۔

سیلیشیا۔ جب ہڈی کے تندرست ہونے کا عمل کُست پر چکا ہو۔ ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ صحت میں
دیجئے اور کافی لمبے عرصے کے بعد دہرائیے۔

گلکیریا فاس } یہ بہت اہم ادویات ہیں اول بدل کر ہڈی کو تندرست کرنے اور گلے ٹرنے
گلکیریا فلور } کے عمل کو روکنے کے لئے دی جائیں۔

یوفوریم۔ جڑے کی ہڈی گلنا سٹرنا۔ جڑے کی ہڈی کا گلنا سٹرنا۔

فاسفورس۔ پختلے جڑے کا گلنا سٹرنا۔

کالی آئیوڈ۔ جب آئسک یا پارے کے غلط استعمال کی وجہ سے گلے ٹرنے کا عمل ہو رہا ہو۔

کوکولس۔ ٹوٹنے کے بعد ٹوٹی ہوئی ہڈی کے سرے کو باہر نکالنے یا ران کی ہڈی کو باہر نکالنے

میں مدد دیتی ہے۔

ایسڈ فلور۔ گلے ٹرنے گوشت کو باہر نکالنے میں مدد دیتی ہے۔

چہرے کا اعصابی درد (اعصابی نظام کے تحت درد اعصاب بھی دیکھئے)

میگنیشیا کا رب چہرے کا اعصابی درد جو ہر مہفتہ بعد تین یا چار روز تک برقرار رہے۔ یہ گولی لگنے جیسے درد ہوتے ہیں۔ چہرے کے بائیں جانب کا درد جو بعض کو بسترے باہر نکلنے پر مجبور کر دے۔ متواتر حرکت پر افادہ اور حرکت کو روکنے پر زیادتی۔

کالونٹھ۔ دردی جو جذبات کی اکساہٹ یا جنگ عزت پر لہروں کی صورت میں آئیں جن کو گرمی سے افادہ ہو۔ دباؤ سے آرام ملے۔ اور آرام کے دوران زیادتی ہو۔ بائیں جانب کا درد اعصاب درد کے دوران چہرے کا بگاڑ۔ رخسار کی ہڈی میں درد۔ آنکھ کے نیچے والے گڑھے کے اعصاب کا درد۔ سیلا ڈونا۔ رخسار چہرے کے ساتھ شدید ہوں۔ آنکھ میں خون ظاہر ہوں۔ سر گرم اور چھونے پر شدید حساس دانیس طرف کا درد اعصاب جو ٹھنڈی دھیر سے ہو۔

میگنیشیا فاس۔ پھاڑنے والے اور گولی لگنے جیسے درد۔ بجلی کی طرح کے تیز اعصاب میں جو گرمی اور دباؤ سے افادہ پذیر ہوں۔ آنکھ کے اوپر والے اور نیچے والے گڑھے میں شدید دردی۔ سیڈرن۔ آنکھ کے گڑھے کا بالائی حصہ کا درد جس میں وقت کا تعین نمایاں ہو یعنی مقررہ وقت پر درد جیسے دورہ پڑے۔

مینزیم۔ جب درد سٹووی گرمی سے افادہ پذیر ہو (کوئی اور گرمی تیرا خشک گرمی افادہ نہیں) کھانا کھانے کے بعد زیادتی ہو۔ بائیں رخسارے درد کان تک جلنے اور رات کے وقت زیادہ ہو۔ لیکسس۔ جب پنڈلی کی ہڈی میں درد ہو۔

ولیریانہ۔ جب درد آرام کرنے پر زیادہ ہو۔ ایکونائٹ۔ متاثرہ حصے کی جھنجھٹا ہٹ کے ساتھ درد۔ سپائجیلیا۔ بائیں طرف کا شدید جلندار اور چھنے والا درد جو کرنا قابل برداشت ہو۔ سلفر۔ چہرہ کا اعصابی درد عصب کے پانچویں جوڑے کا درد جو چہرے کو ہم پہنچاتا ہے۔ کالجیکم۔ جب ٹھونکی اعصابی کمزوری کے ساتھ درد لیکن سپائجیلیا جیسی شدت نہ ہو۔

سفلینسم۔ جب درد اعصاب رات کو زیادہ ہو۔ چہرے کے ایک طرف کانچا بھی ہو۔

تو x1... یا سی۔ ایم طاقت میں دیجئے۔

آر جنٹم نائیریکم۔ آنکھ کے اوپر ادبھج کی دریں۔

سٹانم۔ جب دریں آہستہ آہستہ آئیں۔ تدریجاً ٹھیں اور شدید ہو جائیں اور آہستہ آہستہ

مرگ جائیں۔ آنکھ کے اوپر کی دریں۔

کیمو میللا۔ جب درد ناقابل برداشت اور بہت شدید ہو۔ اسکے ساتھ دانت درد۔ کان درد۔

یا گردن کا درد ہو۔

پلاٹینا۔ اینٹھن دار دریں۔ ٹھنڈک اور سن ہونے کے ساتھ۔

پلانٹیکو میجر۔ یہ تقریباً ہر قسم کے دروں کے لئے مفید ہے جب یہ مرکب کھیت میں لگائی جائے۔

کالی آیوڈ۔ جلد کی شدید حساسیت۔ ضدی کیسوں میں آنکھ کی نوعیت کے۔

وربیسکیم۔ کان میں ناقابل برداشت کھنچاؤ۔ درد چشم زن میں۔ بخوری سی حرکت پر درد

میں زیادتی۔ دانتوں کو بھینچنے یا آن کو زبان لگانے پر چہرہ سرخ۔ کھٹے دھار۔

سینگونیویر یا سی۔ پنج بھنے یا سر کو فرش پر بٹھائی سے دبانے پر رفاقت۔ اور پرانے جڑے سے ہلکا کرد۔

سٹیفگیہ یا۔ درد اعصاب ہونٹوں کو کھچنے یا کانٹے سے چھونے پر شدید گولی لگنے پس درد

شروع ہو جائے۔

اعصابی خلیوں کے بنے ہوئے گومڑ

آرٹیکا مانٹ۔ اعصابی گومڑوں کے لئے ۲۰۰ طاقت میں دن میں ۲ مرتبہ تقریباً ۶ ماہ تک

دیجئے اگر یہ ناکام ہو جائے یا افاتہ رگ جائے تو درج ذیل ادویات دیجئے۔

مائیریکم۔ اعصابی گومڑوں میں جب آرٹیکا مانٹ ناکام ہو جائے۔ چار گھنٹے کے وقفے

پر ۲۰۰ طاقت دن میں ۳ مرتبہ۔

کلایہ یا کلاب۔ اعصابی گومڑوں پر چار ہفتہ بعد ظاہر ہوں۔ پیپ دار گومڑوں میں ٹوٹی ہوئی۔

برائی ادویا۔ سر کے گوڑ۔ جلد کے بہت سے حصوں میں بھڑکنے سخت خدود۔
کیلنڈولا۔ زخم کی وجہ سے اور اصلی مرض کے گوڑ۔
سفلینیم۔ سر کے اوپر کانٹھیں یا گوڑ۔

بھیانگ خواب

کونیم۔ دماغ میں قلت خون کی وجہ سے۔
چی ادویا۔ کسی بھوت کا خواب کہ اس کی اس کی بھاتی پڑیٹھا ہوا ہے اکثر بڑا کر فزیر سے جگ جائے
سائیکلیم۔ سو جانے کے بعد بھیانگ خواب نظر آئیں۔
لیڈم۔ سونے سے ڈرے کہ وہ مرنے جانے لگا سو جا ہوا۔ محسوس ہو گھٹن کا احساس۔
امونیا کارب۔ دل کی بیماری میں ہر رات بھیانگ خواب۔
نکس و امیکا۔ رات کا کھانا زیادہ کھانے پر یا شراب کے مشروبات پینے سے۔
ڈیجیٹیلیس۔ جریان منی یا احتلام ہونے پر۔

موٹاپا

کلکیر یا کارب۔ یہ ایک مزاجی دوائی ہے جو موٹاپے کو دور کرتی ہے سوتے
میں رات کے وقت ماتھے پر پسینہ ہونے کیے کو ترک کر دے۔ ۲۰x میں دیکھئے اور ہر سفتہ بعد دہرائیے۔
فیرم میٹ۔ قلت خون کیساتھ موٹاپا، جہر پھولا ہوا۔ جسم پر دبائے سے گرے صبریں۔
امونیم میور۔ چوڑے موٹے۔ چڑیلے گوڑ۔ جسم موٹا نا لگیں تلی۔
فیوکس دیس۔ موٹاپے کیلئے استعمال کیجئے جب کلکیر یا کارب ناکام ہو جائے۔ مدد کیجئے
قسطوں کی صورت میں دیکھئے۔

تھائیرائیڈینیم۔ موٹاپا دور کرنے کے لئے ابھی دوائی ہے۔
آرم میٹ۔ دل میں چربی سیلی تنزی کیلئے۔
انسٹم کروڈ۔ نوجوان لوگوں میں موٹاپا۔

گرفیٹس۔ ہونا پے کی طرف نابل خاص طور پر گردوں میں حیض میں دیر سے آئے۔

استقامتی سو جن

آرم میور۔ پیشاب میں البیومن کے ساتھ استقامتی سو جن پیٹ کے اعضاء سخت ہونے پر۔ دفعہ دار بخار۔ تپ دق۔ جگر اور تلی کی بیماریوں سے۔
فیٹریم کلورائیڈ۔ چلنے پر ہاتھوں پر سوزش یا سو جن آئے۔
ایپس میلیفیکا۔ پیٹ کی سو جن کے ساتھ استقامت پیشاب کم آئے پھنسیوں کے رہنے کے بعد پیشاب میں جربلی آئے۔ گردوں۔ جلد کی شفافیت کے ساتھ اور پیاس نہ ہو۔ پیشاب میں بہت زیادہ البیومن ہو۔ بھٹی کا استقامت۔ اعصابی استقامت۔ بھولا بھولا جسم دانے پر گرے پڑیں۔

ایپوسائٹم۔ پیٹ کا استقامت کم پیشاب لیکن پیاس بہت زیادہ یہ ایپس میلیفیکا کے آلت ہے حیض کے رک جانے کی وجہ سے استقامت۔ پیپ تنا ہوا اور پردہ یا بہت زیادہ حیض کے بہہ جانے کی وجہ سے تھکاؤ کے ساتھ ہوسانس کو نکلنے کی کوشش کرے۔ اور خزانے دار سانس لے۔ آرسینک الم۔ شریوں میں دل کے بڑھ جانے کی وجہ سے دل کی بیماریوں میں استقامت جلد کا۔ استقامت۔ آنکھوں۔ چہرہ اور ٹخنوں کا استقامت مریض۔ بے چین۔ پریشان اور خواب پر خفا۔ فاسفورس۔ گردوں کی سوزش میں اسہال قلت خون کے ساتھ۔

ویسکیریا۔ گردوں کے مکمل طور پر ناکام ہونے پر استقامت جو پیشاب خارج کرنا بند کر دیں۔ گردوں کے کام چھوڑ دینے کی وجہ سے پیشاب خارج نہ ہو۔ ایک ڈرام مدریکوئی خوراک دیجئے۔ کالی آئیوڈ۔ سوجے ہوئے غدودوں کے دباؤ سے۔

لیکسس۔ دل کی بیماریوں میں پہلے دایں ٹانگ اور پھر بائیں ٹانگ کی سو جن ہو۔ ٹیرینتھنا۔ گردوں میں اجتماع خون۔ گردوں کی بیماریوں اور کمزوریوں کے ساتھ۔ چائینا۔ کمزوری اور قلت خون کے ساتھ استقامت۔

فیروزس این - دل کی بیماریوں بجز اور گردوں کی پیچیدگیوں کی وجہ سے استقامت گردوں اور دل کا استقامت تیزی سے دور ہو جاتا ہے۔ پیشاب مقدار میں بڑھ جاتا ہے اور البیون جلد غائب ہو جاتا ہے۔
 ہائیدروکوٹائیکس - استقامت - فیل پاغائیر یا کے لئے نہایت مستند دوا ہے۔ ۹۰ x میں دیکھے۔
 تھائیرائیڈیم - بازوؤں اور چہرے کا استقامت بغیر کسی ظاہری کے سبب کے۔
 رسٹاکس - حسیوں کی تھیلی کا استقامت بغیر - مردانہ آرتھرائٹس اور عورت کی اندام نہانی اور منہ پر استقامت - یہ بھلی کی نسبت جلد کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔

قبل از وقت بڑھایا۔

امبر اگر سیسا - قبل از وقت بڑھایا وہ علامات جو ۶۰ سال کی عمر میں شروع ہونی چاہئیں ۵۰ سال کی عمر میں ظاہر ہونا شروع ہوں - کانپنا - لکھڑانا اور دماغی کی خواب جیسی کیفیت بہت زیادہ بھول جانے کے ساتھ۔

برسیا کارب - قبل از وقت بڑھایا - بچوں جیسے کام اور بچوں جیسی باتیں کرنے - بوڑھے لوگوں میں بیوقوفانہ رویہ - پٹھوؤں کا جواب دینا - ذہانت میں نقص آجائے۔
 اپریشیا سے پہلے، اپریشیا سے بعد - اپریشیا کے علامات بھی دیکھئے۔

پالپسینٹہ۔

گلکیریا کارب - ڈھیلے ڈھالے آدمیوں اور بچوں میں پالپسینٹہ جو تکیہ کو تر کر دے۔ یہ ایک مذہبی دوا ہے کمزور یا پالپسینٹہ - مینڈکے دوران سکوپالپسینٹہ - پالپسینٹہ میں جب پاؤں ٹھنڈے ہوں تو پالپسینٹہ کی پالپسینٹہ - پالپسینٹہ کے لیے چوڑی کی دھاتی ہے۔ خاص طور پر پاتھوں کی تھیلیوں اور پاؤں کی تلوؤں پر گندھی بولڈالپسینٹہ۔

سمبوکس - دن کے دوران یا جاگتے وقت کمزور کرنے والا پالپسینٹہ جو نہی مینڈکے پالپسینٹہ کی پالپسینٹہ - پالپسینٹہ میوور - پاؤں کا پالپسینٹہ یا تلوؤں میں جلن۔

درجہ حریم البم۔ ٹھنڈے پینے میں جلن۔ سردی اور گرمی ادل بدل کر۔ عموماً منہ پر ٹھنڈا پسینہ۔
میگنیشیا کرب۔ کھٹا پسینہ۔

پیٹرولیم۔ بدبودار پسینہ خاص طور پر نغلوں کا یہ آنا بدبودار ہوتا ہے کہ جو نہی مریض کمرے میں داخل ہوتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔

بنسرواک الیڈ۔ پسینہ جس کو ٹھنڈا لیتا ہوا نہ ہو۔ پیشاب میں یورک الیڈ بہت ہی رنگ دار۔
پیشاب اور بہت ہی بدبودار پیشاب۔ گھوٹے کے پیشاب جیسی بیخودالا پیشاب۔
ٹیرنٹولا۔ کانے سے بہت زیادہ پیشاب آئے۔

کوئیم۔ جو نہی سوئے خواہ دن ہو رات پسینہ آئے یا آنکھیں بند کرنے پر ہی پسینہ آئے۔ بیکوئس
کالٹ ہے۔

مرکوریس۔ جب چلے تو شدید پسینہ آئے۔ دن رات پسینہ اگر رات کے وقت زیادہ چڑھنے لگے
دلے۔ بدبودار پسینے، بستر کے پٹوں کو تر کر دیں۔ بدبودار ہوا ہر جگہ پھیل جائے۔ پیشاب پاخانہ
اور پسینہ بدبودار۔ یہ میٹھی پھینے والی بو رکھتا ہے۔ کھاتے وقت پریشانی اور ٹھنڈا پسینہ۔
لیکسس۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ پسینہ۔ غونی پسینہ۔

اکونائٹ این۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ٹھنڈے پسینے جس کو ٹھنڈے کا ارادہ ہوا ہی دن پسینہ آئے۔
کالی کرب۔ درد والے حصوں پر پسینہ آئے
ہمیرسلفر۔ پاؤں پر ٹھنڈا اور بدبودار پسینہ۔

پلسٹیل۔ جسم کے من ایک حصے پر پسینہ۔ اسی طرح جسم کے من ایک حصہ پر گرمی جب کہ
دوسرا حصہ ٹھنڈا ہو۔

سلیسلک الیڈ۔ پاؤں کا گند اپنی بکثرت احساس کر پاؤں کو پسینہ آنے والا۔

سینٹی کولا۔ لاغر بچوں میں سر پر رات کے وقت پسینہ، پاؤں پر بدبودار پسینہ۔ من دھانپنے
والے حصوں پر پسینہ (تھوہا کالٹ) جب ہاتھ لکھے کئے جائیں۔ توان پر پسینہ آئے۔

ٹیوبو کوئیم۔ ذہنی مشقت سے پسینہ سفید لہن پر زرد داغ ڈال دے رات کے پینے موسم میں

تبدیلی سے حساس۔ سرد۔ نمدار۔ گرم یا بارشوں کے موسم۔ طوفان سے پہلے زیادتی۔
 ٹائٹنگ ایسڈ۔ ہاتھ اور پاؤں پر بکثرت پسینہ۔
 انٹیم ٹارٹ۔ متاثرہ حصوں پر بکثرت پسینہ۔
 ٹیلیویریم۔ بدبودار پاؤں کا پسینہ۔
 نیفٹھالین۔ کنزور کرنے والے رات کے پسینے۔ دن کے وقت پتلے بدبودار اسہال۔
 کاربو انیمیلز۔ پسینہ زرد داغ ڈالے۔
 گرینفائٹس۔ پسینہ زرد داغ ڈالے۔ کھٹا اور بدبودار۔
 بیلادونا۔ دھانپے ہوئے صحنہ پر پسینہ۔
 سورٹینیم۔ تھوڑی سی مشقت پر پسینہ۔
 سٹیف گیبریا۔ گندے انڈوں جیسا پسینہ۔ رات کا پسینہ دق کی وجہ سے گھلے ہوئے مریضوں میں۔
 اوسیم۔ بغلوں میں بسن کی بو جیسا پسینہ۔
 جبرائیل۔ پسینہ بکثرت چہرہ اور سر سے شروع ہو کر تمام جسم پر پھیل جائے اور ہاتھ پاؤں
 ٹھنڈے ہو جائیں اور آخر کار کھٹی مٹے آئے۔
 اکنوائٹ لائیکوٹوم۔ ہاتھوں پر پسینہ۔
 لاروسیروسس۔ ٹھنڈے مریضوں میں گرم کردوں میں آنے پر پسینہ جو کھلی ہوا میں کم ہو۔
 آرہیٹ۔ پسینہ کاڑھے چناب کے ساتھ جو گدلا اور بہت بدبودار ہو۔
 کرڈن ٹنگ۔ غونی پسینہ۔
 چینیم آریکم۔ سوتے میں بکثرت اور کنزور کرنے والا پسینہ۔
 اگنیشیا۔ چہرہ پر تھوڑی سی جگہ پر پسینہ کھانا کھاتے وقت۔
 کیلیڈیم۔ میٹھا بودا پسینہ جس پر مکھیاں آئیں۔
 تھوجا۔ جسم کے کھلے حصوں پر پسینہ اور دھانپے ہوئے حصوں پر پسینہ نہ ہو۔ آلات
 تناسل پر بدبودار پسینہ۔ پسینہ تیل والا۔ میٹھا۔ بدبودار۔ جس طرف لیٹا نہ ہو اسی طرف پسینہ آئے

فیڑم میور۔ کھانا کھاتے وقت پسینہ۔
 کیو میلہ۔ کھانا کھانے یا مشروب پینے پر پسینہ۔
 فلورک الیڈ۔ ہاتھ اور پاؤں متواتر پسینہ میں شرابور۔
پسینہ دب گیا ہو۔

ایکونائٹ این۔ جب دبا ہوا پسینہ نزلہ۔ بخار اور قحطی سوزش میں مبتلا و کڑے۔
 ٹکسوامیکا۔ پسینے کے دب جانے سے بچش۔
 کالجیکم۔ پسینے کے اچانک دب جانے بلکلہ اپن خاص طور پر پاؤں کے پسینے کے دبنے پر تمام جسم کے لیے بھرپور۔
 برائی اونیا۔ زچگی میں پسینہ کا دب جانا۔
 ڈکمارا۔ پسینہ کا اچانک ٹھنڈے دب جانے پر تکالیف ہو جانا۔

گوٹر مٹانے کا۔

کلیریا کرب۔ مٹانے کا گوٹر۔

کان کا گوٹر

ہائیڈر اسٹس۔ کان کی بلغمی بھٹی پر بہت زیادہ گوٹر ملنے کا آگاہ۔
 محقوجا۔ کان کے درمیانی حصہ میں گوٹر۔
 مرکوریس۔ سننے کی نالی دائیں طرف کی نرم آسانی سے خون بہنے والے گوٹر سے رک جاتے۔
 کلیریا کرب۔ کان کا گوٹر۔

نرخرہ۔ حنجرہ۔

سینگونیریا۔ حنجرہ کا گوٹر۔

بریسر ولگیرس۔ آلات موت کا گوڑ، سرخ بغیر متصل کے بنیاد۔

ناک کا گوڑ

گلگیر یا کارب۔ ناک کا گوڑ سو جگھنے کی قوت نہ ہو۔
 ٹیوکریم۔ سارے ہی نھنوں کو بھر دے۔ جس طرف لٹے اس طرف کا نھنا بند ہو جائے۔ بڑا گوڑ
 جوز کام کے غلط علاج کی وجہ سے ہو۔ بھری ناک سفید اخراج۔ نادر موسم میں بڑا ہونے کا جہان
 ناک کے گوڑ کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔

کالی نائٹرک۔ سردی کے درے کے بعد گوڑ تیزی سے بڑھے۔ بڑا تباہواناک دائیں طرف۔
 ہیکلا لاوا۔ ناک کا گوڑ جو چہرہ کو بگاڑ دے۔ ڈیلوں کو اوپر کی طرف کر دے۔ پلکوں کو الٹ
 دے۔ نھنوں کو بند کر دے۔ بچے منہ تک بڑھ آئے جس سے سانس لینا اور چبانے کا عمل مشکل ہو جائے۔
 ایوونا۔ ناک کے گوڑ بائیں طرف۔

امعائے مستقیم یا ریٹیم کا گوڑ

ٹیوکریم۔ گوڑ کے لئے چوٹی کی دوائی ہے۔ اس کے ساتھ علاج شروع کیجئے۔ اگر یہ ناکام ہو جائے
 تو درج ذیل ادویات آزمائیے۔

گلگیر یا فاس۔ امعائے مستقیم کا گوڑ۔
 فاسفورس۔ امعائے مستقیم کا گوڑ یا ناک کی جگہ سوچی ہوئی۔

حفظ ماقدم۔ روکنے والی

بیلادونا۔ سرخ بخار کو روکنے کے لئے۔
 کالی آئیوڈ۔ جانوروں میں منہ اور پاؤں کی بیماریاں روکنے کے لئے۔
 پائیلو کارٹینیم {
 پیروڈینیم { کن پٹروں کے غلات حفظ ماقدم۔

متھائیں سٹائیو۔ ریڑھ کے ستون کے پیلے رنگ کے مادے کی سوزش کیلئے حفظ ماتقدم کے طور پر۔

ویریولینم { جھوٹی پیچک کے غلات حفظ ماتقدم کے طور پر۔
ویکسینم

میلینڈریم { جھپک کے غلات حفظ ماتقدم کے طور پر۔
ماربیلینم

سٹرائیم - تابکاری شعاعوں کے اثرات کے غلات۔

پروٹوسین - کال کھانسی کے غلات۔

انفلوئنزیم - انفلوئنزا کے غلات۔

ڈیفٹھیریم - خناق کے غلات۔

دیکھے۔ جل جانا۔ بھاپ وغیرہ سے جل جانا۔

سکروی

آر سینکیم البم - شدید کمزوری، پیچہ لاغر، انٹرلوں کا نظام درہم برہم منہ سے شدید بدبو۔

سلفر - جب موڑھوں سے خون بہے اور ریض کے منہ سے بدبو دار سانس آئے ریض بوڑھا بھری دار۔

اور کمزور نظر آئے اور جلد کی غیر صحت مند حالت۔ بدبو دار۔ پیپلر خون دانتوں کی جڑوں میں سے ہے۔

مرکوریس - جب دانتوں سے موڑھے پیچھے ہٹ جائیں۔ نیلے اور غیر صحت مند رنگ۔ ٹانگیں سوجی

جوتی اور بہت پُر درد غیر صحت مند جلدی نیلے ناسور نمایاں علامات ہیں۔

کریوزوٹ - منہ بدبو دار میلا۔ موڑھوں میں ناسور۔ نکسیر اور آلات تناسل سے خون بہے۔

کاربووکیج - موڑھوں اور ناک سے متواتر خون بہے۔ یہ گروہوں اور انٹرلوں کبھی بدکتا ہے۔

آرنیکا مانٹ { ٹانگوں میں دردوں کے لئے دی گئی ترتیب میں دیکھئے۔
سمفایٹیم

نوٹ :- سکروی کے علاج کے لئے مغز اک نہایت ضروری ہے۔ پھیلوں کارس اور سبزیاں جلد

اور اچھے نتائج ظاہر کرتی ہیں۔

کیلنڈر والا۔ ۱۔ اور ۱۰ آپ معطر کی نسبت سے ملا کر ہر دو گھنٹہ بعد دھونے سے جلد آرام آتا ہے اور گندی بو دور ہوتی ہے۔

متلی قے جہاز۔ کار۔ گاڑی کے سفر میں جکڑ

پٹرولیم۔ سفری تکالیف کیلئے مخصوص مریض شدید متلی قے اور جکڑوں اس درد میں مبتلا ہو جاتا ہے گاڑی میں سواری کرنے پر جی مٹانا۔

ایپومارنیا۔ دماغی تکلیف کی وجہ سے قے ۲ یا اس سے اونچی طاقت میں استعمال کیجئے۔
ٹوکیئم۔ تھوڑی سی حرکت پر بھی زیادتی۔ سرشہ پر کھلی ہوا میں افادہ۔ لیکن زرد۔ ٹھنڈے پسینے اور ٹھنڈک نمایاں علامات ہوں۔ خاص طور پر اعصابوں کی۔

سٹیفسگیر یا۔ اعصابی آدمیوں میں سفری تکالیف جب سر گرانی اور متلی شروع ہوتے قے لگنے سے پہلے دی جائے۔

کوکولس انڈر۔ جب گاڑی میں سفر کرنے پر بھونسنے سے سفری تکالیف سر گرانی اور متلی وغیرہ ہوں۔
تھیریدرون۔ سفری تکالیف اعصابی عورتوں میں جو جہاز کی حرکت سے نجات پانے کیلئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔

پلسٹیل۔ عرشہ پر کھلی ہوا میں افادہ لیکن جو نہی کمرے میں داخل ہو سفری تکالیف شروع ہو جائیں۔ طبعی طور پر خوش مزاج لیکن جلد ہی آنسو بہانے شروع کر دیں۔ پیاس نہ ہو۔
بورکس۔ متلی اور قے اس کی نہایت نمایاں علامات۔ بچہ کی طرف حرکت سے ڈر۔ جہاز یا گاڑی کی بچہ کی طرف حرکت سے متلی اور قے شروع ہو جائے۔

برالی او نیا۔ جب مریض جیب چپ لیٹے پر افادہ محسوس کرے۔ معمولی سا خلل دوائی پیش کرنے پر ہی تکالیف بڑھ جائے۔

کافیا۔ معده میں متواتر تکلیف سر درد کے ہمراہ۔ بروقت قے کرنے کی رغبت ہو گئے میں محسوس ہو۔

آدھے سر کے دردوں کے ساتھ تپلے مواد کی تے۔

احساسات۔

کارل بوائیٹس۔ تمام حصوں کا ڈھیلا پن آنکھیں اپنے خانوں میں

اور دماغ سر میں ڈھیلا محسوس ہو۔

امونیم میور۔ کمر میں کندھوں کے درمیان ٹھنڈک کا احساس۔

ڈفنے۔ جسم کا حصہ بازوؤں سے علیحدہ محسوس ہو۔

سیپیا۔ ریکٹم میں سیب یا آلو جیسا گولہ محسوس ہو۔ اس علامت سے اسہال اور قبض ٹھیک ہو

سکتے ہیں۔ آنکھوں میں ریت کا احساس۔

کروکس۔ کوئی زندہ چیز پیٹ میں ادھر ادھر گھوم پھر رہی ہے (جنین پیٹ میں شدید حرکتیں کرے)

یا تصوراتی حمل کا احساس اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔

سیکل کارجلن کا احساس جیسے کہ دیکھتے ہوئے کوئے حصوں پر گر رہے ہیں جو چھوٹے پر ٹھنڈے

ہوں۔ ڈھانپنا جانا پسند نہ کرے۔

مینزیریم۔ جیسے کہ دانت بہت لمبے ہوں۔

مرکوریس پرنس۔ محسوس کرے کہ جیسے دو ناک ہوں۔

مائریکایر لفریا۔ جیسے کہ چہرہ پر کپڑے مکوڑے رنگ رہے ہوں۔

لو بلیا انفلیٹا۔ جیسے کہ گلے میں بڑی ہو۔

لیئم ٹنگ۔ کندھوں سے نیچے کی طرف کھینچاؤٹ جیسے کہ گروہوں میں بندھے ہوئے ہوں۔

پینڈرا۔ جیسے کہ کچھ اعلیٰ تقسیم می سے خارج ہو رہا ہو۔

لارویس وکس۔ جیسے کہ مکھیاں اور مکڑیاں جسم پر چڑھ رہی ہوں۔

کیسکم۔ جلن کا احساس جیسے کہ مچیں چھڑکی گئی ہوں۔

آرٹیکلم الیم۔ جلن کا احساس جس کو گری سے افادہ ہو۔

سلفر۔ جسم کے کسی بھی حصے میں جلن کا احساس۔ سر کے گرد سخت بند کا احساس۔ گلے میں بالوں

لاکچھا چھاتی میں ہوت کا گولا۔ چھاتی اور بازوؤں پر چڑھے ریگنے کا احساس۔
 فاسفورس۔ جلن کا احساس۔

بورکیس۔ مکئی کے جانے کا احساس چہرہ پر کھٹل اور کڑے مکڑوں کے چلنے کا احساس
 بیجینڈونیم۔ احساس جیسے کہ اس پر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ ہوا کی نالیوں میں گردش کا احساس
 اور کھانسی آئے۔

ڈلکا مارا۔ ڈوبے کا احساس۔

الینشیا۔ خالی پن کا احساس۔

ٹیرینتجنا۔ احساس کہ اس نے ایک چھوٹا سا گولہ نگل لیا ہے جو معدہ کے گڑھے میں اٹکا
 ہوا ہے جیسے کہ انٹریاں ریڑھ کی ہڈی کی طرف کھینچ رہی ہیں۔

ٹیوبرکولینم۔ ریڑھ کی ہڈی پر گیلے تکلیف دہ پٹوں کا احساس۔

تھوجا۔ احساس کہ دماغ میں کیل ٹھوسا ہوا ہے۔ امعاء مستقیم میں سے ابلتے ہوئے میسر
 کا گزرنا۔ مقعد پانچلنے کے دوران میں مکڑوں میں بٹ جائیگا۔ جیسے کہ ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔
 جیسے کہ جسم شیشے کا بنا ہوا ہے اور ٹوٹ جائیگا۔ جیسے کہ کوئی زندہ چیز جسم میں اچھل کود رہی ہے۔
 تھیرٹین۔ احساس کہ کوئی زندہ چیز جسم میں اچھل کود رہی ہے۔ تھوجا کے ناکام ہونے پر یہ
 استعمال کی جائے۔

کیمومیللا۔ احساس کہ ٹانگوں کی ہڈیوں کے مٹن پر چل رہا ہے اور اپنے کوئی پاؤں نہیں رکھتا۔

گرافیاٹس۔ پچھڑ پکڑی کے جانے کا احساس اسکو دور کرنے کرنے کی سخت کوشش کرے۔

کیمفر۔ جسم کی بیرونی سطح پر شدید ٹھنڈک کا احساس کہ پڑے اتارنے کی زبردست خواہش بہت
 زیادہ گری یا پسینہ جسم کو ڈھالنے کی خواہش کے ساتھ۔ احساس کہ ڈھانپنے ہوئے حصوں پر
 پر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔

ایلینتھس۔ ٹانگوں پر چوڑا چڑھنے کا احساس۔ سر سے بازو تک بجلی کی کرنٹ دوڑنے کا احساس۔

کروٹیلکسی۔ احساس کہ کوئی زندہ چیز سر میں دائروں کی صورت میں چل رہی ہے۔ چند یا

یا چوٹی پر گرم سُرخ لہجے کا احساس۔ پیٹ میں سوراخ ہونے کا احساس جس میں سے ہوا خارج ہوتی ہو۔ کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں ٹھنڈک کا احساس۔ احساس کردل پانی میں مچھو دیا گیا ہو۔ یا جھاتی میں پانی کا احساس۔ دائیں بازو کے مچھوٹے ہونے کا احساس۔

پائیرجن۔ سر پٹوپی کا احساس۔ احساس کہ اسکا سرنگیہ پرچو، اور باقی جسم کا کوئی پیر نہ ہو کہ کہاں ہے۔ فائبرک لیڈ۔ احساس کہ ایک کان سے دوسرے کان تک لہجے کے ٹھنڈے یا بانک میں کسا ہوا ہے۔ گلے میں ککڑیوں کا احساس جیسے کہ پھلی کی ہڈیاں ہوں۔

اکونائٹ این۔ چہرے کے بڑے ہونے کا احساس۔

الیومنا۔ بازوؤں اور جسم کے گرد بیٹیوں کا احساس۔ گلے میں پھلی کی ہڈی کا احساس جس وقت بھی کوئی چیز نکلے حلق میں تنگی کا احساس ہو۔ ٹانگوں کی پشت پر چینٹیوں کے ریگنے کا احساس۔ کھڑی کے جانے کا احساس۔ خشک اندروں یا خون خشک چہرے پر ہونے کا احساس۔ اکیٹا ریسیرا۔ احساس کہ اس کے ارد گرد سیاہ بادل ہو۔ اور اس کا سر ڈھانپ لیا گیا ہو اس لیے اندر جھرا ہو اور درہم برہم ہو اور یہ سیسے کی سر پر وزن دے۔ دماغ میں ہلنے کا احساس جیسے کہ معدہ و گردن سے جند یا ٹک پتھ کس دیا گیا ہو۔

سٹس کیناڈیفنس۔ جسم کے تمام حصوں میں ٹھنڈک کا احساس جیسے کہ معدہ۔ گلا جھاتی انگلیوں کے سبہ وغیرہ احساس کہ تمام جسم میں لیٹے وقت چونٹیاں ریگتی ہوں پریشانی اور تکلیف سے سانس آئے۔ لٹھنے پر مجبور ہو اور تازہ ہوا کے لئے اور کھڑکیاں کھولے جس سے اسے افادہ ہو۔ لیٹے پر فوراً دوبارہ یہ احساس لوٹ آئے۔

کو کولس۔ سر میں ککڑی۔ خالی اور چلنے جانے کا احساس۔

گلونائن۔ احساس کہ ٹھوڑی گھٹنے تک بڑھ گئی ہے

کالی بائیکو ویکم۔ احساس کہ سر اور ناک بھٹ جائے گی۔ کزناک کے اندر ڈھیلی ہڈیاں ایک دوسرے سے رگڑا کھاتی ہوں۔ نٹھنوں میں او پچا مال ہو۔ زبان کی پشت پر بال ہو۔ خا ہیشاب کی نالی میں ہیشاب کے ایک قطرے کے رہنے کا احساس۔ لیٹے پر دم گھٹنے کا احساس۔

کاروبار نیم سلف - احساس کہ قریب ہی کوئی گڑھا ہوا ہے ایسے گرنے کا خطرہ ہو۔ کندھے کے جوڑ پر بوجھ جو اسے اُگے جھکنے پر مجبور کرے۔

کالی کارب - معدہ میں گھونسہ۔ صدمہ یا بُری خبر کا احساس۔ بھلی کی ہڈی یا لکڑی کی جھتی کل گلے میں احساس۔ دو پہر کے وقت شدید ٹھنڈک کا احساس۔

لیکس - بھلی کی ہڈی کا احساس گلے میں۔ احساس کہ چہرے پر جوئیں رنگ رہی ہیں۔ گرمی حرکت اور رات کو زیادتی۔

میںڈورنیم - احساس کہ دائیں کان میں کوئی کیڑا رنگ رہا ہے۔ کان کی اندرونی نالی کی دیوار میں سوراخ کر رہا ہو۔ احساس کہ کاغذ یا پن معدہ کے گڑھے میں سے باہر آ رہی ہو اسے تکلیف سے اٹھنے پر مجبور کر دے دھری ہو جائے اور چلائے۔ ہر طرف سے سوئیاں آنے کا احساس ہو۔ پلکوں کے نیچے ریت ہونے کا احساس۔

مرکیورس - گلے میں سبب کے گودے کے چپکے ہونے کا احساس۔

اوپیم - کسی بھی بیماری میں احساسات کا جاتے رہنا اس دوائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

گوکس کیکٹائی - گلے میں بال کا احساس۔

اونسوڈ - احساس کہ کپاس پر چل رہا ہو۔

ورٹیرم البم - احساس کہ اگر اس نے پانی یا تویہ حلق سے نیچے نہ جائیگا۔ چند یا میں ٹھنڈک

کا احساس۔ دریدوں میں ٹھنڈے پانی کے دھڑنے کا احساس۔ جیسے کہ وہ حاملہ ہو۔ جیسے

کہ اس نے پودینہ کھایا ہو۔ منہ اور گلے میں ٹھنڈک۔ جیسے کہ کوئی زندہ چیز معدے سے گلے کو اٹھ

رہی ہو۔ جیسے کہ انٹریاں چاقو سے کاٹی جاتی ہوں جیسے کہ پیٹ اور انتڑیوں میں گرم کوئلے ہوں۔

ایسٹفاس - احساس کہ اسکے پاؤں اٹھ رہے ہوں اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔

ولیریاہ - احساس کہ گلے سے ایک دھاگہ نکل رہا ہو۔

نیٹریم بور - احساس جیسے کہ زبان سے دھاگہ رہا ہو۔

زیٹھوزائلم - احساس کہ جسم میں سے بجلی کے ہلکے ہلکے جھپٹے گزر رہے ہوں۔

پلاٹیم۔ احساس کہ کوئی جانور پیٹ میں چھوٹے چھوٹے حصوں کو دانتوں نے چیر چھاڑا ہو۔
 مکریہ۔ بازوؤں۔ پیٹ۔ رانوں اور ٹخنوں پر لمبوں کے رنگنے کا احساس۔ حقیقی لمبوں کے کاٹنے
 کی طرح مختلف جگہوں پر چھبیں ظاہر ہوں۔ مثلاً ہونٹوں پر۔ نکتوں وغیرہ پر۔ یہ شدید غارش پیدا کرے۔
 پٹرو لیم۔ احساس کہ دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ٹکڑوں میں ٹھنڈک۔
 پلاٹینیم۔ احساس کہ رانیں سختی سے لپٹی ہوئی ہیں۔ ماتھے پر پانی کا احساس ٹھنڈک کا۔ رنگنے کا۔
 ٹانگوں میں کسن ہونے کا احساس۔ پیٹ کے اندر دھنسنے کا احساس۔
 ٹیلیائی۔ دماغ میں کیل کے گڑنے کا احساس۔
 زنک لوس بلب۔ احساس کہ گھر سے باہر جانے پر جسم پر گیلہ پڑا ڈال دیا گیا ہو۔
 روٹا۔ آنکھوں میں حرارت اور گرمی کا احساس۔ ریڑھ کی ہڈی میں نیچے کی طرف ٹھنڈک کا احساس۔
 سلیسک الیڈ۔ احساس کہ پاؤں پر سینہ آ رہا ہے۔
 مینی کولا۔ احساس کہ سر کھلا ہوا اور ہوا اس کے اندر سے جائے۔ دماغ کے ارد گرد ٹھنڈے
 پڑے کا احساس۔ احساس۔ احساس کہ کمر دو حصوں میں ہو۔ ٹخنے پر ہوا کی نالی میں کسی سخت چیز کا احساس۔
 سلیشیا۔ زبان کے اگلے حصے پر بال کے پڑنے ہونے کا احساس۔
 سیٹیفیکر۔ احساس کہ معدہ اور پیٹ ڈھیلے ہو کر رنگ رہے ہوں۔
 وکم البم۔ احساس کہ اسے کچھ کمرے نیچے کھینچ رہا ہو اس کے فوراً بعد احساس ہو کہ جسم کا اوپر والا
 حصہ ہوا میں تیر رہا ہو۔
 ایومنا سلیسکیٹ۔ احساس کہ دماغ میں سے جسمیوں نیاں نیچے جسم کی طرف رنگ رہی ہوں اور پاؤں
 میں سے نکل رہی ہوں۔ جسم کو لپیٹ دینا چاہتی ہو اور سر کو ٹھنڈی ہوا میں رکھنا چاہیے۔
 بیریم سلف۔ سر میں حرکات کا احساس۔ دماغ کے ڈھیلے ہونے کا احساس۔
 آرسینک سلف فلیوم۔ ٹانگوں کے اور پاؤں کے ذریعے ہونے کا احساس۔ بازوؤں کا سس ہونا
 اور ٹھیکے لگنے کا احساس۔
 پیڈیکولس۔ احساس کہ بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا جا رہا ہے۔

کالی سلف - سر پر بہت ہی مضبوطی سے رکھی ہوئی تنگ ٹوپی کا احساس -
 کینا لیں انڈیکا - احساس کہ دل سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں -
 کالی بائی - دل کے قریب ٹھنڈ کا احساس
 اوسیم - احساس کہ اس نے ٹوٹے ہوئے پتھر نکل لئے ہوں - جیسے کہ کرلوہ کندھوں پر کڑے رنگے ہیں
 ہوں - سر کے گرد ایک ہاتھ ہو -
 اکیوٹیم کام - بیٹے کے گرد جونیٹوں کے رنگنے کا احساس -
 کلیٹیس - صبح کے وقت احساس کہ ابھی اتنا نہیں سویا - یعنی کہ مطلوبہ نیند پوری نہیں ہوئی -
 ایتھوزا - احساس کہ معدہ کے اوپر کچھ نہ بچنے کی طرت اُلٹ گیا ہو بچاتی میں جلن کا احساس -
 سوراٹیم - جیسے کہ سر اور کان اس کے اپنے نہ ہوں -
 الیومن - احساس کہ بازوؤں کے گرد درمی یا ٹپی بندھی ہو، خاص طور پر ٹانگ کے گلو گھٹنے کے
 نیچے - چلتے وقت پاؤں کے لمبے دباؤ سے حساس ہوں -
 آر جینٹم ٹائیریکم - گلے میں پھڑپھڑان یا پھٹی کی ٹہنیوں کا احساس - مریض ہر ٹھنڈی موسمی اور پسند کرے -
 مہر سپرلف - نکلے وقت گلے میں پھڑپھڑان لیکن آر جینٹم ٹائیریکم کے خلاف مریض ہر چیز ٹھنڈی کے بجائے
 گرم چیزوں کو ہی پسند کرے -
 چارٹا - آنکھوں میں ریت کا احساس -
 میگنیشیا میور - احساس کہ بال کھینچے جا رہے ہوں - بالوں کے کیسے دھکیں یہ کو مضبوطی سے پیٹے پر اتارے -
 نیٹریم میو - گلے میں مچھلی کی ہڈی کا احساس -
 سلفورک الیڈ - تمام جسم اور بازوؤں میں سردی کا احساس بغیر ظاہر کا پینے کے -
 ابروٹیم - احساس کہ معدہ ٹک رہا ہو یا پانی میں تیر رہا ہو -
 ایلیم ٹائیوا - زبان پر بال کا احساس - جب پڑھے تو تکلیف ہو - یا پڑھتے وقت
 تکلیف زیادہ ہو جائے -
 میگنیشیا کارب - احساس کہ دانت بہت لمبے ہو گئے ہوں -

صدمہ - دھچکا - شک

ایکونائٹ این - ڈرکی دجہ سے ذہنی صدمہ - لیٹے ہونے کی حالت میں سے اٹھنے پر سرخ بہو انتہائی زرد مردوں جیسا اور دوبارہ اٹھنے پر ڈرے - گرنے پر یا چوٹ لگنے پر ہلکے۔
انیم - تصوراتی ڈر جیسے کہ بصوت سے ڈرکی دجہ سے صدمہ - جنگلی جانوروں کے ڈرکی دجہ سے صدمہ یا شک وغیرہ۔

کیمفر - دماغی چوٹ کی دجہ سے بیہوشی - نظر کا جاتے رہنا - سماعت کا جاتے رہنا - چوٹ کی دجہ سے بیہوشی۔
آرنیکا - زخم کی دجہ سے صدمہ - ٹھنڈے ہاتھ پاؤں - زبان کا ہاتھوں اور پاؤں کا ٹپنا - خشک کمزوری - لاغری اور تھکاوٹ - چھوٹے پر بے حس۔

اگیشیا - خاندان میں اموات کی دجہ سے ذہنی صدمات یا اسی طرح کے واقعات جو افسرہ اور بے احساسات بنادیں۔

کینتھرس - جب صدمہ جلنے یا جھلسنے کی دجہ سے ہو ۲۲ میں دیکھے۔ اور مدر ٹنگھ پانی میں ملا کر جلے ہوئے حصے پر لگائے۔

کارلو دتج - سانس گلا - منہ اور دانت اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے - اور پکھائے جانے کی خواہش۔
چائنا آف - جنون کی کمی کی دجہ سے بیہوشی - کانوں میں گھنٹیاں بچیں - مچانے جانے کی خواہش یا ٹیپرکیم - ذہنی صدمہ جس کا نتیجہ افسردگی ہو کوئی مسکراہٹ نہ ہو اور مریض بالکل نہ بولن چاہے اسے خوراک اچھی نہ لگے - زندگی میں کوئی دلچسپی نہ رہے - یہ صدمات علیحدگی یا محبت میں ناکامی یا کسی اور نامعلوم دجہ سے ہوں - ذہنی صدمات اعصاب - سن ہونا اور کانپنے کا باعث ہو یا ذہنی صدمات بے عمدت

اپریشن کے بعد کی تکالیف

فاسفورس - اونچی خوراک پیٹ کے اپریشن سے ایک دن پہلے دی جائے۔ یہ قلی اور اپریشن کی بے چینی کو دور کر دے گی۔ اعصابی مریضوں میں عضو کاٹنے سے پہلے یا بعد میں اگر بہت

زیادہ خون ہے۔ یہ کھوروں نام کا تریاق ہے اس کے اثرات کو زائل کر دیتی ہے۔ اپریشن کے بعد رت کو روکتی ہے۔ دانت نکالنے کے بعد خون کو بند کرنے کے لئے مفید ہے۔ ۵۴

آرنیکا مانٹ - یہ اپریشن کے صدات کے لئے مفید ہے۔ یہ اپریشن سے پہلے یا بعد میں دی جا سکتی ہے۔ اپریشن کے فوراً بعد دینے پر دکھن اور صدر کو روکتی ہے۔ سر کے زخموں میں سرد کر دیتی ہے۔ اپریشن کے بعد شلنے پر قابو نہ رہنے کو درست کرتی ہے۔

اکونائٹ این - یہ بہت ہی حساس نسیجوں کے اپریشن کے وقت دی جاتی ہے۔ جیسے کہ آنکھ آنکھ یا دیناب کی نالی۔ یہ آرنیکا مانٹ سے بہتر نتائج دیگی جو کہ بڑے بڑے اپریشنوں میں دیکھائی پائیے۔ رشاکس - دکھن اور درد کو بے چین اور دوسری تکالیف کو جو کہ اپریشن کے بعد ہوں پیٹ کے غلبے پر قصائی حصہ میں ہو۔

پلسٹیللا - جہاں پر مریض ہاتھوں کو سر کی پشت پر رکھ کر لیٹے ہو ا کے لئے ضرورت مند ہو اکثر وہ منہ کو دھونا چاہے۔

نکسوایکا - یہ اپریشن کے بعد کی تھکائی کے ساتھ زیادہ آبکیاں اور مریض کی بے چینی شامل ہو۔ ایلیم پیسا - کٹے ہوئے بازو کے تھے پر انھماکی درد۔ در دیں۔ دھاگے کی طرح ہارک اور گولی لگنے جیسی در دیں ہوں۔

امونیا میور - پاؤں کو کاٹنے کے بعد بھارنے والی، موٹی لگنے جیسے درد، رات کے وقت بستر میں تکلیف زیادہ۔ ماش کرنے میں افاقہ ہو۔

مائپیریکم - انگلی کے آخری پورے کاٹنے پر تیز گولی لگنے جیسے درد۔ مارنے کی کی جبر سے انگلی کٹ جانے پر، صدیوں شدید ہوں۔ ناقابل برداشت اور زخم کے مقابلے میں بہت در دیں ہوں۔ سیفسگیر یا - جب پاؤں کے کاٹنے کا احساس سر جری کے کافی بعد لگے ہے۔ درد اور بے چینی ایک غوراک دینے پر ہی درد رک جائیگی۔ پیشاب کی نالی کے پھیلنے پر تکلیف۔ اپریشن کے بعد غیر متعین زخم۔ ورٹیرم الیم - اپریشن کے بعد شدید کڑوی، ٹھنڈے پسینے جسم ٹھنڈا خاص طور پر ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے۔ چہرہ زرد۔ خدو خال بے ڈھنگے۔ بے چینی اور تشنہ کے درے۔

کیمفر۔ یہ درمیزم البم سے زیادہ خطرناک یا شدید کیسوں کو ٹھیک کرتی ہے۔ صدر نمایاں ٹھنڈا سانس
نبض کمزور لیکن تیز۔ زبان اور ہونٹ کانپیں۔ سانس کا عمل سُست اور آہیں۔
کاربو ویک۔ نزعی حالت میں شدید اور مایوس کن حالات۔ بیہوشی جو محرکات سے زلٹوٹے بغیر مشکل سے
محسوس ہو اور خراٹے دار سانس ہوں۔

سٹرانیٹیم کارب۔ سرچکل آپریشن کے بعد کے صدر سے خون کا زیادہ بہنا۔ ٹھنڈک اور پیسے۔

اوپیم۔ { کافی لمبی بے ہوشی کے لئے اگر اوپیم ناکام ہو جائے
ہیپلی پورس۔ { تو ہیپلی پورس استعمال کرائیے۔

پائیر و جینم۔ آپریشن کے بعد گلے ٹٹنے کی حالت میں دیکھئے۔

تنگ جوتوں کے زخم۔

”کاٹنے کے زیر عنوان ملاحظہ فرمائیے۔

گوتاہ قد۔ ناکہ۔

ٹیوبرکولینم۔ { یہ ادویات ۲۰۰ ملات میں ہر ہفتہ اول بدل کر چھ ماہ تک یا زیادہ دیر تک
برٹیا کارب۔ { دی جائیں۔ قدموں ۱۰ سال سے ۱۴ سال کی عمر تک بڑھے کا امکان ہوتا ہے
تھو جا۔ { جتنی چھوٹی عمر ہوتے ہی اچھے نتائج کی توقع ہوتی ہے۔

بو۔ بوورسٹا۔ بغلوں میں بو۔

نکس ماسکٹا۔ عورتوں کی بغلوں کے پیچھے اور چھاتیوں میں بدبو۔

خواب خرامی۔ سوتے میں چلنا

آریٹمیز یا دلگیریس۔ سوتے میں چلنا یا کوئی اور کام کرنا۔

نیٹرم میور۔ سوتے میں اٹھ کر بیٹھ جانا۔

اگیشیا۔ ہر چیز جو گلی میں سے گزرتی ہے اسکو دیکھتا ہے لیکن جاگنے پر معمول جاتا ہے۔ صاف طور پر دماغ کی اندرونی حالت کو بتاتا ہے (عزت نفس کے مجرد ہونے کی وجہ سے)

غنفورگی

ایسلی بورکس۔ شعور کے ہوتے ہوئے کوئی بھی چیز دیکھی یا سنی نہ جائے۔ ہر چیز اپنا ذائقہ کھو بیٹھے۔
ریڑھ کے گوڑے میں سے ریڑھ کی ہڈی
کے اندرونی اجزاء کا خارج ہو جانا۔

ٹیوبرکولنیم۔ اس دوائی سے علاج شروع کرنا چاہیے ۲۰۰ طاقت کی ایک خوراک دیجئے۔
سلیشیا۔ ٹیوبرکولنیم ۲۰۰ x کی ایک خوراک دینے کے ایک ہفتہ بعد سلیشیا ۲۰۰ کی تین خوراکیں
دن میں، پندرہ دن تک جائیں اس کے بعد سلیشیا دوبارہ دی جائے اس کے بعد آرسینک آئیوڈ
دی جائے۔ ٹیوبرکولنیم ۲۰۰ x صحت ۲ ماہ میں ایک دفعہ دہرائی جائے۔

کلکیر یا کارب۔ جب آرسینک آئیوڈ مناسب کام نہ کرے تو کلکیر یا کارب دی جائے۔

ریڑھ کے مہروں کی سوزش

کلکیر یا فلور۔ گردن کے غدود اور گوشت، سخت۔ کیلشیم کا جماد۔ پتھر جیسی سختی ریڑھ کے
جوڑوں کے درمیان سوزش۔ چکر۔ کم درد جوڑوں میں کرکن۔ مریض ٹھنڈا اور خدار موسم سے حساس
ہو۔ آرام کرتے وقت زیادتی مرض ہو گرمی سے اتفاق ہو۔

نیفالیسم۔ سرچاڑے خاص طور پر اٹھنے پر، بازوؤں کا سس ہونا درد سے بدلے۔ یعنی جب بازو
سُن ہوں تو درد نہ ہو اور جب درد ہو تو بازو سُن نہ ہوں۔ ٹانگ کے اگلے اعصاب میں کاٹنے
والا تیز درد۔ رانوں میں اور پٹھے کے ٹھنڈے میں پھاڑنے والا درد لیٹنے پر زیادہ ہو بیٹھنے پر ناقص ہو۔

میٹھور نیم۔ جب میٹرھا کھڑا ہو تو جگر آئیں۔ گردن سخت۔ گردن کے پھوں میں ناخن۔ بازوؤں کا سن ہوجانا۔ جھنڈا درد۔ چنڈیا پر وزن اور دباؤ۔ ہاتھوں اور پاؤں کی جلن۔ اعصاب کا نہیں۔ اور جھنجھٹا۔ بازوؤں کا استسار۔ ناقابل برداشت درویں۔ اذیت بخش اعصابی درد۔ صبح سے شام تک زیادتی ہو۔ ساحل سمندر اور معدہ کے بل لینے پر فاقہ۔

رہوڈوڈنڈرون۔ گردن کی گڈی کے پھوں کا دباؤ اور کھنچاؤ۔ گردن سخت۔ گڈی کی سختی کم اور کندھوں میں پھاٹنے والے درد۔ بازوؤں کی جھنجھٹ اور بھاری پن اور انگلیوں کے سرے جیسے کہ ان میں دوران خون نہ ہو۔

لیڈم۔ کندھوں، ہاتھوں اور بازوؤں میں کھینچنے والے اور پھاٹنے والے درد۔ ہاتھوں اور بازوؤں کو اوپر اٹھانے پر یا ہلانے پر پھاٹنے والی درد۔ ہاتھوں میں ڈنگ لگیں اور بازوؤں اور ٹانگوں میں بے حسی۔

فلورک ایسٹر۔ گردن کی گڈی میں سختی اور درد۔ کمزوری اور لنگر اپن۔ بازوؤں اور گردن کا سن ہونا۔ انگلیوں میں سوئی چھبنا۔ لکھنے میں درد اور تکلیف۔ چوڑوں کی ہڈیوں میں اور پاؤں کے تلوؤں میں سوئی لگنے جیسے درد۔ ٹانگیں سوجائیں۔ یہ دوائی ہڈیوں کے زائد بھنے کو نرم کرتی ہے اور جذب کر لیتی ہے۔

کاسٹیکم۔ گردن کے غدودوں کی سوزش۔ گردن کی گڈی میں دباؤ اور سختی۔ کندھوں میں درد۔ بازوؤں اور ہاتھوں میں درد اور کھنچاؤ۔ دائیں ہاتھ میں فالجی احساسات۔

کالوفائیلیم۔ گردن کی گڈی کی سختی۔ سر کو حرکت دینے والے ہاتھ میں کھنچاؤ اور سر بائیں طرف کو کھینچ جائے۔ انگلیاں بہت سخت اور کھینچی ہوئیں۔ جب ہاتھ کی ٹھلی بند کرے تو کاٹنے والی دریں۔

اکٹیا پائیکاٹما۔ بازوؤں میں لنگر پن کا احساس۔ خاص طور پر دائیں بازو میں۔ ہاتھوں کی فالجی کمزوری۔ تحصیل دباؤ کے لئے بہت ہی حساس۔

مورچ۔ پھوٹ بھی دیکھئے۔

آرنیکا مانٹ۔ اس دوائی کی مدد سے سناڑہ چھتہ پر لگایا جائے اور اس پر سیٹک دیا جائے اور

اندرونی طور پر... طاقت میں ایک قطرہ ہر پانچ گھنٹے بعد دیا جائے۔ جب افادہ شروع ہو جائے تو دوائی کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہفتہ میں دو دفعہ دہرائیے۔ سیاہ اور نیلے داغ مویج دالے جوڑ اس دوائی سے بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ خاص طور پر بچے دھرتے ہوئے اس کی طرف آئیں ان سے ڈرے۔

رشتا کس۔ جب آرٹیکالاکام ہو جائے یا مویج کو غیر مکمل آرام دے یہ مویج کو بہت کم وقت میں ٹھیک کر دے گی۔ ایک۔ ایم طاقت دیکھئے۔

اگنیشیا۔ دماغی کیسوں میں مظہر ہوتی ہے۔ نیند بہت کم اور بے چینی۔ آواز کا براہ راست نہ کرنا پانی جیسا پیشاب کانپے اور اینٹھن ہو۔

روماجی۔ خاص طور پر کلائی ٹخنہ کی مویج۔ ایک ایم طاقت میں آرٹیکالاکام۔ ایم سے بدل کر ہر تیسرے روز دیکھئے حتیٰ کہ آرام آجائے۔
(دیکھئے پھر افادہ۔ قد۔)

سختی

آرٹیک سلف فلیم۔ زیر غورانی کنبہ رہنے پر تمام جوڑوں کی سختی۔
انٹیم ٹائٹ۔ گردن کی سختی۔ گردن پھیلی ہوئی اور سر پیچھے کو جھکا ہوا۔
رشتا کس۔ سختی جس کو حرکت کرنے پر افادہ ہوا اور جب آرام سے ہو تو زیادتی ہو۔
اکونائٹ این۔ ہوا کے جھونکوں یا سردی کی وجہ سے گردن سخت۔ گردن ہلانے پر درد میں زیادتی۔ درد گردن سے کندھوں تک بڑھے۔
کالچیک۔ سختی کے ساتھ نایج اور درد۔
سہوڈ فینڈرون۔ خشک ٹھنڈی ہواؤں سے طوفانی موسم کے آنے پر تکلیف میں زیادتی۔
چیلیڈونیم۔ دائیں طرف درد اور سختی۔
برائی اونیا الباسختی درد کے ساتھ جو حرکت کرنے پر زیادہ ہو۔

انگوٹھا چوسنا۔

نیٹرم میور۔ بچہ اپنا انگوٹھا چوسے اور ناخنوں کو کاٹے۔ ۱۔ ایم طاقت میں ہر ہفتہ دیکھ کر یوں۔ پریذوں اور چھوٹے جانوروں سے ڈرے۔

دھوپ میں جھلس جانا۔

صال۔ دھوپ میں جھلس جانے کے لئے مخصوص دوائی ہے
نوٹ ۱۔ جلد ہونے حصہ پر ایٹیکا یورٹس مرہم بھی لگائی جاسکتی
ایکونائٹ۔ پریشانی اور موت کے ڈر کے ہمراہ۔ مریض کُندہن۔ بیوقوف اور بیٹھنے پر
زیادتی ہو۔

جیلسم۔ چکر۔ سر کے گرد پی بندھی معلوم ہو پکوں کے بھاری پن کے ساتھ۔ کپٹی میں درد
جو کان تک جاتے اور ناک کے پہلو تک جاتے۔ بدھاس بسر کو نیکی پر اپنی کرنا چاہیے۔
اوپیم ۲۰۰x۔ جب بیہوشی اور تھکاوٹ ہو۔ یہ سیلا ڈونا کے بعد دی جائے۔

گلونا تن۔ زرد چہرے کے ساتھ شدید سرد۔ آنکھیں منجمد۔ سفید زبان بھر پور گول نبض۔
سانس مشکل سے آئے۔ تپ اور معدہ میں ڈوبنے کا احساس۔ درجہ حرارت زیادہ، بعض اوقات
بیہوشی۔ پہلے پہل یہ ہر پانچ منٹ کے بعد دیکھئے پھر وقفہ بڑھا دیجئے۔

سیلا ڈونا۔ سرد چہرے پر اجتماع خون اور گرم۔ اونگھ۔ ہوش کا نہ رہنا۔ ڈھانپنے ہوئے بھول
پرسپنہ۔ کانوں میں سیٹیاں بھیس اور چھاتی میں گھٹن۔

نیٹرم میور۔ سن شدک کے زمن اثرات سرد کے ساتھ گرم موسم کے آنے پر دوبارہ لوٹ آئیں۔
سوزج کی گرمی کی وجہ سے کمزوری اور سرد۔

لیکسس۔ جب سوزج کی گرمی مریض میں سرگرمی اور بیہوشی پیدا کرے۔ گرم پانی سے شدید کمزوری
پیدا ہو۔

پیسینہ - سوزش - گھٹنوں کی سوزش

دیکھئے پسینہ - سوزش وغیرہ -

سیلشیا - جوڑوں میں سوزش ٹھنڈے مریضوں میں جوڑوں کی چکنائی خارج ہونے پر ایسے مریض گرم موسم میں بھی گرم کپڑے پہنیں - متاثرہ حصوں کو گرم کپڑوں کے ساتھ لپیٹنا چاہیے خاص طور پر گردن اور کندھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو - 2×1 یا 2×1 طاقت میں دیکھئے -

ایس میل - گھٹنے کے جوڑوں میں شدید درد اوپر کی طرف اور اگلی طرف زیادہ درد - گھٹنے میں گولی لگنے جیسی درد سفید سوزش اور جلن -

رٹاکس - گھٹنوں کا کنٹھیادی درد - رات کے وقت اور مرطوب موسم میں درد زیادہ - برائی اونیا - گھٹنے کے جوڑوں میں چکنائی کی سوزش - جب پتلے تو سختی ہو سکتی لگنے جیسے درد کھینچنے والے - جھکے وار درد -

پلاسٹیل - گھٹنوں کی سوچن بغیر درد کے - پھاڑنے والی - جھٹکوں والی اور کھینچنے والی دردی گھٹنوں کی گرم سوزش -

آئیوڈم - بہت زیادہ سوزش - جگہ بدلنے والی دردی -

سلفر - گھٹنے کے جوڑوں کا استقاء - گھٹنوں کا نیم حاد درد -

کلیریا کرب - گھٹنوں کے جوڑوں کی بیماریوں کی بنیادی دوائی ہے -

لیڈم - گھٹنوں کی چوٹوں یا زخموں کے لئے جہاں جوڑوں سے مواد برے جھٹھے حاسن دردی -

پھاڑنے اور مسلسل درد والی ہوں -

روڈاجی - جوڑوں کی ہتلی کی سوزش - گھر کی نوکرانی کے گھٹنے کی سوزش -

پیساس

لایکوپس درج - شدید پیاس بہت زیادہ مقدار میں پانی پیئے - من اور من

ٹھنڈا پانی ہی تسلی کرے -

ایلیم ٹائیوا - پیاس جو نیند اچاٹ کر دے -
 سلفر - جب بعض زیادہ پانی پئے لیکن بہت کم کھانا کھائے -
 ڈیجیٹالس - بھوک کی غیر موجودگی میں شدید پیاس یعنی بھوک نہ ہو صحت شدید پیاس ہو جب
 سلفر نام ہو جائے تو یہ دی جائے -

آرینیکم البم - تھوڑی تھوڑی مقدار میں تھوڑے تھوڑے وقفے پر پانی کی پیاس منہ خشک ہو -
 کلکیر یا آرینیکم - ٹھنڈے پانی کے لئے پیاس لیکن خوراک کھانے کی بالکل خواہش نہ ہو -
 کینتھرس - گلے میں پیاس لیکن ذہنی طور پر پانی سے نفرت ہو - گلے میں جلن -
 گوانیکم - خوراک اور دودھ سے نفرت شدید پیاس ہو -

انجماد خون

لو تھروپس لین - انجماد خون کے لئے چوٹی کی دوائی ہے - یہ انجماد خون کے لئے ادھر تک
 مطابقت کرنے کی قابلیت -

کلکیر یا آرینیکم - تھوڑی تھوڑی - ضمنی خرابیوں کے سرکٹ غیر معمولی طور پر بڑھ گئے ہوں -
 ایپس میل - راتوں کے جھکاؤ کے درمیان میں - ایک موٹی رسی راتوں کے اندر دنی وطن -
 ایکسس - ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ انجماد خون کی ایک مخصوص دوائی ہے -
 سمبل - انجماد خون میں بہت مفید تباہی جاتی ہے -

ادیکھے گارڈی کے سفر کی تکالیف

گوٹر - (عورتوں کے اعضائے تناسل کے تحت گوٹر بھی دیکھئے)

کلکیر یا فلور - سخت گولے اور گانٹھیں - سخت غدد پتھر کی طرح سختی - ٹھنڈے پھوٹے کیلئے
 شاندار اور انتہائی موثر دوائی ہے - کینسر کو بخشنے رکھتی ہے - عورتوں کی چھاتیوں میں سخت گولے
 کو نیم - جھاوڈا لے غدد میں بہت زیادہ سختی رات کو تکلیف کی زیادتی - کینسر - چھاتیوں کے
 گوٹر یا - کینسر کی ابتدا - غددوں کی چوٹ اور خراش کیلئے سب سے بڑی دوائی ہے -

میگ کارب - اس سے گوٹروں کا علاج کیا گیا ہے جو کہ جسم پر واقع ہوں۔
 برہمیرس و لیکرس - گوٹروں اور ان کے اکاؤ کے لئے۔

تھوچا - پریمیجان اور ملید باز لوگوں میں گوٹروں قبض سے گیس پیدا ہو۔ خالی مکان سورج
 کی گرمی کو برداشت نہ کر سکے۔ ٹھنڈے پانی میں نہانا چاہیے جسم کے نکلے حصوں پر سپینہ۔
 بلیس پی - چوڑوں کی وجہ سے اُگے ہوئے گوٹروں - اگر ٹی بھی متاثر ہوئی ہو تو سینوٹھس
 x9 کو ادل بدل کر دیں۔

ریڈم بروم - یہ دوائی کینسر میں بطور عمل انگیز دی جاسکتی ہے۔ کینسر کی یہ بھی حالتوں
 میں انتہائی مفید ثابت ہوئی ہے۔
 لیس الیا - یہ چھاتی کے کینسر کو ابتدائی دور میں روک دیتی ہے۔

ہیکلا لاوا - یہ گوٹروں کے لئے مفید ہے۔ گوٹروں کی تکلیف یا درد کو کم کر دیتی ہے اسلئے مافیا
 کے انجکشن کی جگہ کام کرتی ہے۔ رخص کی مخصوص شکل نمونہ زرد تھکا ہوا اور کمزور دھاتی دیکھا جاتا ہے۔
 کلکیر یا کارب - خنازیری مزاج آدمیوں میں گوٹروں عصب کے پھوڑے میں مایا پائپ لائن کرنا تو ہے۔
 گوٹروں یا گوٹروں جو چاہتے بعد دوبارہ ظاہر ہوں۔ افراط خون والے گوٹروں جو خون ملا مواد رکھتے ہوں
 بریٹا کارب - گوٹروں خاص طور پر گردن کے چڑیلے گوٹروں خاص طور پر کمر کے ٹھوں میں متاثر۔
 فاسفورس - گردن پر گوٹروں۔

ہائیڈروکس - گلہن اور دم کے لئے مفید ہے۔ یہ سادہ غدد کے گوٹروں کی تکلیف کو کم کرتا ہے۔
 کاربو انجیلیس - پستانوں کے گوٹروں یا کینسر یا چھوٹی چھوٹی گانٹھیں جو پتھر کی طرح سخت ہوں۔ بغل
 کے غدد دوسرے ہوئے پستانوں سے کھینچنے والے درد کے ساتھ۔

کالی سائیم - دماغ کے گوٹروں جو شدید سر درد پیدا کریں۔
 آرٹیکا مانٹ - دی گئی ترتیب میں ۶ ماہ کے لئے استعمال کیجئے۔ دن میں دو دفعہ صبح ایک
 ہائیپریم { خوراک شام ایک خوراک رات بجے۔
 بریٹا آئیوڈ - سخت گوٹروں۔

طمی دنبل - گوشتین

برٹیا کارب - جلن خاص طور پر گردن میں -
 کرڈٹیلز ہووے - خبیث گومڑ جلن کے ہمراہ
 سیفگیر یا - اعلیٰ گومڑ کے لئے جب کلکیر یا کارب ناکام ہو جائے -
 ٹیکہ - ویکسینیشن -

قھوجا - اگر ٹیکے (ویکسینیشن) کے ہمراہ دی جائے تو ٹیکہ
 کا اثر نہ ہوگا - ٹیکے کے بُرے اثرات کے لئے جیسے کہ اگزیمیا وغیرہ -
 ویکسینیم - ٹیکے کے بُرے اثرات کیلئے سوزش اور متاثرہ حصہ سے مواد کا بہنا -
 انٹم نارٹ - ٹیکوں کے بُرے اثرات کے لئے جب قھوجا ناکام ہو جائے -

ڈٹامنز

ہرمین پٹھک نکتہ نگاہ سے ڈٹامن مقبوری بہت اہمیت رکھتی ہے -
 ڈٹامن کی گولیان اور کیپول جو ڈٹامن اے بی سی مختلف نکلیات کی کمی کو دور کرنے کیلئے
 دی جاتی ہیں جو روزمرہ کی خوراک میں سے جسم کو میسر نہیں آتیں - ڈٹامنز کی مقبوری اتنی کامیاب
 مقبوری نہیں ہے - ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانی جسم کو خوراک میں سے ڈٹامن حاصل کرنے
 کے اہل بنا ضروری ہے - ایسے ہو مو پتی معقول شہادت دیتی ہے - یہ صرف مزدوں ادویات ہی
 نہیں رکھتی جو جسم کو نکلیات کی کمی پورا کرنے میں مدد دیتی ہے - بلکہ ادویات نظام جسم کو خوراک
 میں سے مطلوبہ ڈٹامن استعمال کرنے کے اہل بنا دیتا ہے - شمال کے طور پر کیلیم کے نکلیات
 کی کمی آسانی کے ساتھ کلکیر یا ناس ۶ طاقت یا کم طاقت میں دینے سے پوری ہو سکتی ہے -

مٹے - موٹکے -

قھوجا - ایک ساتھ ابھرنے والے مٹوں کی طرح کی ٹہنیاں
 سر کے پھل طرف - ٹھوڑی وغیرہ پر چٹے، سیاہ مٹے - بڑے بچوں جیسے تے والے بعض

طعی ذیل - گوشتین

برٹیا کارب - جلن خاص طور پر گردن میں -
کروٹیل سہور - خبیث گومڑ جلن کے ہمراہ
سیفگیر یا - اعصابی گومڑ کے لئے جب کلکیر یا کارب ناکام ہو جائے -
ٹیکہ - ویکسینیشن -

تھوجا - اگر ٹیکے (ویکسینیشن) کے ہمراہ دی جائے تو ٹیکہ
کا اثر نہ ہوگا۔ ٹیکے کے بُرے اثرات کسے لئے جیسے کہ اگزیمیا وغیرہ -
ویکسینیم - ٹیکے کے بُرے اثرات کیلئے سوزش اور متاثرہ حصہ سے مواد کا بہنا -
انٹیم نارٹ - ٹیکوں کے بُرے اثرات کے لئے جب تھوجا ناکام ہو جائے -

ڈاٹامنٹر

ہو میو پیٹک نکتہ نگاہ سے ڈاٹامن تھویری بہت اہمیت رکھتی ہے۔
ڈاٹامن کی گولیان اور کیپول جو ڈاٹامن اے بی سی مختلف نکلیات کی کمی کو دور کرنے کیلئے
دی جاتی ہیں جو روزمرہ کی خوراک میں سے جسم کو میسر نہیں آتیں۔ ڈاٹامنٹر کی تھویری اتنی کامیاب
تھویری نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانی جسم کو خوراک میں سے ڈاٹامن حاصل کرنے
کے اہل بنانا ضروری ہے۔ ایسے ہو میو پیٹھی معقول شہادت دیتی ہے۔ یہ مرنہ خوردوں ادویات ہی
نہیں رکھتی جو جسم کو نکلیات کی کمی پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بلکہ ادویات نظام جسم کو خوراک
میں سے مطلوبہ ڈاٹامن استعمال کرنے کے اہل بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کیلسیم کے نکلیات
کی کمی آسانی کے ساتھ کلکیر یا ناس ۶ طاقت یا کم طاقت میں دینے سے پوری ہو سکتی ہے۔

مٹے - موٹکے -

تھوجا - ایک ساتھ ابھرنے والے مٹوں کی طرح کی ٹھنڈیاں
سرکے پھل طرن - ٹھوڑی وغیرہ پر چٹے، سیاہ مٹے۔ بُرے بیجوں جیسے تنے والے بعض

اوقات ان سے غمی خارج ہو اور آسانی سے خون بہے۔

کلکیر یا کارب - جھوٹے سینک جیسے متے بہت زیادہ تعداد میں غارش والے اور ڈنگ گئے جیسے درد والے متے - سو جے ہوئے اور ناسوری متے۔

سلفر - سخت درد والے - اور تپکن دار۔

فیٹرم میور - ہتھیلیوں پر متے۔

کالی میور - ہاتھوں پر متے۔

سیپیا - ہر ذکر کے کنارے پر متے جسم پر بڑے سخت اور سیاہ متے۔

کاسٹیکم - متے جو بنیاد پر سے نرم ہوں - سینک جیسی سطح پر ہاتھوں اور بازوؤں پر متے پلگوں اور چہرہ کے متے بہت سے جھوٹے جھوٹے مے۔

روٹاجی - متے دردوں والے - چپٹے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ہوا رہتے۔

ڈلکا مارا - ہاتھوں کی پشت پر متے۔

سٹیفگیس یا - آتش یا سوزاک کے باعث متے - خشک تے والے متے - گو بھی کے بھول جیسے بارے کے غلط استعمال کے بعد متے۔

ٹائٹرک الیڈر - مے آلات تامل پر کے مے سائیکوٹک یا سفلیٹک بڑے بڑے دانے دار - تے دار - دھونے پر آسانی سے خون بہے غمی خارج ہو چکنے والی۔

میگنیشیا سلف - سارے چہرے پر متے۔

سبائنا - آتشکی یا سوزاک مے ، ناقابل برداشت غارش اور جلن کے ساتھ۔

فیٹرم پیکریم - کئی کئی متے - ہاتھ متوں سے بھرے ہوئے ہوں - چند ہی یا گٹوں کے مے مخصوص دوائی ہے۔

فیٹرم کارب - ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر مے - جھوٹے پر دکھیں

طمانگوں کی سوچن - بھڑیاں (سوکھتاں بھی دیکھئے)

لائیکو پوڈیم - تجری دار اور بیماریار دکھائی دے خاص پر جسم کے والا حصہ ماتھے پر بھڑیاں ہوں۔
... .. کو روادر - ذکر سک۔